ہیومن اناٹومی و فزیالوجی

تشریح و فعلیات پر ایک جامع کتاب

www.KitaboSunnat.com



حکیم غلام جیلانی خان

پبلشر: ادارہ تحقیقاتِ طبِ یونانی فیصل آباد

بسم اللہ الرحمن الرحیم

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب .....

- عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

- کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں﴾

- نشرواشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com
www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com

ہیومن اناٹومی و فزیالوجی - ود بکچر

یا

تشریح انسانی ومنافع الاعضاء

(MODIFIED EDITION)

علم تشریح و منافع اعضا اپنی نوعیت کی واحد کتاب ہے جو کہ سلیبس کے عین مطابق تیار کی گئی ہے۔ لیکن ہر ایک جگہ پر طبی اور ڈاکٹری اصلاحات کا (COMPARISON) کیا گیا ہے۔ اس میں تمام اعضاء جسم کی تفصیل اور اُن کے افعال و وظائف کا مفصل بیان کرتے ہوئے اکثر اختلافی مسائل میں اطباء یونانی اور ڈاکٹرز کے (IDEAS) کا (COMPARISON) کر کے تحقیق شدہ مصدقہ (AFFIRMATIONS) کو بیان کیا گیا ہے۔ اور منافع اعضاء میں (LATEST INFORMATION) کا اضافہ کیا گیا ہے۔

(This Book contains the Modern Data)

شمس الاطبا حکیم و ڈاکٹر غلام جیلانی خان صاحب
سابقہ میڈیکل آفیسر زدی گریٹ برٹن۔ ایران و رکن مجلس حفظ وصحت

عمدۃ الحکماء وزبدۃ الحکماء پنجاب یونیورسٹی و اسلامیہ کالج لاہور

قیمت :- -/48 روپے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

میں نے اس کتاب کو وسیع مطالعہ کے بعد لکھا ہے

اس کتاب کے دوران تالیف میں تشریح ومنافع الاعضاء کی اُردو، فارسی، عربی اور انگریزی کی بہت سی کتابیں میرے پیش نظر رہی ہیں۔ لیکن انگریزی کی مندرجہ ذیل کتب فزیالوجی سے میں نے خاص طور پر استفادہ کیا ہے۔ اس سے آپ اس کتاب کی خوبی واہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

(۱) ہینڈ بک آف فزیالوجی۔
از ڈاکٹر ہیلی برٹن۔ ایم۔ ڈی
(۲) ہینڈ بک آف فزیالوجی از ڈاکٹر ہرلس ایم۔ ڈی۔
(۳) ٹیکسٹ بک آف فزیالوجی از ڈاکٹر ہاول ایم۔ ڈی۔
(۴) اِسنشیلز آف فزیالوجی از ڈاکٹر بین برتج ایم۔ ڈی۔
(۵) لیسن آن ایلی مینٹری فزیالوجی۔
از ڈاکٹر ہکسلے ایم ڈی۔
(۶) ہیومن فزیالوجی از ڈاکٹر فرنوکس
(۷) فزیالوجی فار بگنرز از ڈاکٹر فاسٹر۔

علاوہ ازیں تاریخ تشریح ومنافع الاعضاء کے لکھنے میں نے مندرجہ ذیل کتب تاریخ وغیرہ سے استفادہ کیا ہے

(۱) ہسٹری آف میڈیسن از ڈاکٹر گارٹن صاحب۔
(۲) روحنیس آف میڈیسن از میکفی صاحب۔
(۳) شارٹ ہسٹری آف آرین میڈیکل سائنس۔
از سر بھگونت سنگھ جی۔ ایم۔ ڈی۔
(۴) ہسٹری آف میڈیکل آرٹ از ہیراجی ایڈلجی مطبوعہ بمبئی ۱۸۸۰ء
(۵) میڈیسن آف اینشینٹ انڈیا از روڈلف
(۶) انسائیکلوپیڈیا برٹینکا۔
(۷) ہارمزورتھ انسائیکلوپیڈیا۔

"جیلانی"

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔

نحمدہٗ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم وآلہٖ واصحابہٖ اجمعین۔

تشریح ومنافع الاعضاء

العلم علمان علم الابدان وعلم الادیان

دیباچہ

دنیا میں جو قدرتی اجسام نظر آتے ہیں۔ وہ دو قسم کے ہیں (۱) بیجان اجسام (۲) جاندار اجسام

بیجان اجسام (اجسام غیر جنبہ یا اجسام جامدہ۔ ان اینی میٹ باڈیز) میں نہ تو جان ہوتی ہے نہ اعضاء جسم اور نہ نمود بالیدگی۔ جیسے پتھر ایسے اجسام کا بیان علم المعادن (میزالوجی — Minexology.) کے متعلق ہے **جاندار اجسام** (اجسام حیہ۔ اجسام نامیہ۔ اینی میٹ باڈیز) میں جان یعنی زندگی وحیات سب سے بڑی صفت ہے ایسے اجسام مختلف اعضاء سے مرکب ہوتے ہیں۔ ان میں نمود بالیدگی ہوتی ہے۔ جیسے نباتات وحیوانات ایسے اجسام کا بیان **علم الحیات** (بائی آلوجی۔ Biology.) کے متعلق ہے لیکن تسہیل بیان کے لیے ان میں سے نباتات کا بیان **علم النباتات** (بٹنی Botany.) کے متعلق ہے اور انسان کے سوا دیگر حیوانات کا بیان **علم الحیوانات** (زوالوجی۔ Zoology.) کے متعلق ہے۔ **علم الحیات** (بائی آلوجی) میں جاندار اجسام کا بیان ہوتا ہے اس علم کے دو حصے ہیں (۱) **علم ہیئت اجسام** (مارفالوجی Morphology.) اس میں زندہ اجسام کی شکل و ساخت کا بیان ہوتا ہے **علم تشریح** (اناٹومی۔ Anatomy.) بھی اس میں شامل ہے۔ کیونکہ اس میں بھی زندہ اجسام یا ان کے اعضاء کی ساخت کا بیان ہوتا ہے (علم افعال الاعضاء (فزیالوجی۔ Physiology.) جس میں اعضاء جسم کے افعال و وظائف کا بیان ہوتا ہے۔ مثلاً آنکھ اور جگر دو مشہور اعضاء جسم ہیں۔ علم تشریح میں تو ان کی صرف شکل وساخت کا بیان ہوتا ہے۔ مثلاً آنکھ کی شکل گول ہوتی ہے۔ اس میں تین طبقات

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اور تین رطوبات ہوتی ہیں۔ جگر کے پانچ لوتھڑے ہوتے ہیں وغیرہ لیکن علم منافع الاعضاء میں ان کے افعال و وظائف کا بیان ہوتا ہے۔ یعنی آنکھ کس طرح دیکھتی ہے اور جگر کس طرح سے صفراء پیدا کرتا ہے؟ وغیرہ۔

پھر نباتات وحیوانات کی شکل وساخت کے بیان کے اعتبار سے علم تشریح کی دو قسمیں ہیں (۱) تشریح نباتی (باٹنی Botany.) اور (۲) تشریح حیوانی (اناٹومی Anatomy. جس کی پھر چند قسمیں ہیں۔ اور تشریح انسانی (ہیومن اناٹومی Human Anatomy بھی اس کی ایک خاص قسم ہے جس کا کہ اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے اسی طرح نباتات وحیوانات کے افعال الاعضاء کے بیان کے اعتبار سے علم الاعضا کی بھی دو قسمیں ہیں (۱) افعال الاعضاء نباتی (ویجی ٹیبل فزیالوجی Vegetable Physiology. اور (۲) افعال الاعضاء حیوانی (اینیمل فزیالوجی Animal. Physiology جس کی ایک بڑی اور مہتم بالشان قسم افعال الاعضاء انسانی (ہیومن فزیالوجی Human Physology. ہے۔ جس کا کہ اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔

اب ذیل میں علم تشریح کی تعریف اور اسکے دیگر اقسام کا بھی مختصر بیان کر دیا جاتا ہے۔

تعریف واقسام تشریح

عربی لفظ تشریح اور انگریزی لفظ اناٹومی دونوں کے لغوی معنی ہیں چیرنا پھاڑنا اور اصلاحی معنی ہیں۔ وہ علم جو کہ لاش چیرنے سے حاصل ہوتا ہے پس لغوی اور اصطلاحی معنوں کے اعتبار سے تشریح (اناٹومی) کے دو حصے ہیں (۱) تشریح علمی یعنی علم تشریح جس میں مختلف اعضاء جسم کی ساخت اُن کی وضع اور ان کے باہمی تعلقات کا بیان ہوتا ہے (۲) تشریح عملی یا عمل تشریح (ڈی سیکشن Diesction. پریکٹیکل اناٹومی Practicat Anatomy جس میں عمل تشریح یعنی لاش چیرنے کا بیان ہوتا ہے۔

لیکن بعض دیگر اعتبارات سے علم تشریح کی یہ چند قسمیں ہیں۔

(۱) تشریح بیانی (ڈسکرپٹو اناٹومی) جس میں اعضاء کی ساخت بحالت صحت کا بیان ہوتا ہے

(۲) تشریح مرضی (مارباڈ اناٹومی) جس اعضاء کی ساخت بحالت مرض کا بیان ہوتا ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(۳) تشریح طبی (میڈیکل اناٹومی) جس میں طبی امراض میں احشاء کے باہمی تعلقات کا بیان ہوتا ہے
(۴) تشریح جراحی (سرجیکل اناٹومی) جسمیں اعمال جراحیہ کے اعتبار سے اعضاء کے حالات کا بیان ہوتا ہے
(۵) تشریح سطحی (سرفیس اناٹومی) جسمیں بیرونی سطح جسم پر نشان لگاکر اندرونی اعضاء کے وضع قیام کا بیان ہوتا ہے
(۶) تشریح مقامی (ریجنل اناٹومی) جس میں خاص خاص مقامات جسم کی تشریح خصوصی کا بیان ہوتا ہے۔
(۷) تشریح تشخیصی (ایپلائڈ اناٹومی) جس میں بحالت مرض تشخیص و علاج کا بیان ہوتا ہے۔
(۸) تشریح دقیق (مائی نیوٹ اناٹومی) جس اعضاء کی دقیق خردبینی ساخت کا بیان ہوتا ہے۔
(۹) تشریح مقابلہ (کمپیریٹو اناٹومی) جس میں مختلف حیوانات کے اعضاء جسم کا تشریحی مقابلہ ہوتا ہے

مذکورہ بالا اقسام تشریح میں سے اس کتاب میں زیادہ تر تو تشریح بیانی کا ہی بیان ہے لیکن سوائے تشریح مقابلہ کے دیگر اقسام تشریح کا بھی ضمناً مختلف مواقع پر مختصر بیان کیا گیا ہے

ضرورت تشریح ومنافع الاعضاء

چونکہ علم طب کا موضوع جسم انسانی ہے۔ اس لیے علم طب کی تحصیل میں پہلے جسم انسان کے اعضاء کی ساخت یعنی تشریح اور ان کے افعال یعنی افعال الاعضاء کا جاننا ضروری بلکہ لازمی ہے کیونکہ جب تک اعضاء جسم کی ساخت اور اُن کے طبعی افعال کا علم نہ ہو تب تک اُن کی حالت صحت کا علم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب کسی عضو کی طبعی ساخت یا طبعی فعل میں فرق آجاتا ہے تو اسکی حالت کو مرض کہتے ہیں۔

اگرچہ علم طب کے تمام اجزا یعنی تمام علوم طبیہ {علم کیمیا (کیمسٹری Chemistry) علم طبیعیات (فزکس Physies) علم الحیات (بائی آلوجی Biology) علم تشریح (اناٹومی) علم افعال الاعضاء (فزیالوجی Physiology) علم الامراض (پیتھالوجی Pathology) علم طب (میڈیسن Medicine) علم الجراحت (سرجری Surgery) علم الادویہ (میٹریا میڈیکا Materia Medica) علم العلاج (تھراپیوٹکس Therapeutics) علم القابلہ (مڈوائفری Midwifery) طب قانونی (میڈیکل جورس پروڈنس Medical Jurisprudence) وغیرہ وغیرہ} باہم اس قدر متحد و مربوط ہیں۔ کہ جب تک ان سب

۱ Medical Anatomy ۲ Surface Anatomy ۳ Regional Anatomy
۴ Applied Anatomy ۵ Minute Anatomy ۶ Compaiative Anatomy

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کی تحصیل وتکمیل نہ کی جائے تب تک کبھی کوئی طبیب یا جراح اپنے منصبی فرائض کو بخوبی انجام نہیں دے سکتا لیکن تمام علوم طبیہ میں علم تشریح وعلم الاعضاء اقدم واہم ہیں۔ بلکہ یہ علم طب کی بنیاد ہیں کیونکہ علم تشریح میں اعضاء کی ساخت وشکل اور علم منافع الاعضاء میں ان کے افعال ووظائف بتلائے جاتے ہیں، اور انہی پر ساری طب کا دارومدار ہے۔

اگرچہ علم وعمل تشریح دونوں لازم وملزوم ہیں۔ لیکن ان میں بھی علم تشریح مقدم ہے بالخصوص تشریح بیانی (ڈسکرپٹو اناٹومی) Descriptive Anatomy. کیونکہ تشریح مرضی (مارباڈ اناٹومی) Morbid Anatomy. کا زیادہ تر علم وعمل طب میڈیسن Medicine. اور علم جراحت (سرجری) Surgery سے ہے۔ اور تشریح جراحی سرجیکل اناٹومی Surgical Anatomy تو اعمال جراحیہ یعنی دستکاری (آپریشنز) کیلئے نہایت ضروری بلکہ لازمی ہے، کیونکہ تاوقتیکہ جراح کسی حصہ جسم کی تشریح یعنی اس کے مختلف رگ ریشہ سے بخوبی واقف نہ ہو وہ اس پر بلا خوف وخطر اور کامیابی سے آپریشن یعنی دستکاری نہیں کرسکتا اسی طرح تشریح سطحی سرفیس اناٹومی Surface Anatomy. جاننے کے بغیر اندرونی اعضاء جسم کے طبعی مقام ووضع قیام سے واقفیت نہیں ہوسکتی جسکے بغیر انکی غیر طبعی حالت مرض کا علم نہیں ہوسکتا علم تشریح کے ساتھ ہی علم افعال الاعضاء کا جاننا بھی نہایت ضروری ہے بلکہ ان دونوں کو پہلو بہ پہلو مطالعہ کرنا مناسب ہے۔ لیکن ساتھ ہی علم کیمیا (کیمسٹری) Chemistry. وعلم الطبیعات فزکس Physics کا جاننا بھی نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ افعال حیات کے ساتھ کیمیاوی وطبعی اعمال کی بطبق (تخصیص) کا نام ہی علم افعال الاعضاء فزیالوجی Physiology ہے یعنی وہی طبعی وکیمیاوی اثرات جو کہ بجان اجسام میں عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آنکھ کو لیجئے علم طبعیات (فزکس) کی وہ شاخ جس کو علم البصریات (آپٹکس) Optics کہتے ہیں اس میں دیگر امورات کے علاوہ وہ قوانین بھی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اشیاء کے عکس لینز کے ذریعے کس طرح ڈالے جاتے ہیں، وہی قوانین ان قدرتی لینز (عدسہ قرنیہ وجلیدیہ) جو کہ آنکھ میں سامنے رکھے ہوتے ہیں۔ ان کے درمیان میں سے بیرونی اشیاء کے عکس آنکھ کے طبقہ شبکیہ (ریٹی نا) پر پڑنے کی تنظیم کرتے ہیں۔ (دیکھو ماہیت بصارت صفحہ ۲۵۷ پر) اسی طرح سے کیمیاوی اعمال یا قوانین کا جو تعلق افعال حیات سے ہے اس کی ایک عمدہ مثال فعل ہضم ہے۔ غذا میں جو بعض خاص کیمیاوی مواد ہوتے ہیں۔ ان پر معدہ وامعاء

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

دربا تنفس اس کی رطوبات ہاضمہ کیمیاوی طریق سے عمل کر کے ان کو تحلیل کرتی اور قابل ہضم وجذب بناتی ہیں (دیکھو غذا کا ہضم ہونا صفحہ ۱۱۹)

لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ آیا کوئی چیز اور بھی ہے؟ یعنی کیا طبعی وکیمیاوی قوانین کے سوا کوئی اور قوانین بھی ہیں جن کا ان کے ساتھ شمار کیا جائے۔ مثلاً کیا کوئی **قوت حیات** (وائٹل فورس Vital Force) ہے؟ اس کے متعلق صاف طور پر یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ کہ عالمان علم افعال الاعضاء (فزیالوجی Phsiology) تاحال اس قابل نہیں ہیں۔ کہ طبعی قوانین سے تمام افعال حیات کو صاف طور پر بیان کر سکیں۔ اور اگرچہ موجودہ حکماء یورپ کا ایک گروہ تو قوت حیات کا قائل نہیں۔ بلکہ وہ تو اس کے تصور یا فرض کرنے کو بھی ضروری نہیں سمجھتا۔ چنانچہ ڈاکٹر ہیلی برٹن ایم۔ ڈی جن کی مؤلفہ مشہور ومستند فزیالوجی اکثر میڈیکل کالجوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ وہ بھی اس گروہ میں شامل ہیں لیکن ایک اور گروہ ہے جو قوت حیات کا قائل ہے اور وہ فزیالوجی کی تعلیم کے لیے علم کیمیا اور علم طبعیات کے ساتھ علم النفس (سکالوجی sychology.) کی تعلیم کو بھی ضروری خیال کرتا ہے لیکن جس طرح فزیالوجی اور اس سے متحدہ دیگر علوم مثلاً پیتھالوجی۔ اناٹومی۔ کیمسٹری اور فزکس میں کوئی قطعی حد فاصل نہیں۔ اسی طرح سے اس کے مذکورہ بالا ہر سہ اقسام یعنی طبعی کیمیاوی وحیاتی اعمال میں بھی کوئی خاص تفریق نہیں یہ بھی مشترک ومتحد خیال کیے جاتے ہیں۔

ہر شخص کو ان علوم کی ضرورت ہے

طبابت پیشہ حضرات کو تو علم تشریح وعلم افعال الاعضاء کا جاننا نہایت ضروری بلکہ لازمی ہے لیکن حفظ صحت کیلئے ہر شخص کو بھی ان علوم کا کچھ نہ کچھ جاننا ضروری اور مفید ہے۔ کیونکہ تندرستی (تن درستی) درحقیقت تن کو درست رکھنے پر ہی منحصر ہے اور تن یا بدن کا درست رکھنا ساخت بدن یعنی علم تشریح اور افعال بدن یعنی علم الاعضاء کے جاننے پر موقوف ہے پس تندرستی کے لیے کچھ نہ کچھ علم تشریح وعلم منافع الاعضاء کا جاننا ہر شخص کے لیئے ضروری ہے۔ اور جس طرح سے بقائے حیات کے لیے دل ودماغ وجگر اعضاء رئیسہ ہیں۔ ان کے افعال ووظائف کا جاننا بقائے حیات کے لیے یقیناً مفید ہے۔ اسی طرح سے بقائے نسل کے لیے اعضاء تناسل

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہیں۔ پس ان کی طبعی ساخت وافعال کا جاننا بھی بقائے نسل کے لیے یقیناً ضروری ومفید ہے۔ لہٰذا ان کے علم کو نفرت وحقارت سے دیکھنا یا نہایت شرمناک خیال کرنا مناسب نہیں۔ اسی لاعلمی سے ملک میں اعضائے تناسل کے امراض روز افزوں ہیں۔ اور ان کے خراب نتائج سے نسل کمزور ہو رہی ہے۔ پس اس لاعلمی کو ضرور دور کرنا چاہیئے۔

تمام حیوانات کو خلاق اکبر نے اعضاء تناسل اور قوت شہوانی عطاء فرمائی ہے۔ اور پھر ان کو ان کے جائز وناجائز استعمال کی عقل وتمیز مرحمت فرمائی ہے۔ ان کے طبعی یعنی جائز استعمال سے تو لذت وآرام حاصل ہوتا ہے۔ اور نسل قائم رہتی ہے۔ لیکن ان کے ناجائز استعمال سے امراض وآلام نصیب ہوتے ہیں۔ اور نسل ماری جاتی ہے۔ اس لیے اس کتاب میں میں نے اعضاء تناسل کی ضروری تشریح اور ان کے افعال ووظائف کو بھی لکھ دیا ہے۔ جس کو خاص وعام بآسانی مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے مطالعہ میں حیا وشرم کو ضرور مدنظر رکھنا چاہیئے۔ کیونکہ یہ اعضاء استحیائیہ ہیں۔

تاریخ تشریح ومنافع الاعضاء

یہ امر مسلمہ ہے۔ کہ علم وعمل تشریح کے بغیر علم وعمل جراحت نہیں آسکتا۔ اور چونکہ بعض قدیم ہندی ومصری ویونانی حکماء علم جراحت میں بھی کمال رکھتے تھے۔ اس لیے وہ یقینی طور پر علم وعمل تشریح سے بھی واقف تھے۔ قدیم ہندی حکیموں میں اشونی کمار[1]۔ دھن ونتری[2] اور بالخصوص سشرت[3] نہایت ممتاز جراح گزرے ہیں۔ قدیم ہندو حکیم مُردوں کو چیر کر عملی تشریح سکھاتے تھے (ملاحظہ ہو مختصر تاریخ آیورویدک مؤلفہ سرگوبند سنگھ جی) چرک[4] کا مقولہ ہے کہ ویدِ حکیم کو اعضاء جسم سے ضرور واقف ہونا چاہیئے۔ اسی طرح سے سشرت علم تشریح کے جاننے کی تاکید کرتا ہے (ملاحظہ ہو تاریخ طب قدیم وجدید مؤلفہ مہراجی ایڈیٹر جی صفحہ

---

[1] اشونی کمار دو ہمزاد بھائی تھے جو فن جراحی میں نہایت ماہر تھے۔ انہوں نے دکش پرجاپتی کے بریدہ سر کو جوڑ دیا تھا۔

[2] دھن ونتری مہاراج ہندی رب الطب ہے۔ یہ حضرت مسیح سے کئی سو برس پہلے ہوتے ہیں۔

[3] سشرت جو دھن ونتری کا شاگرد تھا اپنے وقت کا نہایت کامل جراح تھا۔ سشرت سنگھتا جراحی میں اس کی مشہور کتاب ہے۔

[4] چرک یہ نہایت مشہور قدیم ہندی طبیب بھی حضرت مسیح سے کئی صدیاں پہلے ہوا ہے۔ چرک سنگھتا انہیں کی تصنیف ہے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

قدیم مصری حکیم بھی علم تشریح وعلم جراحت سے واقف تھے چنانچہ قدیم مصری علوم حکمیہ و طبیہ کی ابتداء کو اپنے رب الطب آتھوتوس Authothus سے منسوب کرتے ہیں جس کی مصنفہ ۴۲ کتابوں میں سے ۳۶ فلسفہ اور علوم طبیہ پر تھیں۔ جن میں سے ایک کتاب علم تشریح پر اور ایک علم جراحت پر تھی لیپزگ یونیورسٹی (جرمنی) کے کتب خانہ میں جو نہایت ہی پرانی مصری تحریرات ایبرس[1] پاپیرس نامی موجود ہیں کہتے ہیں کہ ان میں یہ طبی کتب بھی موجود ہیں (بحوالہ تاریخ طب قدیم وجدید ندکورہ) قدیم مصریوں کا رب الشفاء امحوطپ[2] بھی علم جراحت سے واقف تھا۔ اس لیے وہ بھی تشریح جانتا ہوگا (ملاحظہ ہو رومینس آف میڈیسن مؤلفہ میکنی صاحب) تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ قدیم یونانی حکماء واطباء نے علوم حکمیہ وطبیہ میں قدیم مصری حکماء واطباء سے استفادہ کیا ہے (بحوالہ تاریخ طب قدیم وجدید) اسی جراح سے قدیم یونانی اسقلی ہوس[3] کو رب الشفاء یا ربانی طبیب مانتے تھے ابوطب حکیم بقراط[4] Hippocrate. اسی کے خاندان میں سے ہوا ہے۔ بقراط نہ صرف پدر طب بلکہ وہ پدر جراحی بھی تھا۔ اس کی ۷۲ تصانیف میں سے ۶ کتابیں علم جراحت (سرجری) پر ہیں۔ اور چونکہ علم جراحت کے لیے علم تشریح کا جاننا لازمی ہے۔ اس لیے وہ علم تشریح بھی ضرور جانتا تھا بقراط نے علم افعال الاعضاء امتحانی (ایکس پیری منٹیل فزیالوجی) کی بنیاد رکھی (ملاحظہ ہو رومینس آف میڈیسن مؤلفہ میکنی صاحب) اور (دلائف آف ہپوکریٹ بائی ڈاکٹر ایڈیم) بقراط کے بعد ارسطو[5] Aristote یونان میں ایک نہایت نامور اور جلیل القدر حکیم گزرے ہیں سب سے پہلے اسی نے علم تشریح پر ایک کتاب لکھی ہے (ملاحظہ ہو تاریخ طب مؤلفہ گارٹن صاحب جلد اول) ارسطو کی تحریک پر سکندر[6] اعظم نے اسکندریہ میں ایک دارالعلوم (کالج) کی بنیاد رکھی جو ترقی

---

[1] ایبرس پاپیرس حضرت مسیح سے سولہ سو برس پہلے کی لکھی ہوئی مصری تحریرات ہیں جو یورپ کے بعض عجائب خانوں میں محفوظ ہیں ان میں بعض معالجات ایسے مرقوم ہیں جو حضرت مسیح سے ۲۷۰۰ سال قبل لکھے ہوئے ہیں قدیم مصریوں میں مُردوں کو ممبلم یعنی دفن کرنے کی جو رسم تھی۔ وہ درحقیقت تشریح تعلیم تھی ملاحظہ ہو۔ رومینس آف میڈیسن مؤلفہ میکنی صاحب صفحہ ۱۰

[2] امحوطپ قدیم مصریوں کا رب الشفاء تھا۔ وہ تمام علوم میں کامل ہونے کے علاوہ علم تشریح میں بھی ماہر تھا

[3] اسقلی پوس قدیم یونانیوں کا رب الشفاء تھا۔ وہ ایک نہایت کامل حکیم اور جراح بھی تھا۔

[4] بقراط حضرت مسیح سے ۴۶۰ سال قبل پیدا ہوا۔ اور ۳۵۷ سال قبل مسیح ستانوے سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔

[5] ارسطو ۳۸۴ سال قبل مسیح پیدا ہوا ۶۳ سال کی عمر میں سکندر اعظم کا اتالیق مقرر ہوا اور ۶۲ سال کی عمر میں انتقال کیا۔

[6] سکندر اعظم (۳۵۶) تا ۳۲۳ قبل مسیح) نے ۳۳۲ سال قبل مسیح شہر اسکندریہ کی بنیاد رکھی۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کر کے عہد بطلیموسی[1] میں ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا۔ جہاں بڑے بڑے نامور فاضل مختلف علوم فنون کی تعلیم دیتے تھے اسکندریہ کے اس دارالعلوم میں علم وعمل تشریح کی بھی بہت ترقی ہوئی بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکیم ایراسیسطراطوس ۳۰۰ تا ۳۶۰ قبل مسیح) نے جو کہ اس دارالعلوم میں معلم تشریح تھا۔ سب سے پہلے انسانی لاش کو چیرا اور عمل تشریح کی بنیاد رکھی۔ اس نے اعصاب حس واعصاب حرکت میں تمیز وتفریق کی اس نے دل وجگر اور عروق دموید کے باہمی تعلقات پر جو نظریہ قائم کیا وہ صدیوں تک مسلم ومستند رہا اس کو صمامات قلب (والو آفدی ہارٹ) کا بھی علم تھا اس نے امعاء میں عروق کیلوسیہ (لیکٹی ئیل) کو بھی معلوم کیا تھا۔ وہ ایک مشہور عالم تشریح اور نامور جراح تھا (ملاحظہ ہو ڈکشنری آف دی میڈیسن صفحہ ۱۳۰) ایراسیسطراطوس کا ہمعصر حکیم **ہیرافیلوس** Herophilus. بھی دارالعلوم اسکندریہ کی طبی درس گاہ میں معلم تشریح تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے چھ سو حیوانی وانسانی لاشوں کو چیرا۔ اور بعض زندہ مجرموں پر بھی عمل تشریح کیا اس نے تشریح قلب وتشریح جسم پر کتابیں لکھیں۔ دماغی بطون اور دماغی وریدوں کو اسی نے ظاہر کیا۔ چنانچہ گدی کی ہڈی کے اندر جو چھ دماغی وریدوں کا مجمع ہے وہ اب تک اسی کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی **معصرۂ ہیرافیلوس** (ٹارکیولر ہیروفیلائی) کہلاتا ہے۔ تاریخ تشریح میں منافع الاعضاء میں **حکیم جالینوس** Galenus. مختصر Galen (۱۳۱ء تا ۲۰۰ء) کا نام بھی نہایت معزز ومتاز ہے۔ اس نے بھی اسکندریہ کے دارالعلوم میں تعلیم حاصل کی۔ وہ تشریح میں ایراسیسطراطوس اور ہیرافیلوس کا معتقد اور پیرو تھا۔ اس نے بہت سے مردوں بندروں۔ کئی دیگر حیوانات ایک مردہ ہاتھی اور کئی ایک انسانی مردوں کو چیر انظام عصبی کی تشریح میں اس نے خصوصیت سے بہت تحقیقات کی چنانچہ دماغی بطون کے اندر چند ایک باریک وریدیں اب تک اسی کے نام سے مشہور ہیں یعنی اور وہ **جالینوسیہ** (وینی گیلیناتی) کہلاتی ہیں جالینوس نے **منافع الاعضاء** (فزیالوجی) پر ایک کتاب لکھی

---

[1] بطلیموس مصر کے ایک شاہی خاندان کا نام ہے۔ اس خاندان میں تیرہ بادشاہ ہوئے ہیں بطلیموس اول لیکن بقول بعض بطلیموس دوم کے عہد میں سکندریہ کے دارالعلوم کو نہایت ترقی ہوئی یہ دارالعلوم ۳۸۹ء تک جاری رہا حکیم بطلیموس (۱۲۷ء تا ۱۵۱ء) مشہور عالم ہیئت ومصنف کتاب المجسطی بھی اسی دارالعلوم میں معلم تھا حکیم اقلیدس بھی اپنی کتاب اقلیدس کا یہیں درس دیتا تھا۔ جالینوس نے بھی اسی دارالعلوم میں تعلیم حاصل کی۔ اس کالج سے بڑے بڑے نامور علماء وفضلاء پیدا ہوئے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اور تشخیص امراض کو امتحانی افعال الاعضاء (ایکس پیریمنٹل فزیالوجی) پر منحصر کیا۔ غرضیکہ وہ ایک جدت پسند عالم تشریح اور ایک قابل و نامور جراح تھا۔

مسلمانوں کے دورِ ترقیات میں **ابوالقاسم زہراوی۔ ابن زہر۔ ذکریا رازی۔ اور علاؤ الدین** ایرانی وغیرہ کئی ایک نامور حکیم ہوئے ہیں۔ جو فنِ جراحت (سرجری) سے بھی بخوبی واقف تھے لیکن علم تشریح ومنافع الاعضاء میں انکی معلومات یونانیوں کی کتابوں تک ہی محدود رہیں۔ اور عملی تشریح کی طرف ان کو توجہ نہ ہوئی۔ اس علم تشریح ومنافع الاعضاء میں وہ جدید معلومات کا اضافہ نہ کر سکے۔

یورپ کے زمانہ جاہلیت میں جو کہ پانچویں صدی سے دسویں صدی مسیحی تک شمار ہوتا ہے علم طب کے مطالعہ اور اسکی تحقیقات کے مراکز صرف خانقاہیں ہی تھیں۔ لیکن چھٹی صدی مسیحی میں پنڈت طبقے کے مجاورین نے طب کے مطالعہ پر توجہ کی۔ اور ان کے ایک سردار کی سفارش سے بقراط اور جالینوس کی شہرہ آفاق تصانیف وغیرہ کا مطالعہ شروع ہوا۔ گیارہویں صدی مسیحی میں کئی ایک عربی طبی کتب کے لاطینی زبان میں تراجم ہوئے۔ لیکن پندرھویں صدی میں یورپ والوں نے بقراط اور جالینوس کی تصنیفات کا اصل یونانی زبان میں مطالعہ شروع کیا۔ اور جالینوس کی مستند تصانیف پڑھنے سے انہیں **تشریح ومنافع الاعضاء** کا از سرِ نو خیال پیدا ہوا۔ اور پھر رفتہ رفتہ انہوں نے ان علوم اور دیگر تمام علوم حکیمہ وطبیعیہ میں اس قدر ترقیات کی ہیں۔ کہ اگر آج بقراط اور جالینوس زندہ ہوتے۔ تو موجودہ ترقی یافتہ **علم طب** اور بالخصوص **علم جراحت** کو دیکھ کر حیران رہ جاتے لیکن افسوس ہے کہ ہندوستان میں بندی ویرنانی طب کے مقلدین وعالمین نے یورپ کی گذشتہ چند صدیوں کی ان طبی ترقیات سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا لیکن اب گردشِ زمانہ نے ان کو کسی قدر متنبہ کیا ہے۔ شاید اب وہ تلافی مافات کریں اور پھر اپنے اسلاف کی طرح علوم طبیعیہ میں کمال حاصل کر کے ناموری اور شہرت حاصل کریں خدا کرے ایسا ہی ہو۔ آمین۔

سبب تالیف کتاب ہذا

اکثر علم دوست حضرات کی خواہشات وفرمائشات پر میں نے یہ کتاب طلبا تشریح و منافع الاعضاء اور طبابت پیشہ اصحاب کیلئے بالعموم اور اردو خوان شائقین کیلئے بالخصوص لکھی ہے۔ یورپ کی اکثر زبانوں میں عوام الناس کے پڑھنے کیلئے اناٹومی فزیالوجی پر بہت سی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

چھوٹی چھوٹی آسان و عام فہم کتابیں پائی جاتی ہیں جن کو اُن ممالک کے معمولی تعلیم یافتہ اشخاص بآسانی پڑھ کر مستفید ہوتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں عوام کیلئے تو کیا ابھی تک خواص کیلئے بھی عام ملکی زبان یعنی اردو میں ایسی کتابیں نہیں پائی جاتیں۔ پس امید ہے کہ میری یہ ناچیز تالیف کسی حد تک اس کمی کو پورا کرے گی بشرطیکہ اہل ملک اس سے فائدہ اٹھائیں۔

میں نے اس کتاب کو آسان اور سلیس اردو میں لکھا ہے لیکن ہر موقع پر طبی اور ڈاکٹری مترادف اصطلاحات کو بھی بریکٹ میں لکھ دیا ہے۔ عام اردو خوان شائقین تو بغیر ان اصطلاحات کے پڑھنے کے تمام مطالب کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں لیکن طلباء تشریح و منافع الاعضاء اور اطباء و ڈاکٹر صاحبان ان طبی و ڈاکٹری مترادف اصطلاحات کو پڑھ کر ان علوم کی دیگر مطولات کو بآسانی سمجھ سکیں گے جو تعلیم و تعلم اور تصنیف و تالیف کیلئے ایک نہایت مفید بات ہے۔

میں نے اس کتاب میں عظام، عضلات، شرایین اور وردہ اور اعصاب کی مختصر تشریح لکھی ہے جو عام شائقین اور اطبا کیلئے ضروری اور مفید ہے لیکن اندرونی اعضاء جسم کی تشریح اور اُن کے افعال و وظائف کا مفصل بیان کیا ہے۔ بالخصوص افعال دماغ و ماہیت خواص خمسہ ظاہرہ کو نہایت وضاحت سے لکھا ہے اور معلومات جدیدہ کو خاص طور پر درج کتاب کیا ہے نیز یونانی و ڈاکٹری کے اختلافی مسائل میں محققہ و مصدقہ اقوال کا بیان کیا ہے اس لیے یہ کتاب طلباء تشریح و منافع الاعضاء اور حکیموں و ڈاکٹروں کیلئے بھی ازبس ضروری اور مفید ہے بشرطیکہ وہ اس کا بغور مطالعہ کریں عام شائقین کیلئے بھی ساری کتاب کا پڑھنا زیادہ مفید ہے لیکن مندرجہ ذیل مقامات کو ضرور پڑھنا چاہیئے

پیدائش انسان	۷	حرارت بدنیہ	۱۰۸
فواند خون	۴۷	ہضم معدی و معوی	۱۲۹ ، ۱۳۹
خون اور روح	۴۸	غذا کیونکر ہضم ہوتی ہے	۱۴۱
دوران خون	۵۱	افعال جگر	۱۵۴
دل کیوں حرکت کرتا ہے	۶۶	دلچسپ جدید معلومات	۱۶۸
عروق جاذبہ و کیلوسیہ	۸۵	افعال کلاہ گردہ	
حجاب منصب صدر	۹۴	اعضاء تناسل مردانہ	۱۷۶
تنفس سے خون کس طرح صاف ہوتا ہے	۹۸	اعضاء تناسل زنانہ	۱۸۹
افعال غدہ درقیہ	۱۰۶	اعضاء نفسانیہ	۲۰۶
جدید تحقیقات و معلومات		مرکز عصبیہ کے وظائف	۲۳۹
		حرام مغز کے وظائف	۲۴۳
		مرکز عصبیہ کے وظائف	۲۳۹
		مؤخر دماغ کے افعال	۲۵۱
		دماغ و عقل	۲۶۶
		دماغ میں مراکز وظائف	۲۷۰
		خواص عامہ و خاصہ	۲۷۸
		ماہیت بصارت	۲۹۲
		ماہیت سماعت	۳۲۰
		ماہیت لامسہ	۳۵۰

جیلانی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

فہرست مضامین و فرہنگ اصطلاحات تشریح ومنافع الاعضا بترتیب حروف تہجی

اس فہرست میں تمام اعضاء جسم انسان کے افعال وغیرہ کے اردو عربی انگریزی نام بمعانی ترتیب وار درج ہیں۔

آ		آنت - آنتیں	۱۳۳	(پراکسیزمی میٹینیز دا نہیں)	۲۷
آئی بال (آنکھ کا ڈھیلا)	۲۸۶	آنتوں کا ہضم	۱۳۹	اثقل وریدیں	۷۹
آئی بروز (بھویں)	۲۸۳	آنتوں کی سانست	۱۳۵	اثنا عشری (آنت)	۱۳۴
آئرس (طبقہ عنبیہ)	۲۸۵	آنسو کی تھیلی	۲۸۵	اجسام: بیضیہ یا مدیرہ	
آئی لڈز (پپوٹے)	۲۸۳	آنسو کی گلٹی	۲۸۴	اجسام ربا عیہ	۲۶۰
ایجیکٹو سین سیشن (احساس ظاہری)	۲۷۹	آنسو کی نالی	۲۸۵	احساس باطنی	۲۷۹
		آنکھ اور بینائی	۲۸۲	احساس رنگ	۳۱۴
آپٹک تھیلیمس (سر پردہ)	۳۲۵	آنکھ کا ڈھیلا (مقلہ)	۲۸۶	احساس ظاہری	۲۷۹
آپٹک کمشر (تقاطع صلیبی)	۳۱۸	آنکھ کی ملوبتیں	۲۹۱	احساس لمس	۳۵۰
آپٹک نرو (عصب باصرہ)	۲۷۰	آنکھ کے پردے	۲۸۸	احساس مادی تغیرات	۲۸۱
آپٹیکل اینگل (زاویہ بصری)	۳۰۲	آنکھ کے ترمرے	۳۱۶	احالۂ ہوا تیر (ہوا بیت بصار)	۳۱۸
آٹومیزم (ذاتی حرکت)	۲۴۲	آنکھ کے متعلقات	۲۸۳	اختتام اعصاب	۱۹
آڈیٹری نرو (عصب سامع)	۲۷۱	آواز اور اس کی رفتار	۳۲۹	اختلاف قوت سامعہ	۳۳۱
آرتھروڈیا (پھسلنے والا جوڑ)	۳۶	آواز اور گفتگو	۹۲	اختلاف قوت شامہ	۳۴۹
آرٹری اور (دبا ریک شریان)	۷۷	آواز اور جنس کے آلات	۹۰	امزاج بول	۱۷۲
آرچ آنڈی (آرنا مخرابی)	۷۲	آواز نکلنا	۱۰۴	اخلاط اربعہ	۱۶۰
آریکل (دکان)	۳۲۰	آہ کھینچنا	۱۰۵	اوعیہ (جلد)	۳۴۶
آڑا شگاف دماغ	۲۲۴	ا		اذن القلب	۶۱
آسیکلز (چھوٹی ہڈیاں)		ایڈی سینس نرو	۲۷۱	اذن متوسط (طبل الاذن)	۳۲۳
آکسی ڈیشن (تنفس)	۱۰۹	ایڈوعن (تخم)	۱۲۲	اذن وقوت سامعہ	۳۶۰
آکولو کنکٹیوا (ورم ملتحمہ عینیہ)	۲۸۶	ایڈوحی فل (اے آرٹا اور طے بطنیہ)	۷۴	اذن یسری قلب	۶۳
آلات آشک	۲۸۴			اذن یمنی قلب	۶۱
آلت - اندری	۱۸۶	ایڈوحی فل (نیخ ذقسام بطنی)	۱۲۳	ارادی عضلات	۳۷
آلفیکٹری نرو (عصب شامہ)	۲۱۷	ابسارپشن (امتصاص)	۸۵	ارطبۂ جانبیہ	۱۵۰

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

آرپ سین (زردوین)	۱۴۳	اعصاب مانعہ	۲۳۹	ازآرٹری رکلائی کی شریان	۷۴
ارکنائڈ میمبرین (غشاعنکبوتی)	۲۰۹	اعصاب متحرکہ عروق	۱۱۲	الیوٹرنز (دھونکنی)	۲۸۰
آری افس آفذی دیمانار فرج	۱۹۴	اعصاب نخاعی		املاق لاپ سین (نشاستین)	۲۶۲
استقرار حمل	۹	اعضائے استحیائیہ	۱۸۹	امبلائیکل ریجن (ناف کا مقام)	۱۲۴
اسنان - دانت	۱۱۵/۳۵	اعضائے بول	۱۶۴		
اسنان دائمیہ	۱۶۱	اعضائے تناسل	۱۶۲	امتصاص (چوسنا)	۸۵
اسنان سینہ (دودھ کے دانت)	۱۱۵	اعضائے سینہ	۵۴	امتناع تاثیر	۲۴۲
اصل النخاع (سرحرام مغز)	۲۳۱	اعضائے صوت وسینہ	۹۰	امتناع حرکت متعکسہ	۲۴۵
اضراس (ڈاڑھیں)	۱۱۵	اعضائے غذا	۱۱۲	ام جافیہ (دماغی موٹی جھلی)	۲۰۸
اطراف بالا (علیا)	۲۷	اعضائے نفسانی	۲۰۶	ام رقیق (دماغی پتلی جھلی)	۲۰۹
اطراف جسم (ہاتھ پاؤں)	۲۷	اغوز (کافی آنت)	۱۳۶	ام غلیظ (دماغی موٹی جھلی)	۲۰۸
اطراف زیریں - سفلی	۲۸	اغشیہ دماغ (دماغی جھلیاں)	۲۰۷	امعاء دقاق (چھوٹی آنتیں)	۱۳۳
اطراف علیا	۳۱	افعال جگر	۱۵۴	امعاء غلاظ (موٹی آنتیں)	۱۳۶
اعتدال حرارت	۱۱۰	افعال گردہ	۱۶۷	امبنو الیسٹر	۱۵۹
اعصاب	۲۳۵	افعال کلاہ گردہ	۱۶۹	ان آرتھروسس (رگول پالی دار جوڑ)	۳۰۶
اعصاب حرکت	۲۳۶	افعال منی	۱۸۴		
اعصاب حرکت میں بقاء حرکت	۲۳۸	افعال غدۂ درقیہ	۱۰۶	انابیب بولیتہ (پیشاب کی نالیاں)	۱۶۵/۹۶
اعصاب حس	۲۳۶	اقسام اعصاب	۲۳۹		
اعصاب حس نقل حس	۲۳۷	اقسام بطن	۲۲۳	انٹر سکیپولر ریجن	۵۸
اعصاب حواس (مشترک نقل حس)	۲۳۸	اقسام حرکات منعکس	۲۴۷	ہرنیہ شانہ کا درمیانی مقام	
اعصاب دماغی -	۲۷۰	اقسام ذائقہ	۲۴۳	انٹرنل ایلیک آرٹری (پیڑو کی اندرونی شریان)	
اعصاب شرکی	۲۷۴	اقسام مصدر	۲۵۴		
اعصاب شرکیہ کے افعال	۲۷۰	اقسام مفاصل	۳۴		
اعصاب ظہریہ	۲۷۳	اگزلری (دین) وریدالطحال	۷۶	انٹرنل پابپل زد	۲۷۴
اعصاب عجزیہ	۲۷۳	اگزلری آرٹری (شریان الطحال)	۸۲	انٹرنل جوگلر دین (گردن کی اندرونی وریدیں)	
اعصاب عنق	۲۷۲	اگلا دماغ (مقدم دماغ)	۲۲۴		
اعصاب قطنی	۲۷۳	اگلا سینگھ دماغ	۲۲۳	انٹرنل سفنی نس دین (ناک کی اندرونی وریدیں)	۸۳
اعصاب کا تعلق حرارت جسم سے	۱۱۱	اگلی ڈاڑھیں	۱۱۵		
		الحاقی مادہ	۱۰	انٹسائزرز (آنتیں)	۱۱۳

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

انٹرنل کراٹڈ آرٹری (دماغ کی شریان) ۷۳
انثیین (خصیے) ۱۷۹
انجذاب ۸۵
انجذاب بذریعہ جلد ۲۴۸
انجماد خون ۴۴
اندازہ جسامت ومسافت ۳۱۶
اندازہ شکل ومقدار اجسام
اندام نہانی ۱۸۹
اندرونی اعضائے تناسل ۱۹۶
اندرونی ساخت گردہ ۱۶۵
اندھیرے میں کیسے نظر آتا ہے ۳۱۷
انسان کی آواز ۳۳۰
انسپائی ریشن (شہیق) ۱۰۰
انسجۂ اصلیہ ۱۵
انطباع تصور (ماہیت یہ بات) ۳۱۹
انعقاد نطفہ ۸
انعکاس صورت ۳۰۹
انعکاسی حرکات
انفراسٹرنل ریجن (پسلی کے نیچے کا مقام)
انفنڈی بیولم (وقیف) ۲۱۹
انف وقوت شامہ ۳۳۶
انفیری اردینا لیوا (اجوف نازل) ۱۸۳
انامی نیٹ آرٹری (شریان بینام) ۷۲
انہی بیشن (امتناع تاثیر) ۲۴۲
انیلیں ۱۱۵
اوتارا (ٹینڈفر) ۳۸
اوتارا لصوت ۹۲
اودہ (وریدیں) ۷۸
اودیۃ الدماغ (دماغ کی وریدیں) ۸۱
اوردہ کبد (جگر کی وریدیں) ۱۵۲
اورطی (شریان اعظم) ۷۲
اورطی البطنیہ (شریان شکم) ۷۴
اورطی صدریہ (شریان سینہ) ۷۴
اوسط دماغ ۲۲۰/۲۲
اوسط دماغ کے افعال ۲۵۴
اویبۃ المنی (منی کی تھیلیاں) ۲۸۳
اوم (عورت کا انڈا) ۸
اوویریز (خصیۃ الرحم) ۲۲۰
اے آرٹار (شریان اعظم) ۷۲
ایسابنیٹس (عرق جاذبہ) ۸۵
ایپی ڈرمس (بشرہ) ۱۶
ایپی گلاٹس (غضروف بکمی) ۹۱
ایپی گیسٹرک ریجن (معدے کے اوپر کا مقام) ۱۲۴
ایڈری نے لین (جوہر کلاہ گردہ) ۱۶۰
ایڈمینٹوری کینال (کان کی نالی) ۲۰۱
ایسافیکس (مری) ۱۰۲
ایس گمنائرم (مثل بصلہ) ۲۰۵
ایسنڈنگ کولن (قولون صاعد) ۱۳۷
الیمال تاثیر ۲۲۹/۲۴۳
ایکلاموڈیشن (نظر جمانا) ۳۰۲
ایجیوڈرم (آبی بالائی) ۱۰
ایکسٹرنل ایلک آرٹری (بیرونی طبقہ جنین) ۷۵
ایکسٹرنل پاڈینڈل نرو (پیڑو کی بیرونی شریان) ۲۷۴
ایکسٹرنل پاپلیٹل نرو (گھٹنے کا پچھلا عصب) ۸۰
ایکسٹرنل جوگولر (گردن کی بیرونی وریدیں) ۸۳
ایکسٹرنل سفی نس وین (ٹانگ کی بیرونی وریدیں) ۱۹
ایکسس سلنڈر (جوہر عصبی) ۱۴۱
ایلبیومن (زلال) ۲۹۱
ایکونس (میومر) ۲۰
ایلی مینٹس (عناصر) ۱۳۳
ایلیمنٹری کینال (غذا کی نالی) ۱۱۳
ایلیمنٹری کینال (غذا کی نالی) ۱۳۶
ایلیسیوکاوالوراسام (دقیق واعوری پیچیدہ آنت و کالی آنت کی گوائڑی) ۱۱۸
ایمیٹر شیٹ (کلا سفید) ۲۲۳
ایمیٹر شیٹ (کلا پوٹ اللہ بیضیہ)
ایمیٹر ریفیل نرو (ٹانگ کا اگلا عصب) ۲۷۴
ایمنڈوڈرم (اندرونی طبقہ جنین) ۱۰
ایمپل جرک (تخنے کا جھٹکا) ۲۴۸
ایمپل کلونس (تخنے کی اینٹھن) ۲۴۸
ایمپرمیٹ (حرارت عزیزی) ۱۰۸

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ب	
بائل صفرا،	۱۵۵
بادی آفندی میڈرڈ جسم شانہ	-
بادی آفندی یوٹرس جسم رحم	۱۳۸
بارتھولائن گلینڈز (غدود)	۱۹۳
بارہ انگشتی آنت	۱۳۴
بازو کی اندرونی وریدیں	۸۱
بازو کی بیرونی وریدیں	۸۱
بازو کی شریانیں	۷۳
بافت و ساخت جسم	۱۴
بال	۳۴۳
بال سی باریک گیس	۷۷
بانقراس (بلکبہ	۱۶۱
بانقراس کے منافع	۱۶۲
بانقراسین رجوہر بلبہ	
بانہیں اور (انگلیں	۲۷
بایاں بغل کا مقام	۵۶
بایاں بغل کے نیچے کا مقام	۵۶
بایاں پستان کا مقام	۵۶
بایاں چپڑے کا مقام	۱۲۵
بایاں پھیپھڑے کے اوپر کا مقام	۵۸
بایاں شانہ کے نیچے کا مقام	۵۱
بایاں کریوں کے نیچے کا مقام	۱۲۴
بایاں کے مقام	۱۱۴
بایاں ہنسلی کے اوپر کا مقام	۵۵
بایاں ہنسلی کے نیچے کا مقام	۵۶
بدن کی گرمی	۱۰۸
براڈیگینٹ (رحم کا عریض بند	۱۵۱

برائی (اوراز) (غدود مشتہ)	۹۳
برزخ (الحلقوم)	۱۱۸
برزخ الدماغ (پل دماغ)	۲۳۰
بروزا بیض	۲۲۴
برنس آرٹیریل (شریان الیلی	۷۲
برین (دماغ)	۸۲
	۲۱۰
بڑا بیضوی مرکز	۲۲۱
بڑا دماغ (مقدم دماغ)	۲۱۲
بڑی آنتیں	۱۳۶
بڑی بڑی دو ہڈیوں کے نام	۸۰
بڑے دماغ کے افعال	۲۵۶
بڑے دماغ کے شگاف	۲۱۴
بڑے دماغ کے لوتھڑے	۲۱۴
بڑے دماغ کے نشیب و فراز	۲۵۵
بڑے دماغ پر مراکز دلائف کا تعین	۲۵۶
بشرہ (جلد کا بالائی طبق)	۱۶
بصر (شبکہ خ) (ڈھیلے کی نظر)	۳۰۳
بعلۃ الہ بیز (غدود دہیز)	۱۹۳
بطن (شکم یا پیٹ)	۱۲۲/۱۲۱
بطن الوسط دماغ	۲۲۰
بطن السیر یا (یاں خانہ دل)	۶۳
بطن (مین) دیا (یاں خانہ دل)	۶۱
بطن رابع (چوتھا بطن دماغ)	۳۰
بطن القلب (دل کا بطن)	۶۲
بطن مؤخر دماغ کا پانچواں بطن	۲۲۸
بطن چاہبیہ (دماغ	۲۲۲
بطہ بن دماغ	۲۲۷
بظر (رٹ - ن - ا)	۱۶۱

بلاسٹوڈرم (بچہ دی جھلی)	۳۰۴
بلغم (غذا کی نالی)	۱۲۱
بلیڈر (مثانہ)	۱۷۱
بواب (دروبان)	۱۲۶
بول (پیشاب)	۱۷۲
بولیمیہ (بولیمیا)	
بھلوئیں	۲۸۳
بھیجا	
بھینگا پن	۳۰۸
بیرونی کان	۳۲۰
بیرلاک دین (وریدیں بالیق	۸۱
بیضہ (بیضے (خصیے	۱۶۹/۲۰۳
بیضہ (انثی عورت کا انڈا)	۲۰۲/۷
بیکٹیریم	۱
بے ہم شریان	۷۲
بے نام وریدیں	۸۲
پ	
پائیلورس (دروازہ)	
پائیلورک اینڈ	
پائیرز پیچرز (مشخاشتی غدود)	
پاپلوٹل آرٹری (گھٹنے کی پچھلی شریان	۷۵
پانزدہ (دماغ)	۲۲۱/۲۲۲
پانزدہ (پٹھے) (رپل جگر)	
پانی	۱۴۲
پاؤں کے ٹخنے کی ہڈیاں	۳۳

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

پاپا میٹر دماغ کی جھلی	۲۰۹	پنڈلی کی اگلی شریان	۷۵	پیڑو	۱۷۱
پپوٹے	۲۸۳	پنڈلی کی پچھلی شریان	۷۵	پیڑو کا مقام	۱۲۵
پپوٹے کی باریک گلٹیاں	۲۸۴	پہنچے کی ہڈیاں	۳۲	پیشاب	۱۷۲
پت (صفرا)	۱۵۴	پورٹل وین (ورید باب)	۸۳/۵۲	پیشاب کی نالی	۱۹۴/۱۷۳
پتہ اور اس کی نالی	۱۵۴	پوسٹیریئر ٹیبیل آرٹری (پنڈلی کی پچھلی شریان)	۷۵	پینکریا (کوشا (رطوبت لبلبہ)	۱۶۲
پتھری کا مادہ	۱۷۴			پینکریشین (جوہر لبلبہ)	
پچھلی ڈاڑھیں	۱۶۰	پوسٹیریئر کارنوا رقرن موخر)	۲۲۳	پے یٹ (تالو)	۱۱۷
پراسٹینٹ گلینڈ غدہ قدامیہ		پھسلنے والا جوڑ	۳۶	پیلوس (حوض)	۱۷۱
پرمینینٹ ٹیتھ (دائمی دانت)	۱۶۱	پھیپھڑے	۹۵	پے نس (ذکر)	۱۸۶
پردۂ بکارت	۱۹۵	پینکریاس (لبلبہ)	۱۳۰	پیموڈنڈم (شرمگاہ	۱۹۳
پروٹو پلازم (مادۂ حیات)	۴	پینک گلینڈ (غدود)	۱۲۷	**ت**	
پروسٹیٹر (غدیہ لحمیہ)	۱۴۱	پیپ ٹونز	۱۳۰	تاج الکلیہ (تاج گردہ)	۱۶۸
پریس بال (اوپیار ٹمپانی کا نقل)	۳۰۳	پیتھے ٹک نرو (عصب اختباقی)	۲۷۰	تالو (پے یٹ)	۱۱۷
پستان	۳۰۶	پیٹ	۱۲۲	تامور (غلاف دل)	۵۹
پسینہ	۳۴۸	پیٹ کے بچے کا بڑھنا	۱۲	تحویل تاثیر	۲۴۴/۲۴۰
پسینہ کے غدود	۳۴۸	پیٹ کے حصے	۱۲۳	تخم انسان	۶
پلازما (آب خون)	۴۳	پیٹھ کے پٹھے	۲۷۳	تخیلات چشم	
پل دماغ	۲۳/۲۲۰	پیچو سٹری باڈی	۲۶۰	ترکیب بول	۱۷۳
پلک . پلکیں	۲۸۴	پیچو ٹری گلینڈ (غدہ نخامیہ)	۲۶۱	تشریح دقیق وماہیت انتشار ذکر	
پلمونری آرٹری (شریان ی)	۶۹	پیچو ٹیٹرین	۲۶۱	تصویر حرام مغز	۲۳۳
پلمونری سرکولیشن دوران خون رئوی)	۵۲	پیچیدہ آنت	۱۳۳	تصاویر چھاتی وغیرہ کے تشریحی مقام	۵۷
		پیدائش انسان	۷		
پلوس (حوض)	۲۸	پیدائش حرارت	۱۰۸	تصاویر متعلق چشم	۳۰۷
پلوس آفذی کڈنی (حوض گردہ)	۱۶۵	پیدائش خون	۴۶	تصاویر معدہ بمعائے ہضم وغیرہ	۱۲۷
پلیورا (غلاف ریہ)	۱۹۴	پیراڈ آفذی کدنی (زنبار گردہ)	۱۶۵	تصورات کاذبہ	۲۸۰
پلیورا کاسٹیلس	۱۹۴	پیرائنڈ گلینڈ (کان کی غدود)	۱۲۰	تصویر آنکھ کا بال	۲۸۷
پلیورا پلمونیلس	۹۴	پیراسٹالٹک موشن (حرکت دودی)	۱۳۵	تصویر امتحان گھٹنے کے جھٹکے کی	۲۴۸
پنار بیرونی کان)	۳۲۰	پیری کارڈیم (غلاف دل)	۵۹	تصویر امتحان گھٹنے کے جھٹکے کی	۲۴۹

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تصویر اتعکاس	۳۱۰	تصویر عضلات جسم	۴۰	تنفس سے خون کیسے صاف ہوتا ہے	۹۸
تصویر اوپر سے تراشا ہوا دماغ	۵۷	تصویر غدد جازبہ	۱۲۰	تنفس سے خاص خاص حالات	۱۰۴
تصویر برادرہ	۲۷	تصویر کھوپری	۲۴	تھائرائڈ گلینڈ (غدہ درقیہ)	۱۰۶
تصویر پانچ کی ہڈیاں	۶۲	تصویر کلاہ گردہ ونصف گردہ	۱۶۷	تھائرکسین (جوہر غدہ درقیہ)	۱۰۶
تصویر بطنین واذنین قلب	۱۲۷	تصویر گردہ	۱۶۵	تھائیمس گلینڈ (غدہ قنویسہ)	۱۰۷
تصویر بطون دماغ	۲۹۷	تصویر گردہ ومثانہ وغیرہ	۱۶۵	تھرامبوجن	۴۵
تصویر بکس (آنکھ)	۲۶۳	تصویر گوش	۳۲۲	تھرامبین (انجماد خون)	۴۵
تصویر بندر کے دماغ کی	۳۲۱	تصویر لنیز	۳۰۰	تھرمبسک ایسڈ آرٹاری (اور طی صدریہ)	۷۴
تصویر بیرونی کان	۳۲۳	تصویر متعلق چشم	۳۰۰	تھوریکسک ڈکٹ مجری صدر	۸۹
تصویر پیٹ کے حصے	۳۱۲	تصویر مجری الصدر	۸۹	تھوریکسک ڈکٹ دوسری (مجری الصدر)	۵۴
تصویر تقاطع شعاع	۳۲۷	تصویر معدہ	۱۲۶	تھوریکس (سینہ)	۵۳
تصویر تیہ عشائی	۲۸	تصویر معدہ واحشاء	۱۳۸	تھوریکس سینہ کی ہڈیاں	۵۴
تصویر ٹانگ کی ہڈیاں	۲۳	تصویر معدہ وجگر وغیرہ	۱۶۲	تھوک	۱۲۱
تصویر ٹھوڑی یا ڈاڑھ	۱۴۹	تصویر میل پگمن کیپسول	۱۶۷	تھوک کی گلٹیاں	۱۱۹
تصویر جگر	۲۳۴	تصویر نرخرہ وپھیپھڑے	۱۹۶	تھوک کے فوائد	۱۲۱
تصویر جرام مغز	۲۱۲	تصویر نصف کرہ دماغ	۲۵۹		
تصویر حبس دماغ	۹۱	تصویر نقشہ چشم	۳۰۷	ٹ	
تصویر حنجرہ وقصبۃ الریہ	۱۸۲	تصویر وضع قیام دل	۶۱	ٹانڈل ائر (ہڈی موجی)	۱۰۱
تصویر خصیہ	۲۱۰	تعریج سینی	۱۳۸	ٹارسل بونز (سلامیات)	۳۳
تصویر دماغ	۲۶۴	تعریج طحالی	۱۳۸	ٹانکلین (لعابین)	۱۴۳
تصویر دماغ بن مانس	۲۱۱	تعریج کبدی	۱۳۸	ٹانسلز (لوزتین)	۱۶۸
تصویر دماغ کی زیریں سطح	۱۸۸	تقاطع صلبی	۲۱۸	ٹرائی فیشیل نرو	۲۷۰
تصویر ذکر	۱۹۹	تکون اضلاع		ٹرپ سین	۱۶۳
تصویر رحم وخصیۃ الرحم	۲۶	تلی سیسی ہڈیاں	۹۶	ٹرینس فرینس (تحویل)	۲۴۴/۲۴۳
تصویر ریڑھ کا ستون	۲۷	تلی	۱۶۳	ٹرنسورس فشر (شگاف)	۲۴۴/۱۵۱
تصویر سینہ کا پنجرا	۲۷	تمام ہڈیوں کے نام وتعداد	۳۰	ٹرینسورس کولن (قولون معترض)	۱۳۷
تصویر شرائین	۷۶	تنفس ضرورت تنفس	۹۷	ٹریکیا (حنجرہ)	۹۲
تصویر شیشہ وشمع	۲۹۹	تنفس پر اعصاب کا اثر	۱۰۳	ٹخنے کی اینکھن	۲۴۹

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ٹخنے کا جھٹکا ۲۴۸
ٹشی کاز (خصیتین) ۱۷۹
ٹشو ریپیج یافت ۱۵
ٹمپیم (ڈھول)
ٹ۔ن۔ا (بظر) ۱۹۱
ٹینڈنز (نسیں) ۱۳۸
ٹوٹھ۔ٹیتھ (دانت) ۱۱۵/۳۰
ٹھٹھری۔ڈھانچ ۳۰/۲۱
ٹیوبر سائی
ٹیوبیولائی یودی فغرائی
ٹیوبیولائی سرکولیرس ۲۲۲
ثندی۔ثدیان ۲۰۶
ثقبۃ الفواد ۱۰۶
ثقبۂ مجریٔ بول ۱۹۴
جاذب گلٹیاں ۸۰
جانبی بطون ۲۲۲
جبڑے کی نچلی گلٹی ۱۱۹
جبل الزہرہ ۱۸۹
جبنین
جبداول اقسام صدر کے تشریحی مقام ۵۶/۵۵
جرثومہ وطریق پیدائش ۱
جرمی تل سپاٹ ۸
جرمی تل ویسی کل ۸
جسم انسان کی ہڈیوں کا ڈھانچ ۲۱
جسم فلشب جسم لاحس لہ ۲۱۷
جسم مشرشر ۲۲۳
جسم مضلع وسریر بصیر ۲۵۹
جسم میں حرارت کا طریق پیدائش ۱۰۹
جسم نخاعی ۲۶۰
جفن۔اجفان ۲۹۳
جگر ۱۴۹
جگر کے عروق جاذبہ ۱۵۴
جگر کے لوتھڑے ۱۵۲
جگر کی نالی ۱۵۴
جگر کی وریدیں ۱۵۲
جگر کا بالائی طبق ۱۶
جگر و قوت لامسہ ۳۴۶
جلد کی ساخت ۳۴۶
جلد کے فضلات ۳۴۸
جلدی وریدیں ۸۱/۸۰
جمائی ۱۰۶
جوئی
جوڑا اور بندکشین ربندھن ۳۳
جوڑوں کے اقسام ۳۴
جوف رحم ۱۹۹
جوف حانہ۔حوض ۲۸
جوہر حیات، نواۃ ۵
جیب کی مانند وریدیں ۸۰
جیب کی مانند وریدیں ۸۰
جیب گردہ ۱۶۵
جیب المذی ۱۷۵
جیجونم (صائم) ۱۳۴
جیلیٹن (مین اشٹیشین) جیلی ریٹیسوآرگنزم اعضاء تناسل ۱۴۲ ۱۷۶

چ

چکنائی کے غدود ۳۴۸
چوتھا بطن دماغ ۲۳۰
چوچی ۲۰۶
چھاتی ۲۰۶
چہرہ ۲۵
چہرہ کا عصب ۲۷۱
چہرہ کی ورید ۸۰
چہرہ کی ہڈیاں ۸۰
چھوٹا دماغ ۲۲۸
چھوٹے دماغ کے افعال و وظائف ۲۵۱
چھونے کی قوت ۳۵۰
چھوٹی آنتیں
چھینک
چیچک۔چیکس ۱۱۴

ح

حاجبین ۲۸۳
حالبین ۱۷۰
حس الکمنی ۱۸۲
حبل الورید ظاہر ۸۰
حبل الورید غائر ۸۱
حجاب منصف صدر ۹۴
حدبۂ رمادیہ ۲۱۹
حرارت بدنیہ ۱۰۸

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

حرارت عزیزی ۱۰۸
حرام مغز ۲۲۳
حرام مغز کے افعال وظائف ۲۴۳
حرام مغز کی جھلیاں ۲۳۲
حرام مغز کے پٹھے ۲۴۲
حرکات تنفس ۱۰۰
حرکات چشم ۳۰۷
حرکات منعکسہ ۲۶۴
حرکت دودیہ ۱۳۵
حرکت قلب ۶۵/۶۶
حرکت منعکس ۲۴۱
حس اتصال ۲۷۸
حس الٰہی ۳۵۰
حس تسادی قوت توازن ۳۳۳
حس حری ۳۵۰
حس حشوی ۳۵۲
حس شبکیہ ۳۱۲
حس عضلی ۳۵۱
حسی تاثرات ۲۴۳
حضرہ زور قیہ ۱۷۶
حفاظت دندان ۱۱۷
حفظ حرارت ۱۱۰
حق الیقین
حقیقت الجماد خون ۴۵
حکمت تنفس ۹۹
حلق ۱۱۳/۱۲۷
حلقوم ۱۱۳
حیمات لمبیہ ۳۴۷

حمض بولی
حمق مع نقص اعضاء ۱۰۶
حنجرہ ۹۱
حنک (تالو) ۱۱۷
حنک صلب ۱۱۸
حنک لین ۱۱۸
حواس ۲۷۷
حواس خاصہ ۲۷۹
حواس کلیہ وخاصہ کا فرق ۲۷۹
حوض کلیہ ۱۶۵
حول (جھینگا پن)
حویصلۂ جرثومہ ۸
حیض ۲۰۵

خ

خاکی ابھار دودماغ ۲۱۹
خالی آنت ۱۳۴
خدان - رخسار ۱۱۴
خروج شعاع ۳۱۸
خزانۂ معنی ۱۸۳
خصیتین ۱۷۹
خصیتین کے متعلقات ۱۷۸
خصیہ کی تشریح دقیق ۱۸۱
خصیہ کی ڈوری ۱۷۹
خصیۂ رحم ۲۰۲
خصیہ رحم کی نالی ۲۰۱
خلاء مشقوب مقدم دماغ ۲۱۸
خلاء مشقوب مؤخر دماغ ۲۱۹

خلل بصارت
خلیہ - خلیات ۴
خمل معدہ ۱۲۷
خمیر ۱۴۳
خواب دیکھنا ۲۲۹
خواب میں چلنا ۲۶۹
خون اور روح ۴۱
خون کا پانی - پلازما ۴۳
خون کہاں پیدا ہوتا ہے ۱۶۰
خون کے دانے یا ذرات ۴۱
خون کے سرخ ہونے ۴۲
خون کے سفید دانے ۴۲
خون ایک رفتار پر کیوں دورہ کرتا ہے ۵۱
خون کی ماہیت ۴۱
خیالات چشم ۳۱۶

د

دائمی دانت ۱۱۶
دائیں جاذب نالی ۹۰
دانت ۳۰۸
دانہائے لیمف ۸۸/۸۹
دایاں چھڑے کا مقام ۱۲۵
دایاں بغل کا مقام ۵۶
دایاں بغل کے نیچے کا مقام ۵۶
دایاں پستان کے نیچے کا مقام ۵۶
دایاں سیاہی شاخ کے نیچے کا مقام ۵۸
دایاں شاخ کے نیچے کا مقام ۵۸
دایاں [illegible] کے نیچے کا مقام ۵۸

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

دایاں کمر کا مقام ۱۲۴
دایاں ہنسلی کے اوپر کا مقام ۵۵
دایاں ہنسلی کے نیچے کا مقام ۵۶
دبر ۱۳۸
دبر جھلیاں بصفاقات ۳۹
درز حقیقی ۳۵
درز غیر حقیقی ۳۵
درز دالا جوڑ
درمیانی کان
دروازہ بگھر کی دیدہ ۸۳
دلائل نبض ۲۷۸/۲۷۹
دل - قلب ۵۹
دل کا بایاں بطن - بطن ایسر ۶۳
دل کا بایاں کان - اذن ایسر ۶۳
دل کا فعل ۶۳
دل کا وضع قیام ۵۹
دل کی آوازیں ۶۵
دل کے حصے ۶۱
دل کیوں حرکت کرتا ہے ۶۶
دل وذبض کی حرکت ۶۴
دماغ ۲۱۰
دماغ اور عقل ۲۵۵
دماغ کا اندرونی بیان ۲۲۰
دماغ کی بالائی سطح ۲۱۲
دماغ کی تانگیں ۲۱۹
دماغ کی زیریں سطح ۲۱۷
دماغ کی شریان ۷۳
دماغ کے پردے ۲۰۷
دماغی پٹھے ۲۷۰
دماغی دیدیں ۸۱
دنبہ - چھوٹا دماغ ۲۲۸
دوار سمعی ۳۲۵
دودھ کے دانت ۱۱۵
دوران خون - دورہ دموی ۵۱
دورہ رئویہ - دورہ صغیرہ ۵۲
دورہ کبیرہ سسٹیمیٹک سرکولیشن ۵۳
دونوں بانہیں ۳۱
دونوں ٹانگیں ۳۲/۳۸
دہلیز البطنین ۲۳۰
دہلیز الفرج ۱۹۲
دیکھنے عصب ۲۷۰

ڈ

ڈارسل زدز
ڈارسس سینس آرٹری شرلن ۷۵
ڈرمس (جلد) ۳۴۶
ڈھانچ - ہڈھڑی ۲۱
ڈھیلے کا محرک عصب ۲۷۰
ڈی آر تھرو سس مفصل دودی ۳۵
ڈیسنڈنگ کولن ۱۳۷
ڈیوڈینم (اثنا عشری) ۱۳۴
ڈیوراميٹر (رام غلیظ)
ڈی سیڈوآر متیمیہ ۱۱
ڈی سیڈوآر یڑی فلکسا ۱۱
ڈی سیڈوآوپرا ۱۱
ڈی سیڈوآسی روٹانا

ذ

ذات التلافیف ۱۳۴
ذاتی حرکت ۲۴۲
ذرات جگر ۱۵۴
ذرہ ۴
ذکر ۱۸۶
ذالقہ باطنیہ ۳۴۵
ذالقہ کس طرح محسوس ہوتا ہے ۳۴۴

ر

رائٹ آریکل ۶۱
رائٹ انفرا انگزاری ریجن ۵۶
رائٹ انفرا ایلائی ٹل ریجن ۵۷
رائٹ انفرا اسلیپولر ریجن ۵۸
رائٹ انگوئی نل ریجن ۱۲۵
رائٹ انفرا کلیکیولر ریجن ۵۵
رائٹ انفرا عمیری ریجن ۵۶
رائٹ ایگزلری ریجن ۵۶
رائٹ سوپرا اسپائنل ریجن ۵۸
رائٹ سوپرا کلیکیولر ریجن ۵۴
رائٹ لمبر ریجن ۱۲۴
رائٹ لمفنگ ڈکٹ ۹۰
رائٹ وینٹری کل ۶۲
رائٹ ہائپو کانڈیک ریجن ۱۲۴
رائگہ مارٹس ۳۷
راس النخاع ۲۳۲/۲۳۰
ران کی شریان ۷۵
رباطات ۱۹۹
رباطات رحم ۳۳
رباطات اکیلی ۱۵۰
رباط طولی ۱۵۰
رباط مستدیر
رباط معلق
رباط ہلالی ۲۲۲/۱۹۷
رحم

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

رطوبات چشم ۱۱۴
رطوبت بانقراس ۲۹۱
رطوبت بیضیہ ۲۹۱
رطوبت جلیدیہ ۲۹۱
رطوبت زجاجیہ ۲۹۲
رطوبت عدسیہ ۱۴۷
رطوبت قریۃ النعاب یا الانفحہ ۱۴۷
رطوبت لبلبیہ ۱۶۲
رطوبت لیفیہ ۴۴
رطوبت متداخلہ ۴۸
رطوبت محصورہ ۱۴۷
رطوبت معدیہ ۱۲۸
رطوبت معویہ ۱۳۱
رکب کوہ زہرہ
روافع ۷۰
رودجیر آفدی شامک ۱۲۷
روح یا نفس ۴۱/۴۸
روح حیوانی ۴۲/۴۷
روح طبعی ۵۰
روح طبی ۴۹
روح کے متعلق حکماء کے مذہب ۴۹
روح نفسانی ۵۰/۵۱
رئتیں (پھیپھڑے) ۹۵
ری پروڈکٹو آرگنز (اعضاء تناسل) ۱۷۶
ریڈیل آرٹری ۷۴
ریڈیل وین ۸۱
ریٹی ناشکیہ ۲۸۹
ریڑھ کا ستون ۲۶/۲۱
ری فلیکشن (انعکاس) ۲۴۱/۲۴۴
رلیفی
ریق (لعاب دہن) ۱۲۱
ریکٹم (مقعد) ۱۳۸

ز

زائدہ حلمیہ ۲۱۷
زائدہ ودودیہ ۱۴۶
زائدہ دبیہ ۱۵۲
زائدہ مشکلہ ۱۵۲
زائدہ مربعہ ۱۵۲
زائدہ یمنی ۱۵۲
زائدہ یسریٰ ۱۵۲
زاویہ نگاہ۔ زاویہ بصری ۳۱۲
زبان اور ذائقہ ۳۴۱
زبان عصب ۲۷۱
زبان کا نچلا عصب ۲۷۲
زبان کی نچلی گلٹی ۱۱۹
زبان کی ہڈی ۳۱
زرد آب ۴۴
زعفر دم چھوڑنا ۱۰۰
زوائد کمہ ۱۵۲
زوال شبکیہ ۳۱۲
زونا پیلے نیوسیڈا ۸
زیریں سطح دماغ کے مقامات ۲۱۷

س

سائنس پاکولیرس (جیبنی)
سائنسز (جیوب) ۸۰
ساخت مغز حرام ۲۳۴
ساخت دماغ ۲۲۷
ساخت رحم ۲۰۰
ساخت کیسہ ۴۴
ساخت معدہ ۱۲۶
سالف پیلسٹ (زرنالو) ۱۱۷
سالفین الدماغ (دماغ کی ٹانگیں) ۲۱۹
سالفین المخ (مخ کی ٹانگیں) ۲۲۰
ساکن رگیں ۷۸
سالٹس (نمکیات) ۱۴۲
سالیوری گلینڈز (غدود) ۱۳۵
سام نمبولزم (نوم تقطیر) ۲۶۹
سبات کو مار خواب غفلت) ۲۶۹
سب جگتوسن سیش ۲۷۹
سب کلیویس آرٹری
ہینلی کی پچھلی سٹریان ۷۲
سب لنگوئل گلینڈز (زبان کا نچلا غدود) ۱۱۹
سب میگزلری گلینڈز
جبڑے کا نچلا غدود ۱۱۹
سپائنل ایکسٹری انرو
عصب نخاعی اضافی ۲۷۲
سپائنل کارڈ (حرام مغز)
سپائنل نروز (اعصاب نخاعی) ۲۷۳
سپیم سکروٹائی
فوطہ کا درمیانی پردہ ۱۷۹
سٹیم لوسٹڈم (رئیس الامراض) ۲۲۴
سپرمیٹک کارڈ (منی کی ڈوری) ۱۸۲
سپلین (تلی) ۱۶۳
سپیشل سینسز (حواس خاصہ) ۲۷۹
سٹامک۔ معدہ ۱۲۵
سرتۃ الطحال ۱۶۳
سٹرنل ریجن ۵۶
سحایا۔ اغشیہ دماغ ۲۰۷
سر۔ کھوپری ۲۴
سر کی ہڈیاں ۳۰
سر حرام مغز ۲۳۱
سر حرام مغز کے افعال وخلالت ۲۴۹
سرکولیشن آف بلڈ (دوران خون) ۵۱
سرواکل نوز (اعصاب عنقیہ)
سروکیس یوٹرائی (عنق رحم) ۱۹۹
سیری برم (مقدم دماغ) ۲۱۲
سیری بیلم (موخر دماغ) ۲۲۸
سریر بصری ۲۲۴
سنسک ٹکٹ
سسٹومیٹک سرکولیشن ۵۲
سمائڈ بونز (تل می ہڈیاں) ۲۹
سعۃ الصدر وسعت سینہ ۱۰۲
سعۃ النفس ۱۰۲
سکروٹم (فوطے) ۱۷۸
سکل انٹرکس وڈ (عظم معا) ۱۳۰
سکیلے ٹن (ہیکل عظمی) ۳۰
سکلیرا (پکار (طبقہ صلبیہ) ۲۸۸
سگمائڈ فلکسر (پیچ حم) ۱۳۸

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سلاوا۔ تھوک	۱۲۱	سیل بسیلہ (کرمات)	۴	شرائین الصغر	۷۷
سلاوری گلینڈز زندہ لعابیہ	۱۱۹	سیمن۔ منی	۱۸۵	شریان البطلی	۷۳
سلالہ کے لغوی معنی	۱۳	سیمی سرکیولر کنیار ہلالی نالیاں	۲۹۲	شریان اعظم	۷۲
سلی اری مسل (عضلہ بذریہ)	۲۸۹	سنیاہ تھرڈ سس (غیر متحرک جوڑ)	۳۴	شریان تحت الترقوہ	۷۳
سمال انٹسٹائن۔ چھوٹی آنتیں	۱۳۳	سنیئرم اوریلی مائیس (چھوٹا بینوی مرکز)	۲۲۱	شریان جگر	۱۵۳
سمال سیاٹک نرو (پیڑو کا چھوٹا عصب)	۲۷۲	سنیئرم اوریلی مائیجس (بڑا بینوی مرکز)	۲۲۱	شریان حرقفی اصلی	۷۴
سمپے تھیٹک نرو (اعصاب شرکیہ)	۲۷۴	سنیری امپریشنز حسی تاثرات	۲۴۳	شریان حرقفی باطن	۷۴
سن۔ انسان۔ دانت	۱۱۵	سنیری نروز (اعصاب حسی)	۲۳۶	شریان حرقفی ظاہرہ	۷۵
سنائی کس طرح دیتا ہے	۳۴۹	سین سز (حواس)	۲۷۷	شریان زندی	۷۴
سنکوپی۔ غشی	۲۶۸	سین سوریم (مرکز حواس)	۲۷۹	شریان سباتی ظاہرہ	۷۳
سوئٹ گلینڈز زندہ عرقیہ	۳۴۸	سینہ اعضائے سینہ	۵۳	شریان ساعدی غائرہ	۷۳
سوپرا رنیل کیپسول		سینہ کا درمیانی پردہ	۹۴	شریان شحمی	۷۵
سوپرا اسٹرنل ریجن (ہنسلی کے اوپر کا مقام)	۵۵	سینہ کی جھلی	۹۴	شریان قصبی مقدم	۷۵
سوپیری اوریٹا کیولر والو	۸۳	سینہ کی شریان اعظم	۷۴	شریان قصبی مؤخر	۷۵
سوداء	۱۵۹	سینہ کی نالی	۱۸	شریان الکبد	
سوراخ بول	۱۹۴	سینہ کی ہڈیاں	۲۶/۳۱	شریان کی ساخت	۷۱
سوراخ فرج	۱۹۴	سینہ کی ہڈی سے اوپر کا مقام	۵۵	شریان لااسم لہ	۷۲
سونگھنے کا عصب	۲۷۰	سینہ کی ہڈی سے نیچے کا مقام	۵۶	شریان نبض	۷۴
سونگھنے کی ماہیت	۲۲۹	سینہ کے اعضاء	۵۴	شریان مابض	۷۵
سیرم۔ زرد آب	۴۴	سینہ کے حصے	۵۴	شریان وریدیہ	۷۸
سیرم و پلازما کا فرق	۴۴	سیلوچرا سلائیاں لاروز	۳۴	شفت (لب)	۱۱۴
سی رشس گلینڈز زندہ عرقیہ	۳۴۸	**ش**		شفران صغیران چھوٹے لب	۱۹۲
سیکرل اینڈ کاسیجل نروز	۲۳۷	شامہ ما طیبہ	۳۴۰	شفران کبیران بڑے لب	۱۹۱
سیکم (آغور)	۱۳۶	شکر شیمیہ	۲۲۲	شکل وہیاست رحم	۲۰۰
سکینڈری پیمس	۳۵	شرم گاہ	۱۸۹	شکم (پیٹ)	۱۲۲
		شرائین۔ عروق صوارب	۶۸	شکاف انجوف	۱۵۱

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

عناصر جسم انسان ۲۰
عنق الرحم ۱۹۹
عنق الطحال ۱۶۲
عنق الکلیہ ۱۶۸
عنق المثانہ ۱۷۲
عورتوں کا خصیہ ۲۰۲
عورتوں کے اعضاء تناسل ۱۸۹
عورتوں کا مادۂ تولید ۲۰۳
عین وقوت باصرہ ۲۸۲

غ

غدد بلغمیہ ۱۲۷
غدد جاذبہ ۸۷
غدد مہلیز ۱۹۳
غدد شحمیہ ۳۴۸
غدد عرفیہ ۳۴۸
غدد لعابیہ ۱۱۹
غدد معدیہ ۱۲۸
غدد مذی ۱۷۷
غدد مصمیہ ۱۲۷
غدۂ بلغمیہ۔ غدۂ ہستدیرہ ۱۲۰/۱۲۴
غدۂ تحت الفک ۱۱۹
غدۂ تحت اللسان ۱۱۹
غدۂ ترسیہ ۱۰۶
غدۂ ترمیہ ۲۱۹
غدۂ جنین ۱۰۷
غدۂ خلف الاذن ۱۲۰
غدۂ قدامیہ۔ غدۂ مثانہ ۱۷۷
غدہ مذی ۱۷۷
غدہ لخامیہ ۲۶۰
غدہ وری ۱۷۷
غدہ ورقیہ ۱۰۶
غذا کا ہضم ۱۴۴
غذا کی نالی ۱۱۳
غذا کیسے جزو بدن ہوتی ہے ۱۴۱
غشاء الاضلاع ۹۴
غشاء البکارت ۱۹۵
غشائے جرثومی بیضہ
غشاء الریہ ۹۴
غشاء الصدر ۹۴
غشاء صلب ام غلیظ ۲۰۸
غشاء طبلی ۳۲۲
غشائے عنکبوتی ۲۰۹
غشاء قشری ۱۶
غشائے لین ۲۰۹
غشائے مستبطن القلب ۶۰
غشائے مفروش ۳۲۲
غشی ۲۶۸
غضروف بکبی ۲۹
غضروف ۹۱
غلاف دل۔ تامور ۵۹
غلاف عصب ۱۹
غلسمہ (زم تالو) ۱۱۷
غوتر (گیگھ) ۱۰۶
غیر ارادی عضلات ۳۷
غیر متحرک جوڑ ۳۴

ف

فائبرین (لیفین) ۴۴/۱۴۱
فاسانیوی کیولرس (رحمزہ زور رقیہ) ۱۷۶
فاسیز (سلقوم) ۱۱۸
فاسفین ۳۱۷
فاصل التصفن ۱۷۹
فاصل لاصع ۲۲۴
فتحۃ المبیل (فرج) ۱۹۴
فخذین الدماغ ۲۱۹
فرخ آنت (قولون) ۱۳۷
فرج (رحبل) ۱۹۶
فرج کا سوراخ ۱۹۴
فرج کے بڑے لب ۱۹۰
فرج کے چھوٹے لب ۱۹۱
فرجۂ اجوف ۱۵۱
فرجۂ باب ۱۵۱
فرجۂ طولیہ
فرجۂ مرارہ ۱۵۱
فرجہ مستعرضہ ۲۲۴
فرمینٹ (خمیر) ۱۴۳
فرنیا طبیعی اورم ۱۱۴
فسٹراف ڈکس وبونس ۱۵۱
فشراف گال بلیڈر ۱۵۱
فشراف سلویس ۲۱۸
فشراف وینا کیوا ۱۵۱
فضیلت قوت سامعہ ۳۳۵
فلمنٹ ۲
فلیگ میٹک پمرمنٹ ۱۶۱
فلیگ مون (خلفونی) ۱۶۱

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

شگاف طولانی ۱۵۱
شگاف مجری دریدی ۱۵۱
شہادت حواس ۲۸۱
شہیق رم کھینچنے کی آواز ۱۰۰

ص

صدر یا تھوڑی پس (سینہ) ۵۳
صدری یا سینہ کی ہڈی ۳۱
صدقۃ الاذن کان کی کرکری ۳۶۰
صفات بول ۱۷۳
صفاقات نشیمن زیر جھلیاں ۱۳۹
صفراء (پت) ۱۵۵
صفن (فوط) ۱۷۸
صفیحہ رماویہ دماغ ۲۱۷
صلب عمود الفقرات ریڑھ ۳۱
صمام دقیقی واعوری ۱۳۶
صیوان الاذن کان کی کرکری ۳۲۰

ض

ضرورت نفس ۹۷
ضفیرہ شمسیہ ۲۲۲

ط

طبقات چشم ۲۸۸
طبقہ شبکیہ (جالیدار پردہ) ۲۸۹
طبقہ صلبیہ (سخت پردہ) ۲۸۸
طبقہ عنبیہ (انگوری پردہ) ۲۸۹
طبقہ قرنیہ (شفاف پردہ) ۲۸۸
طبقہ مشیمیہ (عروقی پردہ) ۲۸۸
طبقہ ملتحمہ (آنکھ کی جھلی) ۲۸۶
طحال (تلی) اور اس کے افعال ۱۶۳
طمث (حیض) ۲۰۵

ظ

ظروف کیلوس ۹۰
ظروف منی ۱۸۳

ع

عرف جبلی ۱۷۵
عروق - رگیں ۶۸
عروق جاذبہ ۸۵
عروق جاذبہ کبد
عروق جاذبہ کی رطوبت ۸۶
عروق خارجہ ۸۸
عروق خشنہ ۹۳
عروق داخلہ ۸۸
عروق سواکن ۷۸
عروق شعریہ ۷۷
عروق ضوارب ۶۸
عروق کیلوسیہ ۸۶/۸۵
عروق لبنیہ ۸۵
عروق مصاصہ ۸۵
عروق نبضی ۲۲۴
عصب اشتیاقی ۲۷۰
عصب بصر عصب مجوف ۲۷۰
عصب تحت اللسان ۲۷۲
عصب ثلاثی وجہی ۲۷۱
عصب راجع ۲۷۱
عصب سمع ۲۷۱
عصب قصبی خلفی ۲۷۴
عصب قصبی مقدم ۲۷۴
عصب لسانی وحلقی ۲۷۵
عصب مالفضی (اسی) ۲۷۴
عصب مانفضی وحشی ۲۷۴
عصب مبعد مقلہ ۲۷۱
عصب محرک مقلہ ۲۷۰
عصب نخاعی اضافی ۲۷۲
عصب وجہ ۲۷۱
عصب وزکی صغیر ۲۷۳
عصب وزکی کبیر ۲۷۳
عصبی تاثرات ۲۵۳
عصبی ریشوں کے عام افعال ۲۳۶
عصبی مادہ ۱۸
عضلات گوشت ۳۶
عضلہ ہدہیہ ۲۸۹
عضلین ۱۴۱
عضو تناسل ۱۸۶
عظام الاذن ۳۱
عظام رصغ
عظام رسغ قدم
عظام سمانیہ ۲۹
عظام وجہ ۳۰
عظم لامی ۳۲
عقدہ ۱۹
عقل کی تعریف
عکس تاثیر ۲۵/۲۴۱
عکس سیدھا کیوں نظر آتا ہے
علق کے معنی ۱۳
علقہ ۱۱
عمود الفقرات ریڑھ ۲۶

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

فم (منہ) ۱۱۳
فم معدہ ۱۶۶
فنڈس یوٹرائی (قاع ارحم) ۱۹۸
فوائد خون ۴۷
فوائد دندان ۱۱۷
فورتھ وینٹریکل چوتھا بطن ۲۳۰
فوطہ ۱۴۸
فیٹس (شحومات) ۱۴۲
فیرنگس (حلق) ۱۲۱
فیشیا ڈنٹشیا ۲۲۴
فیشیاز (موٹی جھلیاں) ۳۸
فیشیل بوٹر (چہرے کی پٹھاں) ۳۰
فیشیل نرو (چہرے کا عصب) ۲۷۱
فیشیل وین (چہرہ یکی ورید) ۸۰
فیلڈ آف وژن (میدان بصارت) ۳۱۱
فیلوپین ٹیوب (نفیر یا قناۃ) ۲۰۱
فیمرل آرٹری (ران کی شریان) ۷۵

ق

قاذفان ۔ نفرین ۲۰۱
قارورہ ۱۸۲
قریب نظری ۳۰۴
قسم البطی الیسر ۵۶
قسم البطی الیمن ۵۶
قسم الربی الیسر ۱۲۵
قسم الربی الیمن ۱۲۵
قسم یمین الکتفین ۵۸
قسم تحت الابط الایسر ۵۶
قسم تحت الابط الایمن ۵۶
قسم تحت الترقوہ الایسر ۵۶
قسم تحت الترقوہ الایمن ۵۶
قسم تحت الثدی الیسر ۵۶
قسم تحت الثدی الایمن ۵۶
قسم تحت سنسنہ کتفیہ الیسر ۵۸
قسم تحت سنسنہ کتفیہ الایمن ۵۸
قسم تحت العضاریف الیسر ۱۲۴
قسم تحت الضفادع الیمن ۱۲۴
قسم تحت الکتف الایمن ۵۸
قسم تحت الکتف الایسر ۵۸
قسم تحت القص ۵۶
قسم خشلی ۱۲۵
قسم سری ۱۲۴
قسم فوق الترقوہ الیسر ۵۵
قسم فوق الترقوہ الایمن ۵۵
قسم فوق سنسنہ کتفیہ الیسر ۵۸
قسم فوق سنسنہ کتفیہ الایمن ۵۸
قسم فوق القص ۵۵
قسم فوق المعدہ ۱۲۴
قسم القص ۵۶
قسم قطنی الیسر ۱۲۴
قسم قطنی الایمن ۱۲۴
قشرۃ الکلیہ ۱۶۶
قشری مادہ ۱۶
قصبہ الریہ ۹۳
قعر رحم (قاع رحم) ۱۹۸
قضیب (آلت) ۱۸۶
قلب (دل) ۵۹
قلب متحرک بالذات ۶۷
قلتہ المثانہ ۱۷۲
قنطرۃ الکلیہ ۱۵۱
قوت توازن (حس توازن) ۳۳۳
قوت حرکت
قوت حس ۲۳۶
قوت ذائقہ وشامہ ۳۴۳
قوت ذائقہ ولامسہ ۳۴۷
قوت لامسہ وجلد ۳۴۶
قوت ماسکہ (شبکیہ) ۳۱۴
قوت نفسانی ۲۸۴
قوت ہاضمہ ۱۴۶
قوت الاورطی ۷۲
قوقعہ (کان کا گھونگا) ۳۱۸
قولون ۱۳۷
قولون صاعد ۱۳۷
قولون مستعرض ۱۳۷
قولون نازل ۱۳۷
قیام ذائقہ ۲۴۵
قید شفوی اسفل ۱۱۴
قید شفوی اعلیٰ ۱۱۴
قیف ۔ قمع ۲۱۸

ک

کاسل (کیلوں) ۱۳۱
کایم (کیموس) ۱۳۱
کارپس سٹرائی (جسم راہ کا بھالا) ۲۲۲
کارپس میری (جسم رحمانی) ۲۲۳
کارپس کلوزم (جسم واصل) ۲۲۱
کارپل پونز (پہونچے کی ہڈیاں) ۳۲

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کاربوہائیڈریٹس (شحومات) ۱۴۲
کاروزی لگیمنٹ (رباط کلیل) ۱۵۰
کاکلیار گھونگا ۳۱۸
کامن ایلیک آرٹری (پیڑو کی شریان) ۷۵
کامن بائل ڈکٹ (صفرا کی عام نالی) ۱۵۳
کامن سینس (حس مشترک) ۲۷۹
کامن کیرائڈ آرٹری (گردن کی شریان) ۷۳
کان - گوش ۲۵
کان ٹیکٹ (ملاؤ) ۲۷۸
کان بجنا ۲۳۲
کان کا عصب ۲۷۱
کان کی اندرونی ہڈیاں ۲۲۴
کان کی کری ۲۲۳
کان کی گلٹی ۱۲۰
کان کی نالی ۳۲۱
کان و شنوائی ۳۲۰
کانی آنت ۱۳۶
کبد - جگر ۱۴۹
کچلیاں (کیلے دانت) ۱۱۶
کڈنی - کڈنیز (گردے) ۱۶۴
کرمٹے لائن لینز (آنکھ کا مونی) ۲۹۱
کرم منی ۸
کروا سیریبرائی (ساقین دماغ) ۲۱۹
کروا سیریبلائی (ساقین مینع) ۲۲۰
کرومو سومز ۸/۵
کریہ - کریات ۴
کریسنل نروز (اعصاب دماغ) ۲۷۰
کری - عضروف ۲۹
کلائی کی اندرونی درید ۸۱
کلائی کی درمیانی درید ۸۱
کلائی کی شریان ۷۴
کلاٹ (خون کا تھکا) ۴۴
کلاہ گردہ ۱۶۸
کلی ٹورس (بظر) ۱۹۲
کلیہ (کلیتین گردے) ۱۶۴
کنجنکٹائیوا (ملتحمہ) ۲۸۵
کنڈکشن (ایصال تاثیر) ۲۴۹
کنکٹو ٹشو (الحاقی مادہ) ۱۶
کنویکس گلاس (محدب شیشہ) ۲۹۳
کوا (ملاذہ) ۱۱۸
کوپرز گلینڈز (غدود ی) ۱۷۷
کوتاہ نظری ۳۰۴
کورائڈ (طبقہ مشیمیہ) ۲۸۸
کورائڈ پلکس (صفیرہ مشیمیہ) ۲۲۲
کوکن (رقولون) ۱۳۷
کھانسنا ۱۰۵
کھوپری ۲۴
کیپلیریز (عروق شعریہ) ۷۷
کیزین (جبنین) ۱۴۱
کیسہ ۴
کیسوں کا ملاپ ۶
کیسوں کی افزائش ۶
کیفیت اور ادراک دماغ و عقل ۲۶۶
کیفیلک وین (ورید اکحل) ۸۱
کیلوس - کیموس ۱۳۱
کینائن (دانت) ۱۱۵

گ

گال - رخسار ۱۱۴
گال بلیڈر (پتہ) ۱۵۴
گردن رحم ۱۹۹
گردن کی اندرونی درید ۸۱
گردن کی بیرونی درید ۸۰
گردن کی شریان ۷۳
گردن کے پٹھے ۲۷۳
گردہ گردے ۱۶۴
گردوں کی نالیاں ۱۷۰
گردہ کی ٹوپی ۱۶۸
گریٹ شیاٹک سوراخ ۳۷۳
پیڑو کا بڑا عصب
گلاسو فرنجیل نرو ۲۷۱
زبان و حلق کا عصب
گلامی روس گول گچھا ۱۶۶
گلوٹین (رباط لین) ۱۴۱
گم - گمز (مسوڑھے) ۱۱۵
گمفوسس (گڑا ہوا جوڑ) ۳۵
گنگلیاں - گرہ عقدہ ۱۹
گوشت ۳۶
گول بند ۱۵۱
گول پیالیدار جوڑ ۳۶

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

گھٹنے کا جھٹکا ۲۴۸
گھٹنے کی نشریان ۷۵
گہری وریدیں ۷۹
گھومنے والا جوڑ ۳۶
گھونگا (کانکا) ۲۲۸
گھنگھ ۱۰۶
گیسٹرک جوس (رطوبت معدی) ۱۲۸
گیسٹرک فالیکلز (خمل معدہ) ۱۲۷
گیہنے ٹرنم (ریوقامتی) ۲۶۱

ل

لارنج انفیکشن (ربڑی نلی) ۱۳۶
لامسہ باطنیہ ورہمیہ ۳۵۲
لانجی ٹیوڈینل فشر (شگاف طولانی) ۱۵۱
لانجی ٹیوڈینل لگیمنٹ (رباط طولانی) ۵۰
لب الکلیہ ۱۶۵
لبلبہ ۱۲۹ لبلبین ۱۶۲/۱۴۴
لبے (لوزتین) ۱۱۸
لپ - لب ۱۱۴
لیٹرل انسابیز (رباط جانبی) ۱۱۵
لیٹرل لگمنٹس (رباط جانبی) ۱۵۰
لیٹرل ونٹری کلز (بطول معہ جانبی) ۲۲۲
لکنہ - لثات ۱۱۵
لسان اور قوت ذائقہ ۳۴۱
لسان المزمار ۹۲
لفائفی (پیچیدہ آنت) ۱۳۴
لفافہ سفنہ ۱۲۴
لگیمنٹس (رابطہ) ۳۳
لمبر نروز (اعصاب قطنی) ۲۷۳
لمف (بلغم) ۵۰/۸۸
لمف (رطوبت طلیہ) ۷۵
لمفوسائٹ ۸۸
لمفے عمس (عروق جاذبہ) ۸۵
لمفے نک ٹمپریمنٹ بلغمی مزاج ۱۶۱
لمفے نک کیپلریز (عروق لمفاویہ) ۱۵
لمفے نک گلینڈز (غدد لمفاویہ) ۸۷
لنگنہ رشش - پھیپھڑے ۹۵
لوبز آفدی لور (جگر کے لوتھڑے) ۱۵۲
لور - جگر ۱۴۹
لوئر ایکسٹری میٹیز (ٹانگیں) ۲۸
لوزتین (لبے) ۱۱۸
لہات - کوا ۱۱۸
لیبیا مائنورا (چھوٹے لب) ۱۹۱
لیبیا ماجورا (بڑے لب) ۱۹۰
لے رنکس (حنجرہ) ۹۱
لیسر کولیشن (دوران خون میں) ۵۱
لیفٹ آریکل (بایاں اذن قلب) ۶۳
لیفٹ انفرا پیائل ریجن ۵۸
لیفٹ انفرا سکیبولر ریجن ۵۸
لیفٹ انفرا ایگزلری (ریجن) ۵۶
لیفٹ انفرا کلیویکیولر (ریجن) ۵۶
لیفٹ انفرا میمری ریجن ۵۶
لیفٹ انگوئنل ریجن ۱۲۵
لیفٹ ایگزلری ریجن ۵۶
لیفٹ سوپرا سپائل ریجن ۵۸
لیفٹ سوپرا کلیویکیولر (ریجن) ۵۵
لیفٹ لمبر ریجن ۱۲۴
لیفٹ ہائپوکانڈریک ریجن ۱۲۴
لیفین ۴۴
لیکٹی فیرز (عروق لبنیہ) ۸۷
لیکر کل سیک (آنسو کی تھیلی) ۲۸۵
لیکرمیل کینال (آنسو کی نالی) ۲۸۵
لیکرمیل گلینڈ (غدۃ الدمع) ۲۸۴
لیکوسائٹ ۸۸

م

مائی اوپیا (فریب نظری) ۳۰۴
مائی بومی ان کلینڈر ۲۸۴
مادۂ بول - یوریا ۱۷۳

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مادہ تولید اور حسین	۲۰۴	محرک اثرات	۲۴۳	معاء مستقیم	۱۳۸
مادۂ حیات	۴	محسوسات وادراک	۲۸۱	معالیق خصیہ	۱۸۲
مالٹوز	۱۴۴	محور عصب		معدہ	۱۲۵
مالٹس سینرس (کوہ زہرہ)	۱۸۹	مخ (بھیجا)		معدہ کا بالائی سوراخ	۱۲۶
ماہیت انتشار قضیب	۱۸۸	مخ کبیر (بڑا دماغ)	۲۱۲	معدہ کا ہضم	۱۲۸
ماہیت بصارت	۲۹۲	مڈل انسائرز (دانت)		معدے کے اوپر کا مقام	۱۲۴
ماہیت ذائقہ	۳۴۲	مڈل ایئر (درمیانی کان)	۲۲۳	معوین	۱۴۳
ماہیت سماعت	۳۳۰	مذی	۱۷۷	معیر۔ قاذف نالی	۲۰۱
ماہیت شم	۳۳۹	مذی کی گلٹی	۱۷۷	مفاصل واربطہ	۳۴
ماہیت لامسہ احساس لمس	۳۵۰	مرابض		مفصل اتفاقی	۳۵
مالپوسعین (لعلین)		مرارہ (پتہ)	۱۵۴	مفصل داخل	۳۶
مبرز	۱۳۸	مراکز عصبیہ کے وظائف	۳۳۹	مفصل دوری	۳۶
متحرک جوڑ	۳۴	مردوں کے اعضاء تناسل	۱۷۶	مفصل زاوی	۳۶
متعلقات چشم	۲۸۳	مرضی حرکات منعکسہ	۲۴۴	مفصل شقی مفصل میزابی	۳۵
مثانہ	۱۷۱	مرکز بیضی اصغر	۲۲۱	مفصل عسر	۳۵
مثانہ کی گلٹی	۱۷۷	مرکز بیضی کبیر	۲۲۱	مفصل متحرک	۳۵
مجازی ہلالیہ	۳۲۷	مرکز تنفس	۱۰۳	مفصل مدوّر	۳۴
مجری بول۔ نائرہ	۱۹۴	مرکز حواس	۲۷۹	مفصل مرکوز	۳۵
مجری جاذب (یمین)	۹۰	مرکز حیات	۱۰۳	مفصل مسکح	۳۶
مجری صدر	۸۵/۸۸	مری	۱۲۲	مفصل مسنن	۳۵
مجری غذا	۱۱۳/۱۲۳	مستقر المنی	۱۸۳	مفصل مؤثق	۳۴
مجری کبد	۱۵۴	مسکولر ٹشو (عضلاتی مادہ)	۱۷	مقام ذائقہ	۳۴۴
مجری مرارہ	۱۵۴	مسکولر سینس (حس عضلی)	۱۴۸	مقام قوت لامسہ	۳۴۹
مجری منی		مسوڑے	۱۱۵	مقدار بول	
مجمع نور۔ مجمع البصر	۲۱۸	مسی والی ٹیپلز (خیالات چشم)	۳۱۶		
مجمع العظام (کھٹھڑی)	۳۰	معاء دقیق	۱۳۴		
مچھلیاں۔ عضلے	۳۶				

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مقدار ہوائے تنفس ۱۰۱
مقدم دماغ ۲۱۲
مقعد ۱۳۸
مکسی ڈیما (مرض) ۱۰۷
ملحقات جلد ۳۴۷
ملحقات رحم ۲۰۰
ملک ٹیتھ (دودھ کے دانت) ۱۱۵
ممر بنا ٹمپانی ۲۲۲
میمری گلینڈز (چھاتیاں) ۲۰۶
منقار کس بنظر ۱۹۱
منہ ۱۱۳ منی ۱۸۵
منی کی تھیلیاں ۱۸۳
منی کی نالی ۱۸۴
مینیئرز ڈیزیز (رودادِ سمعی) ۳۲۵
مواد شحمیہ ودہنیہ ۱۳۱/۱۳۲
مواد شکریہ ونشائیہ ۱۴۲
مواد غاذیہ ۱۳۰
مواد غاذیہ ونشائیہ ۱۳۰
مواد مغذیہ ومواد ملحمہ ۱۴۱
مُوتھ (منہ) ۱۱۳
مؤخر دماغ ۲۲۸
موٹر آکولی نرو (عصب) ۲۳۶
موٹر امپریشنز (حسی تحریکات) ۱۴۴
موٹر نروز (اعصاب حرکت) ۲۳۶
مولڈ ارٹھیں ۱۱۵
مہبل عنق الرحم (فرج) ۱۹۶
می اٹیس یوریزلیس (مجری بول) ۱۹۴
میدان بصارت ۳۱۱
میڈلا اُبلانگیٹا (نخاع مستطیل) ۲۲۱/۲۲۰
میڈیاسٹائم (حجاب منصف) ۹۴
میڈین دین (دریدہ مفت انزال) ۸۱
مین سیتر (حیض) ۲۰۵
میننجیز (دماغ کے پردے) ۲۰۷
میوکس یا بلغمی مادہ ۱۷۴
میوکس گلینڈز (غدد بلغمیہ) ۱۲۷

ن

نائزہ (پیشاب کی نالی) ۱۷۸
ناف کا مقام ۱۶۴
ناک اور بو یائی ۳۳۶
ناک کا جوف ۳۳۶
نبض کی شریان ۷۴
نتائج تجربہ دوران خون ۵۳
نخاع (حرام مغز) ۲۳۳
نخاع مستطیل (سرحرام مغز) ۲۳۱
نخاعین (پیچو مٹی ٹرین) ۲۶۱
ندیمی وریدیں ۷۹
نرخرہ ۹۱
نزدام پیشنز (عصبی تاثرات) ۲۵۳
نروز (اعصاب) ۲۳۵
نروس کشور (عصبی مادہ) ۱۸
نروس سسٹم (نظام عصبی) ۲۰۶
نسل بڑھانے والے اعضاء ۱۷۶
نسیج ریافت وحمایت (مادہ) ۱۵
نسیج الحاقی (الحاق مادہ) ۱۶
نسیج بشری (فتری مادہ) ۱۶
نسیج عضلاتی (گوشتی مادہ) ۱۷
نسیج عصبی (عصبی مادہ) ۱۸
نسیمن الاوتار
نشاستہ ۱۴۲
نشوونما جنین ۱۲
نصف کرہ دماغ کی اندرونی سطح ۲۱۵
نطفہ (منی) ۱۸۵
نطفہ کے معنی ۳
نظام عصبی ۲۰۶
نظر جمانا (ایکامو ڈیشن) ۳۰۲
نفس۔ نفس ناطقہ ۴۸
نفس سائکہ (روح رواں) ۴۸
نقطہ جرثومیہ ۸
نمکیات ۱۴۲
نور یا روشنی آنکھوں کے اندر پیدا ہو سکتی ہے ۳۱۷
نوز۔ ناک ۳۶

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

نوم یقظہ (خواب بیداری) ۲۷۰
نی جرک (گھٹنے کا جھٹکا) ۲۴۸
نیزل ڈکٹ (ناک کی نالی) ۲۸۶
نیزل فاسی (ناک کے غار) ۳۳۶
نیمو گیسٹرک نرو ۲۷۱
نبیذ ۲۶۸
نیوری (تارعلاۃ عصب) ۱۹
نیوکلی (اس (نیواۃ)) ۵
نیوما زوئی کن (فلیپ) ۵۰
نیوما ئی کن (اپی مل سپرٹ) ۵۱
نیوما فرینجیل سپرٹ ۵۰

و

وائٹل کیپسٹی (آفدی چیسٹ (وسعت سینہ)) ۱۰۲
واس ڈیفرینس (مجری منی) ۱۸۳
وٹرئس ہیومر (رطوبت زجاجیہ) ۲۹۲
وٹلائن ممبرین (غلاف زردی بیضہ) ۸
وٹلس۔یوک (زردی بیضہ) ۷
وڈی ۱۷۷
ودی کی گلٹیاں ۱۹۴/۱۷۸
ورٹبرل کالم (ریڑھ) ۳۱/۲۶
ورقین (جوہر غدد درقیہ) ۳۶
ورمی فارم پراسس (زائدہ اعور) ۳۶
وریدہ وریدین ۷۸
وریدالبطی (بغل کی وید) ۸۲
وریدالجوف صاعد ۸۳
وریدالجوف نازل ۸۳
وریدالکحل (ہفت اندام) ۸۱
وریدباب ۸۳
وریدباسلیق ۸۳
وریددرجگر ۸۱
وریدزندی مقدم ۸۱
وریدزندی مؤخر ۸۱
وریدشریانی (پلمونری آرٹری) ۷۲
وریدصافن انسی ۸۳
وریدصافن وحشی ۸۳
وریدعضدی خائر ۸۲
وریدفرد صغیر ۸۲
وریدکبیر ۸۲
وریدقیفال ۸۱
وریدلااسم لہ (بے نام وریدیں) ۸۳
وریدوجہ ۸۰
وریدوں کی نہایت باریک شاخیں ۷۷
ورل ان سیشن (حس عشوی) ۳۱
وسعت سینہ ۱۰۲
ولائی (مخملی روئیں) ۱۸۰/۱۸۴
ولوا (فرج) ۱۹۴
وکل کارڈز (آواز کی تاریں) ۹۲
ویجائنا (اندام نہانی) ۱۹۶
وریدمانٹیسم (عرق جبلی) ۱۷۵
ویسی کیولی سیمی نیلیز (خزف المنی) ۱۸۳
ویسوموٹر سنٹر (مرکز محرک عروق) ۱۱۲
ویلم انٹرلازیٹم (عروق جھلی) ۲۲۴
ویلو دلی کینی وٹیٹر ۱۳۵
وین۔وینز (وریدیں) ۷۸
وینا ازی گاس مائنر (وریدفرد صغیر) ۸۲
وینا ازی گاس میجر (اوریدفرد کبیر) ۸۲
وینٹری کل (بطن خانہ) ۶۱
وی نیولز (بہت باریک وریدیں) ۷۷

ہ

ہائی ایڈلبرگ (بند عظم لامی) ۳۱
ہائی پرسٹرڈیپا (بلعید نظری) ۳۰۵

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہاتی پو بلاسٹ بیرونی طبقہ جنین	۱۰	ہضم غذا	۱۱۲	بلو سپاٹ (زرد نقطہ چشم)	۳۱۲
ہاپیو گلاسل زرد نچلا عصب زبان	۲۷۲	ہضم اول۔ ہضم معدی	۱۲۹	یو ٹرس (رحم۔ ناف)	۱۹۷
ہاپیلم (سترہ۔ ناف)	۱۶۳	ہضم دوم۔ ہضم کبدی	۱۴۶	یورک ایسڈ حمض بول	۱۷۴
ہائمن (پردہ بکارت)	۱۹۵	ہضم سوم۔ ہضم عروقی	۱۴۶	یورن (بول پیشاب)	۱۷۳
ہارٹ ڈپریشن	۵۹	ہضم چہارم یعنی ہضم کھٹوی	۱۴۶	یوریا (بولینا)	۱۷۴
ہارٹ ڈپریشن سخت تالو	۱۱۷	ہضم معوی	۱۳۹	یورینری فرینن	۱۷۰
ہپیٹک آرٹری (شریان چکمہ)	۱۵۳	ہفت اندام (رنگ)	۸۱	یورتھرا۔ پیشاب کی نالی زنانہ	۱۹۴
ہپیٹک ڈکٹ (پت کی نالی)	۱۵۳	ہم سانس کیسے لیتے ہیں	۹۹	یورتھرا پیشاب کی نالی مردانہ	۱۷۵
ہپیٹک سلیم (ذمات جگر)	۱۵۴	ہمیں کیونکر دکھائی دیتا ہے	۲۹۲	یوک (زردی بیضہ)	۷
ہپیٹک فلکسر (تعریج کبدی)	۱۳۷	ہموا کی نالی	۲۹۳	یو دولا (رحلق کا کوا)	۱۱۸
ہپیٹک کلنے فلکس (عروق جاذبہ کبد)	۱۵۴	ہوائے انتانی	۱۰۱	خاتمہ	
ہپیٹک وینز (وادردہ کبدیہ)	۱۵۳	ہوائے باقی	۱۰۱		
ہچکی آنا	۱۰۵	ہوائے محفوظ	۱۰۱		
ہدب۔ آمداب	۲۸۴	ہوائے نفس	۱۰۲		
ہڈیوں کی شکل وساخت	۲۱	ہونٹ (لب)	۱۱۴		
		ہنکل عظمی (ڈھانچ)	۲۱		
		ی			
		ییوسٹ موٹ رنگ مارکس	۳۷		

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

تشریح ومنافع الاعضاء

اناٹومی وفزیالوجی

(یا)

تشریح جسم (و) منافع الاعضاء

مقدمہ

اس عالم موجودات میں موالید ثلاثہ یعنی جمادات ونباتات وحیوانات تین قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جن میں سے جمادات تو بے جان ہیں۔ اور نباتات وحیوانات جاندار ہیں اور ان کے اقسام بے شمار ہیں۔

جاندار چیزوں کی پیدائش وافزائش کے دو طریق ہیں (۱) طریق انقسام (۲) طریق تناسل چنانچہ ادنیٰ ترین طبقہ کے نباتات جو صرف ایک ہی ذرہ (سیل[1]) کے بنے ہوئے ہوتے ہیں مثلاً بیکٹیریا[2] (جراثیم یا خرد بینی نباتات وغیرہ) ان کی پیدائش (۱) طریق انقسام سے ہوتی ہے۔ وہ اس طرح سے ہے۔ کہ ایک بیکٹیریم یعنی برثومہ (—) ذرا لمبا ہو کر درمیان سے باریک (—) ہو کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے (—) اور پھر یہ ہر ایک حصہ ایک نیا بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن متوسط و اعلیٰ طبقہ کے نباتات جو کہ تخم یا بیج سے پیدا ہوتے ہیں چنانچہ بعض نباتات کے پھولوں میں نر و مادہ کے عضاء تناسلی علیحدہ علیحدہ پیدا

---

[1] ایک مکمل گل یا پھول کے مندرجہ ذیل چار اعضاء ہوتے ہیں جن میں سے بالائی عضو مذکور اور زیرین عضو مؤنث ہوتا ہے۔

[2] مفرد

[1] Cell

[2] Bacteria,

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہوتے ہیں اور بعض نباتات میں نر و مادہ پھول علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں لیکن بعض اعلیٰ طبقہ کے نباتات نر و مادہ درخت علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ اور نر درخت میں نر پھول پیدا ہوتے ہیں اور مادہ درخت میں مادہ پھول پیدا ہوتے ہیں اور جب نر پھول کی دھول اڑ کر مادہ پھول پر گرتی ہے تب ان کے نر و مادہ اعضاء تناسلی کے وصال سے تخم یا بیج پیدا ہوتا ہے۔ جو درحقیقت نباتی جنین ہوتا ہے۔ اس قسم کے نر و مادہ درختوں کی بہترین مثال درخت خرما یعنی کھجور کا درخت ہے چنانچہ جب تک نر درخت خرما کے پھول کی دھول مادہ

(۱) مسند گل (کیلکس) یہ پھول کا بیرونی حصہ ہوتا ہے۔ یہ عموماً سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کے اندر کاسۂ گل چتر گل اور زر گل وغیرہ اجزاء ہوتے ہیں۔ جن کے نشوونما پانے یا مکمل ہونے تک یہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔

(۲) کاسۂ گل (کورولا) یہ پھول کا اندرونی کاسہ نما حصہ ہوتا ہے۔ جس میں پنکھڑیاں ہوتی ہیں۔ اس کا رنگ عموماً رنگین ہوتا ہے۔

(۳) چتر گل (سٹے منس) یہ پھول کا درمیانی حصہ ہوتا ہے۔ اور یہ رگ گل (فلمنٹ) کا مجموعہ ہوتا ہے ہر ایک رگ گل ایک باریک سی تار ہوتی ہے۔ جس کی چوٹی پر دو کیسہ نما زیرے لگے ہوتے ہیں جنہیں زر گل را منتھرا کہتے ہیں۔ ہر ایک زیرے میں ایک سفوف یا دھول (پولن) ہوتی ہے جس میں قوتِ تولید یا زرخیزی کی طاقت ہوتی ہے۔ یہ چتر گل ہی پھول کا عضو تذکیر یا نر ہوتا ہے چنانچہ اسی کے زر گل کی دھول بقچۂ گل کے دہن رحم پر گر کر اور اس کی نالی کے ذریعے بیضہ دان میں پہنچ کر پھر نباتی بیضہ کے باریک سوراخوں کے ذریعے اس میں داخل ہو کر یا اس سے واصل ہو کر اس کو باردار کر دیتی ہے اور ان دونوں کے وصال سے تخم پیدا ہوتا ہے۔

(۴) بقچۂ گل (پسٹل) یہ پھول کا زیریں حصہ ہوتا ہے۔ اور یہ اس کا عضو ثانیت یعنی مادہ عضو ہے۔ یہ درحقیقت پھول کا رحم ہے۔ اس میں ایک یا زیادہ مُبیض یعنی بیضہ دان (ادا ڈری) ہوتے ہیں اور ہر ایک بیضہ دان میں ایک یا چند نباتاتی انڈے (اوویول) ہوتے ہیں۔ ہر بیضہ دان سے تار یا رگ نکل کر اوپر کو جاتی ہے۔ جس کو رگ رحم یا رحم کی نالی کہتے ہیں۔ اور اس کے بالائی سرے کو دہن رحم کہتے ہیں چنانچہ زر گل کی دھول دہن رحم پر گر کر اور پھر اس کی نالی کے ذریعے بیضہ دان میں پہنچ کر اور بیضہ کے ساتھ وصل کر کے اس کو باردار کرتی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ !!

برگ درختانِ سبز در نظرِ ہشیار ہر ورقے دفتریست معرفت کردگار

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

درخت خرما کے پھول پر نہ گرے تب تک مادہ درخت خرما کو پھل نہیں لگتا۔ اور اس میں تخم یا بیج پیدا نہیں ہوتا ؛

جس طرح نباتات پیدا ہوتے ہیں۔ بعینہٖ اسی طرح سے حیوانات پیدا ہوتے ہیں یعنی ادنیٰ ترین طبقہ کے حیوانات مثلاً امیبا[1] وغیرہ جو صرف ایک ذرہ (سیل) کے بنے ہوتے ہوتے ہیں وہ ادنیٰ ترین طبقہ کے نباتات مثلاً جراثیم کی طرح طریق انقسام سے یعنی تقسیم در تقسیم ہو کر پیدا ہوتے اور بڑھتے ہیں یعنی ایک کے دو اور دو کے چار اور چار کے آٹھ اور اسی طرح سے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں بڑھ جاتے ہیں لیکن اعلیٰ طبقہ کے حیوانات مثل اعلیٰ طبقہ کے نباتات کے طریق تناسل سے پیدا ہوتے ہیں چنانچہ حیوانات کے مادہ نر بھی علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اور ان کے اعضاء تناسل میں نر مادہ کے اجزاء تناسلی بھی جدا جدا پیدا ہوتے ہیں جن کے حسن اتصال و اتحاد سے نطفہ قرار پا کر اولاد پیدا ہوتی ہے۔ حضرت انسان کی پیدائش بھی اسی طریق تناسل سے ہوتی ہے یعنی جب تک مرد عورت کی باہم مقاربت و مواصلت نہیں ہوتی۔ اور ان کے نر و مادہ اجزاء تناسلی و تخم انسان و (بیضہ انثیٰ) کا باہمی اتصال و اتحاد نہیں ہوتا تب تک حمل قرار نہیں پاتا اور بچہ پیدا نہیں ہوتا۔

چونکہ مرد اور عورت کے اجزاء تناسلی یعنی تخم انسان (کرم منی) اور بیضہ انثیٰ (عورت کا انڈا) صرف ایک ایک ذرہ کیسہ کے بنے ہوئے ہیں۔ اور تمام جسم انسانی بھی مختلف قسم کے بیشمار ذرات یا کیسوں کے باہم ملنے سے بنا ہوا ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے صرف ایک ذرہ یا کیسہ کی عام صفات بیان کر دی جائیں تا انسان کی پیدائش اور اسکے جسم کی بافت و ساخت بخوبی سمجھ میں آجائے ؛

---

[1] امیبا۔ یہ پروٹوپلازم یعنی مادۂ حیات کے صرف ایک ذرہ کا بنا ہوا نہایت ہی باریک ہے جو دائمی حرکت سے ہمیشہ اپنی شکل بدلتا رہتا ہے۔ یہ خلیوی یعنی پگھلے ہوئے سریش کے ایک نہایت ہی چھوٹے ذرے کے برابر ایک ذرہ ہوتا ہے۔ جو خوردبین کے بغیر دکھائی نہیں دے سکتا۔ لیکن جب یہ کسی طرف کو حرکت کرنا چاہتا ہے تو اس کے محیط جسم میں سے چند ایک نکال اس طرف کو نکلتے ہیں۔ جن کو اصطلاح میں دست و پاء کاذب کہتے ہیں۔ انہیں نکلوں کے ذریعہ یہ حرکت کرتا ہے۔ اور اپنی غذا جذب کرتا ہے۔ اس میں تمام آثار حیات یعنی **حرکت بالارادہ (۲) قوت اعتذاء (۳) قوت نمو اور (۴) قوت تولید** وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ یہ ننھا سا امیبا بھی اس حکیم مطلق و صانع برحق کی حکمت کامل و صنعت بالغہ کا ایک عجیب نکتہ ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ذرّہ (یا) کیسہ

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
ذرّہ۔ ذرات	کُرَیہ۔ کریات و کریّوات	سل سیلز
کیسہ۔ کیسات	خلیّہ۔ خلیّات و خلایا	Cells.

کیسہ۔ درحقیقت ایک نہایت ہی چھوٹا سا حیوانی ذرّہ ہے۔ جو مختلف جسامت کا ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض کیسے تو نہایت ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ جو خوردبین کے بغیر دکھائی نہیں دیتے۔ لیکن بعض اتنے بڑے بھی ہوتے ہیں۔ جو خوردبین کے بغیر بھی دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بالعموم $\frac{1}{1000}$ سے $\frac{1}{100}$ انچ کی جسامت کے ہوتے ہیں یعنی بعض تو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں۔ کہ اگر ان کو ایک قطار میں ساتھ ملا کر رکھا جائے تو ایک انچ لمبی قطار میں چھ ہزار کیسے آجاتے ہیں۔ اور بعض اتنے بڑے بھی ہوتے ہیں۔ کہ ایک انچ لمبی قطار میں صرف ایک سَو ہی آتے ہیں ؛

ساخت کیسہ۔ ہر ایک معمولی کیسہ ایک نہایت ہی چھوٹا سا ذرّہ یا نہایت ہی چھوٹی سی تھیلی ہوتی ہے۔ جس کی ساخت میں باہر کی طرف ایک شفاف جُبابی جھلّی ہوتی ہے۔ اور اندر کی طرف ایک شفاف لیسدار رطوبت ہوتی ہے۔ جس کو پروٹوپلازم یا مادۂ حیات کہتے ہیں۔ اس پروٹوپلازم کے درمیان ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے۔ جس کو نیوکلی اُس (نواۃ) یا جوہر حیات کہتے ہیں۔ اور کبھی اس نیوکلی اس کے درمیان ایک اور نقطہ ہوتا ہے جس کو نیوکلی اولس کہتے ہیں۔ گویا ہر ایک کیسہ پروٹوپلازم یا مادۂ حیات کا ایک نہایت چھوٹا سا ذرّہ ہوتا ہے۔ جس کے مرکز میں نیوکلی اس یا جوہر حیات ہوتا ہے ؛

نوٹ:۔ بعض کیسے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ جن کے گرد خلاف نہیں ہوتا جیسے سفید دار خون اور بعض کیسے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ جن میں جوہر حیات نہیں ہوتا۔

پروٹوپلازم (یعنی) مادۂ حیات۔ یہ انڈے کی سفیدی کی مانند ایک رقیق یعابدار اور شفاف رطوبت ہوتی ہے۔ جس میں افزائش اور زندہ اجسام کی نوعیت میں تبدیل ہونے کی قدرتی طاقت ہوتی ہے۔ نیز اس میں زندگی کے ذاتی آثار نمایاں ہوتے ہیں یہ مادۂ حیات جسم کے اندر کسی ایک جگہ جمع نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ جسم کے ذرّات یا کیسوں میں منقسم ہوتا ہے جن کی ترکیب

ل Protoplasm

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

واجتماع سے جسم بنتا ہے۔ گویا جسم کے ہر ایک ذرّہ یا کیسہ کا جزو اصلی یہی مادۂ حیات ہوتا ہے یعنی اس کے بغیر کسی جاندار ذرّہ یا کیسہ کا وجود نہیں ہوتا خوردبین کے نیچے دیکھنے سے اسکی ساخت جالدار دکھائی دیتی ہے جس کو اصطلاح میں ٹشینجیو پلازم کہتے ہیں۔ اور اس جال کے رخنوں میں ایک رقیق رطوبت پائی جاتی ہے جسکو اصطلاح میں ہائلو پلازم کہتے ہیں پروٹو پلازم (مادۂ حیات) میں تمام آثار حیات پائے جاتے ہیں یعنی اس میں آزاد حرکت پائی جاتی ہے جس سے وقتاً فوقتاً وہ اپنی شکل بدل سکتا ہے۔ یہ اپنے گردوپیش سے اپنی غذا جذب کرتا اور اسے ہضم کر کے جزو بدن بنا لیتا یعنی اُسے پروٹو پلازم میں تبدیل کر لیتا ہے یہ سانس لیتا ہے۔ یعنی آکسیجن کو جذب کرتا اور کاربانک ایسڈ کو خارج کرتا ہے وغیرہ۔

نیوکلی اس (نواقہ یا گٹھلی) **یا جوہر حیات** ہر ایک کیسہ کے پروٹو پلازم یعنی مادہ اور حیات کے مرکز میں ایک چھوٹا سا گول دانہ ہوتا ہے۔ جس پر کیسہ کی زندگی کا دارومدار ہوتا ہے یعنی کیسہ کی زندگی اسی پر منحصر ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو جوہر حیات کہنا مناسب ہے خوردبین کے نیچے دیکھنے سے اس جوہر حیات کی ساخت میں بھی نہایت باریک ریشوں کا ایک جال پایا جاتا ہے اور اس جال کے رخنوں میں ایک صاف رطوبت پائی جاتی ہے وہ مادہ کہ جس سے نیوکلی اس جال کے نہایت نازک ریشے بنتے ہیں۔ چونکہ وہ بعض قسم کے رنگ قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے اُسے اصطلاح میں کروموٹین کہتے ہیں اور اُن نہایت نازک ریشوں یا ذرات کو کروموسومز کہتے ہیں۔ اور اس جال کے رخنوں میں جو صاف رطوبت ہوتی ہے۔ چونکہ وہ کسی رنگ کو قبول نہیں کرتی۔ اسلیے اُسے اصطلاح میں ایکروموٹین کہتے ہیں۔

ہر ایک جاندار کیسہ کی زندگی کا مدار وانحصار صرف نیوکلی اس یعنی جوہر حیات پر ہوتا ہے چنانچہ اگر ایک کیسہ کو اس طرح سے دو حصّوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ کہ ایک حصّہ پروٹو پلازم میں نیوکلی اس چلا جائے۔ اور دوسرا حصّہ پروٹو پلازم نیوکلی اس سے خالی رہے۔ تو یہ اس نیوکلی اس سے خالی حصّہ پروٹو پلازم جلد مر جاتا ہے۔ لیکن نیوکلی اس والا حصّہ زندہ رہتا ہے اور بڑھ کر مثل سابق اپنے طبعی افعال انجام دینے لگتا ہے۔

نوٹ:۔ ہر ایک قسم کے حیوان کے کیسوں میں کروموسومز کی ایک خاص معیّنہ تعداد ہوتی ہے۔ جو تقریباً غیر مبدّل ہوتی ہے۔ انہیں کروموسومز پر استعداد موروثی موقوف ہوتی ہے یعنی انہیں کے ذریعے والدین کے شمائل وخصائل مولود میں منتقل ہوتے ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

خلاصہ یہ کہ ہر ایک کیسہ **پروٹوپلازم** (مادۂ حیات) کا ایک نہایت چھوٹا سا ذرّہ ہوتا ہے جس کے مرکز میں جوہرِ حیات ہوتا ہے اور یہ کیسہ درحقیقت طبعی و کیمیاوی و حیاتی افعال کا مظہر ہے اور اس میں بھی تمام آثارِ حیات پائے جاتے ہیں۔ یعنی یہ اپنے مسکن میں اپنے گرد و پیش سے اپنی غذا جذب و ہضم کر کے اسے اپنا جزوِ بدن بنا لیتا ہے یہ فضلات کو جسم سے خارج کرتا ہے۔ یہ سانس لیتا ہے۔ یعنی یہ آکسیجن کو جذب کرتا ہے تاکہ قوت بطریق حرارت یا حرکت پیدا ہو۔ یہ اپنی نسل بڑھاتا ہے۔ یعنی اور کیسے پیدا کرتا ہے۔

جسم کی تمام انسجہ یعنی بافتیں اور ساختیں مختلف قسم کے کیسوں سے ہی بنی ہوئی ہیں۔ اور ان بافتوں یا اعضاء بدن کے افعال و خواص درحقیقت ان کیسوں کے افعال و خواص کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ جن سے کہ وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ غرضیکہ تمام کیسے کیسوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور تمام جسم بے شمار کیسوں کا مجموعہ ہے۔

کیسوں (سیلز) کے زندہ رہنے کے لیے خاص درجہ کی حرارت اور آکسیجن (نسیم) ضروری ہے کیونکہ زیادہ سردی یا گرمی کے باعث یا آکسیجن کے بغیر پروٹوپلازم مادۂ حیات) زندہ نہیں رہ سکتا۔

کیسوں کی افزائش یعنی ان کے بڑھنے کا طریق۔ کیسے تین طریق سے بڑھتے ہیں (۱) تقسیم در تقسیم ہو کر یعنی پہلے ایک کیسہ مع اپنے غلاف و جوہرِ حیات کے دو حصّوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور پھر دو کے چار اور چار کے آٹھ تقسیم در تقسیم ہوتے ہوتے بیشمار ہو جاتے ہیں۔

(۲) غلاف کیسہ کے اندر ہی کیسہ کا نیوکلی اُس (جوہرِ حیات) چند حصّوں میں تقسیم ہو کر ہر ایک حصّہ ایک نیا کیسہ بن جاتا ہے۔ اور جب یہ کیسے مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو غلاف کیسہ پھٹ جاتا ہے۔ اور نئے کیسے اُس سے باہر نکل آتے ہیں۔

نوٹ مردہ مادہ کیسوں کے وصال کے بعد جب نطفہ قرار پا جاتا ہے تو اس کی افزائش بھی اسی طریق سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ آگے مفصّل معلوم ہوگا۔

(۳) جسم کیسہ سے چھوٹی چھوٹی شاخیں نکل کر الگ ہو جاتی ہیں۔ اور اُن کے علیحدہ علیحدہ کیسے بن جاتے ہیں۔

کیسوں کا ملاپ کیسوں کا باہم ملاپ تین قسم کا ہوتا ہے یعنی کیسے تین طرح سے آپس میں ملتے ہیں (۱) **پہلو بہ پہلو ملاپ**۔ اس طریق سے کیسے پہلو بہ پہلو مل کر

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جھلیاں وغیرہ بناتے ہیں (۲) **نوک بہ نوک ملاپ**۔ اس طریق سے کیسے ذرا لمبے ہو کر اپنی نوکوں کے ذریعے ملتے ہیں۔ اور ریشے بناتے ہیں۔ جیسے عضلات وغیرہ بنتے ہیں (۳) **شاخ بہ شاخ ملاپ**۔ اس طریق سے کیسے اپنی شاخوں کے ذریعے باہم ملتے ہیں چنانچہ الحاقی وعصبی بافت وغیرہ کے کیسے اسی طریق سے بنتے ہیں۔

پیدائش انسان

ابتداء میں ہر ایک پودا اور ہر ایک حیوان اپنی ہستی صرف ایک کیسہ یا ذرہ (سیل) سے شروع کرتا ہے۔ یعنی ہر ایک نباتات وحیوان کا جسم پہلے ایک ذرہ یا کیسہ سے بننا شروع ہوتا ہے چنانچہ یہ ابتدائی کیسہ اگر نباتی انڈا (اودم) ہو تو رحم گل میں زرگل کی دھول سے باردار ہو کر تخم بنتا ہے۔ اور اگر حیوانی انڈا (اودم) ہو تو رحم مادہ حیوان میں نطفہ نر حیوان سے باردار ہو کر بشکل جنین نشو نما پاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت انسان بھی بیضۂ انثی یا عورت کے انڈے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح سے اعلیٰ طبقہ کے نباتات میں نر درخت کے پھول کی دھول مادہ درخت کے پھول پر گر کر اور اس کے رحم میں پہنچ کر نباتی انڈے کو باردار کر دیتی ہے۔ اور اس سے تخم یا بیج پیدا ہوتا ہے۔ جو درحقیقت نباتی جنین ہوتا ہے۔ اور جو پھر مناسب محل وموقع پر نشوونما پا کر ایک بڑا درخت بن جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپل کا بیج جو دانۂ خشخاش کے برابر ہوتا ہے اس سے پیپل کا اتنا بڑا درخت پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت انسان کی پیدائش کا حال ہے۔ یعنی انسان بھی ایک نہایت ہی چھوٹے بیضۂ انثی (اودم) سے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ عورت کے مادۂ تولید (بیضۂ انثی یا عورت کا انڈا) کے ساتھ مرد کے مادۂ تولید (تخم انسان یا کرم منی) کے حسن اتصال یا وصال سے حمل قرار پا کر بچہ پیدا ہوتا ہے۔

یہاں پر بیضۂ انثی (اودم) اور تخم انسان یا کرم منی (سپرمیٹوزوآن) دونوں نر و مادہ کیسوں کا علیحدہ علیحدہ بیان کرنا بھی مناسب بلکہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔

اودم۔ عورت کے مادۂ تولید میں ایک نہایت چھوٹا سا گول دانہ ہوتا ہے۔ جس کو اودم یا بیضۂ انثی یعنی عورت کا انڈا کہتے ہیں۔ اس کا قطر $\frac{1}{120}$ انچ ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر جو پروٹوپلازم یعنی مادہ حیات ہوتا ہے۔ اسکو اصطلاح میں وِٹے لس یا ویک یعنی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زردی کہتے ہیں۔ اووم کے غلاف کے دو طبق ہوتے ہیں چنانچہ اندرونی طبق کو جو قدرے دبیز اور شفاف ہوتا ہے۔ **زونا پے لیوسیڈا** کہتے ہیں۔ اور اُس کے بیرونی باریک طبق کو **وٹلائن میمبرین** (غلاف زردی بیضہ) کہتے ہیں۔ اووم کے پروٹوپلازم (مادہ حیات) کے درمیان ایک بڑا نیوکلی اُس (جوہر حیات) ہوتا ہے۔ جس کو اصطلاح میں **جرمی نل ویسی کل** (خویضۂ جرثومیہ) کہتے ہیں۔ اور اسکے اندر جو نیوکلی اوس ایک اور نقطہ ہوتا ہے۔ اس کو اصطلاح میں **جرمی نل سپاٹ** (نقطۂ جرثومیہ) کہتے ہیں۔ خوردبین کے نیچے دیکھنے سے اووم کے پروٹوپلازم اور نیوکلی اُس دونوں میں نازک ریشوں کا ایک جال دکھائی دیتا ہے۔ جس میں نہایت ہی چھوٹے چھوٹے ذرات یا نقاط ہوتے ہیں جنہیں اصطلاح میں **کروسومز** کہتے ہیں اووم کے غلاف میں نہایت باریک باریک دھاریاں اور سوراخ (کروموپائلز) نظر آتے ہیں۔ جن کو راہ کرم منی اووم میں داخل ہو کر اُسے باردار کر دیتا ہے۔ اووم خصیۃ الرحم میں پیدا ہوتا ہے۔ اور قاذف نالی (خصیۃ الرحم اور رحم کی درمیانی نالی) کے راستے جوف رحم میں پہنچتا ہے۔

نوٹ:۔ کرم منی کا بیضہ انثیٰ میں داخل ہو کر اُسے باردار کرنا یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ مرد کے مادۂ تولید میں قوت عاقدہ اور عورت کے مادۂ تولید میں قوت منعقدہ ہوتی ہے دیکھئے متقدمین اطبا یونان کا یہ مشہور و معتبر قول کس قدر صحیح ہے کہ آج صدیوں کی علمی تحقیقات کے بعد بھی اس پر مہر تصدیق ثبت ہوتی ہے۔

سپرمیٹوزوآن[۲]۔ مرد کے مادۂ تولید میں بھی ایک نہایت چھوٹا سا بیضوی دانہ ہوتا ہے جسے سپرمیٹوزوآن یا کرم منی یا تخم انسان کہتے ہیں۔ اس کا ایک سر اور ایک لمبی متحرک دم ہوتی ہے یہ کرم $\frac{1}{100}$ ۵ انچ کے قریب ہوتا ہے۔ اور اس کا سر جو اس کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی کا تقریباً $\frac{1}{10}$ حصہ ہوتا ہے۔ اور اس کے سر میں ہی نیوکلی اس (جوہر حیات) ہوتا ہے اور اس میں تمام ضروری **کروموسومز** ہوتے ہیں۔ کرم منی کا سر چپٹا لیکن نیزہ کی طرح نوکدار ہوتا ہے۔ جس کے ذریعے یہ اووم کے غلاف کے باریک سوراخوں کے اندر گھس جاتا ہے۔ یہ اپنی دم کے ذریعے حرکت کرتا اور آگے کو بڑھتا رہتا ہے۔ اور مناسب حالات میں اعلام نہانی میں کئی روز تک زندہ رہ سکتا ہے۔

انعقاد نطفہ۔ اووم کے ساتھ کرم منی کے ملنے سے وہ باردار ہو جاتا ہے۔ یعنی ان

[۱] Chromosomes. [۲] Spermatozoon.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

دونوں نر و مادہ کیسوں کے حسنِ اتصال یا وصال سے نطفہ قرار پاتا یا حمل ٹھہر جاتا ہے اور ان دونوں کیسوں کا وصال قاذف نالی کے آزاد سرے کے پاس ہوتا ہے جہاں سے دس بارہ روز کے عرصہ میں باردار اوَدم یا نطفہ جوف رحم میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے وہ اس نالی میں رُک جائے تو وہیں حمل قرار پا جاتا ہے۔ جو نہایت خطرناک ہوتا ہے۔

غلافِ[1] اوَدم کے اس موقع پر جہاں کہ کرم منی اس میں داخل ہوتا ہے پہلے ایک ذرا سا اُبھار پیدا ہوتا ہے جس کو نقطۂ جاذبہ (کون آف اٹریکشن) کہتے ہیں اور جونہی کہ کرم منی میں داخل ہوتا ہے۔ ایک پتلی سی جھلی پیدا ہو کر اس سوراخ کو بند کر دیتی ہے تاکہ تاکہ دوسرا کرم اس میں داخل نہ ہو سکے اور اگر کسی اتفاق سے اوَر کرم منی بھی اس میں داخل ہو جائے تو پھر مسخوط یعنی عجیب الخلقت بچہ (جس کے کبھی دو سر یا چار آنکھیں وغیرہ ہوتی ہیں) پیدا ہوتا ہے۔

دونوں نر و مادہ کیسوں (اوَدم اور کرم منی) کے جوہر حیات میں جو کروموسومز ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے ہی والدین کے شمائل و خصائل بچے میں منتقل ہوتے ہیں۔ گویا مذکورہ بالا دونوں کیسوں کے یہ کروموسومز ہی مولود میں والدین کی طرف سے موروثی شمائل و خصائل کی بنیاد ہوتے ہیں۔ یعنی انہیں کے سبب بچے صورت و سیرت میں ماں باپ کے مشابہ ہوتے ہیں۔

استقرارِ حمل

جب مرد کا مادۂ تولید عورت کے مادۂ تولید سے مل جاتا ہے۔ یعنی جب اوَدم و کرم منی یا بیضہ و تخم کا باہم وصال ہو کر نطفہ قرار پا جاتا یا حمل ٹھہر جاتا ہے۔ تو اُس میں اسی وقت سے بہت سی تبدیلیاں ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب قاذف نالی کے آزاد سرے کے پاس اوَدم (عورت کا انڈا) باردار ہو جاتا ہے۔ تو پہلے اس کے غلاف کے اندر ہی اندر اسکی زردی دو حصّوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اور پھر دو سے چار اور چار سے آٹھ حصّوں میں تقسیم

[1] غلافِ اوَدم میں اس نقطہ جاذبہ کے پیدا ہونے سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ان دونوں نر و مادہ کیسوں میں کشش اتصال و وصال ہوتی ہے۔ اس لیے حکیم روحانی حضرت مولانا رومؒ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ؎

ذرّہ ذرہ کندایں ارض وسما جنس خود را ہمچو کاہ و کہربا است
نوریاں مر نوریاں را جاذب اند ناریاں مر ناریاں را مے کشند

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہو جاتی ہے۔ جن کے باہم ملنے سے ایک دانہ دار خوشہ مثل دانہ شہتوت کے بن جاتا ہے جس کو اصطلاح میں میٹوری کی فارم یا ڈی کہتے ہیں ۔

نوٹ :۔ اودم تقسیم در تقسیم ہوتے ہوتے جن بیشمار کیسوں میں منقسم ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کیسہ جب دو حصّوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو ان دونوں حصّوں میں کروموسومز کی تعداد بھی بالکل مساوی تقسیم ہوتی ہے۔ جن میں نصف والد کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور نصف والدہ کی طرف سے لہٰذا جدید نظریہ کی رو سے جنین یا مولود کے جسم سے ہر ایک ایک کیسہ (سیل) میں والدین کے شمائل و خصائل موروثی طور پر منتقل ہوتے ہیں ۔

اودم میں مذکورہ بالا تبدیلیاں ہوتے ہوئے وہ دس پندرہ روز کے عرصہ میں قاذف نالی (خصیۃ الرحم کی نالی) میں سے گزرتا ہوا جوف رحم میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر کسی جگہ رحم کی دیوار سے چپک جاتا ہے۔ اور پھر جیسا کہ مذکور ہوا۔ کہ غلاف اودم کے اندر ہی اندر اس کی زردی بے شمار کیسوں میں تقسیم ہو کر ان کا ایک دانہ دار شہتوت نما خوشہ بن جاتا ہے پس اس شہتوت نما خوشہ کی بالائی سطح پر کیسوں کے باہم ملنے سے ایک اور پردہ یا غلاف بن جاتا ہے۔ جس کو اصطلاح میں بلاسٹوڈرم (غشاء جرثومی بیضہ) کہتے ہیں۔ اس خوشہ کے اندر جو رطوبت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے رفتہ رفتہ یہ غلاف پھولتا جاتا ہے یہاں تک کہ یہ زونا پلے سیڈ (غلاف اودم) کی اندرونی سطح کے ساتھ آ لگتا ہے اور چونکہ غلاف اودم پھیلتا نہیں۔ اس لیے وہ آخر کار دباؤ کے باعث معدوم ہو جاتا ہے۔ اور صرف یہ نیا پیدا شدہ غلاف (بلاسٹوڈرم) ہی باقی رہ جاتا ہے۔ جو کچھ عرصہ بعد مندرجہ ذیل تین طبقات میں منقسم ہو جاتا ہے۔

(۱) بیرونی طبقہ جس کو اکٹوڈرم یا ایپی بلاسٹ کہتے ہیں۔ Epiblast.

(۲) درمیانی طبقہ جس کو میسوڈرم یا میسو بلاسٹ کہتے ہیں۔ Mesoderm.

(۳) اندرونی طبقہ جس کو اینڈوڈرم یا ہائپو بلاسٹ کہتے ہیں۔ Endoderm.

مذکورہ بالا تینوں طبقات سے جنین کا تمام جسم بنتا ہے چنانچہ (۱) بیرونی طبقہ سے بدن کا بیرونی حصّہ یعنی جلد اور اس کے ملحقات (بال و ناخن وغیرہ) مغز و حرام مغز اور آلات حواس خمسہ کے حسی پرت بنتے ہیں (۲) اندرونی طبقہ سے بدن کا اندرونی حصّہ غذا کی نالی (جو منہ سے مقعد تک ہے) کا استر۔ ہوا کی نالی (حنجرہ۔ قصبۃ الریہ اور ہوائی کیسوں) کا استر مثانہ اور

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مجری بول کا استر بنتا ہے۔ نیز عذد معدی و جگر اور لبلبہ وغیرہ بنتے ہیں۔ اور (۳) درمیانی طبقہ سے عضلات یعنی گوشت۔ ہڈیاں و کرتیاں۔ اعشاء خون۔ عروق۔ اعضاء تولید و اعضاء بول وغیرہ بنتے ہیں ؛

علاوہ ازیں بار دار ادم (علقہ[1]) کے جوف رحم میں پہنچنے سے پیشتر ہی رحم کا استر یعنی اُس کی اندرونی جھلی (میوکس میمبرین) موٹی ہو جاتی ہے اور اس میں خون کی رگیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ جوف رحم کی یہ بلغمی جھلی ہر طرف سے موٹی ہو کر اور باہم مل کر جوف رحم کو پُر کر دیتی ہے جوف رحم کے یہ تغیرات ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ ہر ماہ میں بوقت حیض ہوا کرتے ہیں۔ مگر اب نطفہ ٹھہرنے کے وقت یہ زیادہ تر نمایاں ہوتے ہیں جسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رحم میں جہاں پر نطفہ ٹھہرتا ہے۔ رحم کی اندرونی جھلی پھول کر نرم اور دبیز ہو جاتی ہے اور جب تک نطفہ کا تعلق رحم سے اچھی طرح نہیں ہو جاتا تب تک وہ اسی جھلی سے پرورش پاتا رہتا ہے اور چونکہ بعد ولادت یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ جھلی جس کی شکل بہت کچھ بدل جاتی ہے۔ تقریباً ساری خارج ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کو عربی میں اعشاء ساقط" اور انگریزی میں "ڈی سیڈوا" کہتے ہیں۔ اور اس کے مندرجہ ذیل تین حصے ہوتے ہیں۔ جو پہلے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ لیکن بعد کو باہم مل جاتے ہیں ؛

(۱) "ڈی سیڈوا ویرا" یعنی "غشاء ساقط رحمی" جو رحم کی تمام سطح پر لگی ہوتی ہے۔ اصل میں یہ رحم کی غشاء مخاطی یا بلغمی جھلی (میوکس میمبرین) ہی ہوتی ہے۔ جو رفتہ رفتہ نرم اور دبیز ہو کر پھولنے لگتی ہے۔

(۲) "ڈی سیڈوا آری فلیکسا" یعنی "غشاء ساقط منعکس" جو نطفہ کے گرد لپٹی ہوئی ہوتی ہے اصل میں یہ غشاء ساقط رحمی یعنی استر رحم یا رحم کی اندرونی بلغمی جھلی ہی ہوتی ہے جو رفتہ رفتہ نرم اور دبیز ہو کر پھولنی شروع ہوتی ہے۔ اور نطفہ کو گھیر کر اپنے اندر چھپا لیتی ہے۔ حمل کے تیسرے مہینے کے بعد یہ دونوں حصے باہم مل کر خوب جڑ جاتے ہیں اور بآسانی علیحدہ نہیں ہو سکتے ؛

(۳) "ڈی سیڈوا آسیر وٹائنا" یعنی غشاء ساقط متاخرہ۔ غشاء ساقط رحمی کا وہ حصہ ہے جس پر

[1] علقہ کے لغوی معنی ہیں (۱) خون کی ٹھیکی (۲) لٹکی یا چمٹی ہوئی چیز (۳) چونکہ چونکہ بار دار ادم رحم کی اندرونی جھلی پر کسی جگہ چمٹ جاتا ہے اس مناسبت سے اسکو علقہ کہتے ہیں۔ نیز دیکھو متعلق صفحہ ۱۳ ؛

Decidua.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جوف رحم میں داخل ہو کر پہلے پہل ٹھہرتا ہے۔ اور آخر کار اسی کے بڑھاؤ سے آنول (مشیمہ پلے سینٹا) بنتی ہے۔ جس سے رحم میں جنین کی پرورش ہوتی ہے۔

نشوونماء جنین (یعنی) پیٹ کے بچے کا بڑھنا

پہلے ہفتہ میں جنین (بصورت علقہ) قاذف نالی کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اور وہیں برابر طریق انقسام سے بڑھنے لگتا ہے۔ اب تک ایک ہفتہ سے کم کا جنین نہیں دیکھا گیا۔

دوسرے ہفتہ میں جنین کی لمبائی ۱/۱۲ انچ ہوتی ہے۔ نقطۂ قلب پیدا ہو جاتا ہے جنین کے اوپر دو غلاف ایمنیان و کوریان بنتے ہیں۔

تیسرے ہفتہ میں جنین کی لمبائی ۱/۱۲ انچ ہوتی ہے۔ وہ اپنے پر پل کھا کر ترچھا ہو جاتا ہے دماغ کے حصص نمایاں ہوتے ہیں۔ آنکھ اور کان بننے لگتے ہیں۔

چوتھے ہفتہ میں لمبائی ۱/۱ انچ وزن قریب سوا ماشہ۔ جسامت مکھی کے برابر شکل بیضوی مگر گاؤدم یعنی سر بڑا اور دم باریک۔ دہن کے مقام پر ایک گہرا نشان اور آنکھوں کے مقام پر دو سیاہ نقاط ہوتے ہیں دل کے دو حصے ہو جاتے ہیں پھیپھڑے اور لبلبہ نمایاں ہوتے ہیں۔

پانچویں ہفتہ میں ہاتھ پاؤں بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ شریان اعظم و شریان الریہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہنسلی کی ہڈی اور نیچے کے جبڑے کی ہڈی میں استخوانی مرکز پیدا ہوتا ہے۔

چھٹے ہفتہ میں وزن قریب پونے دو ماشہ۔ آنکھ دناک و کان و منہ کے سوراخ نمایاں ہوتے ہیں۔ سر دھڑ علیحدہ نظر آتے ہیں۔ ریڑھ کا ستون۔ کھوپری اور پسلیاں سب کرکری کی بنی ہوتی ہیں۔ دماغ کے غلاف۔ مثانہ۔ گردے۔ زبان و حنجرہ اور دانتوں کے ابھار تمیز ہو سکتے ہیں۔

ساتویں ہفتہ میں عضلات نمایاں ہوتے ہیں۔ پسلیوں و شانہ اور بازوؤں کی ہڈیاں ران اور پنڈلی کی ہڈیوں میں نیز تالو اور بالائی جبڑے کی ہڈیوں میں مرکز پیدا ہوتے ہیں۔

آٹھویں ہفتہ میں بازو و کلائی جانگ و ٹانگ اور انگلیاں تمیز ہو سکتی ہیں کلائی اور کوہنی کی ہڈیوں میں مرکز پیدا ہوتے ہیں ٹھوک کے غدود۔ کلاہ گردہ اور تلی بننے لگتی ہے۔

نویں ہفتہ میں طول قریب ایک انچ۔ وزن ۴ ماشہ۔ غلاف قلب نمایاں ہو جاتا ہے خصیۃ الرحم

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اور خصیے تمیز ہو سکتے ہیں۔ مرارہ یعنی پتہ بھی نمایاں ہوتا ہے ؛

تیسرے ماہ میں طول اڑھائی یا تین انچ۔ وزن سوا یا ڈیڑھ تولہ۔ آنول بن چکتی ہے۔ جنین کی جنسیت تمیز ہو سکتی ہے۔ بال اور ناخن بننے شروع ہو جاتے ہیں۔

چوتھے مہینہ میں طول قریب ۶ انچ وزن دو اڑھائی چھٹانک۔ دماغ کی کنپٹیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں جلد کے نیچے چربی پیدا ہو جاتی ہے۔ چوتڑ اور عانہ کی ہڈی میں مرکز بنتے ہیں ؛

پانچویں مہینہ میں طول قریب ۱۰ انچ اور وزن قریب سوا پاؤ ہوتا ہے۔ سر پر بال نظر آتے ہیں۔ دانتوں کے مرکز پیدا ہو جاتے ہیں پسینہ کے غدو اور غدد لمفاویہ نمایاں ہوتے ہیں ؛

چھٹے مہینہ میں طول قریب ۱۲ انچ وزن قریب نصف سیر پلکیں بنتی ہیں۔ مگر آنکھیں ابھی بند ہوتی ہیں ؛

ساتویں مہینہ میں طول قریب ۱۵ انچ وزن ڈیڑھ دو سیر آنکھیں کھل جاتی ہیں خصیے تقریباً فوطوں میں آجاتے ہیں۔ دماغی لپیٹیں خوب نمایاں ہوتی ہیں ؛

آٹھویں مہینہ میں طول ۱۸ انچ وزن دو اڑھائی سیر۔ ناخن انگلیوں تک آجاتے ہیں۔ جنین اس مہینہ میں لمبائی کی نسبت موٹائی میں زیادہ بڑھتا ہے۔

نویں مہینہ میں طول ۱۸ سے ۲۰ انچ تک اور وزن تین چار سیر ہوتا ہے۔ آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ خصیے فوطوں میں اُتر آتے ہیں جنین لڑکا ہو تو لڑکی کی نسبت لمبا اور وزنی ہوتا ہے ؛

نوٹ:۔ عموماً حمل کو پورے نو مہینے گزرنے کے پانچ سات روز بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔

پیدائش انسان کے متعلق جو کچھ لکھا جا چکا ہے۔ وہ قرآن شریف کی اس آیت کی گویا اور مختصر تفسیر ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً

تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو منتخب ہوئی مٹی سے پھر رکھا ہم نے اسکو نطفہ بنا کر قرارگاہ (رحم) میں پھر بنایا ہم نے نطفہ کو خون کی پھٹکی

۱؎ سُلالہ کے معنی ہیں۔ خلاصہ پس سُلالہ من طین کے معنی ہیں۔ خلاصہ گل یعنی مٹی کا خلاصہ یا سنی ہو مٹی ۲؎ نطفہ کے معنی ہیں مرد کے مادۂ تولید۔ یہی مرد کا مادۂ تولید جب عورت کے مادۂ تولید سے ملتا ہے۔ تو نطفہ قرار پاتا ہے۔ حمل ٹھہرتا ہے ۳؎ علق کے تین معنی ہیں ۱۔ جما ہوا خون ۲۔ ایک دوسری سے علاقہ رکھنے والی یا چمٹی ہوئی چیز (۳) جونک اگرچہ اکثر مفسرین نے علق کے معنی جمے ہوئے خون کی مناسبت سے خون کی پھٹکی کیے ہوئے ہیں۔ تو بصورت ظاہر بالکل مناسب ہیں اور بعض تو خاص کر سرسید احمد مرحوم نے جونک کی مناسبت سے اس کے معنی کرم منی کے لیے ہیں لیکن درحقیقت اس کے دوسرے لغوی معنی اسکے اصطلاحی معنوں کے لیے نہایت موزوں ہیں کیونکہ جب مرد کا مادۂ تولید عورت کے مادۂ تولید سے مل جاتا ہے یعنی کرم اور بیضہ اپنی کا باہم وصال ہو جاتا ہے اور وہ رحم کی اندرونی جھلی پر کسی جگہ چمٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو علقہ سے تعبیر کرنا نہایت مناسب اور صحیح ہے ؛

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۝ (المؤمنون رکوع ۱)

پھر بنایا ہم نے اس خون کی پھٹکی کی گوشت کا لوتھڑا پھر بنایا ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیاں پھر پہنایا ہم نے ان ہڈیوں گوشت پھر پیدا کیا ہم نے اس کو ایک نئی صورت میں پس مبارک ہے اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔

کیونکہ انسانی زندگی کے دو دور ہوتے ہیں۔ ایک دور شکم مادر میں اور دوسرا دور شکم مادر سے باہر چنانچہ جو دور شکم مادر میں گزرتا ہے۔ اس کا نہایت مختصر بیان تو ہم نے صفحات گذشتہ میں کر دیا ہے۔ لیکن اس کا مفصل بیان علم الجنین (ایمبریالوجی) کے متعلق ہے۔ اور جو دور شکم مادر سے باہر گزرتا ہے۔ اس کا مفصل بیان علم التشریح (اناٹومی) اور علم منافع الاعضاء (فزیالوجی) کے متعلق ہے۔ جس کا نہایت مختصر بیان آئندہ صفحات میں کیا جائے گا۔ لیکن جو شائقین ان دونوں دوروں کا مفصل بیان دیکھنا چاہیں وہ مذکورہ بالا علوم کی مطول کتابیں مطالعہ فرمائیں۔

بافت وساخت جسم

یہ بتایا جا چکا ہے۔ کہ زندگی کی اصل بنیاد مادۂ حیات ہے۔ جو کہ ہر ایک ذرہ یا کیسہ کا جزو اصلی ہے اور یہ بھی بتایا جا چکا ہے۔ کہ انسان کی پیدائش مرد عورت کے مادۂ تولید کے باہم ملنے سے یعنی بیضۂ انثی کے ساتھ کرم منی کے ملنے سے ہوتی ہے۔ اور یہ کہ تمام جسم انسان مختلف قسم کے بے شمار ذرات یا کیسوں کا مجموعہ ہے۔ یعنی مختلف قسم کے زندہ

لہ مُضغہ کے معنی ہیں گوشت کا لوتھڑا جبنا پڑ جب علقہ بڑھ کر گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے تب اس کو مُضغہ کہتے ہیں۔

فائدہ: مذکورہ بالا آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الخ میں انسان کی پیدائش پہلے مٹی کے خمیر سے بتائی گئی ہے اور پھر نطفہ سے اگرچہ اس کی تاویل بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے کی ہے کہ نطفہ غذا کا خلاصہ ہے اور غذا بہر صورت مٹی سے پیدا ہوتی ہے اس لیے بالفاظ دیگر نطفہ بھی مٹی سے پیدا ہوا۔ اور انسان بھی مٹی سے لیکن حقیقتاً ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ ابتدائے آفرینش میں تمام نباتات وحیوانات پہلے مٹی ہی سے پیدا کیے گئے۔ اور پھر ان میں تولید وتوالد کا سلسلہ جاری کیا گیا چنانچہ جن نباتات وحیوانات میں تخم یا نطفہ کا مادہ پیدا نہیں کیا گیا۔ ان کی تولید بغیر جوڑے کے طریق انقسام سے ہوتی رہی ہے جیسا کہ اب تک بھی جراثیم اور بعض حشرات الارض وغیرہ میں ہوتی ہے۔ اور جن حیوانات میں نطفہ کا مادہ تولید پیدا کیا گیا ان کا جوڑا پہلے طریق انقسام سے پیدا ہے جیسے کہ حضرت آدم سے اماں حوا پیدا ہوئیں اور پھر تولد وتناسل سے ان کی پیدائش یا نسل بڑھتی رہی۔ جیسا کہ اب تک تمام حیوانات اور نوع انسان میں جاری ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ذرات یا کیسوں کی مختلف باقتیں وساختیں مثلاً ہڈیاں، گوشت پوست اور رگ پٹھے وغیرہ بنتے ہیں۔ جن کو اعضاء مفردہ کہتے ہیں پھر ان اعضاء مفردہ کی ترکیب سے اعضاء مرکبہ مثلاً دل، جگر، آنکھ، ناک اور ہاتھ پاؤں وغیرہ بنتے ہیں۔ جن کا مجموعہ جسم انسان ہے پس ان مواد بسیطہ کو جن سے جسم کی اصلی ساخت تیار ہوتی ہے، نیز جسم کے اصلی بافت وساخت کو کہ جس سے اعضاء مفردہ بنتے ہیں، عربی میں نسیج اور انگریزی میں ٹشو کہتے ہیں مثلاً نروس ٹشو سے مراد ہے عصبی بافت یا عصبی مادہ کہ جس سے اعصاب بنتے ہیں۔ اور مسکولر ٹشو سے مراد ہے لحمی بافت یا لحمی مادہ کہ جس سے عضلات یا گوشت بنتا ہے وغیرہ۔ اگر کسی ٹشو کا کیمیاوی امتحان کیا جائے۔ تو اس کی ساخت میں کئی قسم کے مواد پائے جاتے ہیں۔

یہ بھی بتلایا جا چکا ہے کہ مختلف قسم کے کیسے (سیلز) مختلف طریقوں سے باہم مل کر مختلف قسم کے ٹشوز (النسجہ) بناتے ہیں یعنی (۱) بعض کیسے تو پہلو بہ پہلو مل کر ایک چادر نما پردہ سا بناتے ہیں۔ اس طرح سے مختلف قسم کی جھلیاں اور جلد وغیرہ بنتی ہے (۲) بعض کیسے ذرا لمبے ہو کر اپنی دو جانبی نوکوں کے ذریعے باہم ملتے ہیں۔ اس طرح سے مختلف قسم کے ریشے بنتے ہیں۔ اور (۳) بعض کیسے اپنی شاخوں کے ذریعے باہم ملتے ہیں اور مختلف قسم کی باقتیں بناتے ہیں۔ وہ مواد بسیطہ کہ جن سے بدن کی اصلی ساختیں تیار ہوتی ہیں یا بدن کی وہ اصلی ساختیں کہ جن سے جسم انسان بنتا ہے اور جن کو انگریزی میں ایلی مینٹری ٹشوز اور عربی میں النسجہ اصلیہ یا النسجہ اولیہ کہتے ہیں۔ مندرجہ ذیل چار ہوتے ہیں:

اردو نام	طبی نام	ڈاکٹری نام
قشری مادہ	نسیج بشری	ایپی تھی لیل ٹشو Epithelial Tisane
الحاقی مادہ	نسیج الحاقی	کنیکٹو ٹشو Connective Tissue
لحمی مادہ	نسیج لحمی	مسکولر ٹشو Muscular Tissue
عصبی مادہ	نسیج عصبی	نروس ٹشو Nervous Tissue

نوٹ۔ بعض اعضاء کی ساخت میں تو صرف ایک قسم کا ٹشو (مادہ) پایا جاتا ہے جیسا کہ رسمی کی ساخت میں صرف الحاقی مادہ پایا جاتا ہے۔ لیکن بعض اعضاء مثلاً عروق وغیرہ کی ساخت میں مختلف قسم کے ٹشوز (مواد) پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ ان النسجہ (ٹشوز) کا جن سے کہ جسم انسان بنتا ہے

۱۲ Tissues. ۱۱ Tissue.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مفصل بیان علم الانسجہ (ہسٹالوجی) کے متعلق ہے۔ لیکن ناظرین کی دلچسپی کے لیے ہم نہایت ہی مختصر طور پر یہاں بیان کر دیتے ہیں۔

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
(۱) قشری مادہ	نسیج بشری	ایپی تھی لی ال ٹشو Epithelial Tissue.

قشری مادہ کے کیسے عموماً چوڑے چوڑے ہو کر باہم ملتے ہوئے باریک جھلی (غشاء قشری) بناتے ہیں۔ لیکن بعض مقامات میں اس کے کیسے مچھلی کی پوست کی مانند ہوتے ہیں۔ کہیں مخروطی شکل کے کہیں مدور اور کہیں روئیں دار بھی ہوتے ہیں۔

اس مادہ سے جلد کا بالائی طبق (بشرہ۔ ایپی ڈرمس) بنتا ہے جو حقیقی جلد (ادمہ۔ کوریم) کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جب اس بالائی طبق کے پرانے کیسے رگڑ یا موسم کی تاثیر سے مردار ہو کر گر پڑتے ہیں۔ تو اُن کی جگہ فوراً نئے کیسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ سانپ کی کینچلی اس کی بہترین مثال ہے۔

اسی مادہ سے غذا کی نالی (منہ سے لے کر مقعد تک) اور ہوا کی نالی کی اندرونی سطح پر ایک باریک جھلی کا استر لگتا ہے۔ اور غذا کی اندرونی سطح پر بھی اسی سے استر ہوتا ہے پس بدن کی بیرونی پوشش یعنی جلد اور اندرونی استر یعنی تمام جھلیوں میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں جس طرح جلد پر بشرہ کا غلاف ہوتا ہے اسی طرح تمام اندرونی جھلیوں پر بھی اس کا استر ہوتا ہے۔ استر اسی قسم کی ساخت کی جھلیوں سے ہوتا ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کوئی مادہ غشاء قشری میں سے گزرے بغیر نہ تو باہر سے جسم میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ جسم کے اندر سے باہر کو خارج ہو سکتا ہے۔

مختلف غدد کی نالیوں کو استر کرنے والے اس مادہ یا بافت کے کیسے مختلف قسم کے رطوبات وفضلات مثلاً دودھ، پیشاب اور آنسو وغیرہ پیدا کرتے ہیں۔ ناک حلق۔ اور ہوا کی نالی کے اندر جو اس بافت کی جھلی لگی ہوئی ہے۔ اس سے ایک قسم کی رطوبت پیدا ہوتی ہے۔ جو ان مقامات کو تر اور چکنا رکھتی ہے وغیرہ۔

اُردو نام	عربی	انگریزی نام
(۲) الحاقی مادہ	نسیج الحاقی	کینک ٹو ٹشو Connective Tissue

الحاقی مادہ سے جسم کا ڈھانچہ بنتا ہے۔ یہ جسم کے مختلف اعضاء کے نکال یا قالب

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

بناتا ہے۔ اور ان کی بنیادی ساختوں کو سنبھالتا یا سہارا دیتا ہے۔ ان کو اپنی جگہ پر قائم رکھتا ہے۔ اور ایک عضو کو دوسرے عضو کے ساتھ ملحق کرتا یعنی باندھتا ہے اس قسم کا نشو جسم انسان میں اس کثرت سے ہے کہ وہ ہر ایک عضو کی ساخت میں پایا جاتا ہے کیونکہ وہ ہر ایک دوسرے نشو کے لیے قالب یا ڈھانچہ بناتا ہے کہیں تو اس قسم کے نشو سے خانہ دار جھلی بن کر جسم کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ سے جوڑتی ہے کہیں اس سے دبیز اور ریشہ دار جھلی بن کر مفاصل کے رباطات یعنی جوڑوں کے بند بناتی ہے کہیں اسکی ریشہ دار ساخت سے عضلات کی تسلیں بنتی ہیں کہیں امعاء وعروق وغیرہ کے غلاف بنتے ہیں کہیں کریوں اور ہڈیوں کی بالائی جھلیاں کہیں کریاں اور ہڈیاں بنتی ہیں غرضیکہ جسم میں الحاقی بافت اس کثرت سے ہے کہ بالفرض جسم کو کسی ایسے تیزاب میں ڈال دیا جائے جس میں سوائے الحاقی بافت کے باقی تمام ساخت جسم تحلیل ہو جائے تو تب بھی اسفنج کی مانند جسم کا متخلخل ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے جو کہ صرف اسی الحاقی مادہ کا بنا ہوا ہوگا:۔

مختلف مقاماتِ جسم میں اگرچہ اس بافت کی ظاہری شکل وصورت اور نشوؤں میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے لیکن اس کی اصلی بناوٹ کیسوں کے ایک دوسرے کیساتھ شاخوں کے ذریعے ملنے سے ہوتی ہے اور اگرچہ الحاقی بافت کی یہ تین بڑی قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ (۱) دانہ دار (۲) سفید ریشہ دار اور (۳) زرد لچکدار لیکن (۱) خون (۲) چربی (۳) کریاں (۴) ہڈیاں اور (۵) غدد وغیرہ بھی چونکہ اسی قسم کے مادہ سے بنتے ہیں۔ اس لیے وہ بھی اسی کے اقسام شمار کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض کا مختصر بیان آئندہ اپنے اپنے موقعہ پر ہوگا:۔

اردو	عربی نام	ڈاکٹری نام
(۳) لحمی مادہ	تسیج عضلاتی	مسکولر نشو Moscular Tissue

یہ نشو جسم کا بہت ضروری حصہ ہے۔ اسی سے جسم کا تمام گوشت یعنی عضلات بنتے ہیں۔ اور عضلات سے ہی جسم میں مختلف حرکات پیدا ہوتی ہیں۔ صرف اسی لحمی بافت میں سکڑنے اور پھیلنے کی طاقت ہے۔ اس بافت کے باریک باریک ریشے ہوتے ہیں۔ اور چند ریشے باہم مل کر گچھے یا بنڈل بناتے ہیں۔ اور پھر چند گچھے باہم مل کر عضلہ بناتے ہیں:۔

ساخت وفعل کے لحاظ سے عضلات دو قسم کے ہوتے ہیں ایک دھاریدار یا ارادی عضلات جن کی حرکت انسان کے ارادہ یا مرضی کے تابع ہوتی ہے۔ اور دوسرے صاف یا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

غیر ارادی عضلات جن کی حرکت ارادہ یا مرضی کے تابع نہیں ہوتی ؛

ارادی عضلات کے ہر ایک لحمی ریشہ کی ساخت ایسی ہوتی ہے۔ کہ ہر ایک ریشہ کے گرد ایک پتلا شفاف لچکدار غلاف ہوتا ہے اور اس غلاف کے اندر ایک نرم سا مادہ ہوتا ہے جس میں سکڑنے کی طاقت ہوتی ہے۔ اور اس پر آڑی دھاریاں ہوتی ہیں۔ ہر ایک ریشہ میں بیضوی شکل کا ایک کیسہ ہوتا ہے جس کے اندر کا مادہ حیات (پروٹوپلازم) دانہ دار ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی سکڑنے کی طاقت ہوتی ہے۔ اور اس مادۂ حیات کے اندر روح ہر حیات (نیوکلی اس) بھی ہوتا ہے غیر ارادی عضلات کے ریشے لمبے لمبے کیسوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جن پر غلاف نہیں ہوتا اور نہ ان پر آڑی دھاریاں ہوتی ہیں۔ غیر ارادی عضلات کے ریشوں کی رنگت بہت پھیکی ہوتی ہے اور یہ ارادی عضلات کے ریشوں کی طرح ایک دم نہیں سکڑ جاتے بلکہ ان میں جونک کی سی حرکت ہوتی ہے یعنی ان کا ایک حصہ سکڑتا ہے۔ اور دوسرا حصہ پھیلتا ہے۔ اس قسم کے عضلاتی ریشے مری و معدہ اور آنتوں وغیرہ وغیرہ کی ساخت میں پائے جاتے ہیں۔ عضلات کی ساخت میں جو کیمیاوی مادہ پایا جاتا ہے۔ اس کو اصطلاح میں مایوسین (لحمین) کہتے ہیں۔ اس کے صفات خون کے فائبرین (لیفین) کی طرح ہوتے ہیں مرنے کے بعد عضلات کے اسی مادہ کے منجمد ہو جانے سے مردہ کا جسم اکڑ جاتا ہے (نیز دیکھو بیان عضلات)

اردو نام	عربی نام	ڈاکٹری نام
(۴) عصبی مادہ	نسیج عصبی	نروس ٹشو Nervous Tissue

اس ٹشو سے نظام عصبی (حرام مغز) اور اعصاب بنتا ہے۔ جو تمام جسم پر حکمران ہے۔ کیونکہ اسی کے ذریعے تمام محسوسات اور تمام تحریکات ہوتی ہیں۔ نظام عصبی کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک دماغی و نخاعی (سیری بروسپائنل) جس کے متعلق حس و حرکت یعنی روح اس خمسہ ظاہری و حواس خمسہ باطنی ہیں۔ اس کو نظام عصبی متعلقہ حیات عضوی بھی کہتے ہیں اور دوسرے شرکی (سمپے تھے ٹک) جس کے متعلق دوران خون پیدائش رطوبات و انہضام طعام وغیرہ افعال ہیں۔ اس کو نظام عصبی متعلقہ حیات عضوی بھی کہتے ہیں ؛

نظام عصبی کی ساخت میں عصبی ریشے اور عصبی کیسے پائے جاتے ہیں عصبی ریشے نہایت ہی باریک ہوتے ہیں چنانچہ ایک متوسط عصبی ریشہ کی جسامت ۱/۴ انچ ہوتی ہے اور اسکے درمیانی جوف میں مادۂ حیاتی کا ایک نیم جامد جزو ہوتا ہے۔ جس کو ایکسس سلنڈر (محور عصب

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کہتے ہیں۔ یہی عصبی ریشہ کا اصلی جوہر ہوتا ہے۔ اس کے گرد دو غلاف ہوتے ہیں۔ اندرونی غلاف جس کو میڈلری شیتھ (شحمی غلاف) کہتے ہیں یہ شحمی مادہ کا بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک اور باریک نازک جھلی کا غلاف ہوتا ہے۔ جسکو نیوری لما (غلاف عصب) کہتے ہیں ایکسس سلنڈر جو کہ ہر ایک عصبی ریشہ کا ضروری یا اصلی جزو ہے۔ یہ گویا ایک مسلسل برقی تار ہے۔ جو عموماً نظام عصبی کے مرکز سے شروع ہو کر تمام اعصاب کے اختتامی سروں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں برقی قوت ہوتی ہے۔

ہر ایک عصبی ریشہ کا بیرونی غلاف (نیوری لما) تو سارے ریشہ پر یکساں ہوتا ہے یعنی سالم ہوتا ہے۔ لیکن ریشہ کا اندرونی شحمی غلاف (میڈلری شیتھ) اپنی درازی میں کہیں کہیں سے بیچ میں شکستہ ہوتا ہے۔ جس وجہ سے ریشہ میں ذرا ذرا سے ابھار پڑ جاتے ہیں چنانچہ ایسے ہر دو ابھاروں کے درمیان ایک بیضوی شکل کا نیوکلی اس (جوہر حیات) ہوتا ہے ایسے ریشوں کی رنگت سفید ہوتی ہے۔ لیکن بعض عصبی ریشوں میں شحمی غلاف نہیں ہوتا صرف بیرونی غلاف ہوتا ہے۔ ایسے ریشوں کی رنگت بھوری ہوتی ہے۔ اس قسم کے ریشے اعصاب سترکیہ میں بکثرت ہوتے ہیں۔

عصبی کیسے۔ بعض اعصاب پر عموماً اُن کی جائے آغاز یا انجام کے قریب ہی چھوٹی چھوٹی بلندیاں پائی جاتی ہیں جن کو اصطلاح میں گنگلیاں (عُقدہ۔ گردہ) کہتے ہیں۔ اس کا خردبینی امتحان کرنے پر اس میں عصبی ریشے اور عصبی کیسے پائے جاتے ہیں۔ ہر ایک عصبی کیسہ شاخدار ہوتا ہے اور اس کا قطر تقریباً $\frac{1}{500}$ انچ ہوتا ہے کیسہ کی کئی شاخیں ہوتی ہیں۔ جو پھر شاخ در شاخ ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک شاخ ایسی ہوتی ہے جو شاخدر شاخ نہیں ہوتی۔ یہی درحقیقت ایکسس سلنڈر شاخ ہوتی ہے۔

چند عصبی ریشے ذرا سے لطیف الحاقی مادہ کے ساتھ باہم مل کر عصب (پٹھا) بناتے ہیں۔ جس کے اوپر بھی الحاقی مادہ کا غلاف ہوتا ہے۔

اختتام اعصاب۔ حسّی اعصاب کے اختتام کے کئی طریق ہیں چنانچہ کہیں تو یہ (۱) جال بنا کر ختم ہوتے ہیں۔ کہیں (۲) حلقوں میں ختم ہوتے ہیں کہیں (۳) لمسی کیسوں (ٹیکسٹائل کارپسکلز) میں ختم ہوتے ہیں۔ اور کہیں (۴) بیضاوی عصبی ابھاروں (پے سینی ان کارپسکلز) میں ختم ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہتھیلی اور تلوؤں کی جلد کے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

نیچے تفصیل کے لیے دیکھو بیان نظامِ عصبی یعنی دماغ ونخاع واعصاب کا ۔

عناصرِ جسم انسان

یہ بتلایا جا چکا ہے۔ کہ اگر کسی نشو کا کیمیاوی امتحان کیا جائے۔ تو اس کی ساخت میں کئی ایک کیمیاوی مواد پائے جاتے ہیں۔ یہ کیمیاوی مواد یا تو بسیط یعنی مفرد ہوتے ہیں یا مرکب۔ چنانچہ تجزیہ کرنے پر مرکبات تو مفردات میں متفرق ہو سکتے ہیں۔ لیکن مفردات متفرق نہیں ہو سکتے۔ انہیں بسیط یا مفرد مادوں کو عناصر (ایلی مینٹس) کہتے ہیں۔

حکمائے متقدمین (۱) مٹی (۲) پانی (۳) ہوا (۴) آگ۔ یہ چار عناصر مانتے تھے۔ لیکن حکمائے متاخرین کی تحقیقات سے اب تک ۸۱ عناصر معلوم ہو چکے ہیں۔ جن میں سے مندرجہ ذیل ۱۴ عناصرِ جسم انسان کی بناوٹ میں پائے جاتے ہیں ۔

(۱) آکسیجن (۲) ہائیڈروجن (۳) نائٹروجن (۴) کاربن (۵) فاسفورس (۶) سلفر (۷) کلورین (۸) فلورین (۹) آئرن (۱۰) کیلسیم (۱۱) سوڈیم (۱۲) پٹاسیم (۱۳) میگ نے شیم (۱۴) سلیکا۔ یہ عناصر جسم انسان میں اپنی بسیط حالت میں نہیں پائے جاتے۔ یعنی یہ جدا جدا نہیں ہوتے۔ بلکہ یہ مختلف طریقوں سے مرکب ہوتے ہیں ۔

مختلف اعضاء جسم کی ساخت کے کیسوں میں یہ عناصر بھی مختلف ہوتے ہیں اور بقول بعض حکماء متاخرین جب کسی نشو یا اس کے کیسوں میں ان عناصر میں سے کسی ایک کی طبعی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ تو ان کیسوں (سیلز) یا نشو کی ساخت اور فعل میں فرق آجاتا ہے۔ جس حالت کو کسی نہ کسی بیماری کے نام سے نامزد کیا جاتا ہے۔ یعنی جب جسم کے مذکورہ بالا عناصر میں سے کسی ایک میں کمی یا نقص آجاتا ہے تو کوئی نہ کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے ۔

اب ہم جسم انسان کی تشریح اور اس کے اعضاء کے افعال کا مختصر بیان کرتے ہیں ۔

[illegible] اعضاء (فزیالوجی) کے متعلق تا حال اردو میں کوئی اچھی کتاب موجود نہیں [illegible] منافع الاعضاء کے بہت سے ضروری و مفید مضامین اخذ کر [illegible] اور اگلے [illegible] موضوع پر عنقریب ایک مستند کتاب شائع کر دی جائے گی ۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تشریح جسم ومنافع اعضاء

(۱)

نوٹ:۔ جسم انسان کی بناوٹ میں گوشت۔ پوست۔ رگ۔ پٹھے اور ہڈیاں پائی جاتی ہیں اور چونکہ ہڈیاں جسم کی بنیاد اور سہارا ہیں۔ اس لیے پہلے انہیں کا بیان کیا جاتا ہے۔

جسم انسان کی ہڈیاں

ٹھٹھری یا ڈھانچ

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
ٹھٹھری	ہیکل اعظمی	سکیلے ٹن Skeleton.

انسان کا ڈھانچ ہڈیوں سے بنا ہوا ہے۔ جو تمام جسم کی بنیاد اور سہارا ہیں۔ جسم کا سارا بوجھ یہی ہڈیاں اٹھائے ہوئے ہیں۔ بغیر ان کے چلنا پھرنا یا کوئی کام کرنا دشوار بلکہ محال تھا۔ ہڈیاں اپنی اپنی ساخت میں سخت اور مظبوط مگر ہلکی اور لچکدار ہوتی ہیں۔ تمام عضلات بدن (گوشت) جو جسم کے مختلف اعضاء کو مختلف حرکات دیتے ہیں۔ انہیں ہڈیوں پر لگے رہتے ہیں۔ جسم کے اہم اور نازک اعضاء کو بیرونی آفات اور صدمات سے یہی ہڈیاں محفوظ رکھتی ہیں۔ جیسے کھوپری کی ہڈیاں دماغ کو۔ ریڑھ کی ہڈیاں حرام مغز کو اور سینے کی ہڈیاں دل اور پھیپھڑوں وغیرہ کو محفوظ رکھتی ہیں۔

ہڈیوں کی شکل:۔ مختلف اشکال کے لحاظ سے ہڈیاں چار قسم کی ہوتی ہیں۔ (۱) لمبی ہڈیاں جن کے اوپر اور نیچے کے دوسرے اور ایک درمیانی جسم ہوتا ہے۔ جیسے ران اور بازو کی ہڈیاں (۲) چپٹی ہڈیاں جیسے شانے اور سرین کی ہڈیاں (۳) چھوٹی ہڈیاں جیسے پہنچے اور ٹخنے کی ہڈیاں (۴) ناہموار یا بے قاعدہ ہڈیاں جیسے ریڑھ کے مہرے۔

ہڈی کی ساخت:۔ ہڈی کی ساخت میں ایک نہایت حیوانی مادہ (سینگ کی قسم کا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اور دو تہائی خاکی مادہ (چونے کی قسم کا) ہوتا ہے چنانچہ اگر شیشے کے ایک برتن میں شورے یا نمک کا ہلکا تیزاب ڈال کر اس میں ہڈی کو تین روز تک بھگو رکھیں۔ تو اس کا خاکی مادہ تیزاب میں حل ہو جانے کے سبب وہ نرم لچکیلی اور ہلکی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہڈی کو کسی کھلی جگہ پر جلا دیں تو اس کا حیوانی مادہ جل کر وہ کھریا مٹی کی طرح سفید اور خستہ ہو جاتی ہے ؛

پرندوں کی ہڈیاں زیادہ ہلکی ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ آسانی سے ہوا میں اڑ سکتے ہیں بچوں کی ہڈیوں میں حیوانی مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور خاکی مادہ کم۔ اس لیے جب بچے گر پڑتے ہیں۔ تو اُن کی ہڈیاں خم کھا جاتی ہیں۔ مگر ٹوٹتی نہیں۔ برخلاف بوڑھوں کی ہڈیوں میں خاکی مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے بوڑھوں کی ہڈیاں خفیف صدمات سے بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ ہڈی کی لچک پسلیوں میں خوب نمایاں ہوتی ہے۔ جو سانس لیتے وقت اچھی طرح دیکھی جا سکتی ہیں۔ عرب میں لڑکے اونٹ کی پسلی کی ہڈی کی کمان بنا لیتے ہیں۔

اگر کسی ہڈی کو کھڑے طور پر آری وغیرہ سے کاٹ کر دیکھیں۔ تو اس کی ساخت میں دو حصے دکھائی دیتے ہیں جن میں سے باہر والا حصہ ہاتھی دانت کی مانند سخت ہوتا ہے اور اندر والا حصہ خانہ دار ہوتا ہے۔ لمبی ہڈیوں میں ایک نالی سی ہوتی ہے۔ جس میں گودا بھرا رہتا ہے۔ ہڈی کی بیرونی سطح پر ایک جھلی لگی رہتی ہے۔ جس میں خون کی رگیں جال بنا کر ہڈی کی پرورش کرتی رہتی ہیں۔ اگر ہڈی پر سے یہ جھلی اتر جاوے۔ تو ہڈی مردار پڑ جاتی ہے ؛

جنین میں (یعنی جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے) پہلے سارا ڈھانچ کُریوں کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ جو بعد میں رفتہ رفتہ ہڈیاں بن جاتی ہیں۔ جنین میں سب ہڈیوں سے پہلے ریڑھ کی ہڈی یا مُہروں کا ستون بنتا ہے۔ مختلف ہڈیوں میں عمر کے مختلف اوقات میں خاکی مادہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ یعنی وہ کُریوں سے ہڈیاں بننے لگتی ہیں۔ اور ۲۵ برس کی عمر تک ہڈیوں کا ڈھانچہ بالکل مکمل ہو جاتا ہے۔

نوٹ: ہڈی کی نسبت کُری ساخت میں نرم اور لچک دار ہوتی ہے اور دبانے سے کسی قدر دب جاتی ہے۔ لیکن دباؤ ہٹانے سے پھر وہ اپنی شکل اور وضع اختیار کر لیتی ہے اس کی ساخت میں عروق یا اعصاب نہیں ہوتے۔ لیکن اس پر ایک باریک عروقی جھلی ہوتی ہے ؛

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

GENERAL BUILD OF THE HUMAN BODY



The Human Skeleton.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

انسانی ڈھانچ یا ٹھٹھری میں کل ۲۴۶ ہڈیاں ہوتی ہیں۔ جن کی تفصیل یہ ہے ؛

سر کی ہڈیاں	۸	پہونچے کی ہڈیاں ہر دو طرف	۱۶
چہرہ کی ہڈیاں	۱۴	ہتھیلی کی ہڈیاں ہر دو طرف	۱۰
زبان کی جڑ کی ہڈی	۱	انگلیوں کی ہڈیاں ہر دو طرف	۲۸
دانت اوپر اور نیچے کے	۳۲	کولھے کی ہڈیاں ہر دو طرف	۲
کان کی ہڈیاں ہر دو طرف	۶	زبان کی ہڈیاں ہر دو طرف	۲
ریڑھ کی ہڈیاں یا مہرے	۲۶	چپنی کی ہڈیاں ہر دو طرف	۲
ہنسلی کی ہڈیاں ہر دو طرف	۲	پنڈلی کی ہڈیاں ہر دو طرف	۴
سینے کی ہڈی	۱	ٹخنوں کی ہڈیاں ہر دو طرف	۱۴
پسلیاں ہر دو طرف	۲۴	تلووں کی ہڈیاں ہر دو طرف	۱۰
شانے کی ہڈیاں ہر دو طرف	۲	پاؤں کی انگلیوں کی ہڈیاں	۲۸
بازو کی ہڈیاں ہر دو طرف	۲	چھوٹی چھوٹی تل کی مانند ہڈیاں	۸
کلائی کی ہڈیاں ہر دو طرف	۴	کل ہڈیاں	۲۴۶

نوٹ (۱) بعض متقدمین اطباء تل جیسی ہڈیوں کو نیز چپنی کی ہڈیوں کو ڈھانچ کی ہڈیوں میں شمار نہیں کرتے کیونکہ یہ ہڈیاں عضلات کی نسوں میں ہوتی ہیں۔ اور (۲) بعض اطباء دانتوں کو بھی ہڈیوں میں شمار نہیں کرتے اور (۳) بعض کان کی ہڈیوں کو بھی شمار میں نہیں لاتے۔ لیکن یہ صحیح نہیں ؛



تصویر کھوپری

سر کھوپری

سر کھوپری کی آٹھ اور چہرے کی چودہ کل ۲۲ ہڈیوں سے مل کر بنتا ہے۔ اس کے اوپر والے گول حصے کو کو عربی میں جمجمہ اور انگریزی میں کرے نیم کہتے ہیں۔ سامنے اور نیچے والے حصے کو چہرہ۔ عربی میں وجہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اور انگریزی میں فیس کہتے ہیں۔ سر میں کان کی ہڈیوں کے علاوہ کل آٹھ ہڈیاں ہوتی ہیں۔ اور چہرہ میں دانتوں کے سوا کل چودہ ہڈیاں ہوتی ہیں ۔

کھوپری میں آٹھ ہڈیاں بترتیب ذیل ہوتی ہیں۔ ایک سامنے یعنی پیشانی میں ایک پیچھے یعنی گدی میں دو چھت یعنی چندیا میں۔ دونوں طرف کی کنپٹیوں میں ایک کھوپری کے نیچے یعنی صحن میں (یہ ہڈی چمگادڑ کی شکل کی سی ہوتی ہے) اور ایک آٹھویں ہڈی جو بہت ہلکی اور جالیدار ہوتی ہے۔ پیشانی کی ہڈی کے سامنے اور نیچے ناک کی چھت میں ہوتی ہے کھوپری کی شکل گول محرابدار ہوتی ہے۔ جس سبب سے یہ نہایت مضبوط ہوتی ہے اور اس کے جوف میں دماغ یعنی بھیجا محفوظ رہتا ہے۔ کھوپری پچھلی یعنی گدی کی ہڈی میں ایک بڑا سوراخ ہوتا ہے۔ جسکے راستے حرام مغز باہر آکر ریڑھ کے ستون کی نالی میں جاتا ہے سر کے نیچے والی ہڈی میں کئی سوراخ ہوتے ہیں۔ جن کی راہ سے چند دماغی اعضاء یا پٹھے نیچے آتے ہیں۔ بچوں میں سات برس کی عمر تک سر کی ہڈیاں باہم خوب پیوست نہیں ہوتیں کیونکہ اس عمر تک بچوں کا دماغ بڑھتا رہتا ہے۔ سات برس کی عمر کے بعد سر کی تمام ہڈیاں اچھی طرح باہم پیوست ہو کر کاسۂ سر کو نہایت مضبوط بنا دیتی ہیں ۔

چہرہ۔ جو سر کے سامنے اور نیچے کا حصہ بناتا ہے۔ چودہ ہڈیوں سے مل کر بنتا ہے دو ناک کی ہڈیاں مل کر ناک کا بانسہ بناتی ہیں۔ دو مسیبی نما ہڈیاں ناک کے غار کے ہر دو پہلوؤں میں ہوتی ہیں۔ ایک پتلی سی ہڈی ناک کی بیچ کی دیوار بناتی ہے۔ دو اوپر کے جبڑے کی ہڈیاں باہم مل کر اوپر کا جبڑا بناتی ہیں۔ جس میں اوپر کے سولہ دانت لگے رہتے ہیں۔ دو آنسوؤں کی ہڈیاں چشم خانوں کے اندرونی کونوں میں ہوتی ہیں۔ دو رخساروں کی ہڈیاں جو رخساروں کے ابھار بناتی ہیں۔ دو تالو کی ہڈیاں جو باہم مل کر تالو بناتی ہیں۔ اور ایک چودھویں ہڈی نیچے کے جبڑے کی جس میں نیچے کے سولہ دانت لگے ہوتے ہیں۔ یہ آخری ہڈی سر اور چہرے کی باقی ہڈیوں سے پیوست نہیں ہوتی۔ بلکہ متحرک ہوتی ہے۔ اور غذا کے چبانے میں یہی ہڈی حرکت کرتی ہے ۔

کان۔ بیرونی کان تو کرتی کا بنا ہوا ہے۔ مگر ہر ایک کان کے اندر تین چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک کی شکل ہتوڑی کی مانند ہوتی ہے۔ دوسری کی نہائی یا ہرن کی مانند۔ اور تیسری کی رکاب کی مانند ۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ریڑھ کا ستون Vertebral

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
ریڑھ کا ستون	عَمُودُ الفقرات	ورٹی برل کالم

یہ ستون جس پر سر قائم رہتا ہے۔ چھبیس مہروں سے مل کر بنتا ہے۔ جن میں سے سات مہرے گردن کے۔ بارہ مہرے پشت کے پانچ مہرے کمر کے۔ ایک ڈھڈی کی ہڈی (جس میں چار ٹکڑے ہوتے ہیں) شامل ہوتی ہے۔ جنین میں مہروں کا ستون باقی سب ہڈیوں سے پہلے بنتا ہے۔ اس لیے اس کو ڈھانچ کا مرکز قرار دیا گیا ہے۔ یہ ستون، بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اور اس کے درمیان ایک سوراخ ہوتا ہے۔ جس میں حرام مغز محفوظ رہتا ہے۔ اس ستون کے ہر دو مہروں کے درمیان کرّی کی ایک چکتی یا گدّی ہوتی ہے۔ جو اُن کو باہمی رگڑ وغیرہ سے بچاتی ہے۔ گردن کے پہلے مہرے پر سر قائم ہوتا ہے۔ اور دوسرے محور نامی پر حرکت کرتا ہے۔ اس ستون میں چار خم ہوتے ہیں۔ جو اس تصویر میں نمایاں ہیں ۔

سینہ کی ہڈیاں

ڈھانچ میں سینہ کی ہڈیاں گاؤدم پنجرے کی طرح معلوم ہوتی ہیں۔ جو ہڈیوں اور کرّیوں سے بنا ہوا ہے۔ اس کی بناوٹ میں پیچھے کی طرف ریڑھ کی ہڈی کے پشت والے بارہ مہرے ہوتے ہیں۔ سامنے کی طرف سینہ کی ایک ہڈی (قص سُتُرنم) دونوں طرف بارہ بارہ کل چوبیس پسلیاں (اضلاع۔ ربز) ہوتی ہیں۔ ہر ایک طرف کی بارہ پسلیوں میں سے اُوپر کی سات پسلیاں بذریعہ کرّیوں کے سینے کی ہڈی سے ملی رہتی ہیں۔ ان ساتوں پسلیوں کو سچی پسلیاں (اضلاع حقیقیہ۔ ٹرُو ربز) کہتے ہیں۔ اور باقی پانچ پسلیوں کو چھوٹی پسلیاں (اضلاع خلف۔ اضلاع زُور۔ فالس ربز) کہتے ہیں۔ جن میں سے اُوپر کی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com



تن کے اگلے سرے کُریوں سے ملتے ہیں، مگر وُہ کُریاں سینے کی ہڈی سے نہیں ملتیں، بلکہ آٹھویں پسلی کی گُرّی ساتویں پسلی سے اور نویں کی آٹھویں سے اور دسویں کی نویں سے مِل جاتی ہے۔ اور آخری دو پسلیوں یعنی گیارھویں اور بارھویں کے اگلے سرے آزاد ہوتے ہیں اس لئے ان کو آزاد پسلیاں بھی کہتے ہیں ٭

پسلیوں کی لمبائی پہلی پسلی سے لے کر ساتویں پسلی تک بڑھتی جاتی ہے۔ مگر آٹھویں سے لے کر بارھویں تک پھر گھٹتی جاتی ہے تاکہ سانس کے آنے جانے میں دقت نہ ہو قدرت نے پسلیوں کی ہڈیاں نرم اور لچکدار بنائی ہیں۔ سینے کے جوف میں دل اور پھیپھڑے محفوظ رہتے ہیں ٭

اطرافِ جسم یعنی بانہیں اور ٹانگیں

بانہوں ٹانگوں یا ہاتھ پاؤں کو اطراف اسلئے کہتے ہیں کہ یہ جسم کے اطراف یعنی کناروں میں واقع ہیں۔ دونوں بانہوں کو اطرافِ بالا اور دونوں ٹانگوں کو اطرافِ زیریں کہتے ہیں ٭

اطرافِ بالا

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
دونوں بانہیں	اطراف علیا	ایکسٹریمیٹیز Upper Extremities

دونوں بانہیں اوپر واقع ہیں اور مونڈھوں یا شانوں کے ذریعے سینے سے متصل ہیں۔ ہر ایک بانہہ کے تین حصے ہوتے ہیں (۱) بازو (۲) کلائی (۳) ہاتھ اور ہاتھ کے پھر تین

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

حصے ہوتے ہیں۔ (۱) پہونچہ (۲) ہتھیلی (۳) پنجہ ۔

نوٹ ۱۔ (۱) ہاتھ کا اطلاق بانہہ پر بھی ہوتا ہے لیکن (۲) ناپنے میں ہاتھ کا اطلاق صرف کہنی تک ہوتا ہے ہر ایک بانہہ یعنی بازو کلائی اور ہاتھ میں تینتیس ۳۳ ہڈیاں ہوتی ہیں۔ چنانچہ مونڈھے میں سامنے کی طرف ہنسلی کی ہڈی ہوتی ہے اور پیچھے کی طرف شانے کی ہڈی بازو میں صرف ایک بازو کی ہڈی ہوتی ہے لیکن کلائی میں دو ہڈیاں ہوتی ہیں۔ پہونچے میں چھوٹی چھوٹی آٹھ ہڈیاں ہوتی ہیں۔ ہتھیلی میں پانچ ہڈیاں اور انگلیوں میں سے انگوٹھے میں دو اور باقی ہر ایک انگلی میں تین تین پوروے کی ہڈیاں ہوتی ہیں۔

اطراف زیرین

اردو نام	عربی نام	ڈاکٹری نام
دونوں ٹانگیں	اطراف سفلی	لوئیر ایکسٹریمیٹیز

بانہہ کی طرح ٹانگ کے بھی یہ تین حصے ہوتے ہیں (۱) ران (۲) پنڈلی (۳) پاؤں۔ اور پاؤں کے پھر یہ چار حصے ہوتے ہیں (۱) گٹہ (۲) ایڑی (۳) تلوا (۴) پنجہ۔ ہر ایک ٹانگ کولھے کے ذریعہ دھڑ سے متصل ہوتی ہے اور ہر ایک ٹانگ یعنی ران پنڈلی اور پاؤں میں اکتیس (۳۱) ہڈیاں ہوتی ہیں۔ کولھے میں ایک ہڈی۔ گھٹنے کی ایک ہڈی پنڈلی میں دو ہڈیاں۔ پاؤں کے گٹے میں سات ہڈیاں پاؤں کے تلوے میں پانچ ہڈیاں اور پاؤں کی انگلیوں کے پوروں میں ۱۴ ہڈیاں ہوتی ہیں ٹانگ کی ہڈیاں بانہہ کی ہڈیوں کی نسبت بڑی اور زیادہ مضبوط ہوتی ہیں کیونکہ انکو زیادہ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔

نوٹ ۲۔ دونوں جانب کولھے کی ہڈیوں کے ساتھ پیچھے کی طرف ڈھڈی اور رڈھی کی ہڈیوں کے ملنے سے پیڑو کا جوف بنتا ہے جسے عربی میں جوف عانہ یا حوض اور انگریزی میں پلوس کہتے ہیں اس جوف میں شانہ رودہ مستقیم اور عورتوں میں رحم بھی ہوتا ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تل جیسی ہڈیاں

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
تل جیسی ہڈیاں	عظام سمسمانیہ	سیسے مائڈ بونز Scaphmid Bones

SESAMOID

یہ چھوٹی چھوٹی ہڈیاں جن کی شکل تل جیسی ہوتی ہے۔ لیکن جسامت میں تل سے بہت بڑی ہوتی ہیں بعض عضلات کی نسوں کے جائے اختتام پر پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ ہاتھ اور پاؤں کے ہر ایک انگوٹھے کے عضلات کی نسوں میں ایسی دو دو ہڈیاں ہوتی ہیں گویا چاروں انگوٹھوں کے عضلات کی نسوں میں ایسی کل آٹھ ہڈیاں ہوتی ہیں۔ یہ ہڈیاں عضلات کی نسوں کو مضبوط بناتی ہیں۔ اور ان کو بیمار گڑنے سے بچاتی ہیں۔

اس قسم کی ہڈیاں بچپن کی نسبت جوانی میں، عورتوں کی نسبت مردوں میں، کمزوروں کی نسبت قوی اشخاص میں مکمل اور کبھی زیادہ بھی ہوتی ہیں۔ چینی کی ہڈی (عظیم الرضفہ) مثلاً بھی درحقیقت اس قسم کی ہڈی ہے لیکن وہ اس میں شمار نہیں ہوتی۔

کرّی

اُردو نام	طبّی نام	ڈاکٹری نام
کرّی	غضروف	کارٹی لج Cartilage

ہڈیوں کے بیان میں یہ بتلایا جا چکا ہے کہ جنین میں سارا ڈھانچ کرّیوں کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ جو رفتہ رفتہ ہڈیاں بن جاتی ہیں۔ مگر ہڈیوں کے علاوہ جسم انسان میں کرّیاں بہ نسبت ہڈیوں کے نرم اور لچکدار ہوتی ہیں۔ مہروں کے ستون میں ہر دو مہروں کے درمیان کرّی کی ایک ایک گدڑی سی ہوتی ہے۔ پسلیاں کرّیوں کے ذریعے ہی سینے کی ہڈی سے جڑتی ہیں۔ دیگر ہڈیوں کے جوڑوں میں بھی کرّیاں پائی جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں نرخرہ اور ہوا کی نالی تمام کرّیوں سے بنی ہوئی ہے۔ فم معدہ یا کوڑی کے مقام پر ایک کرّی ہوتی ہے۔ جو اس مقام کی حفاظت کرتی ہے۔ ہر دو کان کے بیرونی حصے بھی کرّیوں کے بنے ہوئے ہیں۔ ناک کے نتھنوں اور آنکھ کے پپوٹوں وغیرہ میں بھی کرّیاں ہوتی ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تمام ہڈیوں کے اُردو عربی وانگریزی نام اور اُن کی تعداد

اُردو نام	طبی عربی نام	ڈاکٹری انگریزی نام	ہڈیوں کی تعداد
۱۔ ٹھٹھری۔ ڈھانچ	مجموع العظام	سکیلے ٹن Skeleton.	۲۴۶
۲۔ سر کی ہڈیاں	عظام الراس	سکل Skull.	۲۲
کھوپری	جمجمہ	کرے نیم Cranium.	۸
پیشانی کی ہڈی	عظم الجبہ	فرانٹل بون Frontal Bone.	۱
چندیا کی ہڈیاں	عظام التحف	پرائٹل بونز Parietal Bones	۲
گدی کی ہڈی	عظم القحدوہ	آکسی پٹیل بون Occipital Bone	۱
کنپٹی کی ہڈیاں	عظام الصدغ	ٹیمپرل بونز Temporal Bone	۲
کھوپری تلے کی ہڈی	عظم وتدی	سفینائیڈ بون Sphenold Bone	۱
جالی دار ہڈی	عظم المصفاۃ	اتھمائیڈ بون Ethmoid Bone	۱
۳۔ چہرہ کی ہڈیاں	عظام الوجہ	مے شل بونز Facial Bones	۱۴
ناک کی ہڈیاں	عظام الانف	نیزل بونز Nasal Bones	۲
اُوپر کا جبڑا	فک اعلیٰ	سوپیرئر میگزری بونز Superior Maxillary	۲
کویہ کی ہڈی	عظم الساق	لیکری مل بون Lacrimal Bones	۲
رخسار کی ہڈی	عظم الوجنہ	میلر بون Malar Bone	۱
تالو کی ہڈی	عظم الحنک	پے لیٹ بون Palate Bone	۲
سیپی کی ہڈی	عظم الصدفہ	انفیریئر ٹربینیٹڈ بون Inferior Turbinated Bone	۲
بانسہ کی ہڈی	عظم الوتیرہ	وومر Vomer	۱
نچلا جبڑا	فک اسفل	انفیریئر میگزری بون Infexior Maxillary Bone	۱
۴۔ دانت	اسنان	ٹیتھ Teath	۳۲
سامنے کے دانت	ثنایا ورباعیات	انسائزر ٹیتھ Incisor Teath	۸

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کچلیاں	انیاب	Canina Teath کینائن ٹیتھ	۴
چھوٹی ڈاڑھیں	اضراس (ثنائیہ)	Bicuspid Teath بائی کسپیڈ ٹیتھ	۸
بڑی ڈاڑھیں	اضراس (رباعیہ)	Molar Teath مولر ٹیتھ	۱۲
۵۔ کان کی اندرونی ہڈیاں	عظیمات الاذن	Ossagler آسیکلز	۰۳
ہتھوڑی نما ہڈی	عظم مطرقی	Mahens میلی لس	۱
اہرن نما ہڈی	عظم سندانی	Incus انکس	۱
رکاب نما ہڈی	عظم رکابی	Stapes سٹے پیز	۱
۶۔ زبان کی ہڈی	عظم لامی	Hyoid Bone ہائی آئیڈ بون	۱
۷۔ ریڑھ مہروں کا ستون	صلب عمود الفقرات	Verteibral Colum ورٹی برل کالم	۳۳
گردن کے مہرے	فقرات عنق	Cervical Vertebrae سروائیکل ورٹیبری	۷
سر کو اٹھانیوالا (۱)	حامل الراس	Atlas اٹلس	۰
دھری مہرہ (۲)	فقرۂ محوریہ	Axis ایکسس	۰
ابھرا ہوا مہرہ (۷)	فقرۂ بارزہ	Vertabra prominens ورٹیبرا پرامی نینس	۰
پشت کے مہرے	فقرات ظہر	Dorsal Vertbrae ڈارسل ورٹبری	۱۲
کمر کے مہرے	فقرات قطن	Lumber Vertebrae لمبر ورٹبری	۵
ڈھڈی کی ہڈی	عظم العجز	Sacrum سکرم	۱
دمچی کی ہڈی	عظم العصعص	Coccys کاک سکس	۱
۸۔ سینہ	صدر	Thorax تھوریکس	۲۵
سینے کی ہڈی	عظم القص	Sternum سٹرنم	۱
پسلیاں	اضلاع	Ribs ربز	۲۴
۹۔ دونوں بانہیں	اطراف علیا	Upper Extremities اپر ایکسٹریمیٹیز	۶۴
ہنسلی کی ہڈی	ترقوۃ	Clavcle کلیوی کل	۲

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

شانے کی ہڈی	عظم الکتف	سکے پُولا Scapula	۲
بازو کی ہڈی	عظم العضد	ہیومرس Humerus	۲
کلائی کی بالائی ہڈی	زند اعلیٰ	ریڈی اُس Radins	۲
کلائی کی زیریں ہڈی	زند اسفل	اُلنا Ulna	۲
۱۰- پہونچے کی ہڈیاں	عظام رسغ	کارپل بونز Carpal Bone	۱۶
کشتی نما ہڈی	عظم زورقی	سکے فائیڈ بون Scaphold Bones	۲
ہلالی کی ہڈی	عظم ہلالی	سیمی لیونر بون Semilunar Bone	۲
مخروطی ہڈی	عظم مخروطی	کیونیائی فارم بون Cuneiform Bone	۲
مٹر جیسی ہڈی	عظم کرسنی	پسی فارم بون Pisform Bone	۲
چوکور میڑھی ہڈی	عظم مربع منحرف	ٹرے پیزیم Trapexium	۲
مشابہ چوکور ہڈی	عظم سبیہ بالمربع	ٹرے پرائیڈ بون Trapezoid Bone	۲
بڑی ہڈی	عظم کبیر	آس میگنم Os Magnum	۲
ٹک نما ہڈی	عظم صُناری	انسی فارم بون Unciform Bone	۲
ہتھیلی کی ہڈیاں	عظام المشط	میٹا کارپس Metacrpus	۱۰
پوروے	سلامیات	فے لنجیز Phalanges	۲۸
۱۱- دونوں ٹانگیں	اطراف سفلی	لوئر ایکسٹریمیٹیز Lower Extremities	
بے نام ہڈی	عظم لا اسم لہ	انامی نیٹ بون Innaminate Bone	
کولھے کی ہڈی	عظم الحاصرہ	ایلیم ہانچ بون Ilium Haunch Bone	
چوتڑ کی ہڈی	عظم الورک	اسکیم Ischium	۰
پیڑو کی ہڈی	عظم العانہ	آس پیوبس Os Pulbis	۰
پیڑو	عانہ حوض	پلوس Pulvis	۴
ران کی ہڈی	عظم الفخذ	فیمر Fumer	۲
چپنی	رضفہ	پے ٹلا Patella	۲

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

پنڈلی کی بڑی ہڈی	قصبہ کبریٰ	ٹی بیا	Tibia ۲
پنڈلی کی چھوٹی ہڈی	قصبہ صغریٰ	فی بیولا	Fibula ۲
۱۲ پاؤں کے ٹخنے کی ہڈیاں	عظام رسغ قدم	ٹارسل بونز	Torsal Bones ۱۴
ٹخنے کی ہڈی	عظم الکعب	ایس ٹریگے لس	Astragalus ۲
ایڑی کی ہڈی	عظم العقب	کیل کے نیم	Calcaneum ۲
کشتی نما ہڈی	عظم زورقی	سکے فائیڈ بون	Scaphoid Bone ۲
پاسہ نما ہڈی	عظم نردی	کیوبائیڈ بون	Cuboid Bone ۲
ٹخنے کی اندرونی ہڈی	عظم رسغی انسی	انٹرنل کیونیائی فارم	Internal Cuneiform
ٹخنے کی درمیانی ہڈی	عظم رسغی وسطی	مڈل کیونیائی فارم	Middle Cuneiform
ٹخنے کی بیرونی ہڈی	عظم رسغی وحشی	ایکسٹرنل کیونیائی فارم	External Cuneiform
تلوے کی ہڈیاں	عظام مشط قدم	میٹاٹارسس	Metatarsus ۱۰
پاؤں کے پوروے	سلامیات قدم	فے لنجز	Phalanges ۲۸
تل جیسی ہڈیاں	عظام سمسانیہ	سیسے مائیڈ بونز	Sesamoid Bones ۸

مفاصل واربطہ (یعنی جوڑ اور بندشیں)

اردو نام	عربی نام (جمع)	انگریزی نام	جمع
جوڑ	مفصل مفاصل	جائنٹ Joint	جائنٹس
بندھن	رباط رباطات	لگے مینٹ Ligament	لگے مینٹس

نوٹ:۔ ہڈیوں کے باہم جوڑنے کو جوڑ کہتے ہیں۔ اور جس چیز سے وہ آپس میں جڑتی یا بندھتی ہیں۔ انہیں بندھن (رباطات) کہتے ہیں۔ یہ رباطات ایک مضبوط سفید ریشہ دار ساخت کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ہڈیوں کے سروں پر چسپاں ہوتے ہیں۔ یہ ہڈیوں کی ضروری حرکات میں مزاحم نہیں ہوتے۔ اور جوڑوں کو بیرونی صدمات اور اکھڑنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ جسم انسان میں چھوٹے بڑے سب جوڑ تقریباً ایک سو اسی (۱۸۰) ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

انسانی ٹھٹھری میں تمام ہڈیاں ایک ہی طریق پر نہیں جڑتیں۔ بلکہ مختلف طریقوں پر ایک دوسرے سے جڑتی اور ملتی ہیں۔ اور اس طرح سے مختلف قسم کے جوڑ بناتی ہیں پس ان جوڑوں میں جہاں حرکت کی ضرورت نہیں یا حرکت سے نقصان متصور ہے صانع مطلق نے اپنی صنعتِ کامل سے ایسی ہڈیوں کے باہم ملنے والے کناروں یا سطحوں کو رباطات وغیرہ کے بغیر ہی ایسی خوبی سے جوڑا ہے۔ کہ ان میں ذرا جنبش نہیں ہوتی۔ جیسے کھوپری کی ہڈی کے جوڑ اور جن جوڑوں میں حرکت کی کم و بیش ضرورت ہے۔ ان کی باہم ملنے والی ہڈیوں کے مقابل سروں یا سطحوں پر ایک نرم لچکدار کڑی لگا کر ان کو چکنا و ہموار کر کے پھر رباطات وغیرہ کے ذریعے ان کو جوڑا ہے۔ تاکہ ان جڑنے والی ہڈیوں کی مقابل کی سطحیں باہم رگڑ نہ کھائیں۔ اور ان کی حرکت میں کسی قسم کا ہرج واقع نہ ہو۔ اس کی کڑی اور رباطات کی اندرونی سطح پر ایک نرم اور چکنی جھلی کا استر لگا دیا ہے۔ جس کو عربی میں غشاء وسمیہ اور انگریزی میں سائی نوویل ممبرین کہتے ہیں۔ اس جھلی سے انڈے کی سفیدی کی مانند ایک گاڑھی لعاب دار اور شفاف رطوبت حسبِ ضرورت ہمیشہ تراوش پاتی رہتی ہے۔ اور جوڑوں کو تر اور چکنا رکھتی ہے

اقسام مفاصل (یعنی) جوڑوں کے اقسام

جوڑ تین قسم کے ہوتے ہیں (۱) غیر متحرک جوڑ (۲) کم متحرک جوڑ (۳) متحرک جوڑ چنانچہ ذیل میں ہر ایک قسم کا مختصر بیان کیا جاتا ہے۔

اُردو نام	طبی نام	ڈاکٹری نام
(۱) غیر متحرک جوڑ	مفصلِ مؤتلف	سی نارتھروسس
قائم جوڑ	مفصلِ ثابت	Synerthrosis

اس قسم کے جوڑ میں جڑنے والی ہڈیاں باہم خوب پیوستہ ہوتی ہیں۔ ایسے جوڑوں میں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ کھوپری کی ہڈیوں کے جوڑ یا جبڑے و دانتوں کے جوڑ سب اسی قسم کے جوڑ ہیں۔ غیر متحرک جوڑ کی پھر یہ تین قسمیں ہیں (ا) درز والا جوڑ (ب) گڑا ہوا جوڑ (ج) نالی دار جوڑ۔ جو ذیل میں درج کیے جاتے ہیں:

اُردو نام	طبی نام	ڈاکٹری نام
(ا) درز والا جوڑ	مفصلِ مدروز	سیوچر Suture

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سلائی دار جوڑ مفصلِ مسنّن

اس قسم کے جوڑ میں دو ہڈیوں کے دندانہ دار کنارے باہم جڑ کر درز یا سلائی کی مانند جوڑ بناتے ہیں۔ جیسے چندیا کی ہڈیوں کا جوڑ اس قسم کے جوڑ کی یہ دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں :

(ا) درز حقیقی جس میں جڑنے والی ہڈیوں کی سطحیں دندانہ دار ہوتی ہیں (۲) درز غیر حقیقی جس میں جڑنے والی ہڈیوں کی سطحیں کھُردری ہوتی ہیں :

اُردو نام	طبّی نام	ڈاکٹری نام
(ب) گڑا ہُوا جوڑ	مفصلِ مرکوز	گمفوسس
کیل نما جوڑ	مفصلِ مسماری	Gomphosis

اس قسم کے جوڑ میں ایک ہڈی دوسری ہڈی میں کیل کی مانند گڑی ہوتی ہے جیسے دانت جبڑوں میں گڑے ہیں :

اُردو نام	طبّی نام	ڈاکٹری نام
(ج) نالی دار جوڑ	مفصلِ شقی	سکنڈی لے سس
نالیدار جوڑ	مفصلِ میزابی	Schendylesis

اس قسم کے جوڑ میں ایک ہڈی کے نالی دار نشیب میں دوسری ہڈی کا لمبا و پتلا دھار دار کنارہ جڑتا ہے۔ جیسے چھلنی نما ہڈی اور ناک کے بانسے کی ہڈی کا جوڑ :

اُردو نام	طبّی نام	ڈاکٹری نام
(۲) کم متحرک جوڑ	مفصلِ عسیر	ایمفی آرتھروسس
کم متحرک جوڑ	مفصلِ ارتفاقی	Amphiarthrosis

اس قسم کے جوڑ میں مشکل سے نہایت ہی کم حرکت ہوتی ہے ریڑھ کے مُہروں کے جوڑ اور پیڑو کی ہڈیوں کا جوڑ۔ اسی قسم کے جوڑ ہیں :

اُردو نام	طبّی نام	ڈاکٹری نام
متحرک جوڑ	مفصلِ متحرک	ڈی آرتھروسس
متحرک جوڑ	مفصلِ سلس	Diarthrosis

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اس قسم کے جوڑ میں ہر قسم کی حرکت ہوتی ہے۔ اس قسم کے جوڑ اعضاء جسم میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اور یہ مندرجہ ذیل چار قسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) پھسلنے والا جوڑ (۲) گول پیالیدار جوڑ (۳) قبضہ دار جوڑ (۴) گھومنے والا جوڑ ؛

(۱) پھسلنے والا جوڑ مفصل مسطح آرتھروڈیا Arthrodia

اس قسم کے جوڑ میں صرف پھسلنے کی حرکت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کنپٹی کی ہڈی اور نچلے جبڑے کا جوڑ۔

(ب) گول پیالیدار جوڑ مفصل داخل ان آرتھروسس Enarthrosis

اس قسم کے جوڑ میں ایک ہڈی کا گول سرا دوسری ہڈی کے پیالہ نما سرے میں داخل ہوتا ہے۔ جیسے شانے اور کولھے کا جوڑ۔ اس قسم کے جوڑ میں ہر طرف حرکت ہو سکتی ہے ؛

(ج) قبضہ دار جوڑ مفصل زاوی گنگلی مس Ginglymus

اس قسم کے جوڑ میں حرکت سے دو ہڈیوں کے درمیان زاویہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے ایسے جوڑ میں صرف پھیلنے اور سکڑنے کی حرکت ہو سکتی ہے۔ کہنی اور گھٹنے کے جوڑ اسی قسم کے جوڑ ہیں ؛

(د) گھومنے والا جوڑ مفصل دوری ڈی آرتھروسس Diarthrosis

اس قسم کے جوڑ میں دوری حرکت ہوتی ہے۔ جیسے سر گردن کے دوسرے مہرے پر گھومتا ہے ؛

عضلات۔ گوشت

اردو نام	عربی نام	(جمع)	انگریزی نام	جمع
مچھلیاں۔ عضلے	عضلہ	عضلات	مسل Muscles	مسلز

نوٹ :۔ عضلاتی مادہ اور عضلاتی ریشوں وغیرہ کی ساخت وغیرہ کا بیان دیکھو صفحہ ۱۷ پر ؛

اگر جسم کے کسی حصے سے کھال کو چربی سمیت علیحدہ کر دیں۔ تو اس کے نیچے سرخ رنگ کا گوشت دکھائی دیتا ہے۔ تمام جسم کے گوشت کے مختلف لمبے لمبے یا چوڑے چھوٹے علیحدہ علیحدہ حصے ہوتے ہیں۔ جنہیں عضلات یا مچھلیاں کہتے ہیں۔ گوشت رنگت میں سرخ ہوتا ہے مگر یہ سرخی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اس میں خون کی موجودگی کے سبب سے ہوتی ہے۔ جو گوشت کے ہر حصے میں دورہ کرتا ہے گوشت کی ساخت میں بہت باریک ریشے پائے جاتے ہیں۔ جو بندلیعنی ایک جھلی کے پہلو بہ پہلو مل کر عضلہ بناتے ہیں اور جسم کے تمام عضلات مل کر نظام عضلاتی بناتے ہیں۔ عضلات ٹھٹھری کو پوشیدہ کرتے ہیں۔ اندرونی اعضاء کو سردی وگرمی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ بیرونی اعضاء کی شکل انہیں سے بنتی ہے۔ جسم کا زیادہ تر حصہ یعنی تمام جسم کا ۲/۵ حصہ عضلات سے بنتا ہے۔ عضلات ہی سے جسم کی سج دھج بنتی ہے اور عضلات ہی سے جسمانی حرکات واقع ہوتی ہے۔ مثلاً چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا۔ کھانا پینا۔ ہنسنا بولنا وغیرہ عضلات میں سکڑنے اور پھیلنے کی طاقت ہوتی ہے مگر یہ طاقت ان اعصاب کے سبب سے ہوتی ہے۔ جو دماغ یا حرام مغز سے نکل کر عضلات میں آتے ہیں۔ ورزش کرنے سے عضلات قوی اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں عضلات بسبب ایک رطوبت کے ملائم اور لچکدار ہوتے ہیں۔ مگر مرنے کے کچھ عرصہ بعد اس رطوبت کے منجمد ہو جانے سے وہ ایسے سخت ہو جاتے ہیں۔ کہ کسی عضو کو سیدھا اٹھانا محال ہو جاتا ہے۔ اس حالت کو عربی میں بوست موت اور انگریزی میں رائیگر مارٹس کہتے ہیں ۔

شکل اور جسامت میں عضلات مختلف ہوتے ہیں۔ بعض لمبے ہوتے ہیں جیسے بازو اور ان کے عضلات۔ بعض چوڑے چپٹے ہوتے ہیں۔ جیسے شکم وغیرہ کے عضلات بعض موٹے ہوتے ہیں۔ جیسے سرین کے عضلات بعض پتلے ہوتے ہیں۔ جیسے پپوٹوں کے عضلات۔ بعض اپنی جسامت میں بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں۔ مثلاً کان کی اندرونی ہڈی کے متعلق ایک عضلہ ہے جو وزن میں صرف آدھی رتی کے برابر ہوتا ہے۔

فعل کے لحاظ سے عضلات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ارادی عضلات اور دوسرے غیر ارادی۔ عضلات ارادی عضلات وہ ہیں۔ جو کہ ہمارے ارادے یا مرضی کے تابع ہیں۔ جسم انسان میں اس قسم کے عضلات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ غیر ارادی عضلات وہ ہیں۔ جو کہ ہماری مرضی کے تابع نہیں۔ بلکہ وہ خود اپنے اختیار سے حرکت کرتے ہیں۔ ایسے عضلات اندرونی اعضاء

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

واحشاء مثلاً دل وشرائین ومعدہ وامعاء اور مثانے وغیرہ کی بناوٹ میں پائے جاتے ہیں ہر ایک عضلہ کے دو سرے ہوتے ہیں۔ اور ایک درمیانی جسم ہوتا ہے۔ دونوں سروں پر عضلہ باریک ہوتا ہے۔ اور درمیان میں موٹا۔ اور ہر ایک عضلہ پر ایک باریک جھلی کا غلاف ہوتا ہے۔ یہ جھلی عضلہ کے ہر دو سروں پر بڑھ کر ایک سفید نس بناتی ہے۔ جسے عربی میں وتر جمع اوتار اور انگریزی میں ٹینڈن کہتے ہیں۔ جہاں سے عضلہ شروع ہوتا ہے اُسے جائے آغاز اور جہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اُسے جائے اختتام کہتے ہیں۔ اکثر ارادی عضلات اپنے ایک یا دونوں سروں پر ہڈیوں سے پیوستہ ہوتے ہیں۔ عضلات کے ہر ایک ریشہ میں قوت ارادی کے اثر سے سکڑنے اور پھیلنے کی طاقت ہوتی ہے۔ ہر ایک عضلہ کا ایک سرا ایک ہڈی پر اور دوسرا دوسری ہڈی پر جسے حرکت دینی ہوتی ہے لگا رہتا ہے۔ جب عضلہ سکڑتا ہے تو درمیان میں موٹا ہو جاتا ہے۔ اور دونوں سرے کھینچ کر ایک دوسرے کے نزدیک آجاتے ہیں۔ اور اس طرح سے ہڈیوں یا جوڑوں میں حرکت ہوتی ہے۔ نظام عضلات کی ترتیب میں قدرت نے ایسی حکمت رکھی ہے۔ کہ جس عضو پر ایک طرف ایسے عضلات لگے ہوتے ہیں۔ جو اُسے سکیڑتے ہیں۔ تو اسی عضو پر دوسری طرف ایسے عضلات لگے ہوتے ہیں۔ جو اُسے پھیلاتے ہیں مثلاً بازو کے سامنے کی طرف جو عضلہ لگا ہوا ہے۔ وہ کلائی کو بازو پر سکیڑتا ہے۔ مگر بازو کے باہر کی طرف جو عضلہ لگا ہوا ہے۔ وہ کلائی کو برعکس پھیلاتا یا سیدھا کرتا ہے۔

جسم انسان میں عضلات کے ۲۴۹ جوڑ یعنی کل ۴۹۸ عضلات بترتیب ذیل ہوتے ہیں۔ جن میں نصف جسم کے ایک طرف اور نصف دوسری طرف ہوتے ہیں ؛

گردن اور سر میں ۸۵ جوڑے یا ۱۷۰ عضلات۔ وسط بدن یا دھڑ میں ۵۰ جوڑے یا ۱۰۰ عضلات دونوں بانہوں میں ۵۴ جوڑے یا ۱۰۸ عضلات ؛ دونوں ٹانگوں میں ۶۰ جوڑے یا ۱۲۰ عضلات ؛

نسیں ۔ جن کو عربی اوتار اور انگریزی میں ٹینڈنز کہتے ہیں۔ سفید ریشوں کی بنی ہوئی ڈوریاں ہوتی ہیں۔ جن کی لمبائی اور مٹائی مختلف ہوتی ہے۔ اور کبھی یہ گول اور کبھی چپٹی ہوتی ہیں۔ لیکن نہایت مضبوط ہوتی ہیں۔ ان میں لچک نہایت کم ہوتی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہے۔ اور عروق اعصاب بھی نہایت کم ہوتے ہیں۔ یہ نسیں ایک طرف تو عضلات پر اور دوسری طرف اعضاء متحرکہ مثلاً ہڈیوں و کرّیوں اور موٹی جھلیوں وغیرہ پر لگی ہوتی ہیں ٭

دبیز جھلیاں۔ جن کو عربی میں صفاقات اور انگریزی میں فیشیا کہتے ہیں۔ یہ ریشہ دار ساخت کی ہوتی ہیں۔ یہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک قسم کی جلد کے نیچے اور دوسری قسم کی جلد کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جلد کے نیچے والی تمام بدن پر محیط ہوتی ہیں اور جلد کو نیچے والی گہری جھلیوں سے ملاتی ہیں۔ مختلف مقامات پر ان کی دبازت مختلف ہوتی ہے۔ دوسری قسم کی جھلیاں نسبتاً سخت اور مضبوط ہوتی ہیں۔ ان میں لچک بالکل نہیں ہوتی اور ان سے عضلات کے غلاف بنتے ہیں۔ اور کبھی عضلات انہیں کے ذریعے چسپاں ہوتے ہیں ٭

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

MUSCULAR SYSTEM

Back View of the Muscles of the Arm.

The large central muscle of the upper arm is the *biceps muscle*.



Side View of the Muscles of the Face and Neck.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تصویر عضلات جسم

Back View of the Muscles of the Trunk.

Front View of the Muscles of the Trunk.

اس سیدھی اُلٹی تصویر میں جسم کے سامنے اور پچھلے عضلات دکھائے گئے ہیں

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

خون (اور) روح

خون

خون ایک سرخ رنگ کا سیال ہے۔ جس کا مزہ قدرے شور اور بو (اس بدن کی بو سے قدرے مشابہ جس سے یہ خارج ہوتا ہے) ہوتی ہے۔ خون پانی سے قدرے بھاری ہوتا ہے۔ اس کا وزن مخصوص ۱۰۶۰ ہے اور پانی کا ۱۰۰۰ ہے جسم میں خون کی گرمی بحالت صحت بالعموم ۹۸٫۴ (فارن ہائٹ تھرمامیٹر) ہوتی ہے۔ شریانی خون کا رنگ شوخ سرخ ہوتا ہے۔ لیکن وریدی خون کا رنگ سرخ سیاہی مائل ہوتا ہے۔ جسم میں خون کی کل مقدار بالاوسط جسم کے وزن کا تقریباً $\frac{1}{11}$ یا $\frac{1}{12}$ حصہ ہوتی ہے۔ زندہ جسم انسان کے اندر خون سیال ہوتا ہے۔ لیکن جسم سے باہر نکلنے پر یہ پہلے گاڑھا سیال نظر آتا ہے۔ اور پھر فالودہ کی مانند جم جاتا ہے۔

خون کی ماہیت۔ خون بظاہر دیکھنے میں تو کیسال معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسے بغور یا تیز نظری سے دیکھا جائے تو اس میں یہ دو قسم کے اجزاء نظر آتے ہیں (۱) خون کا پانی (۲) خون کے دانے یا ذرات۔ لیکن خون کی ترکیب میں (۱) پانی (۲) اجزاء جامدہ ہوائیہ ہوتے ہیں چنانچہ خون کے ایک سو حصوں میں اناسی حصے پانی اور اکیس حصے دیگر اجزاء جامدہ ہوتے ہیں۔ اور باقی نو حصوں میں سے چھ حصے رطوبت زلالیہ ایلبیومن اور رطوبت لیفیہ (فائبرین) اور تین حصے نمکین و روغنی اجزاء وغیرہ ہوتے ہیں۔

خون میں اجزاء ہوائیہ کی مقدار اس کے حجم کے نصف سے بھی قدرے زیادہ ہوتی ہے یعنی ایک سو مکعب انچ میں تقریباً ساٹھ مکعب انچ اجزاء ہوائیہ یعنی کاربانک ایسڈ (ہوائے دخانی) آکسیجن (یسیم) اور نائٹروجن (ہوائے شورجیہ) ہوتے ہیں۔

خون کے دانے یا خون کے ذرات۔ یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک سرخ اور دوسرے سفید اور یہ اس قدر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ کہ خوردبین کے بغیر دکھائی نہیں دیتے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

خون کے سرخ دانے۔ یہ شکل میں ٹکیہ کی طرح گول اور چپٹے ہوتے ہیں یعنی خون کا ہر ایک سرخ دانہ ایک نہایت ہی چھوٹی سی ٹکیہ کی طرح گول اور چپٹا ہوتا ہے جس کے کنارے برابر اور دونوں سطحیں درمیان سے کسی قدر دبی ہوئی ہوتی ہیں یہ اس قدر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک مربع انچ جگہ میں ایک کروڑ سے بھی زیادہ آجاتے ہیں ہر ایک سرخ دانہ خون ایک قسم کے بے رنگ مادہ (پروٹین) کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کی ساخت متخلخل یا خانہ دار ہوتی ہے۔ اس بے رنگ مادہ کے خانوں کے درمیان ایک سرخ رنگ کا مادہ (ہیموگلوبین) ہوتا ہے۔ جس کی ترکیب میں کسی قدر فولاد ہوتا ہے۔ اس سرخ مادہ (ہیموگلوبین) کا یہ خاصہ ہے۔ کہ یہ آکسیجن یعنی نسیم (ہوائے روح پرور) اور بعض دیگر ہواؤں کو بآسانی جذب و دفع کرتا ہے۔ پس جب خون پھیپھڑوں میں پہنچتا ہے۔ تو وہاں پر اس کے سرخ دانے ہوائے تنفس سے آکسیجن یا نسیم کو جذب کر لیتے اور بخارات وخانیہ کو خارج کر دیتے ہیں۔ پھیپھڑوں سے خون دل میں پہنچتا ہے۔ پھر دل سے شرائین میں جب یہ عروق شعریہ میں پہنچتا ہے۔ تو خون کے دانے اس جذب کردہ آکسیجن یا نسیم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو ان باریک رگوں کی نازک دیواروں میں سے نفوذ کر کے یا چھن کر جسمانی ساختوں میں جذب ہو جاتی ہے ۔

نوٹ:۔ مذکورہ بالا بیان سے یہ صاف ظاہر ہے کہ خون کے سرخ دانے آکسیجن یا نسیم بردار ہیں۔ اسی آکسیجن یا نسیم کو جب کہ وہ خون کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ متقدمین اطباء یونان روح حیوانی کے نام سے پکارتے ہیں پس ان کا قول کہ شریانی خون روح حیوانی کا حامل ہے اور وہ اس کو تمام اعضاء بدن تک پہنچاتا ہے۔ بالکل صحیح اور نہایت قابل قدر ہے کیونکہ زمانہ حال کی علمی تحقیقات بھی اس کی مصدق و مؤید ہیں ۔

خون کے سفید دانے۔ خون کے سفید دانے بحالت صحت خون کے سرخ دانوں کی نسبت تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں چنانچہ ہر چار یا پانچسو سرخ میں ایک سفید دانہ ہوتا ہے۔ لیکن بحالت مرض کبھی ان کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ ۲۵ فیصدی ہو جاتی ہے۔ خون کے سفید دانے چند قسم کے ہوتے ہیں۔ اور جسامت میں یہ سرخ دانوں کی نسبت کسی قدر بڑے ہوتے ہیں۔ بالعموم ایک سفید دانہ خون کا قطر تقریباً $\frac{1}{2500}$ انچ ہوتا ہے۔ لیکن بعض سفید دانے سرخ دانوں کے برابر اور بعض ان سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کی شکل بے قاعدہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہوتی ہے بعض قدرے گول ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان میں حرکت ابیبی (دیکھو صفحہ ۲) ہوتی ہے، اس لیے یہ ہمیشہ اپنی شکل بدلتے رہتے ہیں۔ سرخ دانوں کی ساخت میں توسٹروما ہوتا ہے لیکن ان کی ساخت میں پروٹوپلازم ہوتا ہے۔ جو دانہ دار ہوتا ہے۔ اور ان میں ایک دو یا زیادہ نیوکلیائی بھی ہوتے ہیں۔ گویا سفید دانہ خون پروٹوپلازم (مادۂ حیات) کا ایک ذرہ یا یکیسہ ہے۔ جس میں نیوکلی اس (جوہر حیات) بھی ہوتا ہے۔ یہ خون کے دانے کیموس کے دانوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور غدد جاذبہ اور تلی وغیرہ میں بنتے ہیں اور ان سے خون کے سرخ دانے بنتے ہیں۔

خون کے سفید دانے بحالتِ صحت چونکہ عروق دمویہ کی دیواروں میں سے نفوذ کر کے اعضاء کی ساخت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے ممکن ہے کہ ان کو تغذیہ میں بھی دخل ہو۔ لیکن بحالتِ مرض یا جب جسم میں کسی مقام پر ورم ہوتا ہے۔ تو یہ عروق کی دیواروں میں سے زیادہ تعداد میں نفوذ کر کے اس مقام پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں پر جو جراثیم یا مردہ ذرات جسم وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ انہیں ہضم کر جاتے ہیں۔ اور اس طرح سے یہ ازالہ مرض یا رفع ورم میں ممد ہوتے ہیں۔ ساخت کو مردہ ذرات سے صاف کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ گویا حلال خور یا خاکروب ہیں۔ اور جب کسی مرض کے جراثیم جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ سفید دانے ہائے خون ان کے ساتھ بھی جدال وقتال کرتے ہیں۔ اور اکثر انہیں ہضم کر جاتے ہیں اس لحاظ سے یہ گویا جنگ جو سپاہی ہیں غرضیکہ یہ چھوٹی چھوٹی ہستیاں نہایت ضروری ہیں جو ہمیشہ اپنے کام میں مصروف رہتی ہیں۔ جوحزونترین خون کے سفید دانے ہیں۔ وہ انجماد خون میں ممد ہوتے ہیں

خون کا پانی (پلازما) یہ خون کا رقیق حصہ ہوتا ہے۔ اس کا رنگ زردی مائل ذائقہ نمکین اور کیفیت کھاری ہوتی ہے۔ اس کا وزن مخصوص ۱۰۲۸ ہوتا ہے۔ اس کی ترکیب میں یہ تین پروڈیمنز (۱) ایلبیومن (۲) گلوبولن (۳) فائبری نوجن پائے جاتے ہیں۔ یہ آخری مادہ ہی فائبرن میں تبدیل ہو کر انجماد خون کا باعث ہوتا ہے علاوہ ازیں اس میں مندرجہ ذیل حل شدہ نمکیات (۱) سوڈیم کلورائیڈ یعنی نمک طعام (۲) پوٹاشیم کلورائیڈ (۳) سوڈیم فاسفیٹ (۴) پوٹے سیم فاسفیٹ (۵) سوڈیم کاربونیٹ (۶) کیلسیم فاسفیٹ اور (۷) میگ نے شیم فاسفیٹ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

پائے جاتے ہیں ؛

نوٹ :۔ اگر تازہ خون میں قدرے کھانے کا نمک یا میگ نے شیم سلفاس پانی میں حل کر کے ملا دیا جائے۔ اور پھر اس خون کو برف سے سرد رکھا جائے۔ تو پھر وہ خون جمتا نہیں۔ جب ایسے خون کو کچھ عرصہ رکھا جائے تو ذرات خون رفتہ رفتہ تہہ نشین ہونے لگتے ہیں۔ اور اس کی سطح پر تھوڑا سا صاف پلازما رہ جاتا ہے ؛

انجماد خون

جسم سے تازہ نکالا ہوا خون تو بالکل سیال ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا جائے۔ تو یہ دو تین منٹ میں غلیظ یعنی گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اور آٹھ نو منٹ میں فالودہ کی طرح بالکل جم جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کو منجمد خون (کلاٹ) کہتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد (ایک دو گھنٹے بعد) اس منجمد خون میں سے زرد یا پانی تراوش پانے لگتا ہے جس کو سیرم (زرد آب) کہتے ہیں۔ رفتہ رفتہ سیرم کی مقدار بڑھتی جاتی ہے۔ اور منجمد خون کا تھکا سکڑ کر چھوٹا ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس سیرم میں تیرنے لگ جاتا ہے۔

اگر ایک قطرہ سیرم (زرد آب) کا خردبینی امتحان کیا جائے تو اس میں کوئی سرخ یا سفید ذرات خون نہیں پائے جاتے۔ لیکن اگر ذرا سے منجمد خون یعنی خون کے تھکے کو پھیلا کر خوردبین سے دیکھا جائے۔ تو اس میں نہایت باریک ریشوں کا ایک جال سا دکھائی دیتا ہے۔ جس میں سرخ و سفید ذرات خون پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس مادہ سے اس جال کے نہایت باریک ریشے بنتے ہیں۔ اس کو فائبرین (لیفین) کہتے ہیں۔ پس خون کے منجمد ہونے سے اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں۔ ایک سیال حصہ جس کو سیرم (زرد آب) کہتے ہیں اور دوسرا کاٹ (خون کا تھکا) جس میں فائبرین اور ذرات خون خون ہوتے ہیں ؛

نوٹ :۔ سیرم (زرد آب) اور پلازما (آب خون) کو ایک ہی چیز نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ پلازما میں فائبرین موجود ہوتی ہے۔ لیکن سیرم میں موجود نہیں ہوتی ؛

فائبرین (رطوبت لیفیہ یا لیفین) ۔ اسی رطوبت کی موجودگی سے خون

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

خارج ہونے پر جم جاتا ہے۔ اگر تازہ خون کو ایک کھردری لکڑی یا چند باریک شاخوں یا تیلیوں کے ایک مٹھے سے جلد جلد پھینٹا جائے۔ تو فائبرین کے جس قدر ریشے بنتے جاتے ہیں۔ وہ اس لکڑی یا تیلیوں کے مٹھے پر چمٹتے جاتے ہیں۔ اور اگر اس عمل کو تین چار منٹ تک جاری رکھا جائے تو خون میں جس قدر فائبرین ہوتی ہے وہ سب ان تیلیوں پر جمع ہو جاتی ہے۔ پھر اگر اس جمع شدہ فائبرین کو پانی کے دھارے سے خوب دھویا جائے تو خالص فائبرین رہ جاتی ہے۔ جو ایک بے رنگ ملائم ریشہ دار اور لچکدار مادہ ہوتا ہے۔

پھینٹنے کے بعد جو خون باقی رہ جاتا ہے۔ پھر وہ منجمد نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس میں سے تمام فائبرین نکل جاتی ہے۔ اس بقیہ خون کا رنگ اب بھی سرخ ہوتا ہے کیونکہ اس میں خون کے دانے موجود ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ کسی قدر کم ہو جاتے ہیں۔

سیرم (زرد آب) یہ ایک زرد رنگ کا کھاری سیال ہوتا ہے۔ جو کہ خون کے منجمد ہونے کے بعد اس میں سے علیحدہ ہو جاتا ہے اس کی ترکیب میں (۱) ایلبیومن یعنی رطوبت زلالیہ (۲) گلوبیولن (۳) نمکیات اور دیگر مواد پانی میں حل شدہ ہوتے ہیں۔

ایلبیومن اور گلوبیولن کی موجودگی کے سبب سیرم بھی گرم کرنے پر انڈے کی مانند جم جاتا ہے۔

نوٹ: ہر انڈے کی سفیدی ایلبیومن ہوتی ہے۔ جس طرح گرم کرنے پر وہ جم جاتی ہے۔ اسی طرح سیرم کی ایلبیومن جم جاتی ہے۔ گلوبیولن بھی سیرم کی طرح جم جاتی ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ایلبیومن پانی میں حل ہو جاتی ہے۔ مگر گلوبیولن نمکین پانی میں حل ہوتی ہے۔

حقیقت انجماد خون: جب خون جسم سے نکلتا ہے۔ تو چند خون کے سفید دانوں کے ٹوٹنے پھوٹنے سے ایک مادہ پیدا ہوتا ہے۔ جس کو تھرامبوجن کہتے ہیں۔ اسی طرح زخمی ساخت سے جس سے کہ خون بہتا ہے ایک اور مادہ پیدا ہوتا ہے جس کو تھرامبوکائنیس کہتے ہیں۔ یہ مؤخر الذکر مادہ آب خون میں حل شدہ چونے (کیلشیم) کی موجودگی میں تھرامبوجن کو تھرامبین واجمادین میں تبدیل کر دیتا ہے پھر تھرامبین آب خون (پلازما) کی فائبری نوجن (دیکھو بیان آب خون) کو فائبرین میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اور یہ فائبرین جیسا کہ مذکور ہوا خون کو جما دیتی ہے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

نوٹ: قدرت نے خون میں یہ انجمادی خاصہ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ اگر جسم میں کسی مقام پر زخم وغیرہ ہو کر جریان خون ہونے لگے۔ تو اس اپنے طبعی خاصہ سے خود خون ہی منجمد ہو کر اس جریان کو بند کر دے۔ اگر خون میں یہ قدرتی خاصہ انجماد نہ ہوتا۔ تو پھر ذرا سے زخم لگ جانے پر جریان خون جاری رہ کر آدمی تلف ہو جاتا۔ یہ بھی بتلایا جا چکا ہے کہ خون کے انجماد کے لیے خون میں جو طبعی طور پر تھوڑا سا چونا (کیلشیم) پایا جاتا ہے۔ وہ موجود ہونا ضروری ہے۔ پس جن لوگوں کے خون میں چونے کی طبعی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ ان کو ذرا سی چوٹ لگنے پر فوراً جریان خون ہو پڑتا ہے۔ اور پھر مشکل سے بند ہوتا ہے۔ اسی طرح ایسی صورت میں بالخصوص ہر قسم کے اندرونی جریان خون مثلاً خون تھوکنا خونی قے آنا وغیرہ میں چونے یعنی کلسیم کے مرکبات خاص کر کیلسیم کلورائیڈ کو خون کی طاقت انجمادی بڑھانے کے لیے دیا کرتے ہیں۔

پیدائش خون

جنین یعنی پیٹ کے بچے میں خون کے سرخ دانے ان دانوں سے پیدا ہوتے ہیں جن سے اس کا دل بنتا ہے۔ چنانچہ بیرونی دانوں یا ذرات سے دل اور شرائین بنتی ہیں اور اندرونی دانے ایک دوسرے سے الگ ہو کر خون کے دانے بن جاتے ہیں۔ جو پہلے بے رنگ ہوتے ہیں۔ اور پھر سرخ رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ خون کے سرخ دانے خون کے سفید دانوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور خون کے سفید دانے کیلوس کے دانوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ جو کہ غدد جاذبہ میں بنتے ہیں۔ سرخ دانوں سے سفید دانے تازیست پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ جس طرح دائمی تحلیل اور فنا سے بدن میں نقصان واقع ہوتا ہے۔ جس کو خون پورا کرتا ہے۔ اسی طرح خود خون کی کمی بھی پوری ہوتی رہتی ہے یعنی خلاصہ غذا یا کیلوس وغیرہ سے اس میں جدید مواد کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور چونکہ خون اور دیگر اجزاء بدن میں یہ طاقت ہے۔ کہ مناسب مواد کو اپنے جیسا بنا لیں پس اس طرح سے خون اور اجزاء بدن بدل ما یتحلل سے اپنی سابقہ حالت کو

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

قائم رکھتے ہیں۔ لیکن بعض دیگر اعضاء بدن بھی خون کی قوّتِ مغیّرہ کے ممدومعاون ہوتے ہیں۔ مثلاً معدہ۔ آنتیں۔ جگر۔ غدو اور دیگر اعضاء جو اجزاء ومواد خون تیار کرتے ہیں یا وہ اعضاء جو خون کے فضلات کو دور کر کے اُسے پاک وصاف کرتے ہیں مثلاً پھیپھڑے اور گردے وغیرہ نیز بدن کے ہر ایک حصّہ کی قوّت غاذیہ خون کی ترکیب میں دخیل ہوتی ہے۔ کیونکہ بدن کے مختلف اجزاء خون سے حسب ضرورت طبعی مختلف قسم کے اجزاء جذب کرتے ہیں۔ ورنہ خون اپنی طبعی حالت پر قائم نہ رہے :۔

فوائدِ خون

خون کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ کہ یہ تمام اعضاء بدن کو غذا و روح پہنچاتا ہے اور ان کے فضلات کو اخراج کے لیے واپس لے جاتا ہے۔ تمام اعضاء جسم خون ہی سے زندہ ہیں۔ کیونکہ اسی سے وہ تمام ضروری مواد حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی میں وہ تمام فضلات جن کی انہیں آئندہ ضرورت نہیں ہوتی خارج کرتے ہیں۔ پس (۱) خون بدن کے ہر ایک حصّے کی غذا کے لیے مناسب مواد مہیا کرتا ہے۔ اور (۲) بعض غدد جسم تک وہ ان مواد مطلوبہ کو پہنچاتا ہے۔ جن میں ان کی قوتِ مغیّرہ سے خاص رطوبات پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً خون پستان میں ایسے اجزاء لے جاتا ہے۔ جو دودھ بننے کے لائق ہیں۔ اور خصیوں میں ایسے اجزاء لے جاتا ہے جو منی بننے کے لائق ہوتے ہیں (۳) خون ہی روح حیوانی کا حامل ہے اور وہ اس کو تمام اعضاء بدن تک پہنچاتا ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر بدن کا کوئی حصّہ اپنا فعل جاری نہیں رکھ سکتا (۴) خون بدن کے ہر ایک حصّے کے فضلات کو لے کر اعضا تک پہنچا دیتا ہے۔ جو انہیں لے کر خارج کر دیتے ہیں۔ مثلاً۔ بخاراتِ دخانیہ کو پھیپھڑوں تک پہنچاتا ہے۔ جو براہ تنفس خارج ہو جاتے ہیں۔ اجزاء بول کو گردوں تک پہنچاتا ہے۔ جو براہ پیشاب خارج ہو جاتے ہیں وغیرہ (۵) خون بدن کے ہر ایک حصے کو گرم اور تر رکھتا ہے یعنی جسم میں دورۂ خون سے حرارت بدن برقرار اور قائم رہتی ہے۔ بلکہ زندگی کا دارومدار بھی اسی پر ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

خون آکسیجن (روح حیوانی) کا حامل ہے۔ اور اس کو تمام اعضاء بدن تک پہنچاتا ہے۔ جس سے حرارت و قوت پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح کہ کوئلوں کے جلنے سے سٹیم انجن میں قوت حرکت پیدا ہوتی ہے۔ پس ہر ایک حصّہ بدن کی حیات کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ دوران خون کے ساتھ اس کا ایسا تعلق ہو کہ اُن عروقِ شعریہ کی لطیف دیواروں میں سے (جن میں خون بغرض (۱) تغذیہ (۲) تنسیم اور (۳) تصفیہ کے دورہ کرتا ہے) خون کے ضروری مطلوبہ مواد اور آکسیجن یا روح حیوانی تراوش پا کر یا چھن کر اس حصّہ بدن کی ساخت میں آسکیں۔ اور اس کے فضلات منجذب ہو کر بغرضِ اخراج و تصفیہ خون میں جاسکیں المختصر یہ کہ خون پر ہی زندگی کا دارومدار ہے اگر جسم میں دورۂ خون مسدود ہو جائے۔ تو پھر زندگی بھی تمام ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اطباء جاری خون کو نفسِ سائلہ یا روح رواں بھی کہتے ہیں ۔

انسان دو چیزوں یعنی جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ جسم کا تو تشریحی بیان کیا جا رہا ہے لیکن خون کے بیان میں چونکہ رُوح کا ذکر آ گیا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہاں پر روح کی حقیقت کا بھی کچھ بیان کر دیا جائے۔ جو خالی از دلچسپی نہ ہوگا۔

رُوح یا نفس

رُوح یا نفس وہ روح جس کے متعلق قرآن کریم میں قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ ۔ ارشاد ہے۔ وہ ایک جوہر فرد ہے۔ جو عنایت لطافت سے جسم کے ساتھ مقید نہیں بلکہ وہ جسم سے علیحدہ رہ کر اس میں تدبیر و تصرّف کا علاقہ رکھتا ہے۔ اس کی حقیقت کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حکماء اسی روح کو نفسِ یا نفسِ ناطقہ بھی کہتے ہیں لیکن برخلاف ازیں وہ رُوح جس کا اطباء نے بیان کیا ہے۔ اور جس کو روح طبی کہنا مناسب ہے۔ وہ روح جسم میں موجود و مقید ہوتی ہے۔ اور اطبا اسی کو قوتِ حیات یا زندگی سے بھی تعبیر کرتے ہیں پہلے ہم روح یا نفس کے متعلق حکیم افلاطون و حکیم ارسطو کے مذاہب بیان کرتے ہیں۔ اور پھر روح طبی کا بیان کریں گے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

رُوح یا نفس کے متعلق افلاطون کا یہ مذہب ہے۔ کہ روح قدیم اور جسم حادث ہے۔ اور اکثر حکماء اشراقیین کا بھی یہی مذہب ہے۔ لیکن ارسطو کا یہ مذہب ہے۔ کہ انسانی روح اور جسم دونوں حادث ہیں۔ اس کے نزدیک انسانی روح مع تمام انسانی قوتوں کے والدین کے تخم میں موجود ہوتی ہے۔ اور جسم انسانی کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہے۔ انسان کا کوئی عضو اور کوئی قوت ایسی نہیں جو والدین کے مادۂ تولید سے نہ بنی ہو۔ والدین کا مادۂ تولید تمام انسانی اعضاء قوا کا مادہ ہے۔ بعض حکماء نے لکھا ہے کہ جس طرح عناصر کے امتزاج اور ان کے کسر وانکسار اور فعل وانفعال سے مزاج پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح والدین کے مادۂ تولید کے اختلاط سے روح پیدا ہوتی ہے۔ اور روح وجسم میں کسی قسم کا ذاتی یا زمانی تقدم وتاخر نہیں۔ دو چیزیں ساتھ ہی ایک مادہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ حکماء مشائیین کا بھی یہی قول ہے کہ روح مثل بدن کے حادث ہے۔ اور ہمارے حکیم روحانی حضرت رسول کریم کی احادیث سے بھی یہی ثابت ہے۔ کہ روح اور جسم دونوں حادث ومخلوق ہیں۔ البتہ روح کی پیدائش جسم پر مقدم ہے۔ جیسا کہ اس حدیث اِنَّ اللّٰہَ تَعَالٰے خَلَقَ الْاَرْوَاحَ قبل الاجسام سے ظاہر ہے۔

ارسطو کے مذکورہ بالا قول کی تائید موجودہ علم فزیالوجی یا منافع الاعضاء سے بھی ہوتی ہے چنانچہ جیسا کہ صفحہ ۸ پر بیان ہوا۔ والدین کے مادۂ تولید (بیضۂ انثیٰ وکرم منی) میں روح یا جان ہوتی ہے۔ اور ان دونوں کے اختلاط باہمی سے نطفہ قرار پاکر جنین بنتا ہے۔ اور پھر وہ تولد ہوکر رفتہ رفتہ انسانی جسم مکمل ہوتا ہے۔ پس جس طرح سے جسم بتدریج ترقی کرتا اور بڑھتا ہے۔ اس طرح بتدریج اس کی روح بھی ترقی کرتی ہے۔ اور تخم انسان میں جو کروموسومز ہوتے ہیں انہیں سے مولود میں والدین کے خصائل وشمائل منتقل ہوتے ہیں اگرچہ جسم کی ترقی کے ساتھ ساتھ نفس کو بھی ترقی ہوتی ہے۔ لیکن نفس کی تکمیل جسم کی تکمیل کے بعد ہوتی ہے۔ اب ہم روح طبّی کا بیان کرتے ہیں۔

رُوح یا رُوح طبّی۔ اطبّا نے لکھا ہے کہ جب خون جگر سے دل کے بائیں بطن میں آتا ہے۔ اور اس خون سے چھ بخارات پیدا ہوتے ہیں۔ ان بخارات کے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جوہر لطیف کو رُوح کہتے ہیں۔ یعنی دل کے بائیں بطن میں خون سے جو نہایت لطیف بخارات پیدا ہوتے ہیں۔ اطبا انہیں کو روح کہتے ہیں (نیز دیکھو دورانِ خون کا بیان) اور ان کے نزدیک روح کی تین قسمیں ہیں (۱) روح حیوانی (۲) رُوح طبعی (۳) روح نفسانی روح حیوانی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کا جو حصہ دل سے جگر کی طرف چلا جاتا ہے اس کو رُوح طبعی کہتے ہیں۔ اور جو حصہ دل سے دماغ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کو رُوح نفسانی کہتے ہیں (۱) رُوح حیوانی۔ یہ دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور دل سے بذریعہ شرائین خون کے ساتھ تمام جسم میں جاتی ہے۔ یہ قوت حیوانی کی حامل ہے جس سے زندگی قائم رہتی ہے انگریزی میں اس کو نیوماز ڈیکن Pneumazotikon یا وائٹل سپرٹ Vital Spirit کہتے ہیں۔

نوٹ:۔ متقدمین اطباء کی بیان کردہ روح حیوانی درحقیقت وہ آکسیجن یا نسیم ہے۔ جو کہ شریانی خون میں ہوتی ہے۔ اور اسی کے ذریعے تمام جسم میں جاتی ہے۔ اور وہ اس کو زندگی پہنچاتی ہے۔ پس ان کا یہ قول کہ شریانی خون رُوح حیوانی کا حامل ہے اور وہ اس کو تمام اعضاء تک پہنچاتا ہے۔ نہایت صحیح ہے۔ جدید علمی تحقیقات بھی اس قول کا مصدق و مؤید ہیں۔ (دیکھو آگے دورانِ خون کا بیان)

(۲) **رُوح طبعی**۔ روحِ حیوانی کا وہ حصہ جو دل سے جگر میں چلا جاتا ہے اس کو روح طبعی کہتے ہیں۔ یہ قوت طبعی کی حامل ہے۔ جس کے ذریعے بدن کی پرورش اور اس کا نشوونما ہوتا ہے۔ جگر سے اور وہ یعنی وریدوں کے ذریعے تمام جسم میں جاتی ہے۔ اور ہر عضو کو غذا پہنچاتی ہے انگریزی میں اسکو Pneuma Physikon یا نیچرل سپرٹ Natural Spirit کہتے ہیں۔

نوٹ:۔ یورپ کے متاخرین علمائے تشریح و منافع الاعضاء روح طبعی اور جگر اور دہ کے مذکورہ بالا فعل سے منکر ہیں کیونکہ اور دہ اعضاء جسم سے خون کو دل کی طرف واپس لاتی ہے جیسا کہ دورانِ خون کے بیان میں آپکو واضح ہوگا اور نہ ہی جگر سے اعضاء کو غذا پہنچتی ہے وغیرہ ارواح ثلاثہ کا نظریہ بھی غالباً افلاطون کا ہی ہے۔ جو ہزار ہا سال سے آج تک اطبائے یونانی میں مسلّمہ ہے۔ لیکن متاخرین اطبائے یورپ (جس میں موجودہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

یونان بھی شامل ہے۔ اب اس کو نہیں مانتے۔

(۳) رُوح نفسانی روح حیوانی کا مادہ حصہ جو دل سے دماغ میں چلا جاتا ہے۔ روح نفسانی کہلاتا ہے۔ یہ روح قوت نفسانی (قوت حس وحرکت) کی حامل ہے۔ اور دماغ سے بذریعہ اعصاب تمام جسم میں پھیل کر اعضاء کو قوت حس وحرکت عطاء کرتی ہے۔ انگریزی میں اس کو نیو ما سائیکی کن Neuma Paychikon یعنی مل سپرٹ Animal Spirit کہتے ہیں۔

دوران خون

اردو نام	طبی نام	ڈاکٹری نام
دوران خون	دَورۂ دَمویہ	سرکولیشن آف بلڈ Circulaion Blood

جب تک انسان زندہ رہتا ہے۔ دل اور پھیپھڑے ایک منظم طریق پر حرکت کرتے رہتے ہیں۔ پھیپھڑوں کی حرکت سے تنفس جاری رہتا ہے اور دل کی حرکت سے دَورۂ خون جاری رہتا ہے یعنی خون دل کی حرکت سے براہ شرائین جسم کے ہر ایک حصہ میں جاکر پھر براہ اوردہ دل کی طرف آتا ہے۔ خون کی اسی رفتار کو **دوران خون** کہتے ہیں۔ شرائین میں اور وردہ کا باہمی اتصال ایک طرف تو دل کے ساتھ ہے اور دوسری طرف عروق شعریہ کے ساتھ۔ چنانچہ خون دل سے پہلے شرائین میں جاتا ہے پھر عروق شعریہ میں اور پھر اوردہ میں پہنچ کر دل میں واپس آتا ہے۔ اور اس طرح سے یہ ایک دورہ پورا کرتا ہے۔ خون جو اس طرح دورہ کرتا ہے۔ یہ اس کی ذاتی حرکت نہیں بلکہ یہ حرکت دل کے سکڑنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور خون ہمیشہ ایک ہی رفتار پر کیوں دورہ کرتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے (جیسا کہ آگے آپ کو دل کی تشریح سے بخوبی معلوم ہو جائے گا۔ کہ دل کے دونوں اذن دلبطن کے درمیان اور درید شریانی اور ٹی کے دہانوں پر بوکواڑیاں لگی ہوتی ہیں۔ وہ خون کو ایک ہی طرف جانے دیتی ہیں۔ اور اگر خون کسی مخالف وجہ سے مخالف جانب جانا چاہیئے تو یہ کواڑیاں بند ہو کر خون کی بازگشت کو روکتی ہے۔

دورانِ خون۔ جسم کا کثیف اور سیاہی مائل خون وریدوں کے ذریعے اکٹھا ہو کر

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

دو بڑی وریدوں وریدا اجوف نازل (انفیریئر وینا کیوں اور وریدا اجوف صاعد (سوپیریئر وینا کیوا) کے ذریعے دل کے دائیں اذن میں آتا ہے۔ اور وہاں سے اذن و بطن کے درمیانی سوراخ کی راہ دل کے بائیں بطن میں پہنچتا ہے۔ اور وہاں سے بذریعہ دیہ شریانی (پلمونری آرٹری) پھیپھڑوں میں صاف ہونے کے لیے چلا جاتا ہے جہاں پھیپھڑوں کے عروق شعریہ (بال سی باریک رگوں) میں پھیل کر دورہ کرتے ہوئے وہ بخارات دخانیہ (کاربانک ایسڈ گیس) کو اپنے سے خارج کر دیتا ہے اور ہوائے لطیف و روح پرور یعنی نسیم (آکسیجن) کو جذب کر کے شوخ سرخ ہو جاتا ہے۔ پھر پھیپھڑوں میں سے براہ شرائین وریدیہ (پلمونری وینز) وہ دل کے بائیں اذن میں جاتا ہے۔ اور وہاں سے اذن و بطن کے درمیانی سوراخ کی راہ دل کے بائیں بطن میں جاتا ہے۔ اور بائیں بطن سے شریان رادرطی (اے آرٹا) میں جاتا ہے۔ اور پھر اس کی شاخوں کے ذریعے تمام جسم کی عروق شعریہ میں چلا جاتا ہے جن کی نازک دیواروں سے (اس کا آبی حصہ) پلازما بارطوبت محصورہ (ترادش پاکر یعنی رس کر وہ اعضاء کی بافتوں (ٹشوز) میں چلا جاتا ہے۔ اور ان کی پرورش کرتا ہے نیز وہ روح حیوانی (آکسیجن) جو اس کے ساتھ آئی تھی۔ وہ بھی عروق شعریہ کی دیواروں میں سے نفوذ کر کے تحلیل ہو جاتی ہے یعنی اعضاء کی بافتوں یا ذرات جسم میں جذب ہو کر ان کو قوت حیات بخشتی ہے۔ اور اعضاء کی بافتوں کے بخارات دخانیہ کاربانک ایسڈ گیس خون میں جذب ہو جاتی ہیں جس سے وہ پھر کثیف اور سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ اور پھر عروق شعریہ سے خون وریدوں میں چلا جاتا ہے۔ اور وریدوں کے ذریعے اکٹھا ہو کر دو بڑی وریدوں اجوف صاعد و نازل کے ذریعے پھر دل کے بائیں اذن میں چلا جاتا ہے۔ غرضیکہ اسی طرح خون دورہ کرتا رہتا ہے۔ خون کا ایک کامل دورہ ایک منٹ سے بھی تھوڑے عرصہ میں ہو جاتا ہے۔ مگر یاد رہے کہ جسم کا سارا خون ایک ہی دفعہ دورہ نہیں کرتا بلکہ پے در پے شریانوں وغیرہ میں جاتا رہتا ہے

دل اور پھیپھڑوں کے درمیان جو خون کا دورہ ہوتا ہے اسکو دورۂ رئویہ (پلمونری سرکولیشن) یا دورۂ صغیرہ (سمیسر سرکولیشن) کہتے ہیں۔ اور سارے جسم کے دورانِ خون کو دورۂ کبیرہ (سسٹمیٹک سرکولیشن) کہتے ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

نوٹ: عروق شعریہ کی دیواروں میں سے خون کا صرف آبی حصّہ (پلازما جس کو طب میں رطوبت محصورہ کہتے ہیں) تراوش پاتا ہے اور اس تراوش یافتہ آب خون کو ڈاکٹری میں ملف اور طب میں رطوبت طلیہ کہتے ہیں۔ جو جسمانی ساختوں کے خلل و فرج میں بھر جاتی ہے اور ان کی پرورش کرتی ہے اور جو زائد ہوتی ہے یعنی پرورش کرنے کے بعد باقی بچ رہتی ہے۔ وہ پھر عروق شعریہ میں جذب نہیں ہوتی بلکہ بذریعہ عروق جاذبہ جذب ہو کر وریدی خون میں جا ملتی ہے اور واپس جاتے وقت ان اعضاء کی بعض کثافتوں کو بھی اپنے ہمراہ خون میں واپس لے جاتی ہے۔

نتائج تجربۂ دوران خون

(۱) دل آدھے گھنٹے کے عرصے میں اس قدر خون دھکیلتا ہے۔ جو وزن میں سارے جسم کے وزن سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔

(۲) شرائین سے خون نکلنے کے جھٹکے دل کی ضربان کے مطابق ہوتے ہیں۔

(۳) بڑی وریدوں کو باندھ دیں۔ تو دل زرد اور بے خون ہو جاتا ہے۔

(۴) بڑی شرائین کو باندھ دیں۔ تو دل غیر معمولی طور پر بھر کر پھول جاتا ہے۔

(۵) دل کے سوراخوں کی تمام کواڑیوں کی ساخت اس قسم کی ہے کہ وہ خون کو صرف ایک ہی طرف جانے دیتے ہیں۔

(۶) اگر جسم کی کسی ایک رگ میں زہر داخل کر دیا جائے تو وہ فوراً سارے جسم میں پھیل جاتا ہے۔

(۷) جب کوئی شریان کٹ جائے تو زخم سے اوپر اس پر دباؤ ڈالنے سے خون رکتا ہے۔

نوٹ: لیکن دل سے اوپر کی طرف گردن اور سر میں جانے والی اگر کوئی شریان کٹ جائے۔ تو زخم سے نیچے اس پر دباؤ ڈالنے سے خون رکتا ہے۔

(۸) جب کوئی وید کٹ جائے تو زخم سے نیچے اس پر دباؤ ڈالنے سے خون رکتا ہے۔

نوٹ: لیکن سر اور گردن سے دل کی طرف آنے والی اگر کوئی وید کٹ جائے۔ تو زخم سے اوپر دباؤ ڈالنے سے خون رکتا ہے۔

سینہ (و) اعضاء سینہ

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
سینہ	صدر	تھوریکس Therax

سینہ ایک مخروطی شکل کا جوف ہے۔ جو بدن کے بالائی حصّہ پر واقع ہے اسکے سامنے کی طرف

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سینہ کی ہڈی چھ بالائی پسلیاں اُن کی کرّیاں اور پسلیوں کے درمیانی عضلات ہوتے ہیں۔ دونوں جانب پسلیاں اور اُن کے درمیانی عضلات پیچھے کی طرف پسلیاں اُن کے عضلات اور پشت کے مُہرے ہوتے ہیں۔ اس کا بالائی سوراخ تنگ اور ایک جھلی سے بند ہوتا ہے اس کا زیریں سوراخ کشادہ اور دیافرغما عضلہ سے بند اور محدود ہوتا ہے۔

نوٹ:۔ اعضاء اندرونی کو یعنی ان اعضاء کو جو جسم کے جوفوں میں واقع ہیں۔ احشاء کہتے ہیں۔

اعضاء سینہ

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
سینہ کے اعضاء	احشاء الصدر	Thorax Viscerse

جوف سینہ میں دل مع غلاف۔ بڑے بڑے عروق مثلاً شریان اعظم۔ ورید شریانی اجوف صاعد ونازل مجریٔ صدر اور پھیپھڑے وغیرہ ہوتے ہیں جنہیں سے پہلے دل اور بعض عروق کا بیان کیا جائیگا۔ مجریٔ صدر کا بیان عروق جاذبہ میں اور پھیپھڑوں کا بیان اعضاء تنفس میں کیا جائیگا۔

اقسام صدر یعنی سینہ کے حصّے

اطباء مشرحین نے مختلف امراض کی تشخیص کے لیے چند فرضی خطوط کے ذریعے سینہ کو کئی حصّوں میں تقسیم کیا ہے چنانچہ سینہ کے گرد تین فرضی گول خط کھینچنے سے سینہ تین اقالیم یا اقسام میں منقسم ہو جاتا ہے (۱) پہلا گول خط چھاتی کے گرد ہنسلی کی ہڈی کے اندرونی سرے سے شروع کر کے اس ہڈی کی سامنی سطح کے برابر باہر لے جا کر اُس کے بیرونی سرے کے اوپر سے گزر کر پشت پر لے جائیں پھر وہاں سے اس خط کو دونوں شانوں کی ہڈیوں کی سپائن (خارنما ابھار) کے برابر لے جا کر دوسری جانب کی ہنسلی کی سامنی سطح پر پہنچا دیں اور وہاں سے ہنسلی کے سامنے سے گزر کر اس خط کو اسی جگہ ختم کر دیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ (۲) دوسرا گول خط تیسری پسلی کی کرّی کے جوڑ کے زیریں کنارے کے برابر سے شروع کر کے چھاتی کے گرد پستان کی چوچی، شانے کی ہڈیوں کے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

نچلے کونے اور پشت کے ساتویں مہرے کی سپائن پر سے گزار کر اسی مقام پر ختم کریں جہاں سے اس کو شروع کیا تھا (۳) تیسرا گول خط غضروف خنجری کے زیرین کنارے چھٹی پسلی کی کرٹی کے جوڑ کے برابر سے شروع کر کے پشت کے دسویں مہرے کی سپائن کے برابر چھاتی کے گرد پھر اگر اسی مقام پر ختم کریں جہاں سے اس کو شروع کیا تھا۔

(ب) اگر سینہ کی سامنی سطح پر دونوں ہنسلی کی ہڈیوں کے چاروں سروں (سٹرنل یا اندرونی اور اکرومئل یا بیرونی) سے ایک ایک عمودی خط شروع کر کے نیچے کی طرف لے جاویں اور سینہ کی پشت پر دونوں شانوں کی ہڈیوں کے چاروں کناروں (ورٹی برل یا فقری اور ایگزلری یا ابطی کے برابر چار عمودی خط کھینچیں اور ربڑھ کے وسطی ابھار کے برابر پانچواں فرضی عمودی خط کھینچیں تو سینہ کی سامنی سطح نو حصوں پر ہر ایک پہلو دو دو حصوں پر اور پشت آٹھ حصوں پر منقسم ہو جائے گی اور سینہ کے کل اکیس حصے بن جائیں گے۔ جو مندرجہ ذیل جداول اور تصاویر میں بخوبی واضح کیے گئے ہیں تاکہ عوام بالخصوص اطبا کو ان مقامات اور ان کے مشمولات کے سمجھنے میں جو مختلف امراض کی تشخیص کے لیے ضروری ہیں۔ سہولت اور آسانی ہو۔

مندرجہ ذیل جدوال اقسام صدر یعنی چھاتی اور پشت کے تشریحی مقامات بمعہ ان کے مشمولات کے دکھائے گئے ہیں

بایاں ہنسلی کے اوپر کا مقام	سینہ کی ہڈی کے اوپر کا مقام	دایاں ہنسلی کے اوپر کا مقام
قسم فوق اکتسر قوۃ الیسر لیفٹ سوپر کلیوی کیوٹر زیجن	قسم فوق القفص سوپر اسٹرنل زیجن	قسم فوق الترقوہ ایمن رائٹ سوپر اکلیوی کیوٹر زیجن
اس مقام میں بائیں پھیپھڑے کی چوٹی مع غلاف گردن کے عروق عصب رئوی وعدی اور مجری صدر ہوتے ہیں	اس مقام میں مجراب شریان اعظم کا بالائی کنارا گردن کے بڑے بڑے عروقی بے نام شریان اور قصبۃ الریہ ہوتے ہیں۔	اس مقام میں دائیں پھیپھڑے کی چوٹی مع غلاف گردن کے عروق عصب رئوی وعدی گردن کا عصبی جال ہوتے ہیں

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

بایاں ہنسلی کے نیچے کا مقام قسم تحت الترقوہ ایسر لیفٹ انفرا کلیوی کیولر ریجن اس مقام میں بایاں پھیپھڑا مع غلاف قصبۃ الریہ کی جانب تقسیم وریدِ شریانی دل کا بایاں اُذن اور دل کا قاعدہ ہوتا ہے۔	**سینہ کی ہڈی کا مقام** قسم القص سٹرنل ریجن اس میں محراب اوطی۔ بے نام وریدِ وشریان دل کے اُذن۔ ہوا کی نالی۔ غذا کی نالی۔ الجوف نازل وریدِ شریانی اور غدہ تیموسیہ ہوتے ہیں۔	**دایاں ہنسلی کے نیچے کا مقام** قسم تحت الترقوہ ایمن رائٹ انفرا کلیوی کیولر ریجن اس مقام میں دائیاں پھیپھڑا مع غلاف قصبۃ الریہ کی جائے تقسیم مجراب شریان اعظم اور دل کا داہنا اذن ہوتے ہیں۔
بایاں پستان کے نیچے کا مقام قسم تحت الثدی ایسر لیفٹ انفرا میمری ریجن اس مقام میں بایاں پھیپھڑا مع غلاف دل کا بایاں اُذن اور بطن کسی قدر دایاں بطن اور دل کی نوک اور دیافرغما کے نیچے معدہ اور آنتیں ہوتے ہیں۔	**سینہ کی ہڈی کے نیچے کا مقام** قسم تحت القص انفرا سٹرنل ریجن اس مقام میں دل کا دایاں بطن اذنی و بطنی سوراخ اور کواڑیوں پھیپھڑا اور وریدِ شریانی اور دیافرغما کے نیچے جگر و معدہ ہوتے ہیں۔	**دایاں پستان کے نیچے کا مقام** قسم تحت الثدی ایمن رائٹ انفرا میمری ریجن اس مقام میں دایاں پھیپھڑا مع غلاف دل کا دایاں اُذن اور بطن اور دیافرغما کے نیچے جگر و قولون ہوتے ہیں۔
بایاں بغل کا مقام قسم ابطی ایسر لیفٹ ایگزلری ریجن اس مقام میں بایاں پھیپھڑا مع غلاف اور ہوا کی نالی کی شاخیں ہوتی ہیں		**دایاں بغل کا مقام** قسم ابطی ایمن رائٹ ایگزلری ریجن اس مقام میں دایاں پھیپھڑا مع غلاف اور ہوا کی نالی کی شاخیں ہوتی ہیں
بایاں بغل کے نیچے کا مقام قسم تحت الابط ایسر لیفٹ انفرا ایگزلری ریجن اس مقام میں بایاں پھیپھڑا مع غلاف اور دیافرغما کے نیچے معدہ وطحال ہوتے ہیں۔		**دایاں بغل کے نیچے کا مقام** قسم تحت الابط ایمن رائٹ انفرا ایگزلری ریجن اس مقام میں دایاں پھیپھڑا مع غلاف اور دیافرغما کے نیچے جگر ہوتا ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مقامی تشریح۔ ان ہر سہ تصاویر میں چھاتی پیٹ اور پشت کے تشریحی مقامات دکھائے گئے ہیں۔


1 کالر بون کا مقام 2 مونس کے نیچے کا مقام 3 مونس کے نیچے کا مقام 4 بغل کے نیچے کا مقام 5 بغل کے نیچے کا مقام 6 بغل کے نیچے کا مقام 7 پیڑو کا مقام 8 نف کا مقام 9 مقعد کا مقام 10 سپاٹ شانہ کے نیچے کا مقام 11 شانہ کے نیچے کا مقام 12 شانہ کے اوپر کا مقام 13 پیٹھ کا مقام 14 کمر کا مقام 15 کمر کا مقام 16 کمر کا مقام
a b c

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

دایاں سپائن شانہ کے اوپر کا مقام قسم فوق سنسنہ کتفیہ ایمن لائٹ سوپر سپائنل ریجن اس مقام میں دائیں پھیپھڑے کی چوٹی مع اپنے غلاف کے ہوتی ہے۔	شانوں کے درمیان کا مقام قسم بین الکتفین انٹر سکے پولر ریجن دایاں: اس مقام میں دایاں پھیپھڑا قصبۃ الریہ کی جائے تقسیم اور اس کے غدد ہوتے ہیں بایاں: اس مقام میں بایاں پھیپھڑا قصبۃ الریہ غدد شریان اعظم اور غدد کی نالی ہوتے ہیں	بایاں سپائن شانہ کے اوپر کا مقام قسم فوق سنسنہ کتفیہ ایسر لیفٹ سوپر اسپائنل ریجن اس مقام میں بائیں پھیپھڑے کی چوٹی مع اپنے غلاف کے ہوتی ہے۔
دایاں سپائن شانہ کے نیچے کا مقام قسم تحت سنسنہ کتفیہ ایمن رائٹ انفرا سپائنل ریجن اس مقام میں دایاں پھیپھڑا مع غلاف ہوائی نالیاں اور دیافرغما کے نیچے جگر ہوتا ہے۔	———	بایاں سپائن شانہ کے نیچے کا مقام قسم تحت سنسنہ کتفیہ ایسر لیفٹ انفرا سپائنل ریجن اس مقام میں بایاں پھیپھڑا مع غلاف ہوائی نالیاں غذائی نالی اور سینہ دیافرغما کے نیچے تلی آنتیں اور بایاں کلاہ گردہ ہوتا ہے۔
دایاں شانے کے نیچے کا مقام قسم تحت الکتف ایمن رائٹ انفرا اسکے پولر ریجن اس مقام میں دایاں پھیپھڑا مع غلاف اور دیافرغما کے نیچے جگر دایاں گردہ اور کلاہ گردہ ہوتے ہیں۔		بایاں شانے کے نیچے کا مقام قسم تحت الکتف ایسر لیفٹ انفرا اسکے پولر ریجن اس مقام میں بایاں پھیپھڑا مع غلاف اور دیافرغما کے نیچے معدہ آنتیں اور گردہ ہوتے ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اب دل اور نبض وعروق کا بیان کیا جاتا ہے لیکن پہلے غلاف دل کا بیان کیا جاتا ہے۔

غلافِ دل

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
دل کا غلاف	غلاف القلب۔ تامور	پیری کارڈیم Pericardium

یہ مخروطی شکل کا تھیلی نما بند غلاف ہوتا ہے۔ جس کے اندر دل آویزاں رہتا ہے۔ اس غلاف کے اندر ہی دل سے شریانِ اعظم (اورطی) اور اس کی دو بین شاخیں شروع ہوتی ہیں اس تھیلی نما غلاف کی نوک دل کی جڑ سے تقریباً دو انچ اوپر کی طرف شریانِ اعظم کے بیرونی غلاف کے ساتھ چسپاں ہوتی ہے۔ اور اس کا پیندا حجاب حاجز کے درمیانی وتری حصے کے ساتھ چسپاں ہوتا ہے۔ گویا اس کا وضع قیام دل کے وضع قیام کے برعکس ہوتا ہے یعنی دل کا پیندا اس کی نوک میں اور دل کی نوک اس کے پیندے میں ہوتی ہے۔ اور چونکہ اس کی صرف نوک ہی دل کی جڑ یا پیندے کے ساتھ چسپاں ہوتی ہے۔ اس لیے دل اس تھیلی نما غلاف میں آویزاں ہوتا ہے۔ اس غلاف کے دو طبق ہوتے ہیں۔ اندرونی باریک طبق جو آب دار جھلی کا ہوتا ہے۔ دل کے اوپر لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اور بیرونی طبق جو ریشہ دار ساخت کا ہوتا ہے۔ ایک تھیلی سی بناتا ہے۔ اور ان دونوں طبقوں کے درمیان ایک خالی جگہ ہوتی ہے۔ جس میں تھوڑی سی زردی مائل رطوبت بھری رہتی ہے۔ تاکہ دل دھڑکتے وقت ان دونوں طبقات کے درمیان رگڑ پیدا نہ ہو۔ اور دل کو اذیت نہ ہو یہ دونوں طبقات بھی دل کی جڑ کے پاس باہم چسپاں ہوتے ہیں +

نوٹ۔ امراض الاستسقاء حجاب القلب یا احتواء الرطوبت علی القلب میں اس غلاف کے دونوں طبقات کے درمیان ہی زیادہ رطوبت نزاوش پاکر بھر جایا کرتی ہے جس سے دل پر وبال پڑنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ گویا دل ڈوبا جاتا ہے۔

دل

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
دل	قلب	ہارٹ Heart

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

دل جو دورانِ خون کا مرکز ہے۔ ایک مخروطی شکل کا جوف دار عضلاتی عضو ہے۔ یہ اپنے غلاف میں ملفوف سینے میں دونوں پھیپھڑوں کے درمیان رہتا ہے۔ جوانی میں دل پانچ انچ لمبا ساڑھے تین انچ چوڑا اور اڑھائی انچ موٹا ہوتا ہے۔ مردوں میں اس کا وزن سوا پاؤ یا ڈیڑھ پاؤ لیکن عورتوں میں پاؤ یا سوا پاؤ ہوتا ہے۔ آدمی کا دل جسامت میں بڑھاپے تک بڑھتا رہتا ہے۔ دل کے زور سے سکڑنے پر بھی خون شرائین میں جاکر تمام جسم کی پرورش کرتا ہے۔ دل کے اندر کی جانب ایک جھلی لگی ہوتی ہے جو شریانوں اور وریدوں کی اندرونی جھلی کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کو عربی میں غشاء مستبطن القلب اور انگریزی میں اینڈوکارڈیم کہتے ہیں۔

دل اور پھیپھڑوں کی تصویر

اس تصویر میں دونوں پھیپھڑوں کے درمیان دل اپنی اچھی حالت میں دکھایا گیا ہے

(۱) دایاں بطن (۲) بایاں بطن (۳) دایاں اذن (۴) بایاں اذن (۵) اورطی (۶) شعبہ یان ریہ (۷) وریدِ ریہ (۸) دایاں پھیپھڑا (۹) بایاں پھیپھڑا (۱۰) وریدِ جوف علوی (۱۱) عروق تحت الترقوہ (۱۲) شریان سباتی (۱۳) دائیں اور بائیں گردن کی وریدیں (۱۴) نرخرہ (۱۵) اس کی شاخیں

دل کا وضع قیام۔ دل سینے کے اندر ترچھے طور پر واقع ہے۔ اس کی جڑ یعنی دل کا قاعدہ اوپر پیچھے دائیں طرف کو ہوتا ہے۔ جہاں کہ دائیں دوسری پسلی کی کڑی سینے کی ہڈی سے ملتی ہے۔ لیکن اس کی نوک نیچے اور سامنے بائیں طرف پانچویں چھٹی پسلیوں کے بائین اور بائیں چھاتی کی بھٹنی سے تقریباً ڈیڑھ انچ نیچے اور ایک انچ اندر کی طرف ہوتی ہے۔ دل سینے کی ہڈی کے نچلے دو تہائی حصے کے پیچھے اور ہڈی مذکور کے درمیانی خط سے ڈیڑھ انچ دائیں طرف

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تصویر وضع قیام دل



اس تصویر میں سینہ کے اندر میان دل کا اصلی وضع قیام دکھایا گیا ہے۔

(ا) سینہ کی ہڈی (ب) ہنسلی کی ہڈی (۱ تا ۱۰) پسلیاں اور اُن کی کُرّیاں

اور تین انچ بائیں طرف ہوتا ہے۔

دل کے حصّے

دل کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک دایاں حصّہ دوسرا بایاں حصّہ یہ دونوں حصّے ایک درمیانی دیوار کے ذریعے علیحدہ رہتے ہیں۔ اور ہر ایک حصّے میں دو خانے ہوتے ہیں۔ اُوپر والے پتلے خانے کو دل کا کان عربی میں اُذنُ القلب اور انگریزی میں آریکل کہتے ہیں۔ اور نیچے والے موٹے خانے کو عربی میں بطن القلب اور انگریزی میں وینٹریکل کہتے ہیں۔ دائیں طرف کے دونوں خانے ایک سوراخ کے ذریعے ملے رہتے ہیں۔ اور اُن کے درمیان سیاہ خُون ہوتا ہے۔ بائیں طرف کے دونوں خانے بھی ایک سوراخ کے ذریعے ملے رہتے ہیں۔ اور اُن کے درمیان سُرخ خُون ہوتا ہے۔

(۱) **دل کا دایاں کان** (اُذن یمنی) رائٹ آریکل، یہ دل کے بائیں کان کی نسبت کسی قدر بڑا ہوتا ہے۔ لیکن اُس کی دیواریں نسبتاً پتلی ہوتی ہیں۔ اور اس کے اندر قریباً ایک چھٹانک خون سما سکتا ہے۔ دل کا دایاں کان درحقیقت دو بالائی وزیریں جوفدار وریدوں (اجوف ساعدیا سپیریر ینا کیوا) (اجوف نازل

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اس تصویر میں دل کو سیدھا کاٹ کر اُس کے دونوں اُذن اور دونوں بطن دکھائے گئے ہیں۔



Interior of the Right Side of the Human Heart

(۱) اجوف صاعد (سوپیریر وینا کیوا) (۲) اجوف نازل (انفیریر وینا کیوا) (۳) دایاں اذن (۴) ریشہ ہائے عضلاتی متعلقہ اطناب وتری (۵) کیوسپڈ (۶) منفذ شریان الرئیہ (۷-۸-۹) شریان اعظم اور اس کی شاخیں (۱۰) بایاں اذن (۱۱) بایاں بطن

یا انفیریر وینا کیوا) کے باہم ملنے سے بنتا ہے۔ دل کا یہ دایاں کان بذریعہ ایک سوراخ کے اپنے نیچے دل کے دائیں بطن سے ملا رہتا ہے اس سوراخ پر ایک سہ دندانہ کواڑی (تین گوشہ چنٹ) لگی رہتی ہے۔ جس کے متوازی پہلو کی پچھلی سطح پر باریک سفید وتری ڈوریاں چسپاں ہوتی ہیں۔ کواڑی اس واسطے ہوتی ہے کہ جب دل کا بایاں بطن سکڑ کر خون کو شریان الرئیہ میں دھکیلتا ہے تو وہ دل کے دائیں کان میں واپس نہ آجائے۔

(۲) دل کا دایاں بطن۔ بطن ایمن۔ رائٹ وین ٹریکل) یہ بطن شکل میں مثلث ہوتا ہے۔ اس کی دیواریں بائیں بطن کی دیواروں کی نسبت پتلی لیکن اس کا جوف اس کے جوف کے برابر ہوتا ہے۔ اس میں قریباً ڈیڑھ چھٹانک خون

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سما سکتا ہے۔ اس بطن سے شریان رئوی (ورید شریانی) شروع ہوتی ہے۔ جس کے ذریعہ دل سے کثیف خون پھیپھڑوں میں جاکر صاف ہوتا ہے۔ شریان رئوی کے مبدا پر بھی تین ہلالی شکل کی کواڑیاں (صمام ہلالی) لگی ہوتے ہیں۔ جو خون کو بطن قلب سے شریان میں تو جانے دیتی ہیں۔ مگر بطن قلب میں واپس نہیں آنے دیتیں۔

(۳) دل کا بایاں کان (اُذن یُسریٰ۔ لیفٹ آریکل) یہ دل کے بائیں کان کی نسبت چھوٹا ہوتا ہے۔ لیکن اس کی دیواریں موٹی ہیں اس میں دونوں پھیپھڑوں کی دو دو ورید یں ختم ہوتی ہیں۔ جن کے سوراخوں پر کیواڑیاں نہیں ہوتی دل کا یہ بایاں کان بھی بذریعہ سوراخ کے اپنے نیچے والے دل کے بائیں بطن سے ملا رہتا ہے۔ اس سوراخ پر بھی دو دندانہ کواڑی لگی رہتی ہے۔ جس کے دو مضبوط حصے ہوتے ہیں۔ ان پر سفید وتری ڈوریاں لگی رہتی ہیں۔ یہ کواڑی بھی دل کے بطن سے دل کے کان میں خون تو جانے دیتی ہے۔ لیکن اس کی واپسی کو روکتی ہے۔

(۴) دل کا بایاں بطن (بطن اَیسر۔ لیفٹ وین ٹریکل) یہ بہ نسبت دائیں کے لمبا مخروطی ہوتا ہے۔ اس کی دیواریں بہت موٹی ہوتی ہیں۔ اس بطن سے شریان اعظم (اے آرٹا) شروع ہوتی ہے۔ جس کے ذریعے لطیف خون تمام جسم کی پرورش کے لیے جاتا ہے شریان اعظم کے مبدا پر بھی ہلالی شکل کی تین کواڑیاں (صمام ہلالی اورطی) لگی رہتی ہیں۔ اور جب دل کا بایاں بطن سکڑ کر خون کو شریان اعظم میں دھکیلتا ہے۔ تو وہ خون کو اس میں جانے تو دیتے ہیں مگر بطن مذکور میں واپس نہیں آنے دیتے۔

دل کا فعل ۔ دل کا فعل یہ ہے کہ یہ اپنی انقباضی حرکت سے یعنی سکڑ کر خون کو شرائین میں دھکیلتا ہے۔ جس سے وہ بدن کے ہر ایک حصہ میں دورہ کرتا ہے۔ دل خون کو کس طرح دھکیلتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اس کی عضلی دیواریں پے در پے سکڑتی اور پھیلتی رہتی ہیں۔ یعنی دل متواتر سکڑتا اور پھیلتا رہتا ہے۔ چنانچہ دل کے دونوں اذن پھیلتے ہیں تو دائیں

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اُذن میں اُجوف صاعد نازل دریدوں کے ذریعے جسم کا کثیف سیاہی مائل خون آتا ہے۔ اور بائیں اذن میں پھیپھڑوں کی دریدوں کے ذریعے صاف شدہ خون آتا ہے۔ پھر بائیں اُذن کا کثیف خون درمیانی سوراخ کے راستے دائیں بطن میں اور بائیں اُذن کا لطیف خون بائیں بطن میں چلا جاتا ہے۔ اور جب دونوں بطن سکڑتے ہیں۔ تو دائیں بطن کا کثیف خون بذریعہ شریان رئوی پھیپھڑوں میں صفائی کے لیے چلا جاتا ہے اور بائیں بطن کا لطیف خون بذریعہ شریان اعظم (اے ارٹا) تمام جسم میں پرورش کے لیے چلا جاتا ہے۔ دل کے سکڑنے اور پھیلنے کی یہ حرکت ایک لمحے سے بھی تھوڑے عرصہ میں ہو جاتی ہے۔ اور دل کے ہر ایک سکڑنے کی حرکت میں قریب ڈیڑھ چھٹانک خون شریان اور ورید شریانی میں جاتا ہے۔

دل ونبض کی حرکت۔ دل کی حرکت یا دل کی تڑپ جو سینہ پر ہاتھ رکھنے سے محسوس ہوتی ہے۔ یہ دل کے سکڑنے پر اُس کی نوک کے سینہ کی دیوار پر لگنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کی تعداد عمر کی مختلف حالتوں میں مختلف ہوتی ہے۔ نبض کی حرکت بھی جو دل کے حرکت کے تابع ہوتی ہے۔ دل کے بطن کے ہر بار سکڑنے کے بعد ہی شرائین کے فوراً تننے سے پیدا ہوتی ہے۔

انسان کا دل ایک منٹ میں ستر سے پچھتر[۷۵] دفعہ حرکت کرتا ہے دل کی حرکت ابتداء زندگی سے آخر وقت تک روز بروز تعداد میں کم ہوتی جاتی ہے چنانچہ جنین میں اس کی معمولی حرکت ایک منٹ میں ایک سو پچاس[۱۵۰]۔ پیدائش کے وقت ایک منٹ میں ایک سو چالیس[۱۴۰] سے ایک سو تیس[۱۳۰]۔ عمر کے پہلے سال میں ایک سو بیس[۱۲۰]۔ دوسرے سال میں ایک سو دس[۱۱۰] تیسرے سال میں پچانوے[۹۵]۔ ساتویں سال میں ستاسی[۸۷]۔ جوانی میں ستر سے اسی۔ ادھیڑوں میں اسی سے ستر اور بڑھاپے میں ستر سے ساٹھ فی منٹ ہوتی ہے۔

بلغمی مزاجوں کی نسبت دموی مزاجوں میں اور عورتوں کی نسبت مردوں میں دل ونبض کی حرکت تیز ہوتی ہے نیز بعد از غذا اور ریاضت بدنی ودماغی میں بھی تیز ہوتی ہے مگر نیند کی حالت میں کم ہو جاتی ہے۔ اور مرض کی حالت میں تو اس میں بہت سے تغیرات آجاتے ہیں۔ لیکن بحالت صحت شاذ کی نسبت

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

صبح کو اور لیٹنے کی نسبت بیٹھنے میں اور بیٹھنے کی نسبت کھڑے ہونے میں اور کھڑے ہونے کی نسبت چلنے میں حرکات حمل و نبض تیز ہوتی ہیں ۔

دل کی آوازیں۔ اگر کسی آدمی کے سینے پر کان لگا کر سنیں تو دل کے ہر ایک نبضہ یا تڑپ میں دل کی دو آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک کو پہلی آواز اور ایک کو دوسری آواز کہتے ہیں۔ دل کی پہلی آواز کہتے ہیں۔ دل کی پہلی آواز اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ دونوں بطن سکڑتے ہیں۔ اور دل کی نوک سینے کی دیوار پر ٹکراتی ہے غالباً یہ آواز اُذنین و بطنین کے درمیانی سوراخوں کی کواڑیوں کی حرکت یعنی جھٹکے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ پہلی آواز لمبی مگر سست اور اس کی صدا لفظ "لب" کی سی ہوتی ہے۔ اور یہ دل کی نوک پر خوب سنائی دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا وقفہ ہوتا ہے۔ جسے پہلا وقفہ کہتے ہیں۔ دل کی دوسری آواز اس وقت پیدا ہوتی ہے۔ جب کہ دونوں بطن پھیلتے ہیں۔ یہ آواز اور طی کی کواڑیوں کے فوری بند ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ دوسری آواز چھوٹی مگر تیز اور اس کی آواز "دپ" کی سی ہوتی ہے اور یہ دل کے پیندے پر خوب سنائی دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک لمبا سا وقفہ ہوتا ہے۔ جسے دوسرا وقفہ کہتے ہیں۔ دل کے سکڑنے کو عربی میں "انقباض القلب" اور انگریزی میں سسٹولی اور دل کے پھیلنے کو عربی میں انبساط القلب اور انگریزی میں ڈایاسسٹولی اور دونوں حرکتوں کی تکمیل یعنی پوری تڑپ کو عربی میں نبضہ اور انگریزی میں "رتھم آفدی ہارٹ" کہتے ہیں ۔

اگر حرکت قلبی کو برابر حصوں میں تقسیم کریں تو پہلی آواز میں پانچ حصے۔ پہلے وقفہ میں ایک حصہ دوسری آواز میں تین حصے اور دوسرے وقفے میں سات حصے خرچ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اس نقشہ سے ظاہر ہے ۔

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶
				۵	۱			۳							۷
پہلی آواز					پہلا وقفہ	دوسری آواز					دوسرا وقفہ				

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

دل کیوں حرکت کرتا ہے؟

اس لیے کہ یہ دوران خون کا مرکز ہے اسی کی حرکت سے خون تمام جسم میں دورہ کرتا ہے۔ حرکت قلب کے متعلق جالینوس کا یہ خیال تھا، کہ جب قلب میں روح حیوانی پیدا ہوتی ہے تو اس سے قلب متحرک ہوتا ہے حکیم ولیسٹور لطیس کا یہ خیال تھا کہ حرارت قلب سے خون پھیلتا ہے۔ اور خون کے پھیلاؤ سے دل پھیلتا اور حرکت کرتا ہے وغیرہ۔

چونکہ یہ امر مسلّمہ ہے کہ کوئی مادی شے حالت سکون سے متحرک نہیں ہو سکتی۔ جب تک اس پر کسی تحریک کا اثر نہ ہو۔ اس لیے حرکت قلب کا سبب بھی کوئی خارجی تحریک مثلاً حرارت یا برودت یا کوئی داخلی تحریک مثلاً کوئی کیمیاوی تغیر یا قوت وغیرہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ پہلے یہ گمان تھا کہ جس طرح سے وہ قلب کی کاربانک ایسڈ سے آلات تنفس میں تحریک ہوتی ہے اسی طرح سے وہ قلب کی تحریک کا باعث ہوتی ہے۔ یعنی جب خون دل کے خانوں میں جاکر اندرونی جھلی سے مس کرتا ہے۔ تو اس سے تحریک پیدا ہو کر دل سکڑتا اور حرکت کرتا ہے۔ لیکن تجربات اور مشاہدات نے اس قول کو غلط ثابت کیا ہے کیونکہ اگر کثیف خون کی بجائے دل کے اندر خالص پانی کا دوران کیا جائے تب بھی دل برابر سکڑتا اور پھیلتا رہتا ہے۔ چونکہ انفعالات نفسانیہ مثلاً رنج وغم وغصہ وغیرہ نیز دماغی ونخاعی امراض میں حرکات قلب پر بیّن اثر پڑتا ہے۔ اس لیے بعض محققین کی رائے ہے کہ جب حرکت قلب کا مبداء نظام عصبی ہے یعنی دل متحرک بالذات نہیں بلکہ اس کی حرکت نظام عصبی کے تابع ہے۔ بلکہ بعض حکماء کا تو یہ خیال ہے کہ مؤخر دماغ جسم کے تمام غیر ارادی افعال وحرکات کا محل ہے اور حرکت قلب بھی ایک غیر ارادی فعل ہے۔ اس لیے اس کا تعلق بھی مؤخر دماغ سے ہے اور بعض پہلے مؤخر دماغ کو اور اس کے بعد اعصاب شرکیہ کو یکے بعد دیگرے حرکت قلب کا منبع قرار دیتے ہیں۔ لیکن مندرجہ ذیل مشاہدات اور تجربات سے ان دلائل کی قطعی تردید ہوتی ہے چنانچہ۔

(۱) مرغی وغیرہ کے انڈے میں نظام عصبی کے پیدا ہونے سے بہت پہلے نطفۂ قلب پیدا ہو کر خود بخود حرکت کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

انسانی جنین میں یعنی پیٹ کے بچے میں دوسرے ہفتہ میں دماغ سے پہلے نطفۂ قلب پیدا ہوتا ہے ۔

(۲) بعض حیوانات میں یہ مشاہدہ اور تجربہ کیا گیا ہے کہ ان کا دل جسم سے باہر نکال لینے پر بھی کچھ عرصہ خود بخود سکڑتا اور پھیلتا رہا ہے ۔ اور بعض ادنیٰ حیوانات میں یہاں تک دیکھا جاتا ہے ۔ کہ دل کو نکال کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جاتے ہیں ۔ لیکن ان ٹکڑوں کو گرم رکھنے اور مناسب غذا پہنچانے سے دو گھنٹوں تک خود بخود حرکت کرتے رہتے ہیں ۔ بعض صورتوں میں جب کہ دل کو حلقوں کی صورت میں کاٹا جاتا ہے تب بھی وہ حرکت کرتے رہتے ہیں بعض حکیموں کے یہ عینی مشاہدات ہیں ۔ کہ بعض مقتولین میں ایک گھنٹہ بعد از قتل قلب متحرک رہا اور بعض پرندوں میں موت کے ایک دو روز بعد بھی حرکت قلب محسوس کی گئی ۔ اور جب کسی حیوان کے دل کو جسم سے نکال کر بعض خاص نمکیات ۔ پٹاسیم ۔ سوڈیم کیلسیم وغیرہ کے پانی میں رکھا جاتا ہے ۔ تو دو گھنٹوں تک حرکت کرتا رہتا ہے ۔ پس یہ ایک معجزہ ہے ۔ کہ جسم تو مر چکا ہے لیکن دل ابھی زندہ ہے اور حرکت کرتا ہے ۔

پس مذکورہ بالا مشاہدات و تجربات کی بنا پر اب یہ امر مسلمہ طور پر مانا جاتا ہے ۔ کہ قلب متحرک بالذات ہے یعنی دل کی یہ دوامی اور باقاعدہ حرکت ذاتی ہے ۔ اور اس حرکت کا سبب اور باعث خاص دل میں ہی متمکن و مستقر ہے ۔ چنانچہ ہر قلب میں جو اعصاب شریکیہ کی چھوٹی چھوٹی عقدیا گانٹھیں پھیلی ہوئی ہیں اور عصبی ریشوں کے ذریعے آپس میں ملتی رہتی ہیں ۔ وہی حرکت قلب کے لیے بمنزلہ مرکز اور مبدا کے ہیں ۔ لیکن حرکت قلب کم و بیش یا سست و چست کرنے کا انتظام نظام عصبی کے تابع ہے چنانچہ عصب راجع (ویگس ٹرو) حرکت قلب کو سست کرتا ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ جب دونوں طرف کے یہ اعصاب کاٹ دیئے جاتے ہیں ۔ تو حرکات قلب تعداد اور قوت میں بڑھ جاتی ہیں ۔ اور جب ان دونوں اعصاب میں تنبیہ اور تحریک پیدا کی جاتی ہے ۔ یعنی ان کے ذاتی فعل کو عارضی طور پر تیز کیا جاتا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تو حرکاتِ قلب سُست اور کبھی بالکل باطل وزائل ہو جاتی ہیں۔ برخلاف ازیں جب دونوں اعصاب شریکہ (سمپیے تھے ٹک نروز) میں تحریک پیدا کی جاتی ہے۔ تو حرکاتِ قلب چُست اور قوی ہو جاتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگرچہ قلب کی حرکت ذاتی ہے۔ لیکن اس کو سُست و چُست کرنا عصب راجع اور اعصاب شریکہ کے ماتحت ہے ؎

عروق (یا) رگیں

نوٹ:۔ عروق جمع ہے عرق بمعنی رگ کی۔ عروق کا اطلاق (۱) شرائین (۲) اور وہ (۳) عروق جاذبہ عروق لمفیہ اور (۴) عروق خشنہ پر ہوتا ہے۔ چونکہ شرائین اور وہ میں خون ہوتا ہے۔ اس لیے ان کو عروق دموبہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر انہیں کا بیان کیا جائے گا۔ عروق جاذبہ کا بیان آگے اپنے موقع پر آئے گا۔

فائدہ۔ عروق خشنہ کے معنی ہیں۔ کھردری رگیں۔ قصبہ ریہ یعنی ہوا کی نالی کی نہایت باریک باریک شاخوں کو جو پھیپھڑوں میں پھیلی ہیں۔ عروق خشنہ کہتے ہیں۔ انگریزی میں ان کو برانکی اولز کہتے ہیں

شرائین

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
شریان، شریانیں، پٹنے والی رگیں	شریان، شریانیں، عروق ضوارب	آرٹری، آرٹریز Arteries

شرائین ایک قسم کی لچکدار نالیاں ہیں جو دل سے لطیف و سرخ رنگ کا خون تمام بدن میں پرورش کے لیے لے جاتی ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑی شریان اورطہ (اسے آرٹا) دل کے بائیں بطن سے محراب بناتی ہوئی شروع ہوتی ہے اور اس کی محراب میں یہ تین بڑی شرائین نکلتی ہیں (۱) بے نام شریان (۲) گردن کی بائیں شریان (۳) ہنسلی کی بائیں شریان بے نام شریان کی پھر دو شاخیں ہو جاتی ہیں (۱) گردن کی دائیں شریان (۲) ہنسلی کی دائیں شریان پھر گردن کی بائیں شریانیں تو شاخ در شاخ ہو کر گردن اور سر میں یعنی چہرہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کھوپری اور دماغ میں چلی جاتی ہیں اور ہنسلی کی دائیں بائیں شریانیں دونوں طرف کی بغلوں میں سے ہوتی ہوئیں دونوں بازوؤں میں چلی جاتی ہیں۔ چنانچہ ہنسلی کی شریان جب بغل میں جاتی ہے تو بغل کی شریان کہلاتی ہے۔ جب بازو میں جاتی ہے تو بازو کی شریان کہلاتی ہے۔ جو کہنی کے جوڑ کے بالمقابل کلائی کی اندرونی و بیرونی دو رگوں میں منقسم ہو جاتی ہے پھر یہ کلائی کی دونوں شریانیں ہاتھ کی ہتھیلی میں جاکر محراب بناتی ہیں جس میں سے چند شاخیں نکل کر انگلیوں کے دونوں پہلوؤں پر جاتی ہیں ہر ایک انگلی کے آخری پور تک پہنچتی ہیں۔

اور طی کی محراب سے جو تین شاخیں نکلی تھیں وہ تو شاخ در شاخ ہو کر سر گردن اور بازوؤں میں پھیل گئیں اب اور طی دل کے پیچھے سے ہوتی ہوئی سینے میں جاتی ہیں اور اور طی صدر (تھوریسک اے آرٹا) کہلاتی ہے۔ اس سے کئی چھوٹی چھوٹی شاخیں نکل کر پسلیوں وغیرہ میں جاتی ہیں پھر سینے سے آگے بڑھتی ہوئی اور دیافرغما کو چھیدتی ہوئی یہ پیٹ میں پہنچتی ہے۔ اور اور طی بطنیہ (ایبڈومی نل (اے آرٹا) کہلاتی ہے۔ جہاں اس نے بہت سی شاخیں نکل کر معدہ وامعاء وجگر وتلی ولبلبہ وگردوں وغیرہ میں جاتی ہیں پیڑو میں پہنچ کر یہ دو شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور ہر ایک شاخ کولھے کی اصلی شاخ کہلاتی ہے۔ جو کولھے کی اندرونی و بیرونی دو شریانوں میں منقسم ہو جاتی ہے پھر کولھے کی بیرونی شریان آگے ران میں جاکر ران کی شریان کہلاتی ہے۔ اور یہ ران کی شریان گھٹنے کے پیچھے پہنچ کر گھٹنے کی شریان کہلاتی ہے۔ جس کی پھر دو شاخیں ہو جاتی ہیں۔ پنڈلی کی اگلی شریان اور پنڈلی کی پچھلی شریان چنانچہ اگلی شریان تو پنڈلی کے سامنے سے نیچے کو جاتی ہوئی بیرونی ٹخنے کے نیچے پہنچ کر پشت پا کی شریان میں ختم ہو جاتی ہے۔ جو آگے دو شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے۔ اور ان سے چند شاخیں نکل کر انگلیوں میں جاتی ہیں اور پنڈلی کی پچھلی شریان پیچھے کی طرف سے نیچے کو جاتی ہوئی اندرونی ٹخنے اور ایڑی کے درمیان پہنچ کر دو شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے اور ان سے چند شاخیں نکل کر انگلیوں میں جاتی ہیں۔ جن کی شاخیں تلوے اور انگلیوں میں جاتی ہیں۔ دل کے بائیں بطن

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سے تو اورطی (اے آرٹا) نکل کر اور شاخ در شاخ ہو کر تمام جسم میں پھیل جاتی ہے لیکن دل کے بائیں بطن سے پھیپھڑوں کی شریان (وریدشریانی۔ پلمونری آرٹری) نکل کر اور دو شاخوں میں منقسم ہو کر دونوں پھیپھڑوں میں پھیل جاتی ہے۔

ہر ایک شریان شاخ در شاخ ہوتی ہوتی ہوئی نہایت چھوٹی چھوٹی شاخوں یا شریانوں میں ختم ہوتی ہے جس کو عربی میں رواضع اور انگریزی میں آرٹری اولز کہتے ہیں پھر ان نہایت چھوٹی چھوٹی شریانوں (رواضع) سے نہایت ہی باریک یعنی بال سے بھی باریک باریک شاخیں نکلتی ہیں۔ جو بغیر خردبین کے دکھائی نہیں دیتیں۔ ان کو عربی میں عروق شعریہ اور انگریزی میں کے پلریز کہتے ہیں۔ انہیں عروق شعریہ سے چھوٹی چھوٹی وریدیں شروع ہوتی ہیں جو بڑی بڑی ہوتی ہوئیں آخر کار دو بڑی وریدوں اجوف صاعد و نازل میں منتہی ہوتی ہیں۔ اور وہ دونوں دل کے بائیں اذن میں ختم ہوتی ہیں ٭

شرائین دل کے بائیں بطن سے صاف اور سرخ خون جسم کی پرورش کے لیے ہر حصۂ جسم میں لے جاتی ہیں۔ اور جب وہ خون عروق شعریہ میں پہنچتا ہے تو کثیف اور سیاہی مائل ہو جاتا ہے پھر وہ جسم کی وریدوں کے ذریعے اکٹھا ہو کر دل کے دائیں اذن میں اور اس سے دائیں بطن میں آ جاتا ہے۔ جہاں سے کہ وہ پھیپھڑوں میں صاف ہونے کے لیے چلا جاتا ہے (دیکھو بیان دوران خون)۔

اگرچہ تمام شرائین دل سے لطیف اور سرخ خون جسم کی پرورش کے لیے لے جاتی ہیں مگر ان میں سے ایک شریان مستثنیٰ ہے جسے پھیپھڑوں کی شریان (وریدشریانی۔ پلمونری آرٹری) کہتے ہیں۔ یہ خلاف قاعدہ دل کے دائیں بطن سے کثیف اور سیاہ خون پھیپھڑوں میں صفائی کے لیے جاتی ہے اس

لہ یونانی طب کو عربی کتابوں میں بڑی بڑی وریدوں کو جداول اور جداول کی شاخوں کو سواقی اور سواقی کی شاخوں کو رواضع اور رواضع کی شاخوں کو عروق شعریہ لکھا ہے لیکن یہ نام بجائے وریدوں کے شرائین اور عروق جاذبہ کی شاخوں کے لیے زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اس لیے اس کو وریدشریانی بھی کہتے ہیں، ورید تو اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں وریدوں کی سی طرح کثیف خون ہوتا ہے، اور شریان اس لیے کہتے ہیں، کہ اس کی ساخت شریانوں کی مانند ہوتی ہے، نیز یہ شرائین کی طرح تڑپتی ہے ۔

فائدہ :۔ جسم کی تمام شرائین شاخوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ ملی رہتی ہیں جس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی مقام کی کوئی شریان کسی طرح مسدود (بند) ہو جائے۔ تو دوسری شرائین کی شاخیں مسدود شریان کی شاخیں کے ساتھ مل کر اس مقام میں دورانِ خون جاری رکھیں، اور اس کی پرورش میں کسی قسم کا خلل واقع نہ ہونے پائے ۔

جب دل سکڑتا ہے، اور خون کو شرائین میں دھکیلتا ہے تو اس کے دھڑکنے کی حرکت تمام شرائین میں تڑپ پیدا کرتی ہے ۔ یہی سبب ہے کہ ہر ایک شریان اچھلتی اور تڑپتی ہے چنانچہ کلائی پر جو تڑپنے والی رگ ہے نبض دیکھنے کے لیے عموماً اسی کی تڑپ کو محسوس کیا کرتے ہیں ۔

نوٹ :۔ جب دل سکڑتا ہے تو شرائین میں خون جاتا ہے۔ اس لیے شرائین پھیلتی ہیں اور جب دل پھیلتا ہے اور اس میں خون واپس جاتا ہے تو شرائین سکڑتی ہیں ۔

شریان کی ساخت ۔ ہر ایک شریان کی ساخت میں تین طبق ہوتے ہیں (۱) اندرونی طبق جو باریک شفاف اور لچکدار ہوتا ہے۔ اس کے دو پرت ہوتے ہیں اندرونی پرت اینڈوتھی لی ام کا یعنی اسی نازک جھلی کا جو دل کے اندر لگی ہوئی ہے اور بیرونی پرت لچکدار ریشوں کا (۲) درمیانی طبق جو دبیز زردی مائل اور نہایت لچکیلا ہوتا ہے لمبی اور دتری ریشوں سے بنتا ہے (۳) بیرونی طبق جو زیادہ دبیز ہوتا ہے ۔ رباطی ریشوں کے دو پرتوں سے بنتا ہے ۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

بڑی شریانوں کے اردو عربی اور انگریزی نام۔ آغاز وانجام اور وضع قیام

پھیپھڑے کی شریان دل کے دائیں بطن سے اور شریان اعظم دل کے بائیں بطن سے شروع ہوتی ہے

نمبر شمار	پہلا نام اردو دوسرا عربی تیسرا انگریزی	
		یہ شریان کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں جاتی یا تقسیم ہوتی ہے۔
۱	پھیپھڑے کی شریان وریدِ شریان پلمونری آرٹری	یہ دل کے دائیں بطن سے شروع ہوتی ہے اور قریب دو انچ کے لمبی ہوتی ہے بطن سے نکل کر اوپر بائیں جانب کو ترچھی گزرتی ہوئی محراب اورطی کے نیچے یہ دائیں اور بائیں دو شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے جن کی شاخیں پھیپھڑوں میں جاکر نہایت باریک باریک شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہیں جسم کا تمام کثیف خون دل سے اس شریان کے ذریعے پھیپھڑوں میں جاکر صاف ہوتا ہے (دیکھو بیان دوران خون)
۲	شریان اعظم اورطی ایسے آرٹا	یہ دل کے بائیں بطن سے شروع ہوتی ہے اور سب رگوں سے بڑی ہے اس کے تین حصص ہوتے ہیں (۱) محراب اورطہ (۲) اورطی صدریہ (۳) اورطی بطنیہ۔ اس سے کل بیس شاخیں نکلتی ہیں۔ جو پھر شاخ در شاخ ہو کر سارے جسم میں پھیلتی ہیں۔
۳	محراب شریانِ اعظم قوس الاورطی آرچ آف دی ایسے آرٹا	یہ اورطی کا پہلا حصہ ہے۔ جو بائیں بطنِ قلب سے شروع ہوتا ہے اس کے بھی تین حصے ہوتے ہیں (۱) صاعد یعنی اوپر چڑھنے والا (۲) مستعرض یعنی آڑا (۳) ہابط یعنی اترنے والا۔ اس سے پانچ شاخیں نکلتی ہیں۔
۴	بے نام شریان شریان لا اسم لہٗ اناما مینیٹ آرٹری	یہ محراب اورطی سے شروع ہوتی ہے اور قریب دو انچ کے لمبی ہوتی ہے۔ اس سے دو شاخیں نکلتی ہیں (۱) گردن کی دائیں شریان (۲) ہنسلی کی دائیں شریان جن کی شاخیں سر گردن اور سینہ کی دائیں جانب اور دائیں بازو میں پھیلتی ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

۵	گردن کی شریان شریان سباتی عامہ کامن کراٹڈ آرٹری	یہ دو ہوتی ہیں۔ دائیں طرف کی بے نام شریان سے اور بائیں طرف کی محراب اورطی سے شروع ہوتی ہے۔ ہر ایک طرف کی شریان گردن میں کنٹھ کے قریب دو شاخوں (۱) شریان سباتی ظاہرہ (۲) شریان سباتی غائرہ میں منقسم ہو جاتی ہے جس میں سے پہلی سر و چہرہ میں اور دوسری دماغ میں منقسم ہو جاتی ہے۔
۶	سر کی شریان شریان سباتی ظاہرہ ایکسٹرنل کراٹڈ آرٹری	یہ گردن کی شریان سے شروع ہو کر آٹھ شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے جو سر گردن چہرہ غدہ ترسیہ۔ درمیانی کان۔ زبان اور لوزتین میں جاتی ہیں یعنی مقامات مذکورہ میں خون پہنچاتی ہیں۔
۷	دماغ کی شریان شریان سباتی غائرہ انٹرنل کراٹڈ آرٹری	یہ بھی گردن کی شریان سے شروع ہو کر بارہ شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے اور بہت سے حصہ دماغ میں چشمخانوں، اندرونی کاک۔ ناک اور پیشانی میں جاتی ہیں۔
۸	ہنسلی کی نچلی شریان شریان تحت الترقوہ سب کلے ریئن آرٹری	یہ دو ہوتی ہیں دائیں طرف کی بے نام شریان سے اور بائیں طرف کی محراب اورطی سے شروع ہوتی ہے ہر ایک کی پانچ شاخیں ہوتی ہیں۔ جو گردن سینہ حرام مغز بازو۔ دماغ اور اس کے پردوں میں خون پہنچاتی ہیں۔
۹	بغل کی شریان شریان الابطی ایگزلری آرٹری	یہ ہنسلی کی شریان سے شروع ہوتی ہے۔ اور سات آٹھ شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے۔ جو بغل و کندھے اور پہلوئے سینہ اور چھاتی کے عضلات میں جاتی ہیں۔
۱۰	بازو کی شریان شریان العضدی برے کیل آرٹری	یہ بغل کی شریان سے شروع ہو کر اور بازو کے اندر کی طرف نیچے کو جا کر کہنی کے جوڑ کے مقابل سے قریباً نصف انچ نیچے دو شاخوں (۱) نبض کی شریان اور (۲) کلائی کی شریان میں منقسم ہو جاتی ہے۔

نوٹ:۔ ہر ایک شریان کا نمبر جو اس جدول میں ہے اس کا وہی نمبر صفحہ ۷۶ کی تصویر شرائین میں ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

۱۱	نبض کی شریان شریانِ نبض ریڈیل آرٹری	یہ بازو کی شریان سے شروع ہوکر اور کلائی کے انگوٹھے والے کنارے کے برابر نیچے جاکر ہتھیلی میں گہرا شریانی محراب بناتی ہے چونکہ بالعموم نبض اسی شریان پر دیکھا کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس کو اسی نام سے تعبیر کیا ہے۔
۱۲	کلائی کی شریان شریان زندی النر آرٹری	یہ بھی بازو کی شریان سے شروع ہوکر کلائی کے اندر کی طرف جاتی ہوئی پہونچے کے سامنے ہتھیلی پر جاکر اوتھلا شریانی محراب بناتی ہے۔
۱۳	سینہ کی شریان اعظم اورطی صدریہ تھوریسک اے آرٹا	یہ محراب اورطی کا بڑھاؤ ہے اس میں سے پانچ شاخیں نکلتی ہیں جو غلاف دل غلاف شش باریک ہوائی نالیوں (عروق خشنہ ہری (غدا کی نالی) اور پسلیوں کے درمیانی مقامات میں خون پہنچاتی ہیں یہ سینے میں سے حجاب عاجز کے سوراخ کے راستے پیٹ میں جاکر اورطی بطنیہ کہلاتی ہے۔
۱۴	پیٹ کی شریان اعظم اورطی بطنیہ ایڈومینل اے آرٹا	یہ اورطی صدریہ کا بڑھاؤ ہے اور کمر کے چوتھے مہرے کے مقابل دو شاخوں (پیڑو کی عام شریان) میں منقسم ہو جاتی ہے۔ اس سے دس گیارہ شاخیں نکلتی ہیں جو معدہ۔ آنتوں۔ جگر۔ تلی۔ گردوں خصیوں۔ عضلات شکم و پشت میں جاکر خون پہنچاتی ہیں۔
۱۵	کولھے کی اصلی شریان شریان حرقفی اصلی کامن الی ک آرٹری	یہ دو ہوتی ہیں پیڑو کی عام شریان سے شروع ہوکر ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف پیڑو میں نیچے اور باہر جاکر دو شاخوں (۱) پیڑو کی اندرونی شریان اور (۲) پیڑو کی بیرونی شریان میں منقسم ہو جاتی ہے۔
۱۶	کولھے کی اصلی شریان شریان حرقفی اصلی باطن کامن انٹرنل الی ک آرٹری	یہ پیڑو کی عام شریان سے شروع ہوکر اور پیڑو کی ہڈی کے سوراخ پر پہنچ کر شریان حرقفی اصلی باطن اگلے اور پچھلے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں جن سے گیارہ شاخیں نکل کر شانہ اعضائے تناسل مردانہ یا زنانہ اور ران کی اندرونی طرف میں جاتی ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

۱۷	پیٹرو کی بیرونی شریان شریان حرقفی ظاہرہ ایکسٹرنل الی اک آرٹری	یہ بھی پیٹرو کی عام شریان سے شروع ہوتی ہے اور نیچے اور باہر کی طرف جاکر کنج ران پر سے گزر کر ران کی شریان میں ختم ہوتی ہے اس کی دو شاخیں ہوتی ہیں۔ جو مراق لبطن اور عضلات شکم میں پھیلتی ہیں۔
۱۸	ران کی شریان شریان محدی فیمرل آرٹری	یہ پیٹرو کی بیرونی شریان سے شروع ہوکر ران کے سامنے اور اندر کی طرف پیچھے گھٹنے کے جوڑ سے ذرا اوپر گھٹنے کی شریان میں ختم ہوتی ہے اس سے دو شاخیں نکل کر جنگا سہ وفوطہ اور ان کے عضلات وغیرہ میں جاتی ہیں۔
۱۹	گھٹنے کی شریان شریان مابلص پاپلیٹل آرٹری	یہ ران کی شریان کا بڑھا ہوا حصہ ہے گھٹنے کی پچھلی طرف (جس مقام کو عربی میں مابلص اور انگریزی میں پاپلیز کہتے ہیں) سے ترچھے طور پر نیچے اور باہر جاکر دو شاخوں (۱) پنڈلی کی اگلی اور (۲) پاؤں کے تلوے (۳) پنڈلی کی پچھلی شریان میں منقسم ہو جاتی ہے۔
۲۰	پنڈلی کی اگلی شریان شریان قصبی مقدم این ٹیریر ٹیبیل آرٹری	یہ گھٹنے کی شریان سے شروع ہوکر پنڈلی کے سامنے کی طرف اگر نیچے کو جاتی ہے اور ٹخنے کے جوڑ کے نیچے پہنچ کر پاؤں کی شریان میں ختم ہوتی ہے۔ جو پاؤں کے تلوے میں جاکر شریانی محراب بناتی ہے۔
۲۱	پنڈلی کی پچھلی شریان شریان قصبی مؤخر پوسٹیریر ٹیبیل آرٹری	یہ بھی گھٹنے کی شریان سے شروع ہوتی ہے۔ اور پنڈلی کے اندر کی طرف جاتی ہوئی ٹخنے اور ایڑی کے درمیان پہنچ کر دو شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہیں جن کی شاخیں پنڈلی میں جاتی ہیں اور پاؤں کے تلوے میں جاکر شریانی محراب بناتی ہے۔
۲۲	پاؤں کی بالائی شریان شریان ظہر القدم ڈارسیلس پیڈیس آرٹری	یہ پنڈلی کی اگلی شریان سے شروع ہوکر اور پشت پا کر پر پہنچ کر دو شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے۔ جن کی شاخیں پاؤں کی انگلیوں میں جاتی ہیں اور پاؤں کے تلوے میں جاکر شریانی محراب بناتی ہے۔

نوٹ:۔ ہر ایک شریان کا جو نمبر اس جدول میں ہے اس کا وہی نمبر صفحہ ۷۶ کی تصویر شرائین میں ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(تصویر شرائین)



اس تصویر میں تمام جسم کی بڑی بڑی شریانیں دکھائی گئی ہیں جو نمبر لگی کا اس تصویر میں ہے۔ وہی نمبر اس کا جدول میں ہے۔ جہاں پر اس کا نام اور مختصر بیان ہے اور جن کا جدول میں بیان نہیں اُن کے اس تصویر میں نام لکھے گئے ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(۲) بال سی رگیں

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
بال سی رگیں	عروق شعریہ	کے پلیریز
باریک رگیں	عروق سواتی	Capillaries

یہ عروق بال سے بھی باریک ہوتی ہیں، اور خردبین کے بغیر دکھائی نہیں دیتیں ان کی جسامت ایک انچ کا بیسواں حصہ ہوتی ہے یعنی ایک مربع انچ جگہ میں تین ہزار یہ سما سکتی ہیں۔ اس قسم کے عروق باہم مل کر ایک قسم کا شریانی جال بناتی ہیں۔ بالوں ناخن، جلد کے بالائی طبق، کریوں اور آنکھ کے پردۂ قرینہ کے سوا باقی تمام جسم میں ان باریک رگوں کا ایسا جال پھیلا ہوا ہے، کہ اگر جسم میں کسی جگہ سوئی چبھائیں تو وہ ضرور کسی نہ کسی ایسی باریک رگ کو چھیدتی ہے۔ جس سے خون نکل آتا ہے۔ یہ عروق صرف اسی نازک و شفاف جھلی (اینڈوتھی لی ام) سے بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ جو کہ دل کے اندر کی طرف لگی ہوئی ہوتی ہے جیسا کہ مذکور ہوا شرائین کی نہایت باریک شاخیں شرائین اصغر جنہیں انگریزی میں آرٹری اولز کہتے ہیں۔ ان عروق شعریہ میں ختم ہوتی اور وریدوں کی نہایت باریک شاخیں جنہیں انگریزی میں نیولز کہتے ہیں ان عروق شعریہ سے شروع ہوتی ہیں۔ گویا یہ شریانوں اور وریدوں کے درمیان ذریعہ اتصال ہیں۔ جب خون دورہ کرتا ہوا ان عروق شعریہ میں پہنچتا ہے۔ تو آب خون (پلازما۔ رطوبت محصورہ) ان عروق کی نازک دیواروں میں سے تراوش پاکر تمام اعضاء کی ساختوں کو سیراب کرتا ہے یعنی اس سے تمام اعضاء کی پرورش ہوتی ہے۔ نیز خون کے ہمراہ جو روح حیوانی (آکسیجن) ہوتی ہے۔ وہ بھی ان عروق کی دیواروں میں سے چھن کر اور اعضاء کی ساختوں میں جذب ہو کر اُن کو قوتِ حیات دیتی ہے۔ کبھی خون کے سرخ و سفید دانے بھی ان کی نازک دیواروں میں نفوذ کر کے آس پاس کی ساخت میں آجاتے ہیں (نیز دیکھو بیان دورانِ خون) تمام شریانوں کا خون عروق شعریہ میں سے گزر کر وریدوں تک پہنچتا ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

نوٹ:۔ چونکہ عروق شعریہ اعضاء کو سیراب کرتی ہیں یعنی انہیں خون پہنچاتی ہیں۔ اس لیے طب میں ان کو عروق سواقی (سواقی جمع ہے ساقی کی) بھی کہتے ہیں

عروق شعریہ میں خون کا بہاؤ اگرچہ مسلسل ہوتا ہے مگر کمزور اور کم عمر اشخاص میں شرائین کی تڑپ کے وقت اس کی حرکت زیادہ تیز ہوتی ہے لیکن جب انسان بہت تھکا ماندہ ہوتا ہے۔ اور دل کا فعل بھی نہایت کمزور ہوتا ہے تو اس وقت عروق شعریہ میں خون کے سرخ دانے صرف دل کی حرکت کے وقت ہی حرکت کرتے ہیں اور سکون کے وقت ٹھہرے رہتے ہیں۔ اور جب انتہا درجے کا ضعف ہو جاتا ہے تو دل کے خون کو شرائین میں دھکیلنے کے بعد خون کے سرخ دانے عروق شعریہ میں آگے جانے کے بعد پیچھے لوٹتے ہیں جس کا سبب ان کے متصلہ اجزاء کی لچک ہوتی ہے۔ جو پھیلنے کے بعد سکڑتے ہیں اور دانہائے خون دب کر واپس ہو جاتے ہیں۔ پس خون کی رفتار میں زیادہ رکاوٹ عروق شعریہ میں ہی ہوتی ہے۔

وریدیں

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
ورید۔ وریدیں	ورید۔ اوردہ	وین۔ وینز
ساکن رگیں	عروق سواکن	Vean Vens

یہ بتلایا جا چکا ہے کہ شرائین دل سے صاف اور سرخ خون جسم کی پرورش کے لیے لے جاتی ہیں۔ ہر ایک شریان اپنی باریک شاخوں کے ذریعے عروق شعریہ میں ختم ہوتی ہے۔ انہیں عروق شعریہ سے نہایت ہی باریک باریک وریدیں جنہیں دی نیولز کہتے ہیں۔ شروع ہوتی ہیں۔ پھر ان کے باہم ملنے سے آگے بڑی بڑی بنتی جاتی ہیں کیونکہ خون عروق شعریہ میں پہنچنے کے بعد کثیف اور سیاہی مائل ہو جاتا ہے اور جسم کی پرورش کے مقابل نہیں رہتا اور جس راستے وہ جاتا ہے اسی راستے وہ واپس نہیں آسکتا۔ یعنی براہ شرائین واپس نہیں آسکتا۔ پس یہ وریدیں تمام جسم سے اس کثیف خون کو واپس لا کر

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

دل کے دائیں اُذن دکان) میں پہنچاتی ہیں جہاں سے وہ خون دل کے دائیں بطن میں ہو کر پھیپھڑوں میں صاف ہونے کے لیے چلا جاتا ہے (دیکھو بیان دوران خون) اگرچہ تمام وریدیں جسم کا کثیف خون دل میں واپس لاتی ہیں مگر پھیپھڑے کی وریدیں اس قاعدے سے مستثنےٰ ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے پھیپھڑوں سے صاف شدہ خون دل کے بائیں اُذن (دکان) میں واپس آتا ہے۔ اس لیے ان کو شرائین وریدیہ بھی کہتے ہیں۔ انہیں شریان اس لیے کہا جاتا ہے۔ کہ ان میں شریانوں کی طرح سُرخ و صاف خون ہوتا ہے۔ اور وریدا اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی ساخت وریدوں کی مانند ہوتی ہے۔

اکثر وریدوں کے اندر ہلالی شکل کے کواڑ لگے رہتے ہیں۔ جو خون کی بازگشت کو روکتے ہیں۔ جب یہ کواڑ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو وریدیں خون سے پُر ہو کر بہت موٹی اور پیچدار ہو جاتی ہیں جیسا کہ مرض فیل پا میں دیکھی جاتی ہیں تمام وریدیں عروق شعریہ سے بذریعہ چھوٹی چھوٹی اور نہایت باریک شاخوں (وی نیولز) کے شروع ہو کر ایک دوسرے سے ملتی ہوئی بڑی بڑی وریدیں بن جاتی ہیں۔ اور آخرکار دو بڑی وریدوں اجوف صاعد و نازل (سوپیرئر وکیواو انفیریر وینا کیوا) میں تمام ہو کر دل کے دائیں اذن (دکان) میں داخل ہوتی ہیں۔ شرائین کی طرح جسم کی کل وریدیں بھی شاخوں کے ذریعے آپس میں ملی رہتی۔ تاکہ کسی وریدکے بند ہو جانے پر وہاں کے دوران خون میں کسی قسم کا خلل واقع نہ ہو۔

وریدیں تین قسم کی ہوتی ہیں (۱) ادھیلی جن کو جلدی وریدیں بھی کہتے ہیں یہ جلدی خون کو گہری وریدوں میں لے جاتی ہیں۔ (۲) گہری وریدی جو اپنی ہمنام شرائین کے ہمراہ ایک ہی غلاف میں رہتی ہیں۔ ان میں ایسی وریدوں کو جو کہ چھوٹی چھوٹی شرائین مثلاً کندھے کی شریان۔ یا کلائی کی اندرونی و بیرونی شرائین وغیرہ کے ہمراہ دو دو ہوتی ہیں ان کو ندیمی وریدیں کہتے ہیں۔ مگر بڑی بڑی شریانوں کے ہمراہ صرف ایک ہی ایک وریدہ ہوتی ہے۔ بعض گہری وریدیں مثلاً دماغ و نخاع و جگر وغیرہ کی وریدیں شرائین وغیرہ سے بالکل علیحدہ رہتی ہیں

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(۲) جیب کی مانند وریدیں جو بلحاظ فعل کے وریدوں کی مانند مگر بناوٹ میں وریدوں سے مختلف جیب کی طرح ہوتی ہیں۔ اُن کو انگریزی میں سائنسز کہتے ہیں۔ ان کی مثالیں دماغ اور رحم کی دیواروں میں پائی جاتی ہیں۔

وریدوں کے نام اکثر وہی ہوتے ہیں جو اُن کی ہمنام شریانین کے ہوتے ہیں۔ جیسے بیڑو کی ورید۔ ران کی ورید اور گھٹنے کی ورید وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بعض ایسی بھی ہیں جن کا نام اُن کی ہمراہی شریان سے مختلف ہوتا ہے۔

تسہیل بیان کے لیے وریدیں پانچ حصّوں میں منقسم ہیں (۱) سر اور چہرے کی وریدیں (۲) گردن کی وریدیں (۳) ہاتھ۔ کلائی اور بازو کی وریدیں (۴) پاؤں پنڈلی اور ران کی وریدیں (۵) دھڑ یا دھچے کی وریدیں۔

شریان کی طرح ورید کی ساخت میں بھی تین طبقات ہوتے ہیں مگر ورید کا درمیانی لحمی طبقہ بہ نسبت شریان کے بہت پتلا اور کمزور ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ورید کٹ جانے کے بعد بند ہو جاتی ہے اور شریان کھلی رہتی ہے۔

بڑی بڑی وریدوں کے اردو عربی انگریزی نام آغاز انجام اور وضع قیام وغیرہ

نمبر شمار	پہلا نام اردو دوسرا نام عربی تیسرا نام انگریزی	آغاز وانجام وغیرہ
۱	چہرہ کی ورید ورید الوجہ فیشل وین	یہ پیشانی، پپوٹے اور نتھنوں کی وریدوں کے ملنے سے بنتی ہے ناک کی جڑ کے قریب شروع ہو کر گردن کی اندرونی ورید میں ختم ہوتی ہے یہ چہرے کا غلیظ خون دل کی طرف واپس لاتی ہے۔
۲	گردن کی بیرونی ورید جبل الورید ظاہر ایکسٹرنل جگولر وین	یہ کنپٹی۔ جبڑے اور کان کی پچھلی وریدوں کے ملنے سے بنتی ہے نچلے جبڑے کے کونے سے شروع ہو کر ہنسلی کی ورید میں ختم ہوتی ہے چہرے اور سر کی بیرونی سطح کا غلیظ خون دل کی طرف واپس لاتی ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

۳	گردن کی اندرونی ورید حبل الورید غائر انٹرنل جوگولر وین	یہ دماغ کی اندرونی وریدوں کے باہم ملنے سے بنتی ہے گدی کی ہڈی کے زیرین کنارے کے برابر شروع ہو کر اور نیچے گردن کی جڑ پر پہنچ کر "ہنسلی کی ورید" سے ملکر "ورید بے نام" بناتی ہے۔ یہ دماغ اور چہرے کا غلیظ خون واپس لاتی ہے
۴	دماغی وریدیں اوردہ الدماغ سیری برل وینز	یہ اوتھلی اور گہری دو قسم کی ہوتی ہیں جو باہم ملی رہتی ہیں۔ دماغ کے بالائی پردے پر ۱۵ وریدیں اور کھوپری کی ہڈیوں کے اندر چار وریدی نالیاں ہوتی ہیں جو سب باہم مل کر گردن کی اندرونی ورید بناتی ہیں۔
۵	کلائی کی اندرونی ورید ورید زندی مقدم این ٹیریر اُلز وین	یہ ہتھیلی کے اندر کی طرف چند باریک وریدوں سے شروع ہو کر کلائی کے اندرونی کنارے کے برابر اوپر کو جا کر کہنی کے جوڑ کے قریب وسطی باسلیق سے مل کر "وسطی باسلیق ورید" بناتی ہے۔
۶	کلائی کی بیرونی ورید ورید زندی مؤخر ریڈی اَل وین	یہ پشت دست کے وریدی جمع سے شروع ہو کر کلائی کے بیرونی کنارے کے برابر اوپر کو جا کر کہنی کے جوڑ کے پاس "وسطی قیفال" سے مل کر "ورید قیفالی" بناتی ہے۔
۷	کلائی کی درمیانی ورید ورید الکل زہفت انداز میڈی اَن وین	یہ پہونچے کے جوڑ کے سامنے سے شروع ہو کر کلائی کے درمیان میں رہتی ہے کہنی کے جوڑ کے قریب دو شاخوں "وسطی قیفال" اور "وسطی باسلیق" میں منقسم ہو جاتی ہے جن میں سے "وسطی باسلیق" بڑی ہوتی ہے اور فصد اسی رگ سے لیا کرتے ہیں
۸	بازو کی بیرونی ورید ورید قیفال (سرار) کیفے لک وین	یہ کلائی کی بیرونی ورید اور "وسطی قیفال" کے ملنے سے بنتی ہے اور بازو کے باہر کی طرف کندھے کے عضلات میں سے گزر کر "بغل کی ورید" میں ختم ہوتی ہے۔

نوٹ:۔ ہر ایک ورید کا نمبر اس جدول میں ہے۔ اس کا وہی نمبر صفحہ ۸۴ کی تصویر اوردہ میں ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

نمبر	پہلا نام اردو دوسرا عربی تیسرا انگریزی	آغاز و انجام وغیرہ
۹	بازو کی اندرونی وَرید وَرید باسلیق بیزے لِک وین	یہ کلائی کی اندرونی اور "وسطی باسلیق" وریدوں کے ملنے سے بنتی ہے اور بازو کی اندر کی طرف اُوپر کو جا کر "بغل کی وَرید" میں ختم ہوتی ہے۔ باسلیق وسطی انگلی کے مقابل ہوتی ہے اور چونکہ اس کے نیچے شریان ہوتی ہے اس کی فصد نہایت احتیاط سے لینی چاہیے۔
۱۰	بازو کی گہری وَرید وَرید الباطی برے کی آل وین	یہ تعداد میں دو ہوتی ہیں اور اپنی ہمنام شرائین کے ہمراہ رہتی ہیں۔ "اور بغل کی وَرید" میں ختم ہوتی ہیں۔ یہ الناز اور ریڈیل ویز کے باہم ملنے سے بنتی ہیں۔
۱۱	بغل کی گہری وَرید وَرید الباطی ڈیگز لری وین	یہ بازو کی وَرید کا بڑھاؤ ہے پہلی پسلی کے کنارے کے برابر پہنچ کر یہ ہنسلی کی وَرید کہلاتی ہے۔ جو گردن کی وَرید سے مل کر "وَرید بے نام" بنتی ہے۔
۱۲	بے نام وَرید وَرید لا اسم لہٗ انا می نیمٹ وین	یہ دو ہوتی ہیں۔ دائیں ۱½ انچ لمبی اور بائیں ۳ انچ لمبی ہوتی ہے یہ دونوں مل کر سینے کی بالائی بڑی وَرید یا وَرید الاجوف العلوی بناتی ہے۔
۱۳	سینے کی بڑی وَرید وَرید فرد کبیر وینا ایزی کاس میجر	یہ دائیں طرف کمر یا گردے کی وریدوں سے شروع ہو کر اُوپر کو جا کر سینے کی بالائی بڑی وَرید میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں دائیں جانب کی پسلیوں وغیرہ کی کئی وریدیں آ کر ملتی ہیں۔
۱۴	سینے کی چھوٹی وَرید وَرید فرد صغیر وینا ایزی کاس مائنر	یہ بائیں طرف کمر یا گردے کی وریدوں سے شروع ہو کر اُوپر کو جا کر سینے کی بالائی بڑی وَرید میں مل جاتی ہے۔ اس میں بائیں طرف کی پسلیوں کی چھ سات وریدیں آ کر تمام ہوتی ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

نمبر	پہلا نام اردو دوسرا عربی تیسرا انگریزی	وضع قیام
۱۵	بالائی بڑی ورید ورید اجوف صاعد سُوپیاری اَزوینا کیوا	یہ دونوں بے نام دریدوں کے ملنے سے بنتی ہے۔ قریب ۱۳ انچ کے لمبی ہوتی ہے۔ اور دل کے بائیں اُذن میں ختم ہوتی ہے۔ اس ورید کے راستے جسم کے بالائی نصف کا غلیظ خون دل میں واپس آتا ہے۔
۱۶	ٹانگ کی اندرونی ورید ورید صافن انسی انٹرنل سفی نس وین	یہ پشت پا کے دریدی مجمع سے شروع ہو کر اندرونی ٹخنے کے سامنے سے اوپر کو جا کر کنج ران سے قدرے نیچے ران کی ورید بنتی ہے۔ اس میں اور بہت سی دریدیں آن کر ملتی ہیں۔
۱۷	ٹانگ کی بڑی ورید ورید صافن وحشی ایکسٹرنل سفی نس وین	یہ پشت پا کے دریدی مجمع سے شروع ہو کر بیرونی ٹخنے کے پیچھے سے اُوپر کو جا کر گھٹنے کی ورید بن ختم ہو جاتی ہے۔ نوٹ:۔ بعض اسی کو عرق النساء بھی کہتے ہیں۔
۱۸	زیرین بڑی ورید ورید اجوف نازل انفیرئر وینا کیوا	یہ دونوں پیڑو کی عام دریدوں کے ملنے سے بنتی ہے اُوپر کو جا کر دل کے دائیں اُذن کے پیچھے اور نیچے کے حصّے میں ختم ہوتی ہے۔ اس ورید کے راستے جسم کے زیرین نصف اور شکم کے اندرونی اعضاء کا خون غلیظ دل میں واپس آتا ہے۔
۱۹	دروازہ جگر کی ورید ورید الباب پورٹل وین	آنتوں کی بالائی و زیرین اور تلی و معدے کی دریدوں کے باہم ملنے سے ورید الباب الکبد بنتی ہے۔ جو جگر میں پہنچ کر شاخ در شاخ ہو جاتی ہے۔ اور اس کی باریک شاخوں سے خود جگر کی دریدیں (جو اس کے سوا ہوتی ہیں) خون اکٹھا کر کے زیرین بڑی ورید میں لے جاتی ہے۔

نوٹ:۔ ہر ایک ورید کا جو نمبر اس جدول میں ہے۔ اس کا وہی نمبر صفحہ ۸۴ کی تصویر اور دہ میں ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تصویر اَوردہ



اس تصویر میں تمام جسم کی بڑی بڑی وریدیں دکھائی گئی ہیں۔ جو نمبر کسی ورید کا اس تصویر میں ہے وہی نمبر اس کا جدول میں ہے جہاں پر اس کا نام اور مختصر بیان ہے اور جن کا جدول ۱۰ ہے پہلے اُن کے اس تصویر میں نام لکھے ہیں:

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

عُروق جاذبہ وانجذاب

جو غذا ہم کھاتے ہیں۔ اس کا کچھ حصّہ تو بشکلِ فضلات جسم سے خارج ہو جاتا ہے اور کچھ حصّہ بشکل خلاصہ غذا جسم میں منجذب ہو جاتا ہے۔ اس فعل کو انجذاب یا امتصاص (ایب سارپشن) کہتے ہیں۔ اور جن عروق سے یہ فعل انجام پاتا ہے۔ انہیں عروق جاذبہ یا عروق مُمتصّہ (ایبسارنبٹس) کہتے۔ انجذاب کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خون کے وہ اجزاء جو جسم میں صرف ہوتے رہتے ہیں ان کی عوض خون میں جدید اجزاء کا اضافہ کرنا۔ جو اس طرح سے ہوتا ہے کہ غذا پانی اور جو چیزیں جسم کے اندر دنی یا بیرونی حصّے سے ملاقی ہوتی ہیں۔ ان میں مختلف اجزاء جسم کے اندر منجذب ہو جاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جسم کے جو اجزا یا مواد تحلیل وخراب ہو جاتے ہیں۔ ان کو ایسے مقامات میں پہنچانا۔ جہاں سے وہ راہ اخراج پا سکیں۔ یہ دونوں خدمتیں عروق جاذبہ سے انجام پاتی ہیں لیکن عروق دمویہ بھی ان خدمات میں ان کی شریک ہوتی ہیں۔

عُروق جاذبہ

عروق جاذبہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو آبی رطوبت (لمف۔ رطوبت طلیہ) کو جذب کر کے خون میں پہنچاتے ہیں۔ ان کو عربی میں عروق جاذبہ اور انگریزی میں لمفے ٹکس کہتے ہیں۔ اور دوسرے وہ عروق جو آنتوں سے دودھ جیسی سفید رطوبت (کیلوس۔ کائل) کو جذب کر کے خون میں پہنچاتے ہیں۔ ان کو عربی میں عروق کیلوسہ یا عروق لبنیہ اور انگریزی میں لیکٹی فلز کہتے ہیں۔

عروق جاذبہ۔ جسمانی ساختوں کے خلل وفرج سے۔ جہاں لمف تراوش پاتی ہے۔ پہلے بال سی باریک عرق جاذبہ بنتی ہیں۔ جن کو عربی میں مرابض اور انگریزی میں لمفے ٹیک کے پلریز کہتے ہیں۔ پھر ان سے رفتہ رفتہ ذرا بڑے بڑے عروق یا نالیاں بن جاتی ہیں۔ جنہیں طب میں رواضع وسواقی وجداول کہتے ہیں لیکن اس قسم کی سب سے بڑی نالی کو طب میں مجریٔ صدر اور انگریزی میں تھورے سِک ڈکٹ

Lymphatics Lacteals Absorbants

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کہتے ہیں۔ عروقِ جاذبہ کی ساخت بھی مثل دریدوں کے ہوتی ہے۔ اور دریدوں کی طرح ان میں بھی کوارئیاں ہوتی ہیں۔ بلکہ کوارئیوں کی کثرت سے ان کی شکل تسبیح کے دانوں کی طرح گرہ دار ہوتی ہے۔

عروقِ جاذبہ کی رطوبت۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ خون جب دورہ کرتا ہوا عروقِ شعریہ میں پہنچتا ہے تو آبِ خون (پلازما) ان عروق کی نازک دیواروں میں سے تراوش پاکر اعضاء کی ساختوں (ٹشوز) خلل و فرج میں بھر جاتا ہے اور انھیں سیراب کرتا اور ان کی پرورش کرتا ہے اس تراوش یافتہ آبِ خون کو لمف رطوبت لمفادیہ یا رطوبتِ کلیہ) کہتے ہیں۔ یہ لمف یا رطوبت لمفادیہ جو پرورش سے زائد ہوتی ہے۔ وہ براہ عروقِ جاذبہ جذب ہو کر خون میں واپس چلی جاتی ہے۔ پس عروقِ جاذبہ تمام بدن سے اسی رطوبت لمفادیہ کو جذب کرتی ہیں البتہ آنتوں کی عروقِ جاذبہ یعنی عروقِ کیلوسیہ بجائے لمف کے کیلوس کو جذب کرتی ہیں

لمف یا رطوبت طلیہ۔ لمف کے لغوی معنی ہیں پانی۔ چونکہ یہ رطوبت پانی جیسی ہوتی ہے اس لیے اس کو انگریزی میں لمف کہتے ہیں۔ اور چونکہ یہ خون سے عروقِ شعریہ کی دیواروں میں سے جرم اعضاء میں مثل طل یا شبنم کے تراوش پاتی ہے۔ اس لیے عربی طبی اصطلاح میں اس کو رطوبت طلیہ کہتے ہیں۔ یہ لمف یا رطوبت طلیہ پانی کی مانند صاف و شفاف بے رنگ یا قدرے زردی مائل ہوتی ہے۔ اس کا مزہ نمکین اور قدرے کھاری ہوتا ہے۔ اور اس میں بُو نہیں ہوتی۔ یہ پانی کی نسبت بھاری ہوتی ہے۔ اس کا وزن متناسبہ ۱۰۲۵ ہوتا ہے۔ اس رطوبت میں کیلوس کے دانوں کی مشابہ کچھ سفید دانے پائے جاتے ہیں۔ جنہیں دانہائے لمف یا لمف کارپسکلز کہتے ہیں۔ کیمیاوی ترکیب میں یہ رطوبت پلازما (آبِ خون) کے مشابہ ہوتی ہے یعنی اس میں وہ تمام اجزاء موجود ہوتے ہیں جو کہ پلازما میں ہوتے ہیں۔ البتہ اس میں پروٹینز کسی قدر کم ہوتے ہیں لیکن یہ پلازما کی طرح جم سکتی ہے۔ نیز یہ اصلی صفات میں کیلوس کے مشابہ ہوتی ہے جیسا کہ آئندہ آپ کو کیلوس کے بیان سے معلوم ہو جائے گا۔

عروقِ کیلوسہ یا عروقِ لبنیہ (لیکٹی فیرز)۔ یہ عروق آنتوں کے اندرونی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

طبقہ سے شروع ہو کر جال بناتی ہیں۔ چھوٹی آنتوں میں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ بالخصوص صائم اور دقاق میں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ یہ باہم مل کر مجریٰ العلک کے فراخ حصّہ میں جا ملتی ہیں۔ انھیں کے ذریعے آنتوں سے کیلوس جذب ہو کر مجریٰ الصدر میں جاتا ہے۔ متقدمین اطباء نے غالباً انہیں کو مراابض اور جداول اور ماساریقا کے ناموں سے تعبیر کیا ہے۔

نوٹ:۔ اجزاء کیلوسیہ کے کچھ اجزاء بذریعہ ماساریقا و باب الکبد جگر کی طرف جاتے ہیں۔ اور اکثر اجزاء بذریعہ ان عروق جاذبہ و عروق کیلوسہ کے منسلی کی نچلی وریدمیں پہنچتے ہیں۔ اور دورانِ خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔

چھوٹی آنتوں کے اندر جو جھلّی (میوکس ممبرین) لگی ہوئی ہے۔ اس کی سطح پر مخمل کے ریشوں کی طرح بے شمار چھوٹے چھوٹے ابھار پائے جاتے ہیں جن کو دلالی کہتے ہیں۔ ہر ایک ابھار یا ریشہ گویا ایک چھوٹی بند جاذب نالی ہوتی ہے۔ جب کیلوس ان مخملی ریشوں پر بہتا ہے۔ تو وہ ان کو جذب و جمع کر کے مجریٰ صدر میں پہنچا دیتے ہیں۔ نیز دیکھو بیان کیلوس اور ہضم غذا کا بیان اپنے موقع پر۔

غدد جاذبہ

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
جاذب گلٹیاں	غدد جاذبہ	لمفے ٹک گلینڈز Lymphatic Glands

یہ چھوٹی چھوٹی گلٹیاں ہیں۔ جو عروق جاذبہ عروق کیلوسہ کی راہ میں گردن سر کی بیرونی سطح۔ بغل کے اندر کہنی کے جوڑ کے سامنے تنج ران۔ گھٹنے کے جوڑ کے پیچھے اور جداول امعاء (مسینٹری) وغیرہ میں پائی جاتی ہیں۔ یہ چپٹی بیضوی یا گول ہوتی ہیں۔ اور چھوٹے دانے سے لے کر بادام کے حجم کی ہوتی ہیں۔ ان کی رنگت کاٹنے پر خاکستری سرخی مائل ہوتی ہے۔ ان غدد کے اندر منجذب لمف اور کیلوس آ کر کچھ تغیرات حاصل کر کے خون میں ملنے کی قابلیت حاصل کر لیتے ہیں۔ عروق جاذبہ مختلف مقامات پر ان غدد جاذبہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کے درمیان سے گذرتی ہیں۔ ہر ایک گلٹی کے اندر بے شمار خانے ہوتے ہیں۔ اور جب عروق جاذبہ ان غدد کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ تو وہ نہایت باریک باریک شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہیں۔ جن کو عروق داخلہ کہتے ہیں۔ اور پھر وہ باریک باریک شاخیں باہم مل کر یا دور ہو جاتی ہیں۔ جو غدد یا گلٹی سے خارج ہو جاتی ہیں۔ تب ان کو عروق خارجہ کہتے ہیں پس عروق جاذبہ کی تمام رطوبت (لمف) ان غدد میں سے چھن کر نکلتی ہے۔ اور پھر خون میں جا کر ملتی ہے۔ اور اگر اس میں کوئی موذی یا زہریلا مادہ موجود ہو تو وہ ان غدد یا گلٹیوں میں رہ جاتا ہے۔ اور خون میں داخل ہونے نہیں پاتا۔ یہی وجہ ہے۔ کہ جب انگلی یا ہاتھ پر کوئی زخم ہوتا ہے۔ تو اس میں زہریلا مادہ سرایت کر جاتا ہے اور براہ عروق جاذبہ وہ بازو کی طرف جاتا ہے۔ تو بغل کے غدد جاذبہ اسے روک لیتے ہیں۔ اور خون میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ جس سبب سے وہ خود تو متورم ہو کر دردناک ہو جاتے ہیں۔ لیکن سارے خون کو زہریلا نہیں ہونے دیتے۔ اسی طرح سے سوزاک یا آتشک میں یا مرض طاعون میں کنج ران کے غدد جاذبہ زہریلے مادہ کو اپنے میں جذب کر کے متورم ہو جاتے ہیں جس کو عام طور پر بدھ کہتے ہیں۔

ان غدد جاذبہ میں ہی دانہائے لمف (لمفوسائٹ) بنتے ہیں جو درحقیقت سفید دانہائے خون (لیوکوسائٹ) ہوتے ہیں۔ اس کا بیان دیکھو اپنے موقع پر خون میں۔

چونکہ جسم کے مختلف مقامات میں سے تمام لمف اور چھوٹی آنتوں میں سے تمام کیلوس جذب ہو کر بالآخر دو بڑی عروق جاذبہ کے ذریعے (جو گردن کی وریدوں میں ختم ہوتی ہیں) خون میں مل جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ان دونوں بڑی عروق جاذبہ کا بیان کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔

سینہ کی نالی

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
سینہ کی نالی	مجریٰ الصدر	تھوریسک ڈکٹ Thoracic Duct

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تصویر مجریٰ الصدر



مجریٰ الصدر اس تصویر کے وسط میں دکھائی گئی ہے (ا) کٹی ہوئی لیسیوں کے سرے (ا) ظرف کیلوس (ری سپٹی کیولم کائلی (ب) مجریٰ الصدر جو کہ مقام (ج) پر (د) گردن کی بائیں ورید اور (ہ) ہنسلی کی نچلی ورید کے جانے ملاپ پر کھلتی ہے دونوں (د) اور (ہ) ورید یں باہم مل کر بائیں ورید بے نام بناتی ہیں۔ جو اس تصویر میں کٹی ہوئی دکھائی گئی ہے کیونکہ مجریٰ الصدر اس کے پیچھے سے گزرتی ہے (و) غدد جاذبہ (ز) اجوف نازل جو دائیں اور بائیں بے نام وریدوں کے ملنے سے بنتی ہے۔

یہ عروق جاذبہ کی ایک بڑی اور موٹی نالی ہے۔ جس میں سر گردن وسینہ کی دائیں دانب دائیں بازو دائیں پھیپھڑے ودل کے دائیں حصّہ اور جگر کی محدب سطح کے عروق جاذبہ کے سوا باقی تمام جسم کے عروق جاذبہ اور چھوٹی آنتوں کے عروق جاذبہ (عروق لبنیہ) آکر تمام ہوتے ہیں۔ اس نالی کے راستے کیلوس اور لمف کا بہت سا حصّہ خون میں پہنچتا ہے۔ یہ نالی کمر کے دوسرے مہرے کے جسم کے سامنے اور ظ لبطنیہ کی دائیں جانب اور قدرے پیچھے اور حجاب حاجز کے دائیں پاؤں کے پہلو کے برابر باریک باریک عروق جاذبہ کی مشلث نما

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تھیلی (ظرف کیلوس۔ ری سیپٹی کیولم کائلی) سے شروع ہو کر اور اوپر کو جا کر حجاب حاجز کے سوراخ اورطی سے گزر کر اور سینہ میں پہنچ کر ریڑھ کے سامنے پشت کے چوتھے مہرے کے برابر بائیں جانب کو مائل ہو کر اور مری کے بائیں پہلو کے برابر سینہ سے باہر جا کر گردن کے ساتویں مہرے کے بالائی کنارہ کے برابر نیچے کی طرف خمیدہ ہو کر گردن کی بائیں اندرونی ورید (لیفٹ انٹرنل جوگولر وین) اور بائیں ہنسلی کے نیچے والی ورید (لیفٹ سب کلے وین وین) کے جائے ملاپ پر ختم ہوتی ہے۔ یہ نالی تقریباً ۱۸ یا ۲۰ انچ لمبی اور اپنے جائے آغاز میں پر کے قلم کے برابر موٹی ہوتی ہے عام عروق جاذبہ کی طرح اس میں بھی کواڑیاں پائی جاتی ہیں۔ خصوصاً اس کے جائے اختتام پر دو ہلالی کواڑیاں ہوتی ہیں۔ جو اس کی لمف کو وریدی خون میں تو جانے دیتی ہیں۔ لیکن وریدی خون کو اس میں آنے سے روکتی ہیں۔

دائیں جاذب نالی

Right

اُردو نام	عربی نام	انگریزی Lymphatic/
دائیں جاذب نالی	مجریٰ جاذب ایمن	رائٹ لمفے ٹک ڈکٹ Duct

یہ عروق جاذبہ کی ایک چھوٹی اور پتلی نالی ہے جو تقریباً ایک انچ لمبی اور ½ انچ موٹی ہوتی ہے۔ اس میں سر اور گردن وسینہ کی دائیں جانب کے دائیں بازو اور دائیں پھیپھڑے کے دل کے دہنے حصے اور جگر کی محدب سطح کے عروق جاذبہ ختم ہوتے ہیں۔ یہ نالی گردن کی دائیں اندرونی ورید (رائٹ انٹرنل جوگولر وین) اور دائیں ہنسلی کے نیچے والی ورید (رائٹ سب کلے وین وین) کے جائے ملاپ پر ختم ہوتی ہے۔ اس کے جائے اختتام پر بھی دو ہلالی کواڑیاں ہوتی ہیں۔ جو وریدی خون کو اس میں نہیں آنے دیتیں

اعضاء صوت و تنفس (یعنی آواز اور تنفس کے آلات)

نوٹ:۔ تنفس کے اعضا میں اگرچہ ناک۔ منہ۔ حنجرہ۔ قصبہ ریہ عروق خشہ اور

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

پھیپھڑے داخل ہیں۔ لیکن ان میں سے حنجرہ تو آواز کا خاص آلہ ہے اور پھیپھڑے تنفس کے خاص آلات ہیں۔

نرخرہ (یا) حنجرہ

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
نرخرہ	حنجرہ	لے رنکس Lhrynx

یہ آواز کا خاص آلہ ہے۔ اور ہوا کی نالی کے اوپر زبان کی جڑ کے نیچے اور حلق کے سامنے رہتا ہے اس کا اوپر کا حصہ چوڑا اور مثلث لیکن نیچے کا حصہ گول اور تنگ ہوتا ہے اس کے سامنے کے کنارے کے درمیان ایک ابھار ہوتا ہے جسے کنٹھ کہتے ہیں۔ اور جو جوانی میں خوب نمایاں ہوتا ہے حنجرہ کی ساخت میں نو کرٹیاں ہوتی ہیں جن میں سے تین اکیلی اکیلی اور تین جوڑہ جوڑہ ہوتی ہیں علاوہ ان کے رباطات وعضلات وعشائے مخاطی وعروق اور اعصاب پائے جاتے ہیں حنجرہ کے بالائی سوراخ پر پان کی شکل کی ایک کرٹی لگی رہتی ہے جسے عربی میں عُضروف انگلبی اور انگریزی

تصویر حنجرہ وقصبۃ الریہ



Fig. 130.—The Trachea. Front.
A, hyoid bone; B, thyroid cartilage; C, cricoid; D, epiglottis; E, trachea; F, arch of bronchi.

(۱) عظم لامی (۲) عضروف نرمسی (۳) لسان المزمار (۴) کنٹھ (۵) ٹرے کیا یا قصبۃ الریہ (۶) برنکائی یا ہوا کی نالیاں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہیں اپی گلاٹس کہتے ہیں۔ حرکات تنفس کے وقت یہ کرّی عمودی طور پر کھڑی رہتی ہے۔ لیکن نوالہ نگلتے وقت یہ نیچے اور پیچھے کی طرف جھک کر حنجرے کے سوراخ کو بند کر دیتی ہے تاکہ کھانے پینے کی شے حنجرے میں نہ چلی جائے۔ اور اگر اتفاقیہ کوئی شے اس سوراخ کے قریب چلی جائے تو اچھو آتا یا سخت کھانسی اٹھتی ہے۔ حنجرے کے اندر آواز کی تاریں ہوتی ہیں۔ انہیں تاروں کی حرکت سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ حنجرے کے اندر کی طرف روئیں دار بلغمی جھلی کا استر ہوتا ہے۔ جس کی ساخت میں غدد مخاطیہ یا بلغمیہ ہوتے ہیں۔

آواز اور گفتگو

حنجرہ آواز کا مخصوص آلہ ہے۔ اور آواز دراصل آواز کی سچی تاروں سے پیدا ہوتی ہے۔ جنہیں عربی میں اوتار الصوت یا لسان المزمار اور انگریزی میں دوکل کارڈز کہتے ہیں۔ یہ آواز کی تاریں لچکدار ساخت کی دو ڈوریاں ہوتی ہیں۔ جو سوراخ حنجرہ کے اندر دونوں طرف اس کی کرّیوں سے اس طرح لگی ہوتی ہیں کہ عضلات حنجرہ کے انقباض سے ان کی وضع بدل سکتی اور ان کے تناؤ میں کمی بیشی آسکتی ہے۔ اور چونکہ یہ لچکدار ہوتی ہیں۔ اس لیے تنی ہوئی جھلیوں کی طرح آواز کے وقت مناسب طور پر متحرک ہوتی ہیں۔ یعنی کبھی تن جاتی اور کبھی ڈھیلی ہو جاتی ہیں۔ آواز جس قدر زیادہ بلند ہوتی ہے۔ اسی قدر یہ ڈوریاں زیادہ تنتی ہیں۔

گفتگو۔ آواز حنجرہ میں پیدا ہوتی ہے۔ جس میں زبان ناک۔ ہونٹ وغیرہ تغیرات پیدا کر کے اسے حروف و الفاظ میں بدل دیتے ہیں۔ جو خاص خاص معانی کے لیے موضوع و مخصوص ہوتے ہیں۔ گفتگو اگرچہ زبان سے ہوتی ہے لیکن اس میں درحقیقت پہلا فعل حنجرہ کا ہے۔ اور دوسرا فعل زبان کا گفتگو انسان میں اس کے تمام معاملات۔ دماغی ترقیات اور وسعت معلومات کی بنیاد ہے۔ اسی کے ذریعے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا اور تحصیل علوم و فنون کرتا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کراتا ہے۔ گفتگو یا فن تقریر کی طرح فن تحریر بھی کسب علوم وفنون اور ممدنی و معاشرتی ترقیات کے لیے ایک خاص ذریعہ ہے۔ چنانچہ تحریر یا کتابت حقیقت میں گفتگو اور الفاظ کے لیے مکمل علامت اور بہترین نشان ہے۔ جس کے سبب گذشتہ معلومات آئندہ معلومات کے ساتھ جمع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس طرح سے معلومات میں روز بروز اضافہ ہوتا جاتا ہے۔

ہوا کی نالی

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
ہوا کی نالی	قصبۃ الریہ	ٹرے کیا Trachia

یہ گردن کے پانچویں مہرے کے مقابل حنجرہ سے شروع ہو کر سیدھے طور پر گردن میں نیچے کو جاتی ہے۔ اور پشت کے تیسرے مہرے کے سامنے دو شاخوں (شعبتین۔ برانکائی) میں منقسم ہو جاتی ہے۔ چھاتی پر سامنے کی طرف اس کی جائے تقسیم سینے کی ہڈی کے اوپر والے دونوں ٹکڑوں کے جوڑ کی بلندی کے مقابل ہوتی ہے۔ اس کا طول ساڑھے چار انچ اور قطر پون انچ ہوتا ہے۔ اس کی اگلی سطح گول اور محدب لیکن پچھلی سطح چوڑی اور چپٹی ہوتی ہے۔ اور غذا کی نالی سے ملی رہتی ہے۔ اس کی مذکورہ بالا دونوں شاخوں میں سے دائیں شاخ قریباً ایک انچ کے اور بائیں قریباً دو انچ کے لمبی ہوتی ہے۔ یہ دونوں شاخیں دونوں پھیپھڑوں میں جا کر شاخ در شاخ ہو کر پھیپھڑوں کے ہوائی کیسوں یا بلبلوں میں ختم ہوتی ہیں۔ ان ہوائی نالیوں کی ایک نہایت باریک باریک شاخوں کو عربی میں عروق خشنہ اور انگریزی میں برانکی اوار کہتے ہیں۔ یہ عروق خشنہ جس قدر چھوٹی ہوتی جاتی ہیں ان میں کرّی کم ہوتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ آخر میں کرّی بالکل نہیں ہوتی ہے بلکہ صرف عضلی اور لچکدار ساخت پائی جاتی ہے۔

اس کی ساخت میں قریباً سولہ کرّیوں کے نامکمل حلقے عضلاتی اور وتری ریشے بلغمی جھلی اور چھوٹے چھوٹے غدد پائے جاتے ہیں۔ ہوا کی نالی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اور اس کی شاخوں کو اندر سے بلغمی جھلی استر کرتی ہے جس کی اندرونی سطح مخمل کی طرح روئیں دار ہوتی ہے۔ اور جس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ کہ جب تنفس کے ذریعے ہوا اندر جاتی ہے۔ تو وہ گرد وغبار سے خوب پاک وصاف ہو کر پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے۔

سینہ کی جھلی

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
سینہ کی جھلی	غشاء الصدر	پلیورا Pleura

یہ درحقیقت دو آبدار جھلیاں (سیرس ممبرین) ہیں۔ جو دونوں پھیپھڑوں کو ملفوف کرتی ہیں یعنی بطور غلاف ان پر لپٹی ہوئی ہیں اور دیوار سینہ کی اندرونی سطح پر استر لگاتی ہیں اس جھلی کی دو تہیں ہوتی ہیں۔ ایک تہہ پھیپھڑوں کو ملفوف کرتی ہے۔ جسے غشاء الریہ (پلیورا ایلمونیلس) کہتے ہیں اور دوسری تہہ دیوار سینہ کو اندر کی طرف سے استر کرتی ہے۔ جس کو غشاء الاضلاع (پلیورا کاسٹلس) کہتے ہیں اس جھلی کی ان دونوں تہوں کے درمیان جو ایک برائے نام جوف ہوتا ہے۔ اس میں ایک قسم کی رطوبت ہوتی ہے۔ جو پھیپھڑوں کو کثرت حرکت کے باوجود رگڑ وغیرہ سے محفوظ رکھتی ہے۔

حجاب منصف صدر

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
سینہ کا درمیانی پردہ	حجاب منصف	میڈیاسٹائنم Mediastinum

دائیں اور بائیں غشاء الریہ کا وہ حصہ جو سامنے سینہ کی ہڈی سے چسپاں ہو کر پھیپھڑے کے اندرونی پہلو پر استر کرتا ہوا پیچھے کی طرف جا کر ریڑھ کے پہلوؤں پر استر کرتا ہے۔ اور باہم مل کر دونوں پھیپھڑوں کے درمیان مثل دیوار کے حائل ہو کر جوف سینہ کو دو جانبی حصوں میں

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تقسیم کر دیتا ہے۔ یعنی اس پردہ کو جو سینہ کے درمیان حائل ہے، اور اس کی تنصیف کرتا ہے۔ حجاب منصف صدر کہتے ہیں۔

نوٹ (۱) غشاء الصدر کے ورم کو عربی میں ذات الجنب اور انگریزی میں پلیورائی ٹس کہتے ہیں (۲) غشاء الاضلاع کے بالائی حصّہ کے ورم کو ذات الجنب حقیقی اور اس کے زیرین حصّہ کے ورم کو شوصہ کہتے ہیں (۳) دونوں طرف کے غشاء الصدر یا غشاء الریہ کے ورم کو ذات الجنب مضاعف یا خانقہ کہتے ہیں (۴) غشاء الریہ کے ورم کو ذات الجنب رئوی کہتے ہیں (۵) دیا فرغما کی بالائی جھلّی کے ورم کو ذات الجنب خالص اور دیا فرغما کے ورم کو برسام کہتے ہیں (۶) حجاب منصّف کے اگلے حصّے کے ورم کو ذات الصدر اور (۷) اس کے پچھلے حصّے کے ورم کو ذات العرض کہتے ہیں۔

پھیپھڑے

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
پھیپھڑے	رِئتین	لنگز Lungs

یہ تنفس کے خاص آلات ہیں۔ اور تعداد میں دو ہوتے ہیں۔ جو سینے کے جوف میں بسبب دل وغیرہ کے علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں۔ یعنی ہر ایک پھیپھڑہ سینے کے جوف میں مہروں کے ستون کے ایک طرف رہتا ہے رنگت میں سرخ۔ شکل میں مخروطی جن کا نکیلا سرا اُوپر اور چوڑا سرا نیچے ہوتا ہے پھیپھڑے کی چوٹی پہلی پسلی کی سطح سے قریباً ڈیڑھ انچ اونچی ہوتی ہے۔ اور پھیپھڑے کا زیرین حصّہ جو چوڑا اور نشیب دار ہوتا ہے۔ وہ عضلہ دیا فرغما (ڈایا فرام) کی محدّب سطح پر رہتا ہے۔ پھیپھڑے کی بیرونی سطح محدّب لیکن اندرونی سطح مقعر ہوتی ہے جس کے پچھلے کنارے کے نزدیک ایک عمیق نالی ہوتی ہے۔ جس میں پھیپھڑے کی جڑ (جذر ریہ) لگی رہتی ہے جو شعبہ۔ قصبہ۔ وریدِ شریانی شریان وریدی شریان ورید

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تصویر مزمارہ اور پھیپھڑے



Fig. 7. Front View of the Larynx, Trachea, and Lungs.

(۱) حنجرہ یا مزمارہ (۲) قصبہ ریہ (۳) پھیپھڑے

شعبہ وغیرہ سے مرکب ہوتی ہے۔ ایک شگاف کے سبب بائیں پھیپھڑے کے دو حصے مگر دائیں کے دو شگافوں کے سبب تین حصے ہوتے ہیں۔ دایاں پھیپھڑا وزن میں گیارہ چھٹانک اور بایاں دس چھٹانک ہوتا ہے مردوں کے پھیپھڑوں کی نسبت عورتوں کے پھیپھڑے ذرا ہلکے ہوتے ہیں پھیپھڑوں کی رنگت بچپن میں گلابی۔ جوانی میں سرخ سیاہی مائل اور بڑھاپے میں سیاہ ہوتی ہے اور ان کی سطح پر باریک لکیروں سے محدود چھوٹے چھوٹے خانے سے نظر آتے ہیں پھیپھڑے ہلکے اور اسفنج کی طرح مسامدار ہوتے ہیں۔ اور ان کو دبانے پر ان کے اندر کی ہوا خارج ہونے سے کرکراہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ پھیپھڑے کی بالائی سطح پر آب دار جھلی اور باقی ساخت میں خانہ دار جھلی لچکیلے ریشے اور ہوا کے چھوٹے چھوٹے کیسے یا خانے (ائر سیلز) پائے جاتے ہیں۔ جو باہم مل کر لوتھڑے بن جاتے ہیں۔ انہی ہوا کے کیسوں یا خانوں میں ہوا کی نالی کی باریک باریک شاخیں ختم ہوتی ہیں۔ پھیپھڑے کی شریان اور ورید کا جال بھی پھیپھڑے کے ہر حصے میں پھیلا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ہر ایک ہوائی کیسے پر شریانی اور وریدی عروق شعریہ کا جال پھیلا ہوا ہوتا ہے ہر ایک پھیپھڑے پر جو آبدار جھلی کا غلاف ہوتا ہے۔ اسے غشاء الریہ کہتے ہیں ۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تنفّس اور ضرورت تنفّس

ہم سانس کیوں لیتے ہیں۔ جب زندگی کی حالت میں جسم انسان کا ہر ایک عضو اپنے کام میں مصروف رہتا ہے اسی صورت میں دو باتوں کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ جسم میں بدل ما یتحلل ہو یعنی جسم کا جو حصّہ تحلیل یا صرف ہو گیا ہے اس کا بدل حاصل ہو۔ اور دوسرے یہ کہ جسم میں جو فضلات پیدا ہو گئے ہوں۔ وہ خارج کیے جائیں۔ پس جب خون دورہ کرتا ہوا مختلف اعضاء جسم سے گزرتا ہے تو یہ اعضاء جس طرح خون میں سے بعض مفید مواد کو جذب کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اپنے فضلات کو خون میں شامل کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ خون کے جو اجزاء مفیدہ پرورش جسم میں صرف ہوئے ہیں ان کا بدل خون میں پہنچتا رہے۔ اور اس کے فضلات خارج ہوتے رہیں چنانچہ پہلا فعل تو اعضاء ہضم سے پورا ہوتا ہے۔ جو خلاصۂ غذا کو بطور بدل ما یتحلل خون میں داخل کرتے ہیں۔ اور دوسرا فعل اعضاء نفض یعنی فضلات کو خارج کرنے والے اعضاء مثلاً آنتیں۔ گردے۔ مثانہ جلد اور پھیپھڑوں سے انجام پاتا ہے۔ ان فضلات بدنیہ میں بخارات دخانیہ کو۔ جو کہ خون میں شامل ہوتے ہیں نہایت درجہ اہمیت ہے۔ پس تنفس اور پھیپھڑوں کا بہت بڑا فائدہ یہی ہے کہ وہ بخارات دخانیہ (کاربانک ایسڈ گیس) کو خون سے خارج کرتے ہیں اور آکسیجن یا نسیم کو خون میں شامل کرتے ہیں۔ جس سے خون صاف اور شوخ سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ اور براہ شرائین تمام اعضاء کی عروق شعریہ میں پہنچ کر وہ کثیف اور سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ جس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس میں بخارات دخانیہ مل جاتے ہیں۔ جو پھر پھیپھڑوں میں بذریعہ تنفس بدن سے خارج ہوتے ہیں۔ اس لیے تنفس کے بغیر زندگی محال ہے سعدی علیہ الرحمۃ نے خوب کہا ہے۔ ہر نفسے کہ فرو میرود ممد حیات است وچوں برمی آید مفرح ذات ہے یعنی جو سانس اندر جاتا ہے۔ وہ زندگی کو بڑھاتا ہے۔ جو باہر آتا ہے۔ وہ مفرح ذات ہے۔ پس حقیقت میں آدمی کی زندگی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کا مدار دم یا نفس پر ہی ہے۔ ؎

قیام جسم خاکی ہے نفس پر ہوا پر ہے بنا اپنے مکاں کی

تنفس سے خون کس طرح صاف ہوتا ہے۔

پھیپھڑوں کے بیان میں یہ بتایا جا چکا ہے۔ کہ ہوا کی نالیاں پھیپھڑوں کے اندر جاکر آخر میں پھیل جاتی ہیں۔ اور چھوٹے چھوٹے خانوں تبدیل ہو جاتی ہیں جنہیں ہوائی خانے یا (ایر سیلز) کہتے ہیں۔ ان ہوائی خانوں کی دیواریں نہایت نازک ہوتی ہیں۔ جسم کا کثیف خون دل کے بائیں بطن سے بذریعہ ورید شریانی پھیپھڑوں میں صفائی کے لیے جاتا ہے۔ ورید شریانی (پلمونری آرٹری) شاخ در شاخ ہو کر پھیپھڑوں کے ہر ایک حصّے میں پہنچتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کی شاخیں ہر ایک ہوائی خانہ (ایر سیل) کی نازک دیواروں پر بال سی باریک رگوں (عروقِ شعریہ) کا جال بناتی ہیں۔ پس جب سانس لیا جاتا ہے تو ہوا پھیپھڑوں کے ہر ایک ہوائی خانہ تک پہنچتی ہے۔ جہاں پر ہوا کی آکسیجن یا نسیم (ہوا اور روح پرور) خون میں جذب ہو جاتی ہے۔ اور خون کے بخارات دخانیہ بذریعہ تنفس خارج ہو جاتے ہیں۔ پس اس طرح سے بذریعہ تنفس خون صاف ہوتا ہے پھر شریانِ وریدی (پلمونری ویئنز) کی شاخوں کے ذریعے اکٹھا ہو کر دل کے بائیں بطن میں جاتا ہے۔ اور وہاں سے بذریعہ شریان اعظم اور اس کی شاخوں کے تمام جسم میں چلا جاتا ہے (نیز دیکھو بیان دورانِ خون)

مذکورہ بالا بیان سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ خود پھیپھڑے کثیف ہوا یا بخارات دخانیہ پیدا نہیں کرتے۔ بلکہ کثیف خون سے اُسے علیحدہ کر کے خارج کرتے ہیں۔ سانس لینے میں جو صاف ہوا پھیپھڑوں میں جاتی ہے اس میں ۲۱ فی صدی آکسیجن (نسیم) ۷۹ فی صدی ٹائٹروجن (ہوا شوریہ) اور ۰٫۰۴ فی صدی کاربانک ایسڈ (بخارات دخانیہ) ہوتے ہیں۔ لیکن سانس چھوڑنے میں جو کثیف ہوا پھیپھڑوں سے خارج ہوتی ہے۔ اس میں آکسیجن یا نسیم تقریباً ۵ فی صدی کم ہو جاتی ہے۔ اور کاربانک ایسڈ (بخارات دخانیہ) کی مقدار تقریباً ۵ فی صدی بڑھ جاتی ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

حکمتِ تنفس یعنی ہم سانس کس طرح لیتے ہیں

جوف سینہ ایک ایسی خلاء ہے کہ بیرونی ہوا کے ساتھ مستقیماً اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سینہ کے اس خلاء میں دونوں پھیپھڑے دو تھیلیوں کی طرح رکھے ہوئے ہیں۔ جن کا تعلق بیرونی ہوا سے فقط قصبۂ ریہ کے ذریعہ ہے۔ حرکت تنفس یعنی سانس کا آنا جانا سینہ کے بار بار سکڑنے اور پھیلنے کا نتیجہ ہے چنانچہ دم کھینچنے میں خاص عضلات سینہ و شکم کی امداد کے سبب جب سینہ پھیل جاتا ہے۔ تو پھیپھڑوں اور جوف سینہ کے درمیان ایک خلاء پیدا ہو جاتی ہے۔ پس بیرونی ہوا بذریعہ تنفس پھیپھڑوں میں جاکر اور ان کو پھیلا کر سینہ کو بھر دیتی ہے۔ اسی طرح جب سینہ پھیلنے کے بعد اپنی معمولی حالت پر واپس آتا ہے۔ یعنی جب عضلات سینہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ تو سینہ میں فضاء تنگ ہو کر ہوا کو دباتی ہے۔ پس جو ہوا سانس کے ذریعے اندر گئی تھی۔ وہ اب دب کر باہر نکل آتی ہے اسی کا نام حرکتِ تنفس ہے۔ اس حرکت تنفس میں بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب حکمت رکھی ہے! سینہ کا سکڑنا اور پھیلنا عضلات کے فعل پر موقوف ہے سانس لینے میں سینہ خوب فراخ اور عمیق ہو جاتا ہے۔ چونکہ حجاب حاجز یا دیافرغما (ڈایافرام) جب سکڑ کر نیچے اترتا ہے۔ تو سینہ لمبائی میں بڑھ جاتا ہے اور پسلیوں کے درمیانی عضلات کے سکڑنے سے سینہ چوڑائی میں بڑھ جاتا ہے۔ پھر جب عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ یعنی اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتے ہیں۔ نیز پسلیاں اور سینہ کی ہڈی بھی لچک کے سبب اپنی معمولی حالت پر لوٹ آتی ہیں تو سینہ کی اندرونی فضاء لمبائی اور چوڑائی میں گھٹ کر تنگ ہو جاتی ہے اور ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ یہ معمولی حرکت تنفس ہے۔ لیکن جب سانس معمولی سے زیادہ لمبا اور گہرا لینا پڑتا ہے مثلاً بولنے گانے پھونکنے اور کھانسنے وغیرہ میں تو پھر وہ تمام عضلات جو کہ اخراج تنفس کے لیے پیدا کئے گئے ہیں۔ اپنا کام کرتے ہیں۔ کیونکہ مذکورہ بالا اعضاء کی لچک ان حرکات کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ ان عضلات میں سے زیادہ تر شکم کے عضلات

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کام کرتے ہیں۔ جو شکم کے اعضاء کو دبا کر اوپر کی طرف دھکیلتے ہیں۔ جس سے حجابِ حاجز اوپر چڑھ جاتا ہے۔ اور ہوا کو خارج کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب زور سے سانس لیا جاتا ہے تو سینہ پھولتا ہے مگر پیٹ سکڑ کر نیچے کو دب جاتا ہے اور جب زور سے سانس چھوڑا جاتا ہے تو اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اگرچہ حرکاتِ تنفس غیر ارادی ہوتی ہیں۔ لیکن بعض اوقات وہ کسی قدر ارادی بھی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ بولنے۔ گانے اور پھونکنے میں بچوں کے تنفس میں سینہ کم اور پیٹ زیادہ حرکت کرتا ہے۔

حرکات تنفس

تنفس کی دو حرکتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حرکات جس سے ہوا اندر جاتی ہے۔ اس کو عربی میں زفیر اور انگریزی میں انسپائی ریشن کہتے ہیں۔ اور دوسری حرکت جس سے ہوا باہر آتی ہے اسے عربی میں شہیق اور انگریزی میں ایکس پائی ریشن کہتے ہیں پہلی حرکت دوسری حرکت کی نسبت کسی قدر چھوٹی ہوتی ہے۔ اور دوسری حرکت یعنی اخراج تنفس کے بعد خفیف سا وقفہ ہوتا ہے۔

ایک تندرست جوان شخص میں تعداد تنفس ایک منٹ میں تقریباً اٹھارہ ہوتی ہے۔ اس لیے تنفس اور نبض کی نسبت ایک اور چار کی ہوتی ہے۔ یعنی تنفس کی ایک حرکت ہو تو نبض کی چار حرکتیں ہوتی ہیں۔ حرکات تنفس میں امور مثلاً (۱) اختلاف جنسیت جیسے مرد و عورت (۲) اختلاف عمر جیسے بچپن۔ جوانی اور بڑھاپا (۳) حرکت و سکون بدنی مثلاً لیٹنا۔ بیٹھنا۔ چلنا پھرنا اور دوڑنا (۴) اغراض نفسانیہ مثلاً خوف و غصہ اور خوشی وغیرہ (۵) صحت و مرض مثلاً بخار وغیرہ سے اختلاف واقع ہوتا ہے۔ چنانچہ (۱) مرد کی نسبت عورت میں تنفس کسی قدر تیز ہوتا ہے (۲) نئے بچے کا تنفس ایک منٹ میں ۴۴ بار ہوتا ہے پانچ برس کے بچے میں پچیس بار۔ پندرہ سے بیس برس کی عمر میں بیس دفعہ بیس سے پچیس برس کی عمر میں اٹھارہ دفعہ ہوتا ہے پچیس سے تیس برس کی عمر میں سترہ دفعہ۔ اور تیس برس سے پچاس برس کی عمر میں پندرہ دفعہ ہوتا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہے (۳) سکون کی نسبت حرکت بدنی سے تنفس تیز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح (۴) اغراض نفسانیہ مثلاً جوش وغصہ کے وقت بھی تیز ہو جاتا ہے (۵) بخار اور بالخصوص نیمونیا میں تنفس بہت تیز ہو جاتا ہے۔ الغرض جب حرکاتِ میں اختلاف واقع ہوتا ہے۔ تو اکثر اسی وقت حرکاتِ تنفس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے لیکن ان کی باہمی نسبت ہمیشہ یکساں نہیں رہتی۔

مقدار ہوا تنفس

اگرچہ ہم سانس لینے میں ہوا پھیپھڑوں کے اندر لے جاتے ہیں اور سانس چھوڑنے میں ہوا پھیپھڑوں سے خارج کرتے رہتے ہیں تاہم پھیپھڑے ہوا سے خالی نہیں رہتے بلکہ معمولی طور پر سانس لینے میں جو ہوا پھیپھڑوں میں آتی جاتی ہے۔ وہ اس ہوا کی نسبت جو کہ پھیپھڑوں میں مقامی طور پر موجود رہتی ہے بہت تھوڑی ہوتی ہے معمولی حالات میں تندرست جوان اور ادھیڑوں کے سانس کے ساتھ تقریباً ۳۰ مکعب انچ ہوا داخل ہوتی ہے۔ اور بوڑھوں کے تنفس میں کسی قدر زیادہ داخل ہوتی ہے۔ ہر معمولی تنفس میں جس قدر ہوا پھیپھڑوں میں آتی جاتی ہے۔ یعنی اس میں داخل یا خارج ہوتی رہتی ہے اس کو ہوا تنفس (ٹائڈل ایئر) کہتے ہیں۔ اور اس کی مقدار جوان آدمی میں ہر سانس لینے میں تقریباً ۳۰ مربع انچ ہوتی ہے۔ لیکن وہ ہوا جو معمولی سانس لینے کے بعد زور سے گہرا سانس لے کر اندر داخل کی جاسکتی ہے۔ اس کو ہوا اضافی (کمپلی مینٹل ایئر) کہتے ہیں اس کی مقدار تقریباً ۱۰۰ مکعب انچ ہوتی ہے۔ ہوا کی وہ مقدار جو معمولی تنفس کے بعد پھیپھڑوں میں باقی رہتی ہے اور جس کو زور سے سانس لے کر خارج کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ہوا محفوظ (ریزرو ایئر) کہتے ہیں۔ یہ بھی تقریباً ۱۰۰ مکعب انچ ہوتی ہے۔ اور وہ ہوا جو زور سے سانس نکالنے کے بعد بھی پھیپھڑوں میں باقی رہتی ہے اور کسی اختیاری کوشش سے خارج نہیں کی جاسکتی اُسے ہوا باقی (ریسی ڈوئل ایئر) کہتے ہیں۔ اس کی مقدار بھی تقریباً ۱۰۰ مکعب انچ ہوتی ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

پس معلوم ہوا کہ معمولی طور سے سانس لینے پر پھیپھڑوں میں ۲۳۰ مربع انچ ہوا ہوتی ہے۔ جو ہوا تنفس۔ ہوا محفوظ اور ہوا باقی کا مجموعہ ہوتی ہے ٭

وسعتِ سینہ

زیادہ سے زیادہ جس قدر ہوا انسان کے پھیپھڑوں میں آجا سکتی ہے اس سے اس شخص کے سینہ کی وسعت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ وسعت سینہ کو عربی میں سعۃ الصدر یا سعۃ النفس اور انگریزی میں "وائٹل کپیسیٹی آفدی چیسٹ" کہتے ہیں۔ ہر ایک جوان شخص جس کا قد پانچ فٹ سات انچ ہو اس کے سینہ کی وسعت ۲۳۰ مکعب انچ ہوا کی ہوتی ہے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ اس قدر ہوا سینہ میں داخل کی جا سکتی یا اس سے خارج کی جا سکتی ہے اگر اس قدر ہوا سینہ میں داخل کی جائے تو وہ (۱) ہوا نفس (۲) ہوا محفوظ اور (۳) ہوا باقی کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اور اگر سینہ سے خارج کی جائے تو وہ (۱) ہوا نفس (۲) ہوا اضافی اور (۳) ہوا محفوظ کا مجموعہ ہوتی ہے۔ ہر ایک تندرست شخص کے سینہ کی وسعت یعنی اس کے تنفس کی وسعت اس کے قد و قامت۔ اس کے ثقل یعنی وزن جسم و اس کی عمر پر منحصر ہوتی چنانچہ اگر قد و قامت پانچ فٹ سات انچ سے زیادہ ہو تو ہر ایک انچ کی زیادتی پر تقریباً آٹھ مکعب انچ ہوا کی وسعت زیادہ ہو گی اور جس قدر قد میں کمی ہو گی۔ اسی حساب سے اسی قدر فی انچ کمی ہو گی۔ اور اگر جسم کا وزن ایک سو ساٹھ پونڈ سے کم ہو۔ تو وسعت سینہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن جب اس سے زیادہ ہو تو ہر ایک پونڈ وزن پر ایک مکعب انچ ہوا کی گنجائش کم ہو جاتی ہے باعتبار پندرہ سے پینتیس سال کی عمر تک وسعت سینہ میں اس طرح سے ترقی ہوتی ہے۔ کہ ہر ایک سال میں پانچ مکعب انچ ہوا کی گنجائش بڑھتی ہے اور پھر پینتیس سال سے پینسٹھ سال تک فی سال بحساب ڈیڑھ مکعب انچ ہوا کی گنجائش کم ہوتی جاتی ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

عورتوں میں ہم عمر مردوں کی نسبت وسعت سینہ تقریباً نصف ہوتی ہے۔

تنفس پر اعصاب کا اثر

حرکتِ تنفس طبعی اور غیر اختیاری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا۔ تو زندگی ہمیشہ خطرے میں رہتی۔ اور نیند یا بیہوشی میں موت واقع ہو جایا کرتی۔ لیکن یہ بھی ضروری تھا کہ تنفس کا ایک حصّہ اختیاری ہوتا۔ ورنہ بولنا۔ گانا اور کھانسنا وغیرہ ارادی حرکات ناممکن ہو جاتیں۔ حرکاتِ تنفس اور ان کا طبعی نظام راس النخاع (میڈلا اابلاگھیا) کے ماتحت ہے۔ جو ضرورت تنفس سے متاثر ہو کر عضلاتِ حرکت میں قوتِ تحریک بھیجتا ہے۔ لیکن تنفس کے وہ کام جو ارادی ہیں۔ ان میں راس النخاع کے علاوہ دماغ بھی شریک ہوتا ہے کیونکہ ادراک اور ارادہ دماغ ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن تمام عضلاتِ تنفس کا مرکز راس النخاع (میڈلا) ہی ہے۔ جو تمام عضلاتِ تنفس پر حکمران ہے۔ بلکہ غیر معمولی کاموں مثلاً ہچکی۔ جمائی تنگیٔ تنفس اور کھانسنا وغیرہ میں ان عضلات سے بھی کام لیتا ہے۔ جو معمولی تنفس میں کام نہیں کرتے۔ مثلاً حنجرہ چہرہ مثانہ ریڑھ اور شکم کے عضلات وغیرہ

مرکز تنفس راس النخاع کے تقریباً درمیانی حصّہ میں ہوتا ہے۔ اگر اس حصّے میں صدمہ پہنچے تو تنفس فوراً بند ہو جاتا ہے اور موت واقع ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو (مرکز حیات) بھی کہتے ہیں۔ یہ مرکز تنفس یا مرکز حیات کس طرح کام کرتا ہے؟ بعض کا خیال ہے کہ یہ بلا کسی تحریک کے خود بخود کام کرتا ہے۔ اور بعض کا خیال ہے کہ دیگر اعضاب حسیہ کا اس پر اثر پڑتا ہے۔ جو اس میں تحریک کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس مرکز کی تحریک کا باعث وہ خون ہے جو کہ یہاں پہنچتا ہے۔ یعنی جب خون میں بخارات دخانیہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس مرکز میں تحریک تنفس پیدا کرتے ہیں اور جب کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس مرکز کا فعل سست ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس خون میں آکسیجن یا نسیم زیادہ ہو تو اس

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مرکز کا فعل رُک جاتا ہے۔

دیگر اعصاب حسیہ کے ذریعے جو اس مرکز تنفس پر محرک اثر پڑتا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ عصب راجع (دیگس نرد) جو حسی عصب ہے اور جس کی شاخیں پھیپھڑوں میں جاتی ہیں اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو تنفس لمبا اور سست ہو جاتا ہے۔ جو اس امر کی دلیل ہے کہ تنفس پر ان حسی اعصاب کا ضرور اثر پڑتا ہے۔ پھر اگر اس کٹے ہوئے عصب کے مرکزی سرے میں تحریک دی جائے۔ یعنی اسے چھیڑا جائے تو تنفس میں ہوا زور سے داخل ہوتی ہے۔ اگر اس میں ذرا زور سے تحریک دی جائے تو دیا فرغما سخت منقبض ہو کر اپنی حرکت کو بند کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس مرکزی سرے کو آہستہ سے چھیڑا جائے تو بجائے اس کے کہ ہوا داخل ہو ہوا خارج ہوتی ہے۔ پس ظاہر ہے۔ کہ عصب راجع میں دو قسم کے ریشے ہوتے ہیں چنانچہ جب جذب ہوا کے لیے پھیپھڑے پھیلتے ہیں۔ تو عصب راجع کے ان ریشوں میں تحریک ہوتی ہے۔ جو اخراج ہوا کا کام کرتے ہیں۔ اور اخراج ہوا کے وقت جب پھیپھڑے سکڑتے ہیں۔ تو عصب راجع کے ان ریشوں میں تحریک پیدا ہوتی ہے۔ جو جذب ہوا کے لیے کام کرتے ہیں۔ جب قصبہ ریہ میں کوئی چیز غیر طبعی طور پر داخل ہو جاتی ہے تو اسی عصب میں تحریک پیدا ہو کر اُچھو آ جاتا ہے عصب راجع کے علاوہ حنجرہ کا بالائی عصب اور زبان و حلق کا عصب وغیرہ بھی مرکز تنفس پر کسی قدر تحریک کا اثر پیدا کرتے ہیں

تنفس کے خاص خاص حالات

حرکات تنفس میں معمولی تنفس کے سوا چند اور ضروری باتیں بھی ہیں۔ جو فعل تنفس سے مختلف ہیں چنانچہ ان میں سے بعض کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے۔

۱۔ آواز نکلنا:۔ سانس لینے میں ہوا کی آمد و رفت کے لیے حنجرہ کا بالائی سوراخ کھلا رہتا ہے۔ بولتے اور گاتے وقت آواز کی تاریں جو حنجرہ کے اندر لگی ہوتی ہیں۔ تن کر ہوا کے منفذ کو تنگ کر دیتی ہیں۔ پس ان تنی ہوئی آواز کی تاروں

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

میں ہوا زور سے ٹھوکر کھاتی ہے۔ اور آواز پیدا ہوتی ہے۔ جو زبان و دانت اور ہونٹھ وغیرہ کی امداد سے حروف والفاظ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔

(۲) آہ کھینچنا:۔ آہ صرف ایک لمبا سا سانس لینے سے پیدا ہوتی ہے جس کے بعد فوراً ہی سانس چھوڑنے کی حرکت ہوتی ہے دم کھینچنے کی حرکت خصوصاً عضلاتِ شکم سے ہوتی ہے اور دم چھوڑنے کی حرکت سینے کی دیواروں اور پھیپھڑوں کے سکڑنے سے جب عرصہ تک طبیعت کسی خاص بات میں لگی رہتی ہے۔ تو اس عرصے میں حرکات تنفس ایسی سست ہو جاتی ہیں۔ کہ خون میں کافی لطیف ہوا نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے طبیعت ایک گہری غیر اختیاری دم کشی (آہ) کی حرکت سے اس کمزوری تنفس کی تلافی کر دیتی ہے۔

(۳) ہچکی آنا:۔ ہچکی ایک اچانک دم کشی کی حرکت ہے۔ جو حجاب حاجز کے تشنج سے پیدا ہوتی ہے یہ ایسی اچانک حرکت ہوتی ہے۔ کہ حنجرہ کا سوراخ ہوا کے دخول کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے اس لیے آواز کی تاروں کی تحریک سے وہ عجیب آواز پیدا ہوتی ہے جسے ہچکی کہتے ہیں۔

(۴) کھانسنا:۔ کھانسی عموماً ایک گہرا سانس لینے کے بعد آیا کرتی ہے۔ اس وقت حنجرہ کے بالائی سوراخ والی پان کی شکل کی کُرّی سوراخ حنجرہ کو اچھی طرح سے بند کر دیتی ہے اور دم چھوڑنے کے عضلات دفعتہً سکڑتے ہیں تب پہلے پہل تو سوراخ حنجرہ کے کھولنے کے لیے کافی قوت نہیں ہوتی بالآخر آواز کی تاریں فوراً کھل جاتی ہیں۔ اور ہوا زور کی آواز سے خارج کی جاتی ہے۔ کھانسنے سے بلغم وغیرہ جو ہوا کی نالیوں میں ہوتی ہے۔ وہ خارج کی جاتی ہے۔

(۵) چھینک:۔ چھینکنے کا فعل بھی ویسے ہی سرزد ہوتا ہے جیسے کہ کھانسنے کا لیکن اس میں زبان نرم تالو سے اس طرح لگ جاتی ہے۔ کہ ہوا کی لہر ناک میں چلی جاتی ہے اور چھینک آجاتی ہے۔

(۶) جمائی:۔ یہ ایک لمبا سانس لینے سے پیدا ہوتی ہے۔ جس میں منہ اور چہرے کے عضلات تن جاتے ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

غدّہ درقیہ

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
ڈھال سا غدود	غدّہ درقیہ۔ غدہ ترسیّہ	تھائرائڈ گلینڈ Thyroid Gland

نوٹ:۔ چونکہ یہ غدہ گردن میں غضروف درقی (ڈھال نما گرہی جس کے اُبھار کو کنٹھ کہتے ہیں) کے قریب واقع ہے پس اس مناسبت سے اس کا یہ نام رکھا گیا۔

غدۂ درقیہ ایک ڈھال کی شکل کی گلٹی ہے۔ جو گردن میں ہوا کی نالی (قصبۃ الریہ۔ ٹریکیا) کے بالائی حصّہ کے سامنے واقع ہے اس گلٹی میں کوئی نالی نہیں ہوتی اور نہ اس سے کوئی رطوبت خارج ہوتی ہے۔ اس میں دو پہلوی لوتھڑے (لیٹرل لوبز) اور ایک درمیانی حصّہ (جزر واصل واسقمس) ہوتا ہے۔ اس کا وزن نصف سے ایک چھٹانک تک ہوتا ہے۔ لیکن مرض کی حالت میں یہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ اسی گلٹی کے بڑھ جانے کو مرض غوتر یا گھینگھ کہتے ہیں۔

افعال یا وظائف:۔ مدتوں کی علمی تحقیقات سے اب یہ بات معلوم ہوئی ہے۔ کہ اس غدہ میں سے ایک اندرونی رطوبت (انڈوکرائن) تراوش پا کر خون میں ملتی ہے جس کی ترکیب میں آئیوڈین وغیرہ ہوتی ہے۔ پس اس غدہ کے اس جوہری مادہ کو انگریزی میں (تھائیراکسین[1] کہتے ہیں۔ جس کو عربی و اُردو میں درقین کہنا نہایت موزوں ہے۔

اگرچہ اس غدہ کے مخصوص وظائف تا حال یقینی طور پر معلوم نہیں ہوئے لیکن غالباً اس کا اہم فعل یہ خیال کیا جاتا ہے۔ کہ یہ جسم کی مُغیرہ (جو غذا کو جزو بدن بناتی ہے) اور قوتِ نامیہ (جو جسم کو بڑھاتی ہے) خاص اثر ڈالتا ہے چنانچہ اگر بچوں کے جسم سے یہ غدہ یا گلٹی نکال دی جائے یا وہ خود سکڑ کر چھوٹی ہو جائے تو مرض حمق مع نقص اعضاء (کریٹانزم) کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اور ایسے بچوں کے دماغ اور جسم کا بڑھنا کم ہو جاتا یا رُک جاتا ہے۔ پس اس کا سر چھوٹا اور قوائے دماغی ناقص ہوتے ہیں اور دیگر

[1] Thyroccin

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اعضائے جسم بھی اپنی طبعی مقدار سے چھوٹے رہ جاتے ہیں اور عموماً ان کی گردن میں غریا گھنگھ ہوتا ہے ایسے اشخاص کو پنجاب و ہندوستان میں شاہ دولہ کا چوہا کہتے ہیں۔

نوٹ:۔ مرض گنگھ (غریا ٹرا) میں اگرچہ یہ گلٹی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس کا جوہر تھائی راکسین ناقص ہو جاتا ہے۔ جوانوں میں بھی جب اس گلٹی کے مذکورہ بالا جوہر تھائرا کسین میں کمی یا نقص آجاتا ہے تو مرض کسنی ڈیما پیدا ہو جاتا ہے جس میں مریض کا جسم بھدا۔ جلد ڈھیلی۔ ہاتھ پاؤں چوڑے اور پھولے سے ہو جاتے ہیں۔ چہرا زرد اور بھرا بھرا سا پیٹ پھولا ہوا اور وہ سست پژمردہ رہتا ہے۔ اور رفتہ رفتہ اس کے قوائے دماغی زائل ہو جاتے ہیں ۔

پس مذکورہ بالا بیان سے یہ صاف ظاہر ہے کہ جب یہ گلٹی نکال لی جاتی ہے یا کسی سبب سے خراب ہو کر اس کا ذاتی فعل بند ہو جاتا ہے۔ اور خون کی ترکیب میں خرابی آجاتی ہے۔ تو مذکورہ بالا عوارض پیدا ہو جاتے ہیں۔

غدۃ التجنین

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
جنین کی گلٹی	غدۃ التجنین	تھائمس گلینڈ Thymus Gland

یہ بھی ایک گلٹی ہے جو سینہ کی ہڈی (عظم القص۔ سٹرنم) کے بالائی سرے کے پیچھے اور غدہ درقیہ کے نیچے واقع ہے۔ یہ قریباً دو انچ لمبی اور ڈیڑھ انچ چوڑی ہوتی ہے۔ لیکن جنین کی حالت میں یہ بڑی ہوتی ہے۔ اور دو برس کی عمر تک بڑھتی رہتی ہے۔ پھر یہ بتدریج گھٹنے لگتی ہے۔ اور چودہ برس کی عمر میں بالکل جذب ہو جاتی ہے ۔

اگرچہ اس کا فعل بھی تا حال یقینی طور پر معلوم نہیں۔ لیکن خیال کیا جاتا ہے۔ کہ یہ تولید خون میں یعنی خون کے سرخ و سفید دانوں کے بنانے میں مدد دیتی ہے ۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

حرارت بدنیہ

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
بدن کی گرمی	حرارتِ غریزی	اینیمل ہیٹ Animal Heat

انسان کے بدن کی معمولی حرارت منہ۔ مقعد اور اندام نہانی میں ۹۸ سے ۹۹ درجہ تک ہوتی ہے لیکن بغل میں ۹۸ درجہ سے کسی قدر زائد ہوتی ہے۔ بدن کے مختلف حصص میں یہ اختلاف حرارت اگرچہ خون کی مقدار پر موقوف ہے۔ لیکن بعض دیگر اسباب سے بھی اس میں اختلاف واقع ہوتا ہے۔ چنانچہ بوڑھوں کی نسبت جوانوں میں اور جوانوں کی نسبت بچوں میں تقریباً ایک درجہ حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن بچوں اور بوڑھوں میں جوانوں کی نسبت قوتِ تولید حرارت کمزور ہوتی ہے۔ اس لیے وہ سردی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آب و ہوا۔ غذا اور ریاضت کا بھی حرارت بدنیہ پر اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ سرد مقام سے گرم مقام پر جانے سے یا گرم اغذیہ و اشربہ مثلاً گوشت۔ انڈے۔ مٹھائی یا گرم چاء یا قہوہ وغیرہ کھانے پینے سے یا ورزش کرنے سے حرارت جسم ایک دو درجے بڑھ جاتی ہے۔ اور بعض امراض مثلاً کزاز میں بالخصوص بخاروں مثلاً تپ محرقہ وغیرہ میں تو درجہ حرارت اعتدال سے بہت بڑھ جاتا ہے یعنی ۹۸ سے ۱۰۵ یا ۱۰۷ اور کبھی ۱۱۰ درجہ تک بڑھ جاتا ہے۔ اور بعض امراض مثلاً ہیضہ میں حرارتِ جسم اعتدال سے بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مریض کا جسم سرد ہو جاتا ہے۔

پیدائش حرارت۔ نوٹ:۔ حرارت غریزی یا بدن کی اصلی گرمی جو بدن کی اصلاح کرتی اس کو تعفن و فساد سے بچاتی اور تازندگی بدن میں قائم رہتی ہے۔ بقول شیخ و قرشی وغیرہ وہ ایک خاص جوہر حار ہے جو جسم میں جان ڈالے جانے کے وقت قدرت کی طرف سے اس حیوان کو عطا ہوتا ہے اسی جوہر سے جسم میں ہر وقت حرارت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اور دل سے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

بذریعہ شرائین تمام جسم میں پھیلتی رہتی ہے۔ یہ جوہر جوانی تک کم نہیں ہوتا لیکن بعدہٗ بتدریج گھٹتا جاتا ہے۔ اس لیے بڑھاپے میں حرارت بدنیہ کم ہو جاتی ہے۔ اور بالآخر یہ جوہر بالکل کم ہو جاتا ہے تو موت واقع ہوتی ہے لیکن بقول جالینوس یہ حرارت عنصری ناری ہے۔ جو جزآتشی کے امتزاج و اختلاط سے بدن میں خاص درجہ پر پیدا ہوتی ہے اور تا مدت حیات بدن میں قائم رہتی ہے۔ موجودہ علم فزیالوجی یا منافع الاعضاء سے جالینوس کے اس قول کی تائید ہوتی ہے۔ جو کہ درج ذیل ہے۔

جسم میں حرارت کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ چراغ کے جلنے میں کیا حکمت ہے؟ چراغ کے روغن میں جو جلنے والا مادہ (کاربن) ہے۔ وہ بیرونی ہوا کے جزآکسیجن کے ساتھ مل کر جلتا ہے۔ جس سے گرمی اور روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اگر چراغ کو گلاس یا پیالہ سے ڈھانپ دیں۔ تو وہ گل ہو جاتا ہے کیونکہ آکسیجن کا ملنا موقوف ہو جاتا ہے۔ بعینہٖ یہی صورت ہمارے بدن میں ہوتی ہے یعنی آکسیجن جو پھیپھڑوں کے ذریعے ہمارے بدن میں داخل ہوتی رہتی ہے۔ وہ غذا کے اسی طرح مشتعل ہونے والے اجزاء سے جو ہمارے بدن میں موجود ہوتے ہیں۔ مل کر حرارت پیدا کرتی ہے۔ جو بذریعہ خون تمام بدن میں پھیل جاتی ہے گویا جسم میں آکسیڈیشن سے آکسیجن کے اجزاء مشتعلہ کے ساتھ ملنے سے حرارت پیدا ہوتی ہے اور جیسا کہ مذکور ہوا پہلے تو پھیپھڑوں میں آکسیجن کے بخارات دخانیہ کے ساتھ ملنے سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر جب آکسیجن بذریعہ خون اعضاء کی ساخت میں پہنچتی ہے۔ تو اعضاء کی دائمی تحلیل سے جو اجزا مشتعلہ پیدا ہوتے رہتے ہیں ان سے مل کر اشتعال پیدا کرتی ہے۔ جس سے بدن میں حرارت و قوت پیدا ہوتی ہے لیکن حرارت بدنیہ زیادہ تر عضلات جسم میں پیدا ہوتی ہے کیونکہ عضلات سارے جسم کے تقریباً نصف وزن کے برابر ہوتے ہیں۔ اس لیے اُن میں آکسیجن زیادہ صرف ہوتی ہے۔ اور حرارت زیادہ پیدا ہوتی ہے بالخصوص جب کہ وہ زیادہ حرکت کرتے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ورزش

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کرنے یا بھاگنے سے حرارتِ جسم بڑھ جاتی ہے۔ عضلات کے بعد جگر اور جسم کے دیگر غدد مفرزہ میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔

اعتدال حرارت اگرچہ جلد اور تنفس وغیرہ کے ذریعے حرارت جسم برابر خارج ہوتی رہتی ہے۔ اور سردی کا اثر بھی بیرونی حصّہ جسم پر ہوتا ہے۔ وغیرہ لیکن باوجود ان باتوں کے حرارت بدنیہ ہمیشہ اعتدال پر قائم رہتی ہے یعنی ۳۷ درجہ (سینٹی گریڈ تھرمامیٹر) یا ۹۸½ درجہ (فارن ہائیٹ تھرمامیٹر) اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا یہ سبب ہے کہ جس طرح سے حرارت برابر پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح سے وہ برابر خرچ بھی ہوتی رہتی ہے۔ پس اس درجہ سے وہ اعتدالی حالت پر قائم رہتی ہے حرارت بدنیہ زیادہ تر بذریعہ جلد خارج ہوتی رہتی ہے کیونکہ ہمارے جسم سے نکل کر آفتاب کی شعاع کی مانند برابر چاروں طرف پھیلتی رہتی ہے۔ اور جو سرد چیزیں ہمارے جسم سے ملاقی ہوتی ہیں۔ وہ بھی حرارت کو جذب کر لیتی ہیں۔ یا حرارت ان میں منتقل ہو جاتی ہے۔ نیز بذریعہ بخارات و پسینہ خارج ہوتی ہے اسی طرح بذریعہ تنفس اور دیگر فضلات مثلاً بول و براز کے ساتھ بھی حرارت بدنیہ خارج ہوتی ہے۔ لیکن زیادہ تر بذریعہ جلد ہی خارج ہوتی ہے اس لیے حفظ حرارت بدنیہ میں جلد کو نہایت اہمیت ہے اور اس کے بعد ہوائی نالیوں کو۔

حفظ حرارت۔ حفظ حرارت بدنیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اعتدال پر قائم رہے کم و بیش نہ ہو پس اس مقصد کے لیے غذا و لباس میں تغیر و تبدل کیا جاتا ہے بیرونی گرمی سردی سے فائدہ اُٹھایا جاتا ہے۔ مثلاً سردی میں گرما غذایہ کھاتے اور گرم لباس پہنتے ہیں۔ دھوپ یا آگ سینکتے ہیں وغیرہ اور گرمی میں اس کے برخلاف کرتے ہیں۔

حرارت بدنیہ کے اعتدال پر قائم رہنے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ بدن میں گرم خون موجود رہے۔ اور دوسرے یہ کہ خون کا دورہ جسم میں جاری رہے۔ تاکہ حرارت جسم بدستور قائم رہے۔ خون

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جب جلد میں جاتا ہے تو وہ کسی قدر سرد ہو جاتا ہے اور جب جگر میں جاتا ہے تو کسی قدر گرم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب پھیپھڑوں میں صاف ہو کر دل کے بائیں بطن میں جاتا ہے۔ تو اس کی حرارت میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ جلد کو حفظ حرارت بدنیہ میں نہایت اہمیت ہے اس لیے جلد بھی حرارتِ جسم کو اعتدال پر قائم رکھتی ہے اور وہ اس طرح سے کہ ایک تو اس کی وسیع سطح سے شعاع کی مانند چاروں طرف حرارت پھیلتی رہتی ہے اور سرد اجسام اس سے ملاقی ہوتے ہیں۔ ان میں بھی حرارت منتقل ہو جاتی ہے۔ اور بشکل بخارات بھی خارج ہوتی رہتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جلد میں خون کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے۔ جس میں حسب حاجت حرارت کے کم وبیش خرچ ہونے کے لیے مختلف تغیرات پیدا ہوتے ہیں چنانچہ گرمی میں جب اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ حرارت جسم کم ہو جائے تو گرمی کے اثر سے جلد کی شرائین پھیل جاتی ہیں۔ اور وہ خون سے بھر جاتی ہیں۔ جس سے جلد کی حرارت بڑھ جاتی ہے اور پسینہ بکثرت خارج ہوتا ہے جس سے حرارتِ جسم کم ہو جاتی ہے اور برخلاف ازیں جب سردی ہوتی ہے۔ تو جلد کی شرائین سکڑ کر اس میں خون کی مقدار کو کم کر دیتی ہے۔ اور مسامات بند ہو کر پسینہ و بخارات بند ہو جاتے ہیں جس سے حرارتِ جسم بہت بہت کم ضائع ہوتی ہے۔ پس اس طرح سے جلد حفظ حرارت بدنیہ کرتی اور اسے اعتدال پر قائم رکھتی ہے لیکن جلد کا یہ فعل چونکہ اعصاب محرکہ عروق کے تابع ہے۔ اس لیے حرارت بدنیہ کے درجہ اعتدال پر قائم رکھنے میں درحقیقت اعصاب کو بھی بڑا دخل ہے۔

اعصاب کا تعلق حرارت بدنیہ سے۔ اعصاب کے ذریعے جسم کی حرارت درجہ اعتدال پر قائم رہتی ہے۔ جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب کسی عضو کے عصب کو کاٹ دیا جاتا ہے تو اس عضو کی حرارت نمایاں طور پر کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہاتھ پاؤں کے اعصاب کے کاٹ دینے کے بعد یا ان کے مفلوج ہو جانے کے بعد ان کی حرارت بہت کم ہو جاتی ہے دوم یہ کہ جب

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

موت عصبی مرکز کے کسی بڑے صدمہ یا اُن کے اخراج سے واقع ہوتی ہے۔ تو حرارت بدنیہ بہت جلد گھٹ جاتی ہے انفعلات نفسانیہ میں مثلاً غصّہ و خوشی کی حالت میں چہرہ سُرخ و گرم ہو جاتا ہے اور خوف و دہشت کی حالت میں زرد و سرد ہو جاتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حرارت بدنیہ کی پیدائش میں اعصاب کا تعلق ہے۔ چنانچہ جب کسی حصّہ جسم میں حرارت عارضی طور پر بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کا بڑا سبب یہ ہوتا ہے۔ کہ اس حصّہ جسم کی چھوٹی شرائین اعصاب محرکہ عروقی (ویسیو موٹر نروز) کے اثر سے پھیل جاتی ہیں۔ جس وجہ سے ان میں خون زیادہ جاتا ہے جیسا کہ غصّہ میں چہرہ سُرخ ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی حصّہ جسم میں حرارت عارضی طور پر گھٹ جاتی ہے۔ تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے۔ کہ اس کی چھوٹی شرائین سکڑ جاتی ہیں۔ جس وجہ سے اُن میں خون کم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ خوف میں چہرہ زرد ہو جاتا ہے پس اعصاب محرکہ عروقی ہی چھوٹی شرائین کے منافذ کو حسب ضرورت تنگ یا کشادہ کر کے ان تغیرات کا باعث ہوتے ہیں۔ اور اگرچہ ان اعصاب کا تعلق نخاع سے ہوتا ہے لیکن ان کا مرکز محرک عروقی (ویسیو موٹر سینٹر) میڈلاً ابلانگیٹا یا نخاع مستطیل ہوتا ہے۔

اعضاءِ غذا دو، ہضم غذا

نوٹ:۔ اعضاء ہضم دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اصلی دوسرے اضافی چنانچہ منہ و حلق و مری اور بالخصوص معدہ و آنتیں (جن کو بہ حیثیت مجموعی ہاضمہ کی نالی کہتے ہیں) اصلی اعضاء ہضم ہیں۔ اور دانت و غدد لعابیہ و جگر و تلی و لبلبہ اضافی اعضاء ہضم ہیں۔ اب ان سب کا ترتیب وار بیان کیا جاتا ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

غذا کی نالی

اردو نام	طبی نام	انگریزی نام
غذا کی نالی	مجریٔ غذا	Allimentary Ganal

یہ ایک عضلی غشائی نالی ہے۔ جو منہ سے لے کر مقعد تک لمبی ہوتی ہے اس کا طول قریب تیس فٹ کے ہوتا ہے۔ اور اس کے مختلف حصوں کے مختلف نام ہیں جن کا ذکر ذیل میں ترتیب وار کیا جاتا ہے۔

منہ

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
منہ	فم	Mouth مُوتھ

منہ تقریباً بیضوی شکل کا جوف ہے جس کے اندر زبان اور دانت ہوتے ہیں۔ اس کے سامنے دونوں لب دونوں جانب ہر دو رخسارے وغیرہ اوپر سخت تالو اور بالائی جبڑے کے دانت نیچے زبان اور زیرین جبڑے کی اندرونی سطح ہوتی ہے پیچھے نرم تالو اور حلق اس جوف کو بلغمی جھلی (غشاء مخاطی) استر کرتی ہے۔ جو سامنے لبوں کی جلد سے اور پیچھے حلق کی لعاب دار جھلی سے ملی رہتی ہے۔ زندگی میں اس جھلی کا رنگ گلابی ہوتا ہے۔

نوٹ:۔ عام طور پر دونوں لبوں کے درمیانی سوراخ کو دہن یا منہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ درحقیقت سوراخ دہن یعنی منہ کا سوراخ ہے اور دہن یا منہ وہ جوف ہے۔ جس میں زبان اور دانت وغیرہ رہتے ہیں۔ اس کو جوف دہن کہتے ہیں۔ یہ جوف دہن لبوں سے لے کر زبان کی جڑ تک ہوتا ہے۔ جہاں پر غذا اور ہوا کے گذرنے کے لیے ایک تنگ سوراخ ہوتا ہے جس کو عربی میں حلقوم اور انگریزی میں فاینس کہتے کہتے ہیں۔ یہ تنگ سوراخ یا حلقوم درحقیقت سوراخ حلق یعنی گلے کا سوراخ ہے۔ کیونکہ اس سے اگلے جوف کو جمہور متقدمین اطباء

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

حلق (گلا) اور جدید اطباءِ مصر بلعوم کہتے ہیں۔ گویا لبوں کا درمیانی سوراخ سوراخ دہن ہے۔ اس سوراخ دہن سے لے کر زبان کی جڑ تک جوف دہن ہے۔ پھر حلقوم یا سوراخ حلق ہے اور اس سے آگے حلق یا بلعوم یعنی گلا، ہے۔

انتباہ:۔ جدید اطباءِ مصر حلقوم کو حلق یا فم حلقی بھی کہتے ہیں۔ اور اس سے اگلے جوف یعنی گلے یا حلق کو بلعوم کہتے ہیں۔

ہونٹ

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
ہونٹ۔ لب	شفت	لپ Lip

ہونٹ یا لب دو ہوتے ہیں۔ جو منہ کے جوف کو گھیرتے ہیں ان کی ساخت میں باہر جلد اندر بلغمی جھلی۔ درمیان میں عضلات وعروق واعصاب وغشاء الحاقی وچربی اور چھوٹے چھوٹے غدد ہوتے ہیں۔ ہر ایک لب اپنی اندرونی سطح پر درمیان میں بلغمی جھلی کی ایک چنٹ کے ذریعے مسوڑھوں سے جڑا رہتا ہے۔ بالائی لب کی چنٹ کو قید شفوی علیٰ اور زیرین کو قید شفوی اسفل اور انگریزی میں فرینا لیبی ادم کہتے ہیں

رُخسار

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
گال۔ رخسار	عارض۔ خدان	چیک چیکس Cheeks

دونوں رخسار منہ کے جوف کے دونوں جانب دیوار بناتے اور سامنے کی طرف لبوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ان کی ساخت میں بھی باہر جلد اندر بلغمی جھلی (میوکس ممبرین) اور درمیان میں عضلات۔ بہت سی چربی وعروق وغدد وغیرہ ہوتے ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مسوڑھے

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
مسوڑھے	لثہ۔ لثات	گم۔ گمز Gums

گلابی رنگ کی یہ بلندیاں دانتوں کے گرد پائی جاتی ہیں ان کی ساخت میں ریشہ دار مادہ ہوتا ہے ان پر بھی لعابدار جھلی لگی رہتی ہے۔

دانت

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
دانت	سن۔ اسنان	ٹوتھ ٹیتھ Tooth Teath

دانت دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک دُودھ کے دانت یا بچوں کے دانت اور دوسرے مستقل دانت یا دائمی دانت دُودھ کے دانت اسنان لبنیہ ملک تیتھ Milk Teeth دودھ کے دانت۔ جن کو بچوں کے دانت بھی کہتے ہیں۔ یہ بچپن کے زمانہ میں پیدا ہو کر گر جاتے ہیں۔ یہ دائمی دانتوں سے چھوٹے مگر شکل میں ان سے مشابہ ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد کل بیس ۲۰ ہوتی ہے۔ اور ہر ایک جبڑے میں دس دس ہوتے ہیں۔ بچوں میں نیچے کے دانت اُوپر کے دانتوں کی نسبت عموماً پہلے نکلا کرتے ہیں۔ چنانچہ۔

اُردو	عربی	انگریزی	تعداد	مدت نکلنے کی
کاٹنے والے (درمیانی) ثنایا		مڈل انسائزرز۔	۲ نیچے ۲ اُوپر	۶ ماہ سے ۷ ماہ تک نکلتے ہیں
کاٹنے والے (جانبی) رباعیات		لیٹرل انسائیزرز	۲ ۲	۷ ماہ سے ۱۰ ماہ تک
اگلی داڑھیں	اضراس	مولر	۴ ۴	۱۲ ماہ سے ۱۴ ماہ تک
کچلیاں	انیاب	کینائن	۲ ۲	۱۴ ماہ سے ۲۰ ماہ تک
پچھلی داڑھیں	اضراس	مولر	۴ ۴	۱۷ ماہ سے ۲۵ ماہ تک

چھ برس کی عمر کے بعد دُودھ کے دانت گرنے لگتے ہیں۔ اور اُن کی بجائے دائمی نکلنے لگتے ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

دائمی دانت اَسنان دائمہ پرمے نینٹ ٹیتھ Permanent Teeth

دائمی دانت - دودھ کے دانت کے بعد ان کی بجائے پیدا ہوتے ہیں اور بڑھاپے تک رہتے ہیں۔ ان کی تعداد بالعموم بتیس ۳۲ ہوتی ہے۔ لیکن بعض لوگوں میں دو چار عقل ڈاڑھیں نہیں نکلتیں ایسی صورت میں ان کی تعداد ۲۸ یا ۳۰ ہوتی ہے۔

ہر ایک جبڑے کے وسط میں دو دانت درمیانی اور دو ان کے جانبی چار کاٹنے والے دانت ہوتے ہیں جانبی دانتوں کے بعد کچلیاں یا کیل ہوتے ہیں۔ جو چیرنے اور سخت چیزوں کو توڑنے کا کام دیتے ہیں۔ ان کے بعد ہر ایک جبڑے میں پانچ اِدھر اور پانچ اُدھر کل دس ڈاڑھیں ہوتی ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی عقل ڈاڑھیں نہیں نکلتیں ان میں بجائے پانچ پانچ کے چار چار ڈاڑھیں ہوتی ہیں۔

ہر ایک دانت کے تین حصے ہوتے ہیں (۱) سر (باڈی) جو مسوڑھے سے باہر نکلا رہتا ہے (۲) جڑ (روٹ) جو جبڑے کے سوراخ میں گڑی رہتی ہے (۳) گردن (نیک) جو سر اور جبڑے کے درمیان تنگ حصہ ہوتا ہے۔ درمیانی اور جانبی دانتوں نیز کچلیوں میں سے ہر ایک کی ایک ایک جڑ ہوتی ہے۔ مگر آٹھ اگلی ڈاڑھوں میں ہر ایک کی دو جڑیں اور آٹھ پچھلی ڈاڑھوں میں سے ہر ایک کی دو سے پانچ جڑیں ہوتی ہیں۔

سات برس کی عمر میں دودھ کے دانت گرنے لگتے ہیں۔ اور ان کی بجائے دائمی دانت نکلنے لگتے ہیں۔ اور پچیس برس کی عمر تک سارے دانت حسب ذیل طریق سے نکل آتے ہیں۔ ہر ایک جبڑے میں سولہ دانت ہوتے ہیں۔ یعنی درمیان سے آٹھ دائیں طرف اور آٹھ بائیں طرف پس ہر ایک جبڑے میں ایک ایک قسم کے دو دانت ہوتے ہیں۔ اور دونوں جبڑوں میں چار چار یعنی دو اُوپر اور دو نیچے سب دانتوں کے اُردو عربی اور انگریزی نام وغیرہ حسب ذیل ہیں۔

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام	تعداد	نکلنے کی مدت
کاٹنے والے (درمیانی)	ثنایا (ثنیہ)	مڈل اِنسائزرز	۴	سے سات برس تک کل نکل آتے ہیں

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام	تعداد	نکلنے کی مدت
کاٹنے والے (جانبی)	رباعیات (رباعیہ)	لیٹرل انسائزرز	۴	سے آٹھ برس تک نکل آتے ہیں۔
چھوٹی ڈاڑھیں	اضراس (ثنائیہ وثلاثیہ)	بائی کسپڈ	۸	دس گیارہ
کچلیاں (دندان نیش)	اَنیاب (کواسر)	کے نائن	۴	بارہ
بڑی ڈاڑھیں	اضراس		۸	پندرہ
عقل ڈاڑھیں	اضراس الحکم (نواجذ)	ذرڈم مینچ	۴	اٹھارہ سے پچیس

فوائد دندان۔ دانتوں سے غذا چبائی جاتی ہے کبھی کاٹنے کترنے کا کام لیا جاتا ہے۔ بات چیت میں ان سے خوبی حاصل ہوتی ہے لعاب دہن روکنے میں ممد ہوتے ہیں۔ چہرے کی زیب وزینت ہیں۔

حفاظتِ دندان۔ دانتوں کو نرم تازہ صاف مسواک یا منجن وغیرہ سے صاف رکھنا چاہیے۔ کھانے کے بعد خلال کرنا اور خوب کلی کرنا چاہیے۔ زیادہ سرد اشیاء مثلاً برف سے اور زیادہ گرم غذا کھانے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زیادہ ترش چیزوں کے کھانے سے دانت کند ہو جاتے ہیں۔ اور پان میں زیادہ چونہ کھانے سے بھی دانت خراب ہو جاتے ہیں دانتوں کو صاف رکھنے سے وہ بوسیدہ نہیں ہوتے دانتوں کو مضبوط رکھنے سے ہاضمہ قوی اور صحت عمدہ رہتی ہے۔

زبان۔ اس کا بیان دیکھو حواس خمسہ میں۔

تالو

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
تالو	حَنَک	پے لیٹ palate

تالو جوف دہن کی چھت بناتا ہے۔ اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ اگلا حصہ سخت تالو اور پچھلا حصہ نرم تالو کہلاتا ہے۔ سخت تالو کی بناوٹ میں بالائی جبڑے کی ہڈیوں کے حصے اور تالو کی دو ہڈیاں ہوتی ہیں۔ اس کی شکل محراب دار ہوتی ہے۔ اس کی سطح پر بھی بلغمی جھلی لگی رہتی ہے۔ جس کے نیچے تالو

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کے غدد ہوتے ہیں۔ سخت تالو کو عربی میں حنک صلب اور انگریزی میں ہارڈ پیلیٹ کہتے ہیں۔ نرم تالو سخت تالو کے نیچے ایک متحرک نامکمل پردہ ہے جو جوف دہن اور حلق کے درمیان حائل رہتا ہے۔ اس کو عربی میں حنک لین اور انگریزی میں سافٹ پیلیٹ کہتے ہیں۔ اس کی ساخت میں بھی بلغمی جھلی عضلاتی ریشے۔ عروق و اعصاب اور غدد وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ اس کی اگلی سطح منہ کی چھت کے ساتھ پچھلی سطح ناک کی غار کے ساتھ اور دونوں پہلو بلعوم کے ساتھ ملے رہتے ہیں۔ اس کے نچلے آزاد کنارے کے وسط میں انگور کی شکل کی ایک چھوٹی سی بلندی ہوتی ہے جسے عربی میں لہات اور انگریزی میں یوُدولا اور اُردو میں کوا کہتے ہیں۔ اس کوّے کی جڑ کے دونوں پہلوؤں پر عضلاتی وغشائی دو دو محرابی لمبی چنٹیں نیچے کو جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ جن کو حلقوم کے اگلے اور پچھلے ستون کہتے ہیں حلقوم کے اگلے ستون کو عربی میں قائمہ مقدمیہ اور انگریزی میں انٹیریئر پلر اور پچھلے ستون کو قائمہ موخرہ اور پوسٹیریئر پلر آف دی فاسیز کہتے ہیں۔ اور اکثر اطباء ان دونوں ستونوں کو غلصمہ بھی کہتے ہیں۔ اور دونوں جانب کے ان ستونوں کی درمیانی فضاء یا سوراخ کو جو جوف دہن اور جوف حلق کے درمیان مثلِ برزخ کے واقع ہے۔ عربی میں حلقوم یا برزخ الحلقوم اور انگریزی میں فاسیز کہتے ہیں۔

لبّے

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
لبّے	لوزتین	ٹان سیلز Tonsils

نوٹ:۔ لوزتین تثنیہ ہے لوزہ کا جس کے معنی ہیں بادام چونکہ ان غدد کی شکل بادام کی سی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کا نام لوزتین رکھا گیا۔ اُردو میں اُن کو لبّے کہتے ہیں۔ جب یہی گلٹیاں ورم کر جاتی ہیں تو گلے پڑ جاتے ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

یہ بادامی شکل کی دو گلٹیاں ہیں۔ جو حلقوم کے اگلے اور پچھلے ستون یا غلصمہ کے درمیان ہوتی ہیں اُن کی اندرونی سطح پر بارہ یا پندرہ سوراخ ہوتے ہیں۔ جن کے اختتام پر چھوٹی چھوٹی بند تھیلیاں ہوتی ہیں۔ جن میں ایک لعابی رطوبت بھری رہتی ہے۔ اور مذکورہ سوراخوں کے ذریعے خارج ہوتی ہے چونکہ اس گلٹی کے پیچھے اور اندر کی طرف کان کی نالی نفنغ کا سوراخ کھلتا ہے۔ اس لیے ان گلٹیوں کے متورم ہو جانے یا بڑھ جانے سے عموماً ثقلِ سماعت کی شکایت ہو جاتی ہے۔

تھوک کی گلٹیاں

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
تھوک کی گلٹیاں	غُدد لُعابیہ	سلائوری گلینڈز Salivary Glands

چھوٹی چھوٹی گلٹیوں کے سوا لعاب یا تھوک پیدا کرنے والی بڑی بڑی گلٹیاں منہ میں تین جوڑے ہیں یعنی ہر جانب تین تین گلٹیاں ہیں۔ جن میں سے ایک کان کے سامنے اور ایک جبڑے کے نیچے اور ایک زبان کے نیچے ہوتی ہے

۱۔ زبان کی نچلی گلٹی۔ غُدۂ تحت اللسان سب لنگوئل گلینڈ Sublingual Glands

یہ گلٹیاں بھی تعداد میں دو ہوتی ہیں۔ اور سامنے کے دانتوں کے پیچھے زبان کے نیچے واقع ہوتی ہیں۔ ہر ایک گلٹی وزن میں تقریباً ایک ڈرام (۳ ماشہ) اور شکل میں بادام کی مانند ہوتی ہے۔ اس کی بالائی سطح پر بلغمی جھلی لگی رہتی ہے۔ جس میں اس گلٹی کی آٹھ یا دس نالیاں ختم ہوتی ہیں۔ انہیں نالیوں کے ذریعے ان گلٹیوں سے تھوک باہر آتا ہے۔

۲۔ جبڑے کی نچلی گلٹی۔ غُدۂ تحت الفک سب مگزلری گلینڈ

Submaxillary Glands

یہ گلٹیاں بھی تعداد میں دو ہوتی ہیں۔ اور زیریں جبڑے کے نیچے گردن

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

میں درمیانی خط سے ایک دائیں طرف اور دوسری بائیں طرف رہتی ہے۔ ہر ایک گلٹی وزن میں دو ڈرام (۷ ماشہ) ہوتی ہے ہر ایک گلٹی کی تقریباً دو انچ لمبی نالی ہوتی ہے جو اس سے شروع ہو کر زبان کے نیچے جا کر ختم ہوتی ہے۔ یہ گلٹیاں بھی تھوک پیدا کرتی ہیں۔

۳۔ کان کی گلٹی۔ غدہ خلف الاذن پیراٹڈ گلینڈ

تصویر غدد جاذبہ

اس تصویر میں نیچے کا جبڑا کاٹ کر تینوں قسم کے غدد لعابیہ دکھائے گئے ہیں (۱) زبان کی نچلی گلٹی (۲) جبڑے کی نچلی گلٹی (۳) کان کی گلٹی

نوٹ:۔ اگرچہ اس گلٹی کا بیشتر حصہ کان کے سامنے اور پیچھے واقع ہے اور کان کے پیچھے اس کا کمتر حصہ ہوتا ہے۔ مگر پرانی طبی کتب میں اس کا نام غدہ خلف الاذن لکھا ہے۔ جدید کتب طبیہ عربیہ میں اس کو غدہ اذنیہ۔ غدہ الاذن۔ غدہ اصل الاذن اور غدہ نکفیہ کے ناموں سے بھی لکھا ہے کنپٹیوں کی بیماری انہیں گلٹیوں کے متورم ہونے سے ہو جایا کرتی ہے۔

یہ گلٹیاں بھی تعداد میں دو ہوتی ہیں۔ ہر ایک گلٹی اپنی اپنی طرف کے کان سے نیچے اور سامنے رہتی ہے۔ زبان اور جبڑے کے نیچے والی گلٹیوں کی نسبت یہ گلٹیاں بڑی ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایک گلٹی کا وزن نصف سے ایک اونس تک ہوتا ہے۔ ہر ایک گلٹی کی ایک نالی ہوتی ہے۔ جو قریباً اڑھائی انچ لمبی ہوتی ہے۔ اور گلٹی سے شروع ہو کر اوپر کے جبڑے کی دوسری ڈاڑھ کے برابر ختم ہوتی ہے۔ اس نالی کا خول لطیخ کے پر کے خول کے برابر ہوتا ہے۔ یہ گلٹیاں بھی تھوک پیدا کرتی ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
تھوک	ریق۔ لُعاب	سلائوا Saliva

تھوک کے فوائد:۔ تھوک جو مذکورہ بالا تینوں غدودوں سے پیدا ہو کر منہ میں تراوش پاتا ہے یہ (۱) لقمہ کو نرم کر کے چبانے میں مدد دیتا ہے (۲) لقمہ کو لیسدار بنا کر نگلنے میں مدد دیتا ہے۔ (۳) غذا کو تحلیل کر کے اس قابل بنا دیتا ہے۔ کہ منہ میں اس کا ذائقہ محسوس ہو سکے (۴) زبان اور منہ کو تر رکھتا ہے۔ تاکہ تکلم میں آسانی ہو۔ لیکن اس کا اہم ترین فعل یہ ہے کہ یہ غذا کے نشاستہ کے ساتھ مل کر اس کو ایک قسم کی شکر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جس کو مالٹوز (شکر شعیری یعنی ایسی شکر جو جَو یا نشاستہ غذا سے بنتی ہے) کہتے ہیں کہ جب آدمی روٹی کا لقمہ منہ میں چباتا ہے تو لُعاب دہن کی تاثیر سے لقمہ کے اجزاء نشاستہ شکر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جس سبب سے اس کا ذائقہ قدرے شیریں معلوم ہوتا ہے۔ اچھی طرح سے چبا کر کھائی ہوئی غذا جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ تھوک یا لعاب کے اس جوہر کو جو نشاستہ شکر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ انگریزی میں ماٹلین اور عربی میں لعابین کہتے ہیں۔ جو درحقیقت ایک قسم کا فرمنٹ یعنی خمیر ہے۔ جو نشاستہ کے ساتھ مل کر اُسے اس قابل بنا دیتا ہے۔ کہ وہ مٹھاس میں تبدیل ہو کر کیلوس کے ساتھ خون میں شریک ہو جائے۔ لعاب دہن بالا وسط جو بیس گھنٹے کے عرصہ میں تقریباً سوا سیر سے دو سیر تک خارج ہوتا ہے۔

حلق

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
گلا	حلق۔ بلعوم	فے رنکس Pharynx

حلق عضلات اور جھلیوں کا بنا ہوا غذا کی نالی کا وہ حصّہ ہے جو ناک منہ اور حنجرہ کے پیچھے واقع ہوتا ہے۔ اس کا بالائی چوڑا سرا کھوپری کے پیندے کے ساتھ اور زیریں سرا گردن کے پانچویں مہرے کے برابر مری

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سے ملا رہتا ہے۔ اس کی طوالت ½ ۴ انچ ہوتی ہے۔ اس کے جوف میں سات سوراخ ہوتے ہیں۔ دو ناک کے نتھنوں کے پچھلے سوراخ۔ دو کان کی نالیوں کے سوراخ، ایک حلقوم کا سوراخ۔ ایک مری کا سوراخ اور ایک حنجرہ کا سوراخ ؛

نوٹ :۔ متقدمین اطباء تو گلے کو حلق لکھتے ہیں۔ لیکن جدید اطباء مصر وغیرہ گلے کو بلعوم لکھتے ہیں ؛

غذا کی نالی	مری	ایسافے گس Oesaphagus

یہ نالی ۹ انچ لمبی اور حلق سے شروع ہو کر گردن میں ہوا کی نالی کے پیچھے اور نیچے کو جا کر مہروں کے ستون کے سامنے حجاب حاجز کے سوراخ سے گزر کر پشت کے دسویں مہرے کے مقابل معدے کے بالائی سوراخ میں ختم ہوتی ہے۔ اس کی ساخت میں تین طبق ہوتے ہیں۔ بیرونی طبق عضلاتی ریشوں کا درمیانی طبق خانہ دار جھلی کا اندرونی طبق بلغمی جھلی کا۔ اس کے اندرونی طبق کے نیچے بے شمار غدد ہوتے ہیں۔ جو اپنی لیسدار رطوبت سے اس کو تر رکھتے ہیں۔

پیٹ

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
پیٹ	بطن۔ شکم فارسی	ایب ڈومن Abdomen

شکم یا پیٹ بدن انسان میں سب سے بڑا بیضوی جوف ہے۔ جس میں اعضاء غذا و ہضم وغیرہ مثلاً معدہ۔ آنتیں۔ لبلبہ۔ جگر۔ تلی اور گردے وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس کے سامنے عضلات شکم دونوں جانب زیریں پسلیاں پیچھے پشت کے مہرے وغیرہ اوپر کی جانب حجاب حاجز یا دیافرغما۔ نیچے کی طرف جوف عانہ یا پیڑو کی بالائی حد یعنی دائرہ ہوتا ہے۔

پیٹ میں مندرجہ ذیل چھ سوراخ ہوتے ہیں۔ (۱) ناف کا سوراخ جس کی راہ جنین میں ناف کی شریان اور ورید گزرتی ہیں۔ (۲) جوف کا سوراخ جو

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

حجاب حاجز میں ہوتا ہے۔ اور اس کی راہ اجوف نازل گزرتی ہے (۲) شریان اعظم کا سوراخ۔ یہ بھی حجاب حاجز میں ہوتا ہے۔ اس کی راہ شریانِ اعظم ورید فرد اور مجری صدر گزرتے ہیں (۴) مری کا سوراخ یہ بھی حجاب حاجز میں ہوتا ہے۔ اس کی راہ مری اور عصب رئوی گزرتے ہیں (۵-۶) شکم کے نچلے حصّہ میں دو سوراخ ہوتے ہیں جن کی راہ مردوں میں ران کی شریان اور خصیہ کی ڈوری اور عورتوں میں رباط مستدیر (راؤنڈ لگیمنٹ) گزرتا ہے۔

پیٹ کے حصّے

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
پیٹ کے حصّے	اقسام البطن	ایب ڈومی نل
		Abdominal

تاکہ اعضاء شکم کی وضع بحالت صحت بہ سہولت بیان کی جا سکے اطباء مشرحین نے جوف شکم کو چند حصّوں میں تقسیم کر کے مخصوص ناموں سے نامزد کر دیا ہے چنانچہ دو آڑے دو سیدھے خطوط کے ذریعے پیٹ کو نو حصّوں میں تقسیم کیا ہے جس کی صورت یہ ہے کہ پہلا آڑا خط ایک طرف کی آٹھویں پسلی کے بلند مقام سے شروع کر کے دوسری طرف کی آٹھویں پسلی کے بلند مقام تک کھینچا جائے۔ اور دوسرا آڑا خط کولھے کے دائیں جانب کے بلند مقام سے شروع کر کے کولھے کے بائیں جانب کے بلند مقام

تصویر پیٹ کے حصّے



(۱) معدے کے اوپر کا مقام (۲) دائیاں کُریوں کے نیچے کا مقام (۳) بایاں کُریوں کے نیچے کا مقام (۴) ناف کا مقام (۵) دایاں کمر کا مقام (۶) بایاں کمر کا مقام (۷) پیڑو کا مقام (۸) دایاں چڑے کا مقام (۹) بایاں چڑے کا مقام

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تک کھینچا جائے تو اس سے شکم کے بالائی درمیانی اور زیرین تین حصے ہو جاتے ہیں۔ باقی دو سیدھے یا کھڑے خطوط ہر ایک جانب کی آٹھویں پسلی کی کری سے شروع کر کے کنج ران کے درمیانی نقطہ تک کھینچے جائیں۔ تو شکم کے مذکورہ بالا تینوں حصے تین تین حصوں منقسم ہو کر نو حصے بن جاتے ہیں جن میں ایک حصہ وسطی اور دو حصے جانبی ہوتے ہیں۔ ان مخصوص اقسام شکم کے نام و مقام بمعہ ان کے مشمولات کے حسب ذیل ہیں۔

اس جدول میں تشریحی اقسام بطن اور انکے مشمولات لکھے گئے ہیں جنکو سمجھ کر یاد کر لینا تشخیص امراض میں نہایت مفید ہے

(۳) بایاں کریونکے نیچے کا مقام قسم تحت الغضاریف الیسر لیفٹ ہائپو کانڈریک ریجن	(۱) معدہ کے اُوپر کا مقام قسم فوق المعدہ ایپی گیسٹرک ریجن	(۲) دایاں کریونکے نیچے کا مقام قسم تحت الغضاریف ایمن رائٹ ہائپو کانڈریک ریجن
اس مقام میں قم معدہ۔ تلی یا نفراس کا سرا قولون کا طحال خم۔ بائیں گردہ کا نصف بالائی حصہ اور کلاہ گردہ اور کبھی کبھی بحالت مرض جگر کا بالائی لوتھڑا ہوتے ہیں۔	اس مقام میں معدہ کا درمیانی حصہ بواب جگر کا بایاں زائدہ اور زائدہ مثلثہ عروق جگر۔ یا نفراس۔ شریان اعظم اور اجوف کا کچھ حصہ۔ ورید فرد اور مجری صدر ہوتے ہیں۔	اس مقام میں جگر کا دایاں زائدہ مرارہ یعنی پتا۔ بارہ انگشتی آنت رودۂ قولون کا جگری خم دائیں گردہ کا بالائی حصہ اور کلاہ گردہ ہوتے ہیں۔
(۶) بایاں کمر کا مقام قسم قطنی ایسیر لیفٹ لمبر ریجن	(۴) ناف کا مقام قسم سری امبلائکل ریجن	(۵) دایاں کمر کا مقام قسم قطنی ایمن رائٹ لمبر ریجن
اس مقام میں قولون کا	اس مقام میں قولون کا اڑا حصہ آنتوں	اس مقام میں قولون کا چڑھتا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اُترنے والا حصہ بائیں گردہ کا لیسدار حصہ۔ پیچدار آنت کے کچھ پیچ ہوتے ہیں۔	پر کے جریلے پردے اور ماسا ریقا کا کچھ حصہ انگشتی آنت کا آڑھا حصہ خالی اور پیچ دار آنت کے کچھ پیچ ہوتے ہیں	والا حصہ دائیں گردہ کا زیریں حصہ پیچدار آنت کے کچھ پیچ ہوتے ہیں۔
(۹) بایاں چڑے کا مقام قسم اُربی ایسر لیفٹ انگوئی نل ریجن اس مقام میں قولون کا سینی خم یعنی وہ خم دار حصہ جو بائیں طرف رددہ مستقیم سے ملتا ہے حالب اور منی کی نالی ہوتی ہے۔	(۷) پیڑو کا مقام قسم کشلی ہائپوگیسٹرک ریجن اس مقام میں پیچدار آنت کے پیچ بچوں میں مثانہ جوانوں میں جب کہ مثانہ پیشاب سے پُر ہو عورتوں میں ایام حمل میں رحم ہوتا ہے۔	(۸) داہاں چڑے کا مقام قسم اُربی ایمن رائٹ انگوئی نل ریجن اس مقام میں اعور یعنی کانی آنت اور اُس کا زائدہ۔ حالب یعنی گردہ و مثانہ کی درمیانی نالی منی کی نالی قولون کا چڑھنے والا کچھ حصہ ہوتا ہے

معدہ

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
معدہ	معدۃ	سٹامک Stomach

معدہ جس میں غذا جاکر ہضم ہوتی ہے۔ غذا کی نالی کا سب سے زیادہ فراخ حصہ ہے۔ اس کی شکل مشک کی سی ہوتی ہے۔ اور یہ پیٹ کے بالائی اور وسطی حصے میں تقریباً عمودی طور پر واقع ہے۔ اس کا چوڑا اور گول سرا بائیں جانب حجاب حاجز سے نیچے تلی کی طرف کو ہوتا ہے۔ لیکن اس کا لمبا سرا دائیں طرف جگر کی زیریں سطح کے نیچے ہوتا ہے۔ معدہ تقریباً بارہ سے پندرہ انچ لمبا چار انچ چوڑا اور خالی حالت میں تقریباً ساڑھے چار اونس یا بارہ تولہ وزن میں ہوتا ہے۔ اس میں دو سرے۔ دو سوراخ۔ دو کنارے اور دو سطحیں ہوتی ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

بایاں سرا طرف طحالی۔ (پیلنک اینڈ) نہایت کشادہ اور مری کی جائے اختتام سے دو انچ بائیں طرف کو بڑھا رہتا اور بذریعہ ایک غشائی چنٹ کے تلی سے ملا رہتا ہے۔

دایاں سرا طرف کبدی یا طرف بوابی۔ (پائیلورک اینڈ) مشک کے منہ کے مشابہ اور بائیں سرے کی نسبت تنگ ہوتا ہے۔ یہ جگر اور مرارہ سے ملا رہتا ہے۔ معدہ کا بالائی سوراخ فم معدہ یا ثقبۃ الفواد (کارڈی ئیک آری فس) مری کے ساتھ ملا رہتا ہے زیریں سوراخ جس کو عربی میں بواب اور انگریزی میں پائی لورس کہتے ہیں۔ بارہ انگشتی آنت کے ساتھ ملا رہتا ہے۔ اس سوراخ کی راہ غذا معدہ سے آنتوں میں جاتی ہے۔ اس سوراخ میں غشائی وعضلاتی ریشوں کا ایک کواڑ (ابواب دربان) لگا رہتا ہے۔ جو صرف منہضم غذا کو معدہ سے آنتوں میں جانے دیتا ہے۔ معدہ کا زیرین کنارہ درحقیقت اس کا بڑا خم ہے جس سے ثرب چسپاں رہتا ہے۔ اور بالائی کنارہ اس کا چھوٹا خم ہے جو بذریعہ ایک چنٹ کے جگر سے ملا رہتا ہے۔ معدہ کی اگلی سطح اوپر اور سامنے کو اور پچھلی سطح پیچھے اور نیچے کو مائل ہوتی ہے۔

ساخت معدہ۔ معدہ کی ساخت میں چار طبقات ہوتے ہیں (۱) اندرونی طبقہ بلغمی جھلی کا (طبقہ مخاطیہ میوکس کوٹ) ہوتا ہے جس سے رطوبت معدہ خارج ہوتی ہے (۲) دوسرا طبقہ خانہ دار ساخت کا (طبقہ خلویہ یا طبقہ واصلہ سب میوکس کوٹ ہوتا ہے۔

یہ تصویر لمبائی میں کٹے ہوئے معدہ کی جس میں حمل معدہ بھی دکھائے گئے ہیں

تصویر معدہ

(۱) مری
(۲) قعر معدہ
(۳) بواب
(۴) صفرا کی نالی (۵) مرارہ
(۶) لبلبہ کی نالی جو کہ صفرا کی نالی کے ساتھ مل کر بارہ انگشتی آنت میں کھلتی ہے

The Stomach and the Duodenum, laid open to show the Mucous Membrane.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جو پہلے اور تیسرے طبقہ کو باہم ملاتا ہے۔ اس میں معدہ کے عروق واعصاب ختم ہوتے ہیں (۳) تیسرا طبقہ عضلاتی ریشوں کا (طبقہ عضلہ۔ مسکولر کوٹ) ہوتا ہے جس سے معدہ کی حرکتیں پیدا ہوتی ہیں اور (۴) چوتھا بیرونی طبقہ آبدار جھلی کا (طبقہ صفاقیہ سیرس کوٹ) ہوتا ہے جو بطور غلاف کے ہوتا ہے۔

معدہ کا اندرونی طبقہ بلغمی جھلی (غشاء مخاطی میوکس ممبرین) کا ہوتا ہے یہ بحالت صحت وزندگی نہایت ملائم اور چکنی ہوتی ہے۔ اور اس کا رنگ پھیکا ہوتا ہے۔ لیکن ہضم کے وقت اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ خلوئے معدہ کی حالت میں جب کہ معدہ سکڑا ہوا رہتا ہے۔ اس جھلی کے اندر بہت سی لمبی لمبی چنٹیں پائی جاتی ہیں جن کو عربی میں خمل معدہ اور انگریزی میں روجیز آفدی رسٹامک کہتے ہیں لیکن جب معدہ غذا وغیرہ سے پُر ہو کر تن جاتا ہے۔ تو یہ چنٹیں یا شکن غائب ہو جاتے ہیں۔ اگر اس جھلی کو بغور دیکھا جائے تو اس کے اندر شہد کے چھتے کی طرح خانے خانے نظر آتے ہیں۔ جن میں رطوبت کی تراوش کے لیے باریک باریک دہانے پائے جاتے ہیں۔ جو دراصل ان نالی دار چھوٹی چھوٹی گلٹیوں (غدد معدہ۔ گیسٹرک فالیکلز) کے سوراخ ہوتے ہیں جو کہ اس طبقہ میں بے شمار ہوتی ہیں۔ یہ گلٹیاں یا غدد دو قسم کی ہوتی ہیں ایک غدد بلغمیہ (میوکس گلینڈز) جن سے رقیق سیال اور تقریباً شور رطوبت تراوش پاتی ہے۔ اور دوسرے غدد ہضمیہ (پیپٹک گلینڈز) جن سے ترش رطوبت معدی یا رطوبت ہاضم تراوش پاتی ہے۔

تصویر معدہ بحالت ہضم وخلو

تصویر پُر معدہ تصویر نیم پُر معدہ تصویر خالی معدہ



محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
رطوبت معدہ	رطوبت معدیہ	گیسٹرک جُوس Gastric Juice

رطوبت معدہ ایک صاف شفاف قدرے نمکین رطوبت ہے جس میں ۴ فیصدی تیزاب نمک اور ایک جوہر ہاضم (ہضمین پیپ سین) ہوتا ہے۔ یہ رطوبت معدہ اغذیہ کے مواد غذائیہ (پروٹینز) کو تحلیل و ہضم کرتی ہے اس کا فعل خمیر سے بہت کچھ مشابہ ہے۔ جس طرح سے خمیر یا یہ جب آٹے میں ملایا جاتا ہے۔ تو اس میں وہ تغیرات پیدا کرتا ہے۔ اس طرح سے یہ رطوبتِ معدہ بھی اپنے جوہر ہاضم یا ہضمین کے ذریعے غذا کے ساتھ مل کر خمیر کی مانند اس میں کچھ تغیرات پیدا کرتی ہے اور اسے ہضم کرتی ہے۔

جب معدہ غذا سے خالی ہوتا ہے۔ تو رطوبتِ معدہ تراوش نہیں پاتی اس وقت رطوبتِ مخاطیہ سے جو تقریباً پھیکی اور قدرے شور ہوتی ہے اس کی سطح تر رہتی ہے لیکن جب غذا معدہ میں داخل ہوتی ہے۔ تو معدہ کے چھوٹے عروق دمویہ پھیل کر اس میں خون کی آمد بڑھ جاتی ہے۔ اور غدد معدیہ سے رطوبت معدہ تراوش پانے لگتی ہے۔ ایک جوان تندرست شخص کے معدہ سے شبانہ روز میں چار سیر سے تقریباً آٹھ سیر تک یہ رطوبت تراوش پاتی ہے۔ حیوانی اغذیہ بالخصوص زیادہ گوشت کھانے والے اشخاص میں یہ رطوبت زیادہ تراوش پاتی ہے۔ یہ رطوبت معدہ غذا کو اسی وقت ہضم کر سکتی ہے جب تک کہ اس میں جوہر ہاضم (ہضمین) اور ترشی دونوں موجود ہوں لیکن اگر وہ ناقص یا زائل ہو جائیں یعنی اگر اس کی ترشی کم ہو جائے یا جاتی رہے یا اس کا جوہر ہاضم خراب ہو جائے تو پھر یہ غذا کو ہضم نہیں کر سکتی نیز یہ بھی ضروری ہے کہ غذا خوب چبائی ہوئی معدہ میں جائے۔ معدہ میں سو درجہ کی حرارت ہو۔ اس کے طبقہ عضلیہ کی حرکات درست ہوں اور غذا کا جو حصہ ہضم ہوتا رہے۔ وہ معدہ سے الگ ہوتا رہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہضم معدی (یعنی) معدے کا ہضم

جب غذا حلق سے اُتر کر معدہ میں پہنچتی ہے۔ تو اُس میں معدہ کا ہضم شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ معدہ کی حرکات سے (جو اس کے عضلاتی طبقہ کے تینوں قسم کے ریشوں بیدھے ترچھے اور گول کے سکڑنے سے پیدا ہوتی ہیں) وہ اِدھر اُدھر ہوتی رہتی ہے۔ اُس پر رطوبت معدی تراوش پا کر اس کو ہضم کرتی رہتی ہے۔ پس غذا کا تھوڑا تھوڑا حصّہ مثل آش جو کے نرم اور پتلا ہو کر (جس کو کیموس کہتے ہیں) معدہ کے فم اسفل یا بوّاب کے راستے یا بارہ انگشتی آنت میں جاتا رہتا ہے یعنی رفتہ رفتہ جس قدر غذا معدہ میں ہضم ہوتی جاتی ہے۔ اسی قدر وہ براہِ بوّاب آنتوں میں گزرتی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ساری غذا ایک ہی بار معدہ میں ہضم ہو کر مثل آش جو کے ہو جائے۔ اور وہ ساری ایک ہی بار معدہ سے براہ بوّاب آنتوں میں چلی جائے۔ بلکہ رفتہ رفتہ جس قدر ہضم ہوتی جاتی ہے۔ اسی قدر براہِ بوّاب آنتوں میں گزرتی جاتی ہے۔ اور بوّاب جو قدرت نے دربان مقرر کیا ہے۔ وہ بھی صرف منہضم غذا کو آنتوں میں جانے دیتا ہے۔ غیر منہضم غذا کو نہیں جانے دیتا۔ اور آنتوں میں گئی ہوئی غذا کو پھر معدہ میں واپس نہیں آنے دیتا۔

معدہ میں غذا بالعموم تین چار گھنٹے میں ہضم ہو جاتی ہے۔ لیکن مختلف قسم کی غذاؤں کے ہضم ہونے میں وقت کم و بیش صرف ہوتا ہے۔ لطیف غذا زود ہضم ہوتی ہے۔ لیکن ثقیل غذا دیر ہضم ہوتی ہے۔ ہضم میں مقدار غذا کا بھی اثر پڑتا ہے۔ پس مناسب ہے۔ کہ پرخوری نہ کی جائے اور نہ ہی تداخل ہو یعنی کھانے کے اوپر دوسرا کھانا نہ کھایا جائے کھانے کے وقت فکر و تردّد۔ غور و خوض اور رنج و غم سے آزاد ہونا بلکہ دل شاد ہونا ضروری ہے۔

نباتی اغذیہ مثلاً گیہوں وغیرہ کی روٹی۔ دالیں۔ ترکاریاں۔ میوہ جات وغیرہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اور حیوانی اغذیہ مثلاً گوشت۔ انڈے مچھلی۔ دودھ۔ دہی۔ پنیر وغیرہ یہ سب معدہ میں ہضم ہو جاتی ہیں۔

پروٹینز[1] یعنی مواد غاذیہ مثلاً دودھ کی جُنبیت یا پنیر اور انڈے کی سفیدی جو بحالت سیلان ہوتی ہے۔ رطوبت معدہ کی ترشی کے اثر سے دیگر منجمد اغذیہ کی طرح پہلے تو منجمد ہو جاتی ہے لیکن پھر جس قدر قوت ہاضمہ کا اثر ان میں نیز فائبرین (مادۂ لیفیہ) اور دیگر منجمد اغذیہ میں ہوتا جاتا ہے۔ اسی قدر ان کی اصل ترکیب کمزور ہوتی جاتی ہے۔ اور ان کے اصلی خواص غائب ہوتے جاتے ہیں۔ مثلاً انڈے کی سفیدی کی یہ خاصیت ہے کہ حرارت سے جم جاتی ہے۔ لیکن معدہ کی قوت ہاضمہ کے اثر سے اس کی یہ خاصیت زائل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جیلے ٹین یعنی مواد ملامیہ کی خاصیت ہے کہ وہ سردی سے جم جاتے ہیں۔ لیکن قوت ہاضمہ کے اثر سے ان کی یہ خاصیت دور ہو جاتی ہے۔ یہی حال فائبرین (مادہ لیفیہ) اور کیزین (مادۂ جنبیہ) کا ہے یعنی ان کے اصلی خواص بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ غرضیکہ یہ تمام مواد قوت ہاضمہ کے اثر سے منہضم ہو کر عروق جاذبہ میں منجذب ہونے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ پس پروٹینز یعنی مواد غاذیہ جب معدہ میں ہضم ہو کر قابل جذب و نفوذ ہو جاتے ہیں تب ان کو ڈاکٹری میں پیپ ٹونز کہتے ہیں۔

کاربو ہائڈریٹس[2] یعنی مواد شکریہ و نشائیہ جن نباتی اغذیہ کے اندر اجزاء شکر و نشاستہ ہوتے ہیں۔ مثلاً شیریں میوہ جات گیہوں۔ آلو چقندر وغیرہ۔ ان میں جب رطوبت معدہ میں اثر کرتی ہے۔ تو اجزاء شکر و نشاستہ ان اغذیہ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر شکر اور شکر جیسی منحل چیزیں تو فوراً جذب ہو جاتی ہیں۔ اور جو ناقابل جذب ہوتی ہیں۔ وہ بھی قوت ہاضمہ کے اثر سے منہضم ہو کر قابل جذب ہو جاتی ہے لیکن نشاستہ رطوبت معدہ کے اثر سے شکر میں تبدیل نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ لعاب دہن سے جو غذا کے ساتھ مل کر آتا ہے ہضم ہوتا ہے نشاستہ کا ہضم آنتوں تک جاری رہتا ہے کیونکہ لبلبہ اور آنتوں کی رطوبت بھی اس کو ہضم کرتی ہیں۔

[1] Proteins [2] Carbohydrates

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

فیٹس یعنی مواد شحمیہ و دہنیہ یا چربیلے اور روغنی مواد معدہ میں بخوبی ہضم نہیں ہوتے۔ ان مواد میں معدہ کی قوت ہاضمہ سے صرف اس قدر تغیر ہوتا ہے۔ کہ یہ چھوٹے چھوٹے ذرات میں منقسم ہوکر دوسرے مواد کے ساتھ ملے ہوئے آنتوں میں چلے جاتے ہیں۔ اور پھر آنتوں کی قوت ہاضمہ سے ہضم ہوکر قابل جذب ونفوذ ہوجاتے ہیں۔

رقیق وسیال مواد مثلاً پانی اور شراب وغیرہ اور وہ مواد جو معدہ میں آکر تحلیل ہوجاتے ہیں۔ خواہ وہ شکر ونمک وغیرہ کی طرح خود بخود تحلیل ہوجائیں یا لعاب دہن ورطوبت معدہ کی قوت ہاضمہ سے ہضم ہوکر تحلیل ہوجائیں وہ عروق دمویہ معدہ کے ذریعے معدہ ہی میں سے منجذب ہونے لگتے ہیں اور معدہ کی وریدوں اور عروق ماساریقہ کے ذریعے باب الکبد اور جگر میں پہنچتے ہیں۔

معدہ میں منہضم غذا ترش ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ غذا معدہ سے چھوٹی آنتوں میں آتی ہے تو اس میں آنتوں کی رطوبت (رطوبت معویہ سکس انٹریکس) صفراء اور رطوبت بانقراس کے مل جانے سے اس کی کیفیت کھاری ہوجاتی ہے۔ لیکن بڑی آنتوں میں پہنچ کر وہ بعض جراثیمی خمیر کے اثر سے پھر ترش ہوجاتی ہے۔

کیموس وکیلوس

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
کیموس	کیموس	کائم Chyme
کیلوس	کیلوس	کائل Chyle

معدے کے اندر جب غذا ہضم ہوجاتی ہے۔ تب اس کو کیموس کہتے ہیں۔ جو اگرچہ مختلف اغذیہ کی نوعیت کے سبب مختلف ہوا کرتا ہے۔ لیکن یہ قوام میں آٹش جو کی مانند گاڑھا اور مزے اور بو میں ترش ہوتا ہے جس

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

وقت غذا کیموس میں تبدیل ہوتی ہے۔ تو فعل ہضم کے اختتام تک اس کے سارے مواد باہم اس طرح مخلوط ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کی باہمی تمیز دشوار ہو جاتی ہے۔ معدہ میں ساری غذا ایک ہی بار کیموس میں تبدیل نہیں ہو جاتی۔ بلکہ تھوڑی تھوڑی تبدیل ہوتی ہے۔ اور جس قدر کیموس بنتا ہے۔ وہ رفتہ رفتہ معدہ سے براہ بواب بارہ انگشتی آنت میں گرتا رہتا ہے جہاں پر اس میں دیگر رطوبات کے ملنے اس کی کیفیت کھاری ہو جاتی ہے اور اس کی رنگت سفید دودھیا ہو جاتی ہے۔ تب اسے کیلوس کہتے ہیں۔

نوٹ (۱) کیموس ایک یونانی لغت ہے جس کے لغوی معنی ہیں "میں گرتا ہوں" چونکہ یہ معدہ سے بارہ انگشتی آنت میں گرتا ہے۔ اس لیے اس کا نام یہ رکھا گیا۔

نوٹ (۲) یونانی اطباء معدہ و امعاء دونوں میں ہضم شدہ غذا کو کیلوس کہتے ہیں۔ اور معدہ و امعاء سے کیلوس کا خلاصہ براہ ماساریقا جذب ہو کر جگر میں جاتا ہے۔ اور اپنی صورت نوعیہ بدل کر خلطی صورت اختیار کر لیتا ہے تب اسے کیموس کہتے ہیں۔

کیلوس

جب کیموس معدہ سے بارہ انگشتی آنت میں آتا ہے تو اس میں صفراء اور رطوبت لبلبہ کے ملنے سے اور غذا کے روغنی اجزاء کے تحلیل ہو جانے سے اس کی رنگت سفید دودھیا ہو جاتی ہے تب اسے کیلوس کہتے ہیں جس میں سے غذائی مواد کا اکثر حصہ چھوٹی آنتوں کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے روغنی اجزاء جن سے ان کی رنگت دودھیا ہوتی ہے بذریعہ عروق کیلوسیہ عروق لبنیہ جذب ہو کر اور باقی منہضم و رقیق اجزاء بذریعہ عروق ماساریقا منجذب ہو کر خون میں جا ملتے ہیں (نیز دیکھو بیان عروق جاذبہ)

نوٹ:۔ کیلوس ایک یونانی لغت ہے۔ جس کے معنی ہیں رس لیکن اصطلاح

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ڈاکٹری میں درحقیقت کیلوس صرف اس دودھیا رطوبت کو کہتے ہیں۔ جو دورانِ ہضم میں چھوٹی آنتوں سے بذریعہ عروق کیلوسہ یا عروق لبنیہ جذب ہوکر مجریٰ صدر کی راہ خون میں جاملتی ہے کیلوس اپنی ساخت میں خون کے مشابہ ہوتا ہے یعنی اس کا کچھ حصہ تو آب خون کی طرح سیال ہوتا ہے اور کچھ دانہ ہائے خون کی طرح دانہ دار ہوتا ہے کیلوس کے دانوں کو انگریزی میں کائل پسکلز کہتے ہیں۔ خون کے سفید دانے انہیں کیلوس کے دانوں سے بنتے ہیں۔

آنتیں

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
آنتیں	اَمعاء	اِنٹس ٹائنیز Intestines

امعاء بمعنی آنتیں۔ جمع ہے اَمعاء کی آنتیں دو قسم کی ہوتی ہیں (۱) چھوٹی آنتیں (۲) بڑی آنتیں۔

چھوٹی آنتیں

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
چھوٹی آنتیں	اَمعاء دقاق	سمال انٹس ٹائنیز Small Intestines

چھوٹی اور باریک آنتیں تقریباً بائیس فٹ لمبی ہوتی ہیں۔ ان کے تین حصے ہوتے ہیں۔ (۱) بارہ انگشتی آنت (۲) خالی آنت (۳) پیچدار آنت انہی آنتوں میں غذا کے ساتھ صفراء اور رطوبت بانقراس (لبلبہ) اور خاص آنتوں کی رطوبت ملتی ہے۔ اور اجزاء غذائیہ سے اجزاء تفلیہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ یہ آنتیں نہایت پیچ دار ہوتی ہیں۔ اور شروع سے آخر تک بتدریج باریک یا تنگ ہوتی جاتی ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
بارہ انگشتی آنت	اثنا عشری	ڈیوڈینم Duodenum

نوٹ:۔ عربی لفظ اثنا عشر اور انگریزی لفظ ڈیوڈینم کے معنی ہیں بارہ چونکہ یہ آنت تقریباً بارہ انگشت لمبی ہوتی ہے۔ اس کا یہ نام رکھا گیا یہ آنت معدہ کے زیریں سوراخ (دوآب) سے شروع ہوکر اور ہلالی کی طرح خم کھاکر اپنے نیچے والی خالی آنت میں ختم ہوتی ہے۔ جگر اور مرارہ کی مشترک نالی (کامن بائل ڈکٹ) اور لبلبہ کی نالی اسی آنت میں آکر کھلتی ہے۔ جس کے راستے صفراء اور رطوبت لبلبہ آکر غذا میں ملتی ہے؛

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
خالی آنت	معاء صائم جیجُونم	Jejunum

صائم کے معنی ہیں روزہ دار چونکہ چھوٹی آنتوں کا یہ حصہ بعد از مرگ خالی پایا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو خالی آنت کہتے ہیں۔ یہ کمر کے دوسرے مہرے کے بائیں کنارے کے برابر بارہ انگشتی آنت سے شروع ہوکر پیچ دار آنت سے مل جاتی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً ساڑھے سات فٹ ہوتی ہے۔

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
پیچیدہ آنت	معاء دقیق ایلیم	Ilieum

نوٹ:۔ چونکہ چھوٹی آنتوں کا یہ حصہ نسبتاً تنگ اور باریک ہوتا ہے اس لیے عربی میں (سکو معاء دقیق یا معاء دقاق کہتے ہیں۔ اور چونکہ یہ پیچدار ہوتی ہے اس لیے عربی میں اس کو ذات التلافیف (پیچدار) اور لفائفی (پیچ والی) اور انگریزی میں ایلیم (پیچیدہ) کہتے ہیں +

یہ آنت ساڑھے گیارہ فٹ لمبی ہوتی ہے۔ اور خالی آنت سے شروع ہو کر نیچے بڑی آنتوں یعنی اعور (کانی) آنت سے مل جاتی ہے ؛

نوٹ:۔ چونکہ کانی آنت اور پیچیدہ آنت کا مقام اتصال ٹھیک طور پر معلوم نہیں اس لیے ان دونوں آنتوں کے بالائی $\frac{1}{5}$ حصے کو خالی آنت اور زیرین $\frac{4}{5}$ حصے کو پیچدار آنت کہتے ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ساخت۔ معدہ کی طرح آنتوں کی ساخت میں بھی چار طبقات ہوتے ہیں۔ بیرونی طبقہ آبدار جھلی کا۔ اس سے نیچے والا عضلاتی ریشوں کا اس سے نیچے والا خانہ دار ساخت کا جس میں عروق اعصاب ہوتے ہیں۔ اور اندرونی طبقہ بلغمی جھلی یا غشاء مخاطی کا عضلاتی طبقہ میں عمودی اور گول دو قسم کے ریشے پائے جاتے ہیں جن کے سکڑنے سے آنتوں میں کیچوے یا جونک کی طرح حرکت ہوا کرتی ہے۔ جسے عربی میں حرکت دُودیہ اور انگریزی پیراسٹالٹک موشن کہتے ہیں۔ یعنی آنت کا ایک حصّہ سکڑتا ہے تو دوسرا حصّہ پھیلتا ہے۔ اس حرکت سے غذا آنتوں میں آگے کو جاتی ہے۔ اس کا فضلہ براہ مُبرز خارج ہو جاتا ہے۔ اندرونی طبقہ مخاطیہ کی سطح پر مخمل کی مانند رڈیں سے ہوتے ہیں۔ جنھیں انگریزی میں وِلائی کہتے ہیں۔ یہ درحقیقت غشاء مخاطی کی باریک بلندیاں ہیں جن کے اندر عروق جاذبہ یعنی عروق کیلوسہ یا عروق لبنیہ ہوتے ہیں جو کیلوس کو جذب کر کے خون میں پہنچاتے ہیں۔ ان عروق جاذبہ کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں غشاء مخاطی میں بہت چھوٹے چھوٹے غدد جاذبہ ہوتے ہیں جنہیں سالیٹری گلینڈز کہتے ہیں۔ اور کہیں کہیں ان غدد کے مجموعے ہوتے ہیں جنھیں انگریزی میں پائرز پیچز کہتے ہیں۔

چھوٹی آنتوں کی اندرونی سطح میں غشاء مخاطی کی چنٹوں سے مدور یا ہلالی شکل کے خمل بنتے ہیں۔ جنہیں انگریزی میں ویلووی کنی ویلیٹز کہتے ہیں۔ یہ آڑے طور پر واقع ہوتے ہیں۔ اور تقریباً حلقہ نما ہوتے ہیں۔ یہ معدہ میں ہضم شدہ غذا کو جو رقیق و سیال ہوتا ہے۔ روکتے ہیں۔ تاکہ وہ آنتوں میں بخوبی منہضم و منجذب ہو سکے۔

پیچدہ آنت اپنے اختتام پر بذریعہ ایک کواڑی کے اعور یا کانی آنت سے ملتی ہے۔ یہ کواڑی بھی دراصل غشاء مخاطی کی چنٹ ہے جس میں حلقہ نما عضلی ریشے بھی ہوتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بڑی آنتوں کے مواد کو چھوٹی آنتوں میں نہیں جانے دیتی۔

Vilii ۲۲ Valvulae Conniventes

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

بڑی آنتیں

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
بڑی آنتیں	اُمعاء غلاظ	لارج انٹسٹائنز Large Intestines

بڑی آنتیں: یہ تقریباً پانچ فٹ لمبی ہوتی ہیں۔ اور چھوٹی آنتوں سے شروع ہو کر مبرز میں ختم ہوتی ہیں بہ نسبت چھوٹی آنتوں کے یہ اپنے دائرہ میں بہت بڑی اور موٹی اور ساخت میں دبیز اور صورت میں تکونی اور چھالدار ہوتی ہیں۔ اور ان میں چربی بھی بہت ہوتی ہے۔ یہ پیچیدہ آنت کے جائے اختتام سے شروع ہو کر پہلے خوب فراخ لیکن بتدریج تنگ ہوتی ہوئیں سیدھی آنت کے قریب پھر کشادہ ہو کر مبرز میں ختم ہوتی ہیں۔ ان کے بھی یہ تین حصے ہوتے ہیں (۱) کانی (۲) فراخ آنت (۳) سیدھی آنت۔

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
کانی آنت	اَعْوَر	سیکم Caecum

نوٹ:۔ عربی لفظ اَعْوَر اور انگریزی لفظ سیکم دونوں کے معنی ہیں کانی۔ چونکہ اس آنت میں کانی آنکھ کی مانند غذا کی آمد و رفت کے لیے صرف ایک سوراخ ہوتا ہے۔ اِس لیے اس کا یہ نام رکھا گیا۔

کانی آنت ایک تھیلی سی ہے۔ جو بڑی آنتوں کے ابتدائی مقام سے لٹکی ہوئی معلوم ہوتی ہے یہ تقریباً اڑھائی انچ لمبی اور بڑی آنتوں کے دیگر حصوں سے زیادہ فراخ ہوتی ہے۔ یہ پیڑو میں دائیں جانب ہوتی ہے۔ اس کے پچھلے حصے سے معمولی قلم کے برابر موٹا کیچوے کی مانند تین سے چھ انچ تک لمبا ایک زائدہ ہوتا ہے جس کو عربی میں زائدہ دودیہ اور انگریزی میں ورمی فارم پراسس کہتے ہیں۔ یہ درمیان سے خالی ہوتا ہے۔ اور اس کی نالی کانی آنت سے ملی رہتی ہے پیچدار آنت اور کانی آنت کے اتصالی مقام پر ایک کواڑ سی پائی جاتی ہے۔ جس کو عربی میں صمام دقیقی واعوری

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اور انگریزی میں ایلیو سٹیکل والو کہتے ہیں۔ یہ کواڑی فضلات اور ریاح کو چھوٹی آنتوں سے بڑی آنتوں میں آنے تو دیتی ہے۔ لیکن بڑی آنتوں سے چھوٹی آنتوں میں انہیں واپس نہیں جانے دیتی۔

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
فراخ آنت	قولون	کولن Colon

نوٹ:۔ قولون یونانی لفظ ہے جس کے معنی ہیں فراخ یا کشادہ چونکہ یہ آنت دیگر آنتوں کی نسبت زیادہ فراخ ہوتی ہے اس لیے اس کا یہ نام رکھا گیا۔

یہ آنت دائیں جانب کے کولھے میں کانی آنت سے شروع ہو کر پہلے اوپر کو جاتی ہے اور جگر کے نیچے پہنچ کر خم کھاتی ہے۔ پھر آڑی ہو کر ناف کے اوپر سے بائیں طرف کو جاتی ہے۔ اور تلی کے نیچے پہنچ کر خم کھاتی ہے۔ پھر نیچے کو جاتی ہے۔ اور بائیں طرف کے کولھے میں سینی خم کھا کر پیڑو کے جوف کی بالائی حد کے پاس سیدھی آنت میں ختم ہوتی ہے اس لیے اس آنت کے چار حصے ہوتے ہیں جن میں تین خم ہوتے ہیں ؎

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
(۱) چڑھنے والا قولون	قولون صاعد	اسینڈنگ کولن Ascending Colon

یہ دائیں کولھے میں کانی آنت سے شروع ہو کر اوپر کو جاتا ہوا جگر کی زیریں سطح پر خم کھا کر آڑی قولون میں ختم ہوتا ہے۔ اس کے جگری خم کو عربی میں تعریج کبدی اور انگریزی میں ہیپاٹک فلیکشر کہتے ہیں۔

(۲) آڑی قولون	قولون مستعرض	ٹرانس ورس کولن Transverse Colon

یہ حصہ دوسرے حصوں کی نسبت زیادہ لمبا اور آڑے طور پر واقع ہے یعنی ناف کے اوپر سے بائیں طرف کو جا کر تلی کے پاس ایک خم کھا کر اترنے والی قولون میں ختم ہوتا ہے۔ اس کے طحال خم کو عربی میں تعریج طحالی اور انگریزی میں سپلینک فلیکشر کہتے ہیں۔

(۳) اترنے والا قولون	قولون نازل	ڈیسینڈنگ کولن Descending Colon

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

یہ پیٹ میں بائیں جانب نیچے کو اُتر کر اور بائیں کولھے کے اندر پہنچ کر تقریباً سینی میں تمام ہوتا ہے۔

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
سینی خم	تقریج سینی	سگمائڈ فلیکشر Sigmoid Flexure

یہ خم یونانی حرف سین ( ) کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ قولون کا نہایت تنگ حصہ ہے اور بائیں کولھے سے کچھ آگے بڑھ کر پیڑو کے جوف کی بالائی حد کے پاس سیدھی آنت میں ختم ہوتا ہے۔

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
سیدھی آنت	معاء مستقیم	ریکٹم Recum



تصویر معدہ وامعاء

نوٹ: چونکہ دوسری آنتوں کی نسبت یہ آنت سیدھی ہوتی ہے اس لیے اسے عربی میں مستقیم اور انگریزی میں رکٹم یعنی سیدھی آنت کہتے ہیں۔ ورنہ یہ درحقیقت سیدھی نہیں ہے۔ یہ فراخ آنت کے سینی خم سے شروع ہو کر سوراخ مقعد میں ختم ہوتی ہے اس کی اوسط لمبائی چھ سے آٹھ انچ ہوتی ہے۔ یہ دونوں سروں پر تنگ اور درمیان میں کشادہ ہوتی ہے اس کے زیریں حصہ کو فارسی میں دُبر عربی میں مقعد یا میز اور انگریزی میں ایئس کہتے ہیں اس کے اختتام پر دو عضلات

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

لگے رہتے ہیں۔ جن میں سے بیرونی عضلہ ارادی ہوتا ہے۔ اور اندرونی غیر ارادی۔
جو حالتِ نفخ وغیرہ میں نہ کھلنے کے سبب تکلیف کا باعث ہوتا ہے

ساخت: چھوٹی آنتوں کی طرح بڑی آنتوں کی ساخت میں بھی چار طبقات پائے جاتے ہیں۔ ان کے عضلاتی طبقہ میں بھی عمودی اور گول دو قسم کے ریشے ہوتے ہیں۔ اور عمودی ریشوں کے تین چپٹے لمبے بند ہوتے ہیں لیکن چونکہ یہ آنتوں کی نسبت چھوٹے ہوتے ہیں۔ پس ان سے آنتوں میں چھوٹی چھوٹی تھیلیاں سی بن جاتی ہیں۔ جنہیں انگریزی میں سیکولائی کہتے ہیں اور چھوٹی آنتوں کے حمل کی طرح غذا کو روکتی یا ٹھہراتی ہیں۔ بڑی آنتوں کے اندرونی طبقہ مخاطیہ میں چھوٹے چھوٹے غدد پائے جاتے ہیں۔ لیکن ان میں روئیں دار ابھار یا زوائد نہیں ہوتے۔ جو کہ کیلوس کو جذب کرتے ہیں۔ ان میں بھی حرکت دودیہ ہوتی ہے۔

ہضم معوی (یعنی) آنتوں کا ہضم

جیسا کہ مذکور ہوا معدہ نباتی وحیوانی لطیف وثقیل ہر قسم کی غذائیں پہنچتی ہیں وہ ان سب کو ملا کر ایک کر دیتا ہے۔ اور اپنی رطوبت کے ذریعے پروٹین یا مواد غاذیہ کو ہضم کر کے گھلا دیتا ہے یعنی روغنی وشحمی مواد میں صرف اس قدر تغیر ہوتا ہے۔ کہ وہ دوسری غذاؤں کے ساتھ اچھی طرح مل جاتے ہیں لیکن عروقی جاذبہ میں منجذب ہونے کے قابل نہیں ہوتے اور وہ مواد جن میں نشاستہ ہوتا ہے۔ اور جو شکر میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہ تبدیلی لعاب دہن کے ذریعے منہ سے شروع ہوتی ہے۔ مگر معدہ میں آکر رک جاتی ہے۔ پس غذا معدہ میں ہضم ہونے کے بعد براہ بواب جب بارہ انگشتی آنت میں پہنچتی ہے۔ تو اس کی حالت ہوتی ہے کہ مواد غاذیہ بحالت تجزیہ ہوتے ہیں۔ بعض اجزا بالکل منہضم اور بعض قریب الہضم ہوتے ہیں۔ روغنی اور شحمی اجزاء بھی بحالت تجزیہ ہوتے ہیں۔ لیکن منہضم اور قابل جذب نہیں ہوتے اجزاء نشاستہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

شکر میں تبدیل ہونے والے ہوتے ہیں۔ وغیرہ جب غذا معدہ سے گزر کر بارہ انگشتی آنت میں جاتی ہے۔ تو اس میں اس آنت کی رطوبت۔ صفراء اور لبلبہ کی رطوبت مل جاتی ہے۔ اور رطوبت لبلبہ میں تین قسم کے جوہر ہاضم (فرمنٹس خمیر) ہوتے ہیں۔ جو اجزاء نشاستہ۔ اجزاء حیوانیہ اور اجزاء دہنیہ کو ہضم کرتے ہیں۔ نیز صفراء بھی ان رطوبات کے ساتھ مل کر دہنیت کے ہضم کرنے میں ممد ہوتا ہے۔ پس غذا جب چھوٹی آنتوں میں پہنچتی ہے۔ تو اس کے وہ اجزاء نشاستہ جو لعاب دہن کے ذریعے ہضم ہونے سے رہ جاتے ہیں۔ اور وہ اجزاء غاذیہ جو کہ معدہ میں ہضم ہونے سے باقی رہ جاتے ہیں۔ نیز روغنی اجزاء یہ سب یہاں پر پہنچ کر ہضم ہو جاتے ہیں۔ گویا اب غذا کے تمام اجزاء ہضم ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہر قسم کی غذا ہضم ہو جاتی ہے اور آنتوں کے عروق جاذبہ کے ذریعے جذب ہونے لگتی ہے۔

آنتوں کے ہضم کے وقت آنتوں کے رویں دار ابھار خون سے پر ہو کر پھول جاتے ہیں اور کیلوس میں سے دہنیت کو جذب کر کے عروق کیلوسیہ کی طرف بھیجتے ہیں۔ جو پھر مجری صدر میں چلی جاتی ہے۔ اور وہ غیر منہضم اجزاء غاذیہ جو معدہ سے آنتوں میں چلے آتے ہیں۔ جب یہ اجزاء منہضم ہو کر رقیق ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو زیادہ تر عروق ماساریقیہ جذب کرتی ہیں۔ اور غیر منہضم اجزاء نشاستہ جو آنتوں میں پہنچ کر پھر ہضم اور شکر میں تبدیل ہونے لگتے ہیں۔ تو شکر بھی رطوبت امعاء میں تحلیل ہو کر زیادہ تر عروق ماساریقیہ کے ذریعے ہی جذب ہو جاتی ہے۔ غرضیکہ غذائی مواد کا اکثر حصہ چھوٹی آنتوں ہی کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ بالخصوص روغنی اجزاء عروق کیلوسیہ کے ذریعے اور دیگر منہضم رقیق غذا عروق ماساریقیہ کے ذریعے منجذب ہو جاتے ہیں۔ بعض ازیں غذا کا بقیہ جو چھوٹی آنتوں کے آخری حصے میں پہنچتا ہے۔ اس کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے اور اس میں براز کی سی بو ہوتی ہے۔ پھر وہ چھوٹی آنتوں سے گزر کر بڑی آنتوں میں چلا جاتا ہے۔ جب غذا بڑی آنتوں میں آتی ہے تو

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

چھوٹی آنتوں کی طرح اس میں بھی تغیرات جاری رہتے ہیں۔ لیکن چونکہ بڑی آنتوں کی اندرونی سطح میں روئیں دار ابھار نہیں ہوتے جن کا کام کیلوس کو جذب کرنا ہے پس کیلوس میں انجذاب بالخصوص دہنیت کا انجذاب زیادہ تر چھوٹی آنتوں میں ہی ہوتا ہے۔ لیکن بڑی آنتوں میں بھی کسی قدر انجذاب ضرور ہوتا ہے کیونکہ غذا کا بقیہ جب بڑی آنتوں میں پہنچتا ہے۔ تو وہ رقیق وسیال ہوتا ہے۔ لیکن بالآخر غذا کا فضلہ یعنی براز یا پاخانہ منجمد ہوتا ہے جو براہ مقعد خارج ہو جاتا ہے۔ غذا چھوٹی آنتوں میں سے تقریباً دس بارہ گھنٹوں میں اور بڑی آنتوں میں عموماً ۲۴ سے ۲۶ گھنٹوں میں گزر جاتی ہے۔

غذا کیونکر ہضم وجذب ہوتی اور جزو بدن بنتی ہے

نوٹ:۔ تاکہ غذا کا ہضم وجذب ہو کر جزو بدن بننا آپ کو بخوبی سمجھ میں آجائے۔ آپ ان چند باتوں اور اصطلاحات کو بطور تمہید بخوبی ذہن نشین کر لیں۔

نباتی وحیوانی اغذیہ میں مندرجہ ذیل پانچ قسم کے مواد یا اجزاء غذائیہ پائے جاتے ہیں۔

(۱) پروٹینز[1] یعنی مواد مغذیہ یا مواد لحمہ جو جسم میں تغذیہ ونشو نما کا باعث ہوتے ہیں۔ مثلاً گوشت انڈے پنیر وغیرہ اور جن کی مزید مثالیں حسب ذیل ہیں۔

(۲) گلوٹین[2] (لیسین) یعنی لیسدار مادہ جو گیہوں۔ ماش۔ مونگ اور بعض دیگر اناجوں وغیرہ میں ہوتا ہے۔

(۳) ایلبیومن[3] (رطوبت ہیضہ یا رطوبت زلالیہ) انڈے کی سفیدی اس کی بہترین مثال ہے لیکن یہ مادہ اکثر نباتی وحیوانی اغذیہ میں پایا جاتا ہے۔

(۴) کے سین[4] (جنین) یعنی مادہ جنینیت جو دودھ اور پنیر وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔

(۵) مائیوسین[5] (عضلین) جو عضلات اور گوشت میں پائی جاتی ہے۔

(۶) فائبرین[6] (لیفین) جو منجمد خون میں پائی جاتی ہے۔

(۷) جیلے ٹین[7] (ملاین یا سریشین) یعنی مادہ ہلامیہ جو نسوں اور کریلوں وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے۔

[1] Proteins [2] Gluten [3] Albumen

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(۸) گلوبیولین[1] (کوین) یعنی وہ مادہ جو کریات خون اور زردی بیضہ وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔

(۹) کاربوہائیڈریٹس[2] یا مواد شکریہ ونشاستہ۔ یعنی شیریں ونشاستہ دار اجزاء غذا مثلاً (۱) شکر۔ جو کہ تمام شیریں میوہ جات۔ گیہوں۔ مکئی۔ جوار۔ آلو چقندر۔ ایکھ اور دودھ وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ نوٹ: شکر کئی قسم کی ہوتی ہے مگر اس کے تمام اقسام ماہیت میں قریباً یکساں ہوتے ہیں۔ اس کی یہ چار بڑی قسمیں ہیں (۱) شکر نیشکری (۲) شکر انگوری (۳) شکر شیر یا جو کی شکر اور (۴) شکر یعنی دودھ کی شکر

(۲) نشاستہ۔ جو گیہوں۔ چاول۔ و دیگر اناجوں اور آلو وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔

(۳) فیٹس[3] دیا مواد شحمیہ و دہنیہ یعنی شحمی وروغنی اجزاء غذا مکھن۔ گھی۔ چربی اور تیل وغیرہ ان کی بہترین مثالیں ہیں۔ روغنی اجزاء دودھ۔ بالائی۔ پنیر۔ گوشت اور مختلف حیوانی ونباتی اغذیہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔

(۴) سالٹس[4] (نمکیات) جو نمکیات کہ مختلف اغذیہ میں پائے جاتے ہیں۔ وہ سب وہی نمکیات ہیں۔ جو کہ جسم انسان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اور وہ حسب ذیل ہیں (۱) کلورائیڈ آف سوڈیم (۲) کلورائیڈ آف پوٹاشیم (۳) فاسفیٹ آف سوڈیم (۴) فاسفیٹ آف پوٹاشیم (۵) کاربونیٹ آف سوڈیم (۶) کاربونیٹ آف پوٹاشیم اور کسی قدر (۷) فاسفیٹ آف کیلسیم اور (۸) منگنیشیم اور (۹) آئرن وغیرہ ان میں سے اکثر نمکیات صفراء میں اور قریباً سب خون میں پائے جاتے ہیں۔

(۵) پانی۔ جو کہ تمام اغذیہ میں موجود ہوتا ہے۔ اور ان کا بدرقہ اور خون کا جزو اعظم ہے۔

جسم انسان میں اسی قسم کے تمام مواد پائے جاتے ہیں جو کہ اس کی غذا میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی مذکورہ بالا پانچوں قسم کے مواد غذاء اور چونکہ بدل یا تحلل ہے یعنی جس قدر جسم ہر روز تحلیل ہوتا یا گھٹتا ہے۔ یہ اس کا بدل ہو کر اس کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ پس انسان کی غذا ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں سب ضروری اجزاء غذا موجود ہوں۔

اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ہاضمہ کی نالی میں غذا بحیثیت مجموعی کیونکر ہضم

[1] Gelatin [2] Carbohydrates [3] Fats [4] Salts

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

وجذب ہوتی ہے۔ پہلے یہ جاننا ضروری ہے۔ کہ غذا کے مذکورہ بالا اجزاء علیحدہ علیحدہ کیونکر ہضم وجذب ہوتے ہیں۔

آپ کو معلوم ہو کہ بہت سے خرد بینی حیوانات یا جراثیم مختلف مادوں میں داخل ہو کر مختلف قسم کے تغیرات پیدا کر دیتے ہیں۔ اور یہ تغیرات ان فرمنٹس (FERMENTS) یعنی خمیری مواد کے ذریعے ہوتے ہیں۔ جو کہ ان جراثیم میں موجود ہوتے ہیں یا وہ پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ تازہ گندھے ہوئے آٹے میں ذرا خمیر (خمیر مایہ) ملا دینے سے وہ سارا آٹا خمیر ہو جاتا ہے۔ خمیرہ خمر (پیسٹ) کو شکر وغیرہ کے شربت میں ملا دیں تو وہ اس کو شربت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے جسم انسان کے بعض اعضاء بھی کچھ ایسی رطوبت پیدا کرتے ہیں۔ جن میں بعض جوہر ہاضم موجود ہوتے ہیں۔ اور جن کو اصطلاح میں فرمینٹ یعنی خمیر کہتے ہیں چنانچہ لعاب دہن میں ایک جوہر ہاضم ہے جس کو ٹائلین (Ptyalin) (لعابین) کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا فرمینٹ یا خمیر ہے۔ جو کہ نشاستہ کے ساتھ مل کر اس کو ہضم یا تحلیل کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے رطوبتِ معدہ (گیسٹرک جوس) میں ایک فرمینٹ یا جوہر ہاضم ہے جس کو پیپ سین (ہضمین کہتے ہیں یہ پروٹینز کو ہضم کر کے پیپ ٹونز Peptones میں تبدیل کر دیتا ہے یعنی پروٹینز کو ہضم و تحلیل کر کے قابلِ نفوذ و جذب بنا دیتا ہے پینکریاس (بانقراس یا لبلبہ) میں بھی تین قسم کے خمیری مواد پیدا ہوتے ہیں۔ جن میں سے ایک پینکریٹین (Paocreatin) بانقراسین دوسرے کو ٹرپ سین Trypain لبلبین) کہتے ہیں۔ ان تینوں خمیری مادوں سے ایک تو نشاستہ کو ہضم و تحلیل کرتا ہے۔ دوسرا پروٹینز کو اور تیسرا روغنی اجزاء کو اسی طرح سے چھوٹی آنتوں کے اندر دو قسم کے فرمینٹ پیدا ہوتے ہیں۔ جو کہ شکر نیشکری کو شکر شکری میں تبدیل کرتے ہیں۔ اور ایک فرمینٹ ارپ سین (Erepsin) معوین یا رُدرین) پیپ ٹونز کو مزید ہضم کر کے زیادہ لطیف بنا دیتا ہے۔ جس صورت میں اس کو امینو ایسڈز کہتے ہیں۔ گویا لعابین و ہضمین و لبلبین درد دین وغیرہ فرمینٹس (خمیر

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

یا جو ہر ہاضم) ہی غذا کو ہضم کرتے ہیں۔ متقدمین اطبائے یونان نے انہیں خمیروں یا ہاضم جوہروں کی اصلی قوت کو قوت ہاضمہ سے تعبیر کیا ہے۔

لیجئے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ غذا کیونکر ہضم و جذب ہوتی ہے۔

غذا کا ہضم ہونا: جب غذا منہ میں چبائی جاتی ہے تو لعاب دہن اس کے نشاستہ کو ایک قسم کی شکر (مالٹوز) میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پس غذا کا ہضم ہونا درحقیقت منہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ غذا حلق اور مری میں سے گزر کر معدہ میں جاتی ہے لیکن حلق اور مری میں سے غذا خود بخود معدہ میں نہیں جا گرتی بلکہ حلق اور مری کے عضلاتی ریشے سکڑ سکڑ کر اس کو نیچے معدہ کی طرف دھکیلتے ہیں اس لیے اگر لقمہ اتنا چھوٹا ہو جو مری کے عضلاتی ریشوں کے سکڑنے پر ان کی گرفت میں نہ آسکے۔ تو اس کا نگلنا دشوار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوا کی چھوٹی سی گولی بغیر پانی کے گھونٹ کے نگلی نہیں جا سکتی۔

جیسا کہ ہضم معدی میں صفحہ ۱۲۹ پر اور ہضم معوی میں صفحہ ۱۳۶ پر مذکور ہوا غذا معدہ و آنتوں میں ہضم ہو کر کیموس و کیلوس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور عروق دمویہ و عروق ماساریقیہ کے ذریعے منجذب ہو کر خون میں مل جاتی ہے۔

اب ہم بتاتے ہیں۔ کہ غذا کیونکر جذب ہوتی اور جزو بدن بنتی ہے۔ غذا کے لیے صرف یہی کافی نہیں کہ وہ ہضم ہو جائے بلکہ اس کے ذریعے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جسم میں جذب ہو جائے۔ تاکہ وہ بدل مایتحلل بن سکے۔ چنانچہ جسم میں جو عمل انجذاب یا امتصاص ہوتا ہے (جس کو متقدمین اطبائے یونان نے قوت جاذبہ سے تعبیر کیا ہے) اس سے غذا کے بہت سے جوہر اور کئی ایک کیمیائی عناصر کبھی محلول یا معلق خون میں داخل ہوتے ہیں۔ پس خلاصۂ غذا کے منجذب ہونے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ایک تو وہ رطوباتِ جسم (خون و لمف وغیرہ) میں حل ہو جانے کے قابل ہو۔

منہضم غذا دو طریق سے جسم میں جذب ہوتی ہے۔ ایک۔ ایک تو بذریعہ عروق دمویہ (اور وہ معدیہ و معویہ یا شعبہائے باب) اور دوسرے بذریعہ عروق جاذبہ، یہ بتلایا جا چکا ہے۔ کہ معدہ اور آنتوں کی ساخت میں چار چار طبقات ہوتے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہیں، اور اُن کے اندرونی دو طبقات میں تو بہت سے چھوٹے چھوٹے غدد پائے جاتے ہیں جن سے رطوبت ترادش پاکر غذا کو ہضم کرتی ہے۔ اور ان کے بیرونی دو طبقات میں عروق دمویہ عروق جاذبہ کا جال پھیلا ہوا ہے چنانچہ عروق دمویہ ان پانچ وریدوں (۱) وریدمعدہ (۲) وریدا معاء بالائی (۳) وریدا معاء زیرین (۴) وریدطحال اور (۵) وریدلبلبہ میں ختم ہوتی ہیں اور ان پانچوں وریدوں کے باہم ملنے سے وریدباب الکبد (پورٹل وین) بنتی ہے پس معدہ امعاء سے غذا کا بہت سا خلاصہ یعنی اس کے اکثر اجزاء مثلاً منہضم پروٹینز یعنی پیپ ٹونز کاربوہائیڈریٹس (نشاستہ وشکر) بشکل شکر۔ نمکیات اور پانی مذکورہ بالا پانچوں وریدوں (شعبہائے باب الکبد) کے ذریعے جذب ہوکر براہِ راست جگر میں چلے جاتے اور خون میں مل جاتے ہیں۔ لیکن غذا کے روغنی اجزاء ہضم ہوکر بشکل کیلوس آنتوں کے عروق کیلوسیہ یا عروق لبنیہ کے ذریعے جذب ہوکر براہ مجریٔ صدر وریدی خون میں مل جاتے ہیں جب خلاصۂ غذا یا لطیف اجزاء غذا اس طرح سے جذب ہوکر خون میں مل جاتے ہیں۔ تو پھر خون کے ذریعے وہ جسم کی تمام ساختوں یا اعضاء میں جذب ہوکر جزو بدن بن جاتے ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھو بیان خون (عروق شعریہ) ولمف ۔

نوٹ:۔ چونکہ غذا کے ہضم ہونے اور جزو بدن بننے کے متعلق ڈاکٹروں اور یونانی اطباء میں کسی قدر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور خاص دعام کو اس مسئلہ سے بہت دلچسپی ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہضم غذا و تکون اخلاط اور تغذیہ جسم کا مسئلہ جس طرح سے یونانی اطباء مانتے اور تسلیم کرتے ہیں۔ وہ بھی بالاختصار لکھ دیا جائے تاکہ جو کچھ جزوی اختلاف ہے وہ بخوبی سمجھ میں آجائے ایسے اصولی مسائل کے متعلق ڈاکٹروں کا یہ خیال کہ یونانی اطباء کچھ نہیں جانتے صحیح نہیں اور اطباء کا یہ خیال کہ یونانی اطباء سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ بھی درست نہیں۔ یونانی اطباء کسی حد تک علم طب کے موجد ہیں۔ انہوں نے اپنی ترقی کے زمانہ میں علم طب کو بہت ترقی اور فروغ دیا۔ لیکن یہ سمجھنا کہ انہوں نے اس کو مکمل کر دیا یہ صحیح نہیں۔ ان کے بعد اس علم نے دنیا میں بہت کچھ ترقی کی اور اب تک ترقی کر رہا ہے۔ بالخصوص یورپ میں۔ پس ان ترقیات سے بھی

اگلے صفحہ پر دیکھو

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ضرور فائدہ اُٹھانا چاہیے:

طبی نوٹ: اطباء یونانی غذا میں چار استحالے اور چار ہضم مانتے ہیں۔ ہضم اوّل۔ ہضم معدی جو دہن سے شروع ہوتا ہے ہضم دوم ہضم کبدی یعنی جگر کا ہضم۔ ہضم سوم ہضم عروقی اور ہضم چہارم ہضم عضوی بقول ان کے بھی جس وقت غذا منہ میں چبائی جاتی ہے ہضم اوّل اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب غذا معدہ میں پہنچ جاتی ہے۔ تو وہاں پر وہ ہضم ہو کر مثلِ آش جو کے ہو جاتی ہے۔ یہ ہضم اوّل ہے اس میں غذا کی صورت نوعیہ بدستور باقی رہتی ہے۔ اسی کو ہضم معدی اور سریانی میں کیلوس کہتے ہیں پھر جگر کی قوت جاذبہ بذریعہ ماساریقا[1] خلاصہ کیلوس کو معدہ سے جگر میں جذب کر لیتی ہے۔ اور معدہ میں جو کیلوس کا فضلہ بچتا ہے اس کو معدہ کی قوت دافع امعاء کی طرف دفع کر دیتی ہے۔ جب خلاصہ کیلوس جگر میں پہنچتا ہے۔ تو وہاں پر وہ پھر ہضم ہوتا ہے۔ یہ ہضم دوم ہے اس کو ہضم کبدی کہتے ہیں اس ہضم میں غذا کی صورت نوعیہ بدل جاتی ہے یعنی وہ خلطی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تب اسے کیموس کہتے ہیں۔ اور اس سے چاروں اخلاط خون۔ بلغم صفرا۔ سودا پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو شے مثلِ جھاگ کے اوپر آجاتی ہے۔ وہ صفراء ہے اور جو مثلِ تلچھٹ کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ سودا ہے اور جو قصور ہضم سے کچی رہ جاتی ہے وہ بلغم ہے۔ اور جو ٹھیک پختہ ہو کر معتدل القیوم ہو جاتی ہے وہ خون ہے جگر میں اخلاط اربعہ پیدا ہونے کے بعد صفراء اور سوداء کے دو حصے ہو جاتے ہیں چنانچہ کچھ صفراء تو پتہ میں چلا جاتا ہے اور

[1] متقدمین اطباء یونان نے انہیں عروق جاذبہ کو مراقبض اور ماساریقا لکھا ہے۔ بقول اُن کے ماساریقا وہ چھوٹی چھوٹی باریک سخت رگیں ہیں۔ جو اسفل معدہ اور اکثر امعاء سے متصل ہیں۔ اور کیلوس کو معدہ و آنتوں سے جذب کر کے باب الکبد کی طرف لے جاتی ہے [2] بعض اطباء نے ان پانچوں وریدوں یعنی شعبہائے باب کو ہی ماساریقا سے تعبیر کیا ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کچھ خون کے ساتھ عروق میں چلا جاتا ہے اس طرح سے کچھ سوا تونی میں چلا جاتا ہے۔ اور کچھ خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن بلغم کے لیے کوئی خاص مفرغہ یا مقام مقرر نہیں وہ خون کے ساتھ ہی عروق میں چلا جاتا ہے اور چونکہ بلغم طبعی درحقیقت خون خام ہے۔ اور وقت ضرورت یہ مستحیل بہ خون ہو کر یعنی خون بن کر جسم کی پرورش کرتا ہے۔ اس لیے طبیعت نے اس کے لیے کوئی خاص مفرغہ مقرر نہیں کیا۔ بلکہ وہ اس کو خون کے ساتھ ہی رگوں میں جاری کرتی ہے تاکہ یہ سب اعضاء پر بٹا رہے۔ یہاں تک کہ جب کبھی اعضاء کو غذا نہ ملے۔ تو وہی بلغم جو اعضاء کے پاس ہے۔ ان کی غذا بن جائے چونکہ خون میں صفراء سودا اور بلغم ملے ہوئے ہوتے ہیں پس جب خون جگر سے عروق میں پہنچتا ہے تو پھر وہاں پر ہضم سوم یعنی ہضم عروقی شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ رطوبت اولیٰ یعنی خون نضج پاکر بتدریج رطوبت ثانیہ کی طرف مستحیل ہوتی جاتی ہے اور موافق مزاج ہر عضو کے مستعد و منکیف ہو جاتی ہے۔ اور یہ رطوبت ثانیہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک فضول اور دوسرے غیر فضول۔ فضول تو وہ ہے۔ جو جزو بدن نہ ہو سکے اور وہ اخلاط غیر طبعیہ میں داخل ہے اور اس کا اخراج جسم سے واجب ہے اور غیر فضول وہ ہے۔ جو بدن کی محتاج الیہ ہے یعنی وہ جزو بدن بنتی ہے اور اس کی یہ چار قسمیں ہیں (۱) رطوبت محصورہ[1] یعنی وہ رطوبت جو چھوٹی باریک رگوں (عروق شعریہ) کے جوف میں (جو اعضاء اصلیہ سے اتصال رکھتی ہے) بھری رہتی ہے (۲) رطوبت طلیہ[2] یہ وہ رطوبت ہے جو مثل طل یعنی شبنم کے اعضاء اصلیہ پر بکھری ہوئی ہے۔ اور جزو عضو ہو جانے کی قابلیت رکھتی ہے۔ (۳) رطوبت قریبۃ العہد بالانعقاد یہ وہ رطوبت ہے جو اعضاء میں پہنچ کر ان کا رنگ اور مزاج تو حاصل کر چکی ہے۔ لیکن ان کا قوام حاصل

---

[1] رطوبت محصورہ فی اطراف العروق سے مراد پلازما ہے جس کا بیان دیکھو خون میں صفحہ ۴۴ پر۔

[2] رطوبت طلیہ سے مراد ملف ہے۔ جس کا مفصل بیان دیکھو لیف میں صفحہ ۸۵ پر۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

نہیں کیا۔ اور ہضم سوم سے یہی رطوبت مراد ہے (۴) رطوبت متداخلہ یا اصلیہ جس کے ذریعے اعضاء کا التیام اور التصاق ہوتا ہے اور شیرازہ جسم پراگندہ ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ ہضم چہارم یا ہضم عضوی میں رطوبت ثانیہ جو اعضاء کے لیے قابل تغذیہ بالفعل ہے اعضاء کی طرف مستحیل ہو جاتی ہے ہضم اوّل یا ہضم معدی کا فضلہ براز ہے۔ ہضم دوم یا ہضم کبدی کا فضلہ پیشاب ہے۔ ہضم سوم یا ہضم عروقی اور ہضم چہارم یا ہضم عضوی کا فضلہ پسینہ اور میل ہے۔ مذکورہ بالا بیان سے یہ صاف ظاہر ہے۔ کہ غذا کے ہضم ہونے اور جزو بدن بننے کے متعلق ڈاکٹروں اور یونانی اطباء میں صرف تھوڑا سا ہی اختلاف ہے۔ چنانچہ (۱) ڈاکٹر تو معدہ میں ہضم شدہ غذا کو کیموس کہتے ہیں لیکن اطباء جگر میں ہضم شدہ غذا کو کیموس کہتے ہیں (۲) اطباء معدہ میں ہضم شدہ غذا کو کیلوس کہتے ہیں لیکن ڈاکٹر چھوٹی آنتوں میں ہضم شدہ غذا کو کیلوس کہتے ہیں (۳) ڈاکٹر تو یہ مانتے ہیں۔ کہ خلاصۂ غذا کا بہت سا حصہ معدہ و آنتوں سے بذریعہ ان پانچ وریدوں کے جن کے باہم ملنے سے پورٹل وین (ورید باب الکبد) بنتی ہے۔ جذب ہو کر جگر میں چلا جاتا ہے۔ اور کیلوس چھوٹی آنتوں سے بذریعہ عروق جاذبہ (عروق لبنیہ) جذب ہو کر براہ قنات الصدر خون میں جا ملتا ہے۔ لیکن یونانی اطباء اس بات کے قائل ہیں، کہ خلاصۂ غذا یعنی کیلوس معدہ سے (لیکن بقول جالینوس وغیرہ نیز امعاء سے) براہ ماساریقا جذب ہو کر جگر میں چلا جاتا ہے۔ جہاں پر اس سے کیموس یا اخلاط اربعہ بنتے ہیں۔ پھر غذا کے جزو بدن ہونے کے متعلق تو صرف لفظی اختلاف ہے چنانچہ (۴) ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خون بشکل لمف جسم کی پرورش کرتا ہے۔ اطباء یونانی کا بھی ایسا ہی خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ رطوبت اولیٰ یعنی خون رطوبت ثانیہ میں تبدیل ہو کر رطوبت طلیہ (لمف) کی شکل میں جسم کی پرورش کرتا ہے پس دونوں کا مفہوم اور مطلب ایک ہی ہے باقی رہا اخلاط اربعہ اور ان کی تطبیق کا مسئلہ اس کو دیکھو افعال جگر کے بیان میں صفحہ ۱۵۴ پر ٭

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جگر

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
جگر	کبد	لوور Liver

جگر بھی ایک قسم کا غدہ یعنی گلٹی ہے۔ جو جسم انسان کے دیگر کل غدد کی نسبت بڑا ہوتا ہے۔ جگر جوانوں کی نسبت بچوں میں اور بچوں کی نسبت جنین میں بڑا ہوتا ہے۔ اس کی رنگت سرخی مائل بھوری ہوتی ہے۔ اس کا بہت سا حصہ دائیں جانب کے نیچے کی پسلیوں کے نیچے معدہ کے اوپر کو ہوتا ہے مگر اس کے بائیں لوتھڑے کا تھوڑا حصہ بائیں جانب کے نیچے کی پسلیوں کے نیچے بھی رہتا ہے حالت صحت جوانی میں جگر کا وزن ۳ یا ۴ پونڈ (ڈیڑھ دو سیر انگریزی) یا سارے جسم کا چالیسواں حصہ ہوتا ہے۔ اس کا طول ۱۰ سے ۱۲ انچ اور عرض ۶ سے ۷ انچ ہوتا ہے جگر کی بالائی سطح محدب اور حجاب حاجز کے نیچے رہتی ہے جس پر آبدار جھلی (بارلیطون) لگی رہتی ہے۔ یہ سطح دیا فرغما اور دیوار شکم سے متصل ہوتی ہے اور رباط معلق کے ذریعے دائیں اور بائیں دو ٹکڑوں یا لوتھڑوں میں منقسم ہوتی ہے۔ جگر کی زیریں سطح مقعر ہوتی ہے اور اس سطح پر بھی سوائے ایک دو درزوں کے باقی سب پر آبدار جھلی لگی رہتی ہے۔ اس سطح کے نیچے معدہ بارہ انگشتی آنت اور داہنا گردہ



Fig. 140.—The Under Surface of the Liver.

(۱) لاجوف نازل (۲) وریدباب الکبد (۳) ثریان کبدی (۴) وریدکبدی (۵) مرارہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

وغیرہ ہوتے ہیں۔ زیریں سطح پر ایک لمبی درز جگر کو دو حصّوں میں تقسیم کر دیتی ہے جن میں سے دایاں حصّہ بہ نسبت بائیں کے بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور پیٹ کے بالائی اور داہنی طرف کی کل جگہ میں رہتا ہے۔ بایاں حصّہ چھوٹا اور معدے کے اوپر واقع ہوتا ہے۔

جگر کے دونوں کناروں میں سے جگر کا اگلا کنارہ جس پر ایک کھنڈانہ ہوتا ہے پتلا اور آزاد ہوتا ہے اور مردوں میں پسلیوں کے کنارے کے برابر لیکن بچوں اور عورتوں میں اکثر قدرے آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے جگر کا پچھلا کنارہ گول اور دبیز ہوتا ہے جو دیا فرغما سے بذریعہ تاج نما بند (رباط اکلیلی۔ کارونری لگمینٹ) کے چسپاں اور شریان اعظم اور ورید اجوف سے متصل ہوتا ہے۔

جگر بذریعہ پانچ بند یا رباطات کے اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ جگر میں پانچ ہی شکاف پانچ ہی زاوئے اور پانچ ہی قسم کے عروق ہوتے ہیں جگر کے پانچ بند یا اربطہ میں سے چار تو صفاق یا باریطون کے ہوتے ہیں۔ اور ایک بند ناف کی ورید کا بقیہ خشک حصّہ ہے۔ جن کے نام وغیرہ حسب ذیل ہیں۔

نوٹ:۔ (۱) جگر کا لمبا بند (رباط طولی۔ لانجی ٹیوڈینل لگمینٹ) جس کو لٹکانے والا بند (رباط معلق۔ سسپنسری لگمینٹ یا چوڑا بند (رباط عریض۔ براڈ لگمینٹ) بھی کہتے ہیں۔ یہ باریطون جھلی کی ایک چنٹ ہے۔ اس میں تین کنارے ہوتے ہیں۔ چنانچہ بالائی کنارہ حجاب حاجز اور پیٹ کے دائیں سیدھے عضلہ کے خلاف سے ناف تک لگا ہے۔ زیریں کنارہ جگر کی محدب سطح پر اس کے پچھلے سے اگلے کنارے تک چسپاں ہے اور اگلا کنارہ آزاد ہوتا ہے۔ جس کے دونوں پرتوں کے درمیان گول بند ہوتا ہے۔

(۲-۳) جانبی بند (ارابطہ جانبیہ۔ لیٹرل لگمینٹس) یہ بھی باریطون جھلی کی دو چنٹیں ہیں۔ جو جگر کے دائیں اور بائیں لوتھڑوں کو حجاب حاجز سے ملائے رکھتی ہیں۔

(۴) تاج نما بند۔ (رباط اکلیلی۔ کارونری لگمینٹ) یہ بھی باریطون جھلی کی دو تہوں سے مرکب ہے جو جگر کے پچھلے یا دبیز کنارے کو حجاب حاجز سے ملائے رکھتا ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(۵) گول بند (رباط مستدیر۔ راؤنڈ لگامنٹ) یہ دریدنا ف کا بقیہ ہے جو ناف شروع ہو کر رباط عریض کی دو تہوں میں سے گزر گزر کر جگر کے طولانی شگاف میں پہنچ کر اجوف نازل سے جا ملتا ہے ۔

جگر کی زیریں سطح پر یہ پانچ شگاف پائے جاتے ہیں جن سے جگر پانچ زوائد یا لوتھڑوں میں منقسم ہو جاتا ہے

(۱) لمبا شگاف (فرجۂ طولیہ۔ لانجی ٹیوڈنیل فشر) یہ ایک گہرا شگاف ہے۔ جو جگر کے اگلے کنارے کے کھنڈانہ سے شروع ہو کر اس کے پچھلے یا دبیز کنارے تک پہنچ کر اس کو دائیں اور بائیں دو لوتھڑوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اس کی پچھلی تہائی پر اس میں جگر کا آڑا شگاف مل جاتا ہے۔ اس کے جانے ملاپ سے قدرے آگے اکثر اشخاص میں جگر کا ایک ٹکڑا شگاف مذکور پر بصورت پل آڑا گزر کر جگر کے دائیں اور بائیں لوتھڑوں کو ملاتا ہے۔ اس لیے اس کو پل جگر (قنطرۃ الکبد۔ پانز ہیپے ٹس) کہتے ہیں ۔

(۲) شگاف مجری وریدی (فرجۂ مجری وریدیہ فشرآف ڈکٹس وینوسس) حقیقت میں یہ مذکورہ بالا شگاف طولانی کا ایک چھوٹا اور پچھلا حصہ ہے جو شگاف مذکور کے بائیں سرے سے لے کر جگر کے پچھلے کنارے تک پہنچتا ہے۔ اس میں ایک پتلی ریشہ دار ڈوری ڈکٹس وینوسس کا بقیہ ہے ۔

(۳) آڑا شگاف (فرجۂ مستعرضہ۔ ٹرسورس فشر یا فرجۂ باب۔ پورٹل فشر) یہ ایک گہرا اور قریب دو انچ کے لمبا شگاف ہے۔ جس میں شریان جگر۔ وریدباب اور جگر کی نالی واقع ہیں ۔

(۴) شگاف مرارہ (فرجۂ مرارہ۔ فشرآف گال بلیڈر) یہ ایک کم گہرا شگاف ہے۔ جو آڑے شگاف کے دہنے سرے سے لے کر جگر کے آزاد کنارے تک لمبے شگاف کے متوازی جاتا ہے اس میں مرارہ رہتا ہے ۔

(۵) شگاف اجوف (فرجۂ اجوف۔ فشرآف وینا کیوا) یہ ایک چھوٹا اور گہرا شگاف ہے۔ جو آڑے شگاف کے دہنے سرے کے قدرے پیچھے سے شروع ہو کر جگر کے پچھلے کنارے تک جاتا ہے اس میں اجوف صاعد

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سوپیریر وینا کیوا) پایا جاتا ہے۔

جگر کے لوتھڑے (زوائد کبد لوبز آف دی لوور) بھی تعداد میں پانچ ہیں۔ جو حسب ذیل ہیں:۔

(۱) جگر کا دایاں لوتھڑا (زائدہ یمنی۔ رائٹ لوب) یہ جگر کے تمام لوتھڑوں سے بڑا اور بائیں لوتھڑے سے چوگنا یا پنجگنا ہوتا ہے۔ اس کی زیریں سطح پر تین شگاف تین سوراخ اور تین لوتھڑے ہوتے ہیں۔

(۲) بایاں لوتھڑا (زائدہ یسری) لیفٹ لوب) یہ داہنے لوتھڑے کی نسبت چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کی بالائی سطح محدب اور زیریں سطح مقعر ہے۔ جو معدہ پر واقع ہے۔

(۳) چورس لوتھڑا۔ زائدہ مربعہ۔ لوبس کوڈرنیس) یہ ایک مربع صورت کا لوتھڑا ہے۔ جس کے سامنے جگر کا آڑا کنارہ پیچھے آڑا شگاف۔ دائیں جانب شگاف اجوف اور بائیں جانب شگاف مرارہ اور بائیں جانب لمبا شگاف ہوتا ہے۔

(۴) مثلث لوتھڑا (زائدہ مثلثہ۔ لوبس سپی جی لیائی) یہ ایک چھوٹا مثلث شکل کا لوتھڑا ہے جس کے سامنے جگر کا آڑا شگاف دائیں جانب شگاف اجوف اور بائیں جانب شگاف مجری وریدی ہوتا ہے۔

(۵) دمچی لوتھڑا (زائدہ ذنبیہ۔ لوبس کاڈیٹس) یہ درحقیقت مثلث لوتھڑے کا بڑھاؤ ہے۔ جو آڑے شگاف کے دائیں اور شگاف اجوف کے بائیں سرے سے شروع ہو کر باہر کی جانب بڑھتا ہوا داہنے لوتھڑے میں گم ہو جاتا ہے یہ کبھی بالکل نامعلوم ہوتا ہے۔

جگر کے عروق بھی مندرجہ ذیل پانچ ہی قسم کے ہوتے ہیں۔

(۱) وریدِ درِ جگر (وریدِ باب الکبد۔ پورٹل وین) جو (۱) وریدِ معدی (۲) وریدِ معوی اعلیٰ (۳) وریدِ معوی اسفل (۴) وریدِ طحالی اور (۵) وریدِ بانقراسی کے باہم ملنے سے بنتی ہے اور دو شاخوں میں منقسم ہو کر جگر کے آڑے شگاف کی راہ اس کے دائیں اور بائیں لوتھڑوں میں داخل

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہوتی اور تمام جگر میں پھیلتی ہے۔ معدہ وامعاء کا خلاصہ غذا اسی کی راہ جگر میں پہنچتا ہے۔ صفراء یا پت کی پیدائش بھی اسی وریدکی شاخوں سے ہوتی ہے۔

(۲) (شریان جگر (شریان الکبد ہیپے ٹک آرٹری) یہ بھی دو شاخوں میں منقسم ہو کر آڑے شگاف کی راہ جگر کے دائیں اور بائیں لوتھڑوں میں داخل ہو کر اور اس میں صاف خون پہنچا کر اس کی پرورش کرتی ہے۔

(۳) پت کی نالی (مجریٰ الکبد ہیپے ٹک ڈکٹ) یہ جگر کے آڑے شگاف میں واقع ہے۔ اور قریب دو انچ کے لمبی ہے۔ اور دائیں اور بائیں دو پت کی نالیوں کے باہم ملنے سے بنتی ہے۔ یہ پتہ کی نالی (مجریٰ المرارہ۔ سسٹک ڈکٹ) سے مل کر ایک موٹی اور قریب ۲ ۱/۲ انچ کے لمبی نالی بناتی ہے جس کو صفراء کی عام نالی (کامن بائل ڈکٹ) کہتے ہیں جو بارہ انگشتی آنت میں کھلتی ہے۔

(۴) جگر کی وریدیں (اور وہ کبدیہ ہیپے ٹک وینز) جو جگر کی ساخت کے اندر چھوٹی اور باریک وریدوں کے باہم ملنے اور اکٹھے ہونے سے بنتی ہیں۔ جگر کے پچھلے یا دبیز کنارے پر پہنچ کر وریدا جوف صاعد۔ (سپیریئر وینا کیوا) میں تمام ہوتی ہیں۔ شریان جگر اور وریدباب الکبد کا خون جو جگر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ انہیں وریدوں کے ذریعے وریدا جوف میں واپس جاتا ہے۔

نوٹ ط

شریان جگر کا خون حسب قاعدہ کلیہ وریدجگر میں بکایک داخل نہیں ہوتا بلکہ برخلاف قاعدہ کلیہ وہ پہلے وریدباب الکبد کی چھوٹی اور باریک شاخوں میں داخل ہوتا ہے اور پھر وریدباب کے خون سے آمیز ہوتا ہے۔ آخر کو جگر کی وریدوں میں پہنچتا ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(۵) جگر کے عروق جاذبہ (عروق جاذبۂ کبد سے پتے نمک لفٹے نکس) دو قسم کے ہوتے ہیں ایک اوتھلے اور دوسرے گہرے۔ جو عروق جگر کے ہمراہ معدہ کے چھوٹے اطراف کے عروق جاذبہ میں ختم ہوتے ہیں

مرارہ (تا) پتہ

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
پتہ	مرارہ	گال بلڈر Gall Bledder

پتہ ناشپاتی کی شکل کی ایک تھیلی ہوتی ہے۔ جو جگر کے داہنے حصے کی زیریں سطح پر اس کے سامنے کے کنارے کے نزدیک لگی رہتی ہے۔ یہ تھیلی ۱۲ انچ لمبی اور ایک انچ چوڑی ہوتی ہے۔ اور جب فعل ہضم جاری نہیں ہوتا تو جگر سے صفراء یعنی پت پیدا ہو کر اسی تھیلی میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ اس میں قریب ½ چھٹانک کے صفراء سما سکتا ہے۔

پت کی نالیاں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ دو نالیاں جگر کے دونوں حصوں سے پیدا ہو کر باہم مل کر ایک نالی بن جاتی ہے۔ جسے جگر کی نالی (مجریٰ الکبد پتے نمک ڈکٹ) کہتے ہیں۔ اور جو قریب ڈیڑھ انچ کے لمبی ہوتی ہے۔ دوسری پتے کی نالی (مجریٰ المرارہ۔ سسٹک ڈکٹ) کہتے ہیں۔ جو قریب ۳ انچ کے لمبی اور بطخ کے پر کے برابر موٹی ہوتی ہے۔ یہ لبلبہ اور بارہ انگشتی آنت کے درمیان سے نیچے جا کر اور لبلبے کی نالی کے ساتھ مل کر بارہ انگشتی آنت میں کھلتی ہے۔

افعال جگر

جگر کے افعال میں سے اس کا ایک فعل صفراء پیدا کرنا ہے۔ صفراء جگر میں پیدا ہوتا ہے یعنی ذرات جگر (پتے نمک سیلز) صفراء بناتے ہیں۔ وہ جگر کی عروق شعریہ کے خون میں سے مواد مطلوبہ حاصل کر کے خود صفراء بناتے ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اس طرح سے صفراء پیدا ہو کر جگر کی ایک باریک باریک صفرادی نالیوں میں جاتا ہے۔ اور ان سے بڑی صفرادی نالی میں صفراء جگر میں ہمیشہ بنتا رہتا ہے پس اس لحاظ سے اس کی پیدائش لعاب دہن، رطوبت معدی اور رطوبت بالقراس سے جو کہ کھانا کھانے کے بعد ہی نراد شس پاتی ہیں مختلف ہوتی ہے۔

صفراء کے خواص اور فوائد

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
پت	صفراء	بائل Bile

صفراء ایک سیال رطوبت ہے۔ جس میں کسی قدر لیس بھی ہوتی ہے انسان میں اس کی رنگت زرد سنہری مائل ہوتی ہے۔ اور اس کا مزہ نہایت کڑوا ہوتا ہے۔ یہ پانی کی نسبت بھاری ہوتا ہے جگر سے پیدا ہوتے وقت تو صفراء پتلا ہوتا ہے۔ مگر مرارہ یعنی پتہ میں جا کر گاڑھا لیسدار ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد صفراء زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ مگر بھوک کی حالت میں کم پیدا ہوتا ہے۔ اور دو تین دن کی فاقہ کشی میں تو بالکل پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ہضم کے وقت صفراء جگر سے پیدا ہو کر سیدھا بارہ انگشتی آنت میں جاگرتا ہے مگر بھوک کے وقت وہ جگر سے پتہ میں جا کر جمع ہوتا ہے۔ اور پھر ہضم کے وقت آنتوں میں گرتا ہے بحالت صحت ایک نوجوان آدمی کے جگر سے دن رات میں آدھ سیر سے لے کر سوا سیر تک صفراء پیدا ہوتا ہے۔ صفراء کے فوائد حسب ذیل ہیں (۱) صفراء آنتوں کے فعل میں امداد کرتا ہے۔ یہ غذا کے روغنی اجزاء کو قابل ہضم وجذب بنا دیتا ہے۔ یعنی انھیں محلول کر کے رقیق وسیال بنا دیتا ہے۔

(۲) صفراء تعفن وفساد کو روکتا ہے۔ اس لیے یہ آنتوں میں غذا کو متعفن وفاسد نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ تجربات سے یہ ثابت ہوا۔ کہ جب صفراء آنتوں میں نہیں گرتا تو ان کی رطوبت متعفن و بدبو دار ہو جاتی ہے اور جب صفراء کسی ایسی رطوبت کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے کہ جس میں خمیر اٹھ رہا ہو تو اس کی آمیزش سے خمیر رک جاتا یا بالکل زائل ہو جاتا ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(۳) صفراء ایک قدرتی طبعی مسہل ہے۔ کیونکہ یہ آنتوں کے غدد میں تحریک پیدا کر کے رطوبات و مواد کے اخراج کو بڑھا دیتا ہے۔ اور آنتوں کو اخراج مواد کے لیے متنبہ کرتا ہے۔ اسی لیے مرض یرقان میں جب صفراء آنتوں میں نہیں گرتا تو قبض ہو جاتا ہے اور جب صفراء آنتوں میں زیادہ گرتا ہے تو دست آنے لگتے ہیں۔

(۴) صفراء سے وریدباب الکبد کا خون صاف ہوتا ہے جگر میں جو خون باب الکبد کے ذریعے آتا ہے۔ وہ چونکہ معدہ اور آنتوں سے آتا ہے اس لیے اس کے ساتھ غذاء کے اکثر ایسے مواد بھی شامل ہوتے ہیں۔ جو قابل تغذیہ نہیں ہوتے یا مضر ہوتے ہیں پس جگر ان کو صفراء کے ساتھ خارج کر دیتا ہے۔

(۵) صفراء حرارت بدنیہ کے قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ چونکہ پاخانہ میں صفراء کا بہت تھوڑا حصہ پایا جاتا ہے۔ اور وہ بھی اس کا رنگین مادہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ خیال کیا گیا ہے، کہ صفراء کا اصلی تلخ جوہر جو آنتوں سے دوبارہ خون میں جذب ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ اس کی ترکیب میں مواد مشتعلہ کی مقدار ضرورت بدنیہ سے کسی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ گمان غالب ہے۔ کہ وہ آکسیجن یا نسیم سے مل کر مشتعل ہو جاتے ہیں اور بدن میں حرارت پیدا کر کے بشکل بخارات دخانیہ خارج ہو جاتے ہیں۔

(۶) جگر گلائکوجن[1] یا حیوانی نشاستہ بناتا ہے۔ اور وہ اس طرح سے کہ غذا کا نشاستہ آنتوں میں شکر انگوری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر آنتوں میں ساری شکر منجذب ہو کر بذریعہ باب الکبد جگر میں پہنچتی ہے اور پھر جگر اس کو گلائکوجن یا حیوانی نشاستہ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں جگر میں جمع رہتا ہے اور حسب ضرورت پھر شکر میں تبدیل ہو کر خون میں ملتا رہتا ہے اور پھیپھڑوں کے عضلات و دیگر ساختہائے جسم میں پہنچ کر اور صرف ہو کر جسم میں حرارت و قوت پیدا کرتا ہے۔

نوٹ:۔ قدرت نے کاربن اور پانی کو باہم ملا کر شکر بنا دی ہے۔ چنانچہ جب شکر کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ کاربن اور پانی میں متفرق ہو جاتی ہے

[1] Glycogen

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

شکر ہمارے جسم میں حرارت پیدا کرتی ہے اور اُسے قوت بخشتی ہے۔ حرارت جسم زیادہ تر عضلات جسم کی حرارت سے پیدا ہوتی ہے اور جب عضلات میں حرکت ہوتی ہے۔ تو ان میں سے کاربانک ایسڈ گیس اور پانی بنتا ہے اور یہ دونوں شکر کے اجزاء ہیں چنانچہ جب آدمی کوئی زیادہ زور کا کام یا ورزش کرتا ہے۔ تو اس کو سانس چڑھ جاتا ہے۔ اور پسینہ آجاتا ہے۔ جس کے یہ معنی ہیں۔ کہ عضلات کی زیادہ حرکت سے جو زیادہ کاربانک ایسڈ گیس بنتی ہے وہ براہ تنفس خارج ہو جاتی ہے۔ اور جو پانی بنتا ہے۔ وہ بشکل پسینہ خارج ہو جاتا ہے۔ بحالت صحت خون میں ۱ء سے ۱۵ء فیصدی (یعنی ایک ہزار حصہ خون میں صرف ایک یا ڈیڑھ حصہ شکر ہوتی ہے۔ لیکن عضلات میں ۵ر سے ۹ر فی صدی (یعنی ایک ہزار حصہ میں پانچ سے نو حصے) شکر ہوتی ہے پس خون کی نسبت عضلات میں کیوں اس قدر زیادہ شکر ہوتی ہے؟ یہ اس واسطے ہوتی ہے کہ اگر عضلات کو غیر معمولی محنت ومشقت کرنی پڑے تو ان میں شکر کی کمی سے ان کا کام رُک نہ جائے۔ پس عضلات کی حرکت سے حرارت کا پیدا ہونا گویا ان میں شکر کی موجودگی اور اس کی تحلیل پر منحصر ہوتا ہے اور اگر عضلات میں شکر کم ہو تو اس کے تحلیل ہو چکنے کے بعد پھر خود عضلات وغیرہ تحلیل ہونے لگتے ہیں۔ پس غذا کی تمام شکر جگر میں پہنچ کر اور گلائکوجن یا حیوانی نشاستہ میں تبدیل ہو کر جگر میں جمع رہتی ہے۔ اور دوران خون میں نہیں جانے پاتی تاکہ خون میں شکر کی مقدار ضرورت سے زیادہ نہ ہو جائے اور شکر بھی ان امواد میں سے ہے۔ جن کو خون اعضاء جسم میں پہنچاتا ہے پس خون میں شکر کی ایک قلیل مقدار ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ اور جب یہ صرف ہو جاتی ہے۔ تو کسی قدر گلائکوجن جو کہ جگر میں جمع ہوتی ہے جگر اس کو شکر میں تبدیل کر کے خون میں بھیج دیتا ہے۔ پس اس طرح سے خون میں شکر ہمیشہ مناسب مقدار میں موجود رہتی ہے لیکن اگر جگر کے فعل میں نقص یا فتور آجائے۔ جس کے سبب وہ شکر کو ہضم نہ کر سکے یعنی اس کو گلائکوجن یا حیوانی نشاستہ میں تبدیل نہ کر سکے یا قوت ماسکہ کے ضعیف ہو جانے کے سبب جگر

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اس کو جمع نہ کر سکے تو ایسی صورت میں خون کے اندر شکر کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور پیشاب میں شکر خارج ہونے لگتی ہے۔ یعنی مرض ذیابیطس شکری ہو جاتا ہے۔

شیریں اور نشاستہ دار غذا کھانے کے بعد جگر میں زیادہ گلائکوجن بنتی ہے۔ لیکن اگر حیوانی غذا کھائی جائے تب بھی جگر گلائکوجن بناتا ہے۔ کیونکہ یہ جگر کا خاصہ ہے۔ پس جگر کا یہ فعل گوشت خور حیوانات میں بھی پایا جاتا ہے۔

(۲) جگر تولیدِ م کی تکمیل کرتا ہے۔ اور ناکارہ سرخ دانہائے خون کو ضائع کرتا ہے۔

نوٹ:۔ غذا کے کھانے کے بعد باب الکبد (پورٹل وین) کے خون میں بہت سے ایسے اجزاء غذائیہ ہوتے ہیں۔ جو کہ آنتوں سے بوقتِ ہضم غذا منجذب ہو کر آتے ہیں (مثلاً پیپٹونز امینو ایسڈز۔ جو ان سے بنتے ہیں۔ شکر و نمکیات نہایت باریک ذرات میں منقسم شدہ روغنی اجزاء اور پانی) اور یہ اجزاء غذائیہ جب بذریعہ باب الکبد جگر میں پہنچتے ہیں۔ تو یہ دوبارہ جگر میں ہضم ہوتے ہیں (اسی کو اطباء ہضم کبدی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس طرح سے جگر اس خون کی خاصیت پر جو کہ اس کے درمیان سے ہو کر گزرتا ہے ایک قوی اثر کرتا ہے لہٰذا ورید جگر کا خون یا مخصوص بعد از غذا باب الکبد کے خون سے بہت مختلف ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ غذا کے اجزاء میں جو کہ عروق ماساریقیہ وغیرہ کے ذریعے خون کے ساتھ مل کر آتے ہیں۔ جگر اس قسم کے تغیرات پیدا کرتا ہے۔ کہ وہ طبعی خون بننے کے لائق ہو جاتے ہیں یعنی حیوانی مواد جب معدہ اور آنتوں سے عروق ماساریقیہ اور باب الکبد کے ذریعے جگر میں جاتے ہیں۔ تو وہ جگر میں متغیر ہو کر خون سے قریب ہو جاتے ہیں پس اس طرح سے جگر تولید خون کی تکمیل کرتا ہے۔

ناکارہ سرخ دانہائے خون جس کو جگر ضائع کرتا ہے۔ ان کو خون کا تلچھٹ یا سودا سمجھنا چاہیے۔

(۴) جگر یوریا بناتا ہے۔ اور یوریا جیسا کہ مذکور ہوا اجزاء لحمیہ کا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

فضلہ ہوتا ہے جس کو بھی متقدمین اطبّاء کا سودا سمجھنا چاہیے۔

نوٹ۔ عضلات وغدد اور جسم کی دیگر ساختیں جب اپنے طبعی افعال اور وظائف انجام دیتی ہیں۔ تو اُن کے فضلات بشکل یوریا جسم سے خارج ہوتے ہیں۔ پروٹینز یعنی اغذیہ حیوانیہ یا حیوانی مواد جب معدہ میں ہضم ہوکر قابلِ جذب ونفوذ ہو جاتے ہیں۔ تب ان کو پیپ ٹونز کہتے ہیں۔ اور یہی پیپ ٹونز چھوٹی آنتوں میں مزید ہضم ہوکر جب لطیف طور پر قابلِ جذب ونفوذ ہو جاتے ہیں۔ تب انہیں امینو ایسڈز کہتے ہیں۔ اور یہ امینو ایسڈز جس قدر ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ جگر میں پہنچ کر یوریا میں تبدیل ہو جاتے جب آدمی غذا نہیں کھاتا تو یوریا کی پیدائش گھٹ جاتی ہے۔ لیکن بالکل موقوف نہیں ہو جاتی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود جسمانی بافتوں اور ساختوں (ٹشو کے پروٹینز) سے بھی کسی قدر یوریا بنتا ہے۔ کیونکہ عضلات اور جسم کی دیگر ساختیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ صرف وتحلیل ہوتی رہتی ہیں۔ پس ان کے فضلات بھی امینو ایسڈز میں تبدیل ہوکر اور جگر میں پہنچ کر یوریا میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اجزاء الحمیہ کے فضلات اور امینو ایسڈز خون کے ذریعے ہی جگر میں پہنچتے ہیں پھر جگر ان کو خون سے علیحدہ کرکے یوریا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ گویا یوریا خون کا نچھوڑ ہے۔ جس کو متقدمین اطبّاء یونانی کی بیان کردہ سودا سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

افعالِ جگر میں اطبّاء وڈاکٹروں کا اختلاف

جگر کے افعال میں طبیبوں اور ڈاکٹروں کا اختلاف ہے۔ اطبّاء تو یہ کہتے ہیں کہ کیلوس براہِ راست معدہ اور آنتوں سے بذریعہ عروق ماساریقیہ وباب الکبد جگر میں آتا ہے۔ اور جگر کے فعل سے متاثر ہوکر چاروں اخلاط خون۔ بلغم صفراء اور سودا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ خلاصۂ غذا کا کچھ حصّہ تو بذریعہ عروق ماساریقیہ وباب الکبد جگر میں جاتا ہے اور کچھ حصّہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

بذریعہ عروق کیلوسہ ومجریٰ صدر وریدی خون شامل ہو جاتا ہے۔ (دیکھو بیان ہضم معدی ومعوی صفحہ ۱۲۹ تا ۱۳۹) خلاصۂ غذا خون میں شامل ہو کر مختلف اعضاء میں سے گزرتا ہے۔ جن میں خون کے مخصوص اجزاء بنتے ہیں اور ان میں سے جگر سب سے مقدم ہے۔ علاوہ ازیں تلی۔ ہڈیوں کے گودے اور دوسری گلیٹیوں میں بھی خون کے بعض اجزاء بنتے ہیں۔

خون کہاں پیدا ہوتا ہے؟

اطباء تو یہ کہتے ہیں کہ خون بالخصوص جگر میں پیدا ہوتا ہے۔ اگرچہ دوسرے اعضاء میں بھی وقت ضرورت خون بنا لینے کی قوت ہے۔ چنانچہ تغذیہ کے لیے خون نہ ہو تو وہ بلغم کو خون میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ جگر تو لید کی تکمیل کرتا ہے۔ اور خون کے سفید دانوں سے (جنہیں اطباء بلغم سے تعبیر کرتے ہیں) خون کے سرخ دانے بنتے ہیں۔ وغیرہ پس غور کریں تو اس کے متعلق دونوں گروہوں کے خیالات آپس میں بہت قریب ہیں۔

اخلاط اربعہ (اور) ان کی تطبیق

اخلاط اربعہ سے مراد خون، بلغم، صفراء اور سودا ہے۔ ان میں سے خون اور صفراء کے متعلق تو طبیبوں اور ڈاکٹروں میں کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ بلغم اور سودا کے متعلق اختلاف ہے سودا کے متعلق جیسا کہ افعال جگر میں صفحہ ۱۵۴ پر مذکور ہوا یورپا کو سودا سے تعبیر کر سکتے ہیں باقی رہا بلغم چنانچہ بقول اطباء خلاصۂ غذا جو جگر میں پہنچ کر پختہ ہو کر معتدل القوام ہو جاتا ہے۔ وہ خون ہے۔ اور جو قصور ہضم سے خام رہ جاتا ہے۔ وہ بلغم ہے پس بلغم خون خام ہے۔ جو وقت ضرورت مستحیل بہ خون ہو کر یعنی خون میں تبدیل ہو کر جسم کی پرورش کرتا ہے۔ اور وہ خون کے ساتھ رگوں میں دورہ کرتا ہے وغیرہ پس ان باتوں کو مدنظر رکھنے کے لیے بلغم کو ڈاکٹری میں یقیناً سفید دانہائے خون، اور بالخصوص لمف سے تعبیر کر سکتے ہیں خون کے بیان میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ سفید دانے خون کے سرخ دانوں میں تبدیل

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہو جاتے ہیں اور عروق جاذبہ کے بیان میں لمف کے متعلق بھی یہ لکھا جا چکا ہے کہ وہ ایک پانی جیسی شفاف خفیف زرد رنگ کی کھاری رطوبت ہے۔ خون کی طرح لمف کا بھی کچھ حصہ تو سیال ہوتا ہے۔ اور کچھ دانہ دار اور دانہائے لمف جن کو لمف کارپسکلز کہتے ہیں۔ سفید دانہائے خون کے مشابہ ہوتے ہیں جسم سے باہر نکلنے پر لمف جم جاتی ہے اس کا سیال حصہ اگرچہ خون کے سیال حصہ کی نسبت کم ہوتا ہے لیکن اس میں وہ تمام اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ جو کہ آب خون (پلازما) میں پائے جاتے ہیں پس لمف یقیناً قدیم اطباء یونان کی بیان کردہ بلغم ہے اس لیے ڈاکٹری انگریزی کتب میں بلغمی مزاج کو لمفے ٹیک ٹمپریمنٹ یا فلیگ میٹک ٹمپریمنٹ Phlegmatic Temperament لکھتے ہیں۔

فائدہ:۔ لفظ بلغم معرب ہے یونانی لفظ فلغم Phlegm یا فلغما Phlegma جس کے لغوی معنی ہیں مشتعل ہونا۔ لیکن اصطلاحی معنی ہیں اخلاط اربعہ میں سے خلط بلغم بقراط کے زمانہ میں اس اصطلاح کا اطلاق التہاب یا حرارت پر ہوتا تھا۔ لیکن بعد میں یہ لاطینی لفظ پنچو مشا یا بلغم کا جو کہ بدن کی ایک لیسدار خلط ہے مترادف قرار پایا۔ لیکن پھر اس لفظ کا عام اطلاق راہ تنفس یعنی ناک منہ اور حلق وغیرہ کی رطوبت مخاطیہ (میوکس) پر ہونے لگ گیا اور آج کل بھی عام طور پر ناک منہ حلق اور ہوائی نالیوں کی لیسدار رطوبت کو بھی بلغم کہتے ہیں۔ زمانہ بقراط میں جو اس لفظ کا التہابی مفہوم لیا جاتا ہے اب بھی اس فلیگمون Phlegmon یا فلغمونی سے تعبیر کرتے ہیں۔

بانقراس (یا) لبلبہ

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
لبلبہ	بانقراس	پینکریاس Pancreas

(نوٹ) بانقراس معرب ہے یونانی لفظ پانکراس کا جس کے لغوی معنی تمام گوشت اور چونکہ یہ تلی کے ساتھ مثل گردن کے لگا ہوا دکھائی دیتا ہے اس لیے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اس کو عنق الطحال بھی کہتے ہیں۔
بانقراس بھی درحقیقت ایک قسم کا غدہ یا گلٹی ہے۔ جس کی شکل کتے کی زبان کے مشابہ ہوتی ہے۔ اس کا طول ۶ انچ عرض ڈیڑھ انچ موٹائی سوا انچ اور وزن ایک چھٹانک سے تین چھٹانک تک ہوتا ہے۔ یہ گلٹی ناف کے تین چار انچ اوپر معدہ کے پیچھے کمر کے پہلے دوسرے مہرے کے سامنے واقع ہے اس گلٹی میں ایک نالی

تصویر معدہ و جگر بانقراس طحال



مرارہ اور بانقراس کی نالیاں باہم مل کر بارہ انگشتی آنت میں کھلتی ہیں۔

The Stomach, Duodenum, Liver, Spleen, and Pancreas.

ہوتی ہے جو اس کے بائیں سرے سے شروع ہو کر اس کے دائیں سرے کی طرف اکر اور پتہ کی عام نالی کیساتھ مل کر بارہ انگشتی آنت میں جا کھلتی ہے اس گلٹی کی ساخت بھی تھوک پیدا کرنے والی گلٹیوں کی ساخت کی مانند ہوتی ہے۔

بانقراس یا لبلبہ کے منافع۔ اس غدہ یا گلٹی سے ایک رطوبت پیدا ہوتی ہے جس کو رطوبت لبلبہ (پینکریاٹک جوس) کہتے ہیں۔ یہ بے رنگ پتلی سی رطوبت ہوتی ہے۔ جس کی کیفیت کھاری ہوتی ہے۔ اس رطوبت میں یہ تین فرمینٹس یا خمیر ہوتے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(۲) ٹریپ سین (لیلیین) یہ پیپ سین کی طرح غذا کے اجزاء ملحمہ یعنی پروٹینز کو ہضم کرکے پیپٹونز میں تبدیل کر دیتا ہے۔
تفصیل کے لیے دیکھو ہضم وجذب غذا صفحہ ۱۴۱ پر ۔

طحال (یا) تلی

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
تلی	طحال	سپلین Spleen

تلی بھی ایک ایسا غدہ یا گلٹی ہے۔ جس کی کوئی نالی نہیں۔ یہ شکل میں چپٹی مستطیل رنگت میں سُرخ سیاہی مائل اور نرم و نازک ہوتی ہے۔ پیٹ کے بائیں طرف نیچے والی پسلیوں کے نیچے رہتی ہے آب دار جھلی اس کو چاروں طرف سے ملفوف کرتی ہے اور اس جھلی کا ایک بند اس کو معدہ کے ساتھ ملاتا ہے۔ تندرست جوان آدمی میں تلی کا طول پانچ انچ عرض میں تین یا چار انچ۔ موٹائی ایک یا ڈیڑھ انچ اور وزن اڑھائی یا تین چھٹانک ہوتا ہے۔ اس کی بیرونی سطح محدب۔ صاف اور حجاب حاجز کے نیچے رہتی ہے۔ اندرونی سطح مقعر ہوتی ہے۔ جو بذریعہ ایک کھنڈار (ناف طحال۔ سُرۃ الطحال ہائلم) کے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس سطح میں معدہ کا ابھار لبلبہ کا باریک سرا اور خمدار آنت کا خم ہوتا ہے۔ حالت صحت میں تلی پسلیوں کے نیچے محسوس نہیں ہو سکتی مگر جب حالتِ مرض میں وہ بڑھ جاتی ہے تو بعض اوقات ناف اور پیڑو تک چلی جاتی ہے ۔

طحال یعنی تلی کے افعال یا منافع (۱) تلی میں سفید دانہائے خون بنتے ہیں (۲) اس میں سُرخ دانہائے خون بھی بنتے ہیں (۳) پرانے اور ناکارہ سُرخ دانہائے خون کو یہ ضائع کرتی ہے۔

نوٹ:۔ ان ضائع شدہ سُرخ دانہائے خون کو اگر متقدمین اطباء یونان کے خیال کے موجب سودا سے تعبیر کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔

(۴) یہ یورک ایسڈ کے بننے میں بھی مدد دیتی ہے یورک ایسڈ یوریا سے ملتا ہے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جس کو بھی ہم نے سودا سے تعبیر کیا ہے (۵) اس میں ایک اندرونی رطوبت پیدا ہوتی ہے جو رطوبت لبلبہ (لبلبین) کے ہضم میں مدد دیتی ہے۔ نیز خون کے دباؤ پر بھی کچھ اثر ڈالتی ہے۔

نوٹ: تجربات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اگر تلی کو کسی آدمی یا حیوان کے جسم میں سے نکال دیا جائے تو اس کی صحت پر کچھ بہت مضر اثر نہیں پڑتا سوائے اس کے کہ خون کے سرخ وسفید دانوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے وغیرہ۔

اعضائے بول

اعضائے بول تعداد میں چار ہوتے ہیں (۱) دو گردے (۲) دو گردوں کی نالیاں (۳) ایک مثانہ (۴) ایک پیشاب کی نالی جن کا بیان ذیل میں ترتیب وار کیا جاتا ہے۔

کُلیہ (یا) گُردہ

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
گردہ گردے	کُلیہ۔ کلیتین	کِڈنی۔ کِڈنیز Kidney

نوٹ:۔ گردہ کو عربی میں کلیہ کہتے ہیں جس کا تثنیہ کلیتین یا کلیتان اور جمع کُلی ہے۔

گردے تعداد میں دو ہوتے ہیں ایک دائیں طرف دوسرا بائیں طرف ہر ایک گردہ گیارھویں پسلی کے نیچے پیٹ کے پچھلی طرف کمر کے مقام پر واقع ہے۔ دہنا گردہ بسبب جگر کے بائیں گردے سے قدرے نیچا ہوتا ہے۔ جوانی کی حالت تندرستی میں ہر ایک گردہ چار انچ لمبا دو انچ چوڑا اور دو سے تین چھٹانک وزنی ہوتا ہے۔ عورتوں کے گردے وزن میں آدھی چھٹانک کم ہوتے ہیں گردے درحقیقت نالی دار گلٹیاں ہیں۔

ہر ایک گردہ کی اگلی سطح محدب اور پچھلی سطح چپٹی ہوتی ہے۔ بیرونی کنارہ محدب اور اندرونی کنارہ مقعر ہوتا ہے۔ جس میں ایک کھندانہ ہوتا ہے جس کو ناف

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تصویر گردہ ومثانہ وحالبین وغیرہ

Fig. 157. The Kidneys, Bladder, and their Vessels. Viewed from behind.

کی مشابہت سے ناف گردہ (سرۃ الکلیہ ہائیس) کہتے ہیں۔ اس کے راستے عروق واعصاب وغیرہ گردے کے اندر جاتے ہیں۔ اور پیشاب کی نالی (حالب یوریٹر) اس سے باہر آتی ہے گردے کے اوپر کا سرا موٹا اور گول ہوتا ہے جس پر گردے کی کوپی (کلاہ گردہ سوپرارینل کیپشول) لگی رہتی ہے۔ زیریں سرا پتلا اور چھوٹا ہوتا ہے۔ گردے پر ریشہ دار جھلی کا ایک غلاف (رینل کیپشول) ہوتا ہے۔

اندرونی ساخت۔ اگر ایک گردے کو اس کے درمیانی نشیب یعنی ناف گردہ کے مقام پر سے پوری لمبائی میں درمیان سے چیر کر دو حصے کر دیں اور دیکھیں تو اس کے اندر پہلے ایک چھوٹا سا جوف دکھائی دیتا ہے یہ درحقیقت پیشاب کی نالی (حالب۔ یوریٹر) کے بالائی حصے کا پھیلاؤ ہے۔ اس کو اردو میں جیب گردہ۔ عربی میں حوض کلیہ اور انگریزی میں پلوس آف دی کڈنی) کہتے ہیں اس جوف میں چند مخروطی بلندیاں پائی جاتی ہیں۔ جنہیں مینار گردہ (پیرامڈ آف دی کڈنی) کہتے ہیں۔ ان مخروطی بلندیوں کی چوٹیاں اس جوف کی طرف ہوتی ہیں اور ان چوٹیوں پر سینکڑوں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں۔ جو درحقیقت پیشاب کی ان باریک باریک نالیوں کے دہانے ہوتے ہیں۔ جو کہ ان میناروں کی چوٹیوں میں آکر ختم ہوتی ہیں۔ گردے کا یہ درمیانی حصہ جس میں مینار گردہ ہوتے ہیں۔ سرخ زردی مائل ہوتا ہے اس کو گردے کا گودا (لب الکلیہ میڈلا آف دی کڈنی) کہتے ہیں۔ اور اس کے اوپر والے محیطی حصے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کو یعنی گردے کے کنارے کے نزدیک والے حصے کو جو ساخت میں دانہ دار اور رنگت میں سیاہی مائل ہوتا ہے۔ گردے کا چھلکا (قشرۃ الکلیہ۔ کارٹکس) کہتے ہیں اس حصہ سے پیشاب کی نہایت باریک باریک نالیاں شروع ہوتی ہیں جنہیں عربی میں انیب بولیبہ اور انگریزی میں ٹیوبیولائی یوری نفرائی کہتے ہیں۔ ان کے گرد عروق دمویہ کا جال ہوتا ہے اور یہ نالیاں ایک طرف سے بند ہوتی ہیں اور دوسری طرف حوض گردہ میں مینار گردہ کی چوٹیوں میں تمام ہوتی ہیں۔ ان نالیوں سے پیشاب کے قطرات رس رس کر حوض گردہ میں پہنچتے ہیں۔ اور وہاں سے بذریعہ حالب مثانہ کی طرف چلے جاتے ہیں ہر ایک نالی پہلے ایک چھوٹی تھیلی (میل پیگی ئن کیپشول) سے شروع ہو کر سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی نیچے کو آتی ہے لیکن مینار گردہ میں آکر سیدھی ہو جاتی ہے۔ ہر ایک چھوٹی سی تھیلی یا میل پیگی ئن کیپشول میں شریان گردہ (رینل آرٹری) کی آخری نہایت چھوٹی چھوٹی شاخوں میں سے ایک شاخ ہو کر اور بل پیچ کھا کر ایک گول گچھا بنا دیتی ہے جسے انگریزی میں گلامی رُولس کہتے ہیں یہ گچھا اس تھیلی کو بھر دیتا ہے۔ اور اس کا خون بذریعہ ایک چھوٹی سی ورید کے واپس جاتا ہے لیکن یہ ورید فوراً ہی کسی بڑی ورید میں نہیں جا ملتی بلکہ اس باریک نالی کے گرد جو عروق شعریہ کا جال ہوتا ہے اس میں جا کھلتی ہے۔ پھر اس عروقی جال سے چھوٹی چھوٹی وریدیں شروع ہو کر اور رفتہ رفتہ باہم مل کر ورید گردہ (رینل وین) بناتی ہیں۔ جب خون دور کرتا ہوا

لمبائی میں درمیان سے کاٹے ہوئے گردے کی تصویر



Fig. 158.—Longitudinal Section of the Human Kidney. One-half the natural size.

(۱) دانے دار حصہ (۲) میناروں کی شکل کے ستون (۳) حوض گردہ کی نالیاں (۴) میناروں کی چوٹیاں (۵) میناروں کا تنگ حصہ (۶) حوض گردہ (۷) یورٹر یا حالب۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ان شریانی گچھوں میں آتا ہے۔ نویہ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں جن میں اپنی تھیلی ام کا نہایت باریک استر ہوتا ہے۔ خون میں اجزاء بول کو علیحدہ کرتی رہتی ہیں جو پھر ان کی باریک نالیوں کے ذریعے رس رس کر حوض گردہ میں جاتا ہے۔ اور وہاں سے براہ حالب مثانہ میں چلا جاتا ہے سبحان اللہ! اس حکیم مطلق نے کس حکمت کاملہ سے جسم انسان کی یہ مشین یا کل بنائی ہے

افعال گردہ

گردے پیشاب پیدا کرتے ہیں جس طرح دوسرے غدد سے خون کے مختلف مواد مخصوص رطوبات کی شکل میں خارج ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اجزاء بول بھی گردوں کی باریک نالیوں کے ذریعے خارج ہوتے ہیں۔ چوبیس گھنٹے میں دو نیمن پائنٹ یا تقریباً پچاس اونس وزنی یعنی تقریباً ڈیڑھ سیر پیشاب خارج ہوتا ہے۔

چونکہ شریان گردہ اور ورید گردہ حجم میں بڑی ہوتی ہیں۔ اس لیے گردوں میں خون زیادہ مقدار میں تیزی سے دورہ کرتا ہے اور سارے جسم کا خون گردوں کے ذریعے صاف ہوتا جاتا ہے پیشاب کا جو حصہ گردوں کی نالیوں میں بنتا ہے۔ وہ اگلے حصہ کو حوض گردہ کی طرف دھکیلتا ہے جو آخر کار حالب کے ذریعے مثانہ تک پہنچ جاتا ہے۔

تصویر میل پیگین کیپسول



(۱)۔ باریک شریان جو (۲) گچھا بناتی ہے (۳) باریک ورید خارج ہوتی ہے (۴) باریک نالی (۵) گچھے کے اوپر کی اپنی تھیلی ام (۶) ایضاً نیچے کی ؛

تصویر کلاہ گردہ ونصف گردہ

نیچے سے نصف گردہ کاٹ دیا گیا ہے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کلاہ گردہ

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
کلاہ گردہ	تاج الکلیہ	سوپرارنل کیپسول Supra Renal Capsule
گردہ کی ٹوپی	عُنقُ الکلیہ	ایڈرینل Adrenal

نوٹ:۔ بعض طبی لغات میں اس غدہ کو عنق الکلیہ کے نام سے لکھا ہے۔

یہ دو چھوٹی چھوٹی پیٹی زردی مائل گلٹیاں ہیں۔ جو دونوں گردوں کے بالائی سروں پر مثل کلاہ یا ٹوپی کے بذریعہ خانہ دار جھلی کے چسپاں ہوتی ہیں، ہر ایک گلٹی کا طول ایک سے دو انچ موٹائی چوتھائی انچ اور وزن چار سے آٹھ ماشہ تک ہوتا ہے۔ اس گلٹی کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک درمیانی حصہ۔ جزو لبی یا میڈلا۔ اور دوسرا بالائی یا محیطی حصہ (جزو قشری یا کارٹیکل پورشن)

افعال کلاہ گردہ

بحالی صحت اور بقاء حیات کے لیے یہ دو چھوٹی چھوٹی گلٹیاں نہایت اہمیت رکھتی ہیں چنانچہ اگر کسی جانور کے جسم میں سے یہ دونوں گلٹیاں نکال دی جاتی ہیں۔ تو وہ تین دن کے بعد مر جاتا ہے۔ اور مرنے سے پہلے ضعف اعصاب کے سبب اس کے تمام عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اور شریانوں کی عضلی قوت کے گھٹ جانے سے وہ بھی ڈھیلی پڑ جاتی ہیں۔ اور جانور نہایت سست و نڈھال ہو جاتا ہے انسان میں جب یہ غدد یا گلٹیاں ماؤف ہو جاتی ہیں۔ تو خون کی کیمیاوی ترکیب میں خلل آجاتا ہے۔ ضعف اعصاب و ضعف قلب نمایاں ہوتا ہے۔ جلد کی رنگت زردی یا سیاہی مائل ہو جاتی ہے غیر برعکس ازیں اگر اس گلٹی کا جوہر ایڈرینلین خون کے اندر داخل کیا جائے تو اختیاری عضلات کی انقباضی قوت بڑھ جاتی ہے رگیں تن جاتی ہیں۔ دل قوی ہو جاتا ہے پس اس سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ یہ گلٹیاں اندرونی طور پر کچھ ایسے مواد تیار کرتی ہیں۔ جو خون کی ترکیب میں نہایت اہمیت رکھتے ہیں۔ اور بقاء حیات کے لیے نہایت ضروری ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اس غدّہ یا گلٹی کے دو حصّے ہوتے ہیں۔ ایک درمیانی حصّہ (جزو لبی میڈلا) اور دوسرا بیرونی حصّہ (جزو قشری کارٹیکل پورشن) جس کے افعال اگرچہ تا حال مبہم ہیں۔ لیکن اس قدر معلوم ہے کہ اگر ابتدائی زندگی میں اس گلٹی کے بیرونی حصّہ میں کوئی رسولی وغیرہ ہو جائے یا وہ بڑھ جائے جس سے اس کا جوہر زیادہ مقدار میں پیدا ہو کر خون میں ملتا رہے۔ تو یہ غیر طبعی طور پر یہ آثار بلوغت نمایاں ہونے لگتے ہیں یعنی آدمی جلد بالغ ہو جاتا ہے۔ اگر جنین یعنی پیٹ کے بچّے میں یہ شکایت ہو اور وہ مذکر ہو تو مولود اکثر خنثیٰ پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر مؤنث ہو تو مولود میں بجائے علامات تانیث کے زیادہ تر علامات تذکیر نمایاں ہوتی ہیں۔ اگر پیدائش کے بعد اس گلٹی میں کوئی رسولی وغیرہ ہو جائے تو مریض بہت جلد بالغ ہو جاتا ہے۔ اور اس کا جسم بھی بہت جلد بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ ایسی مریضہ دو تین سال کی عمر کی لڑکی قد و قامت میں چودہ سالہ لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ اور اُس کو حیض آنے لگتا ہے۔ اور تمام علامات بلوغت نمایاں ہوتی ہیں۔ ایسا مریض چھ سات برس کا لڑکا چند ہفتوں یا مہینوں میں بالغ ہو کر ایک چھوٹا سا مضبوط آدمی بن جاتا ہے۔ جس کی مونچھیں بھی نکل آتی ہیں اور اس میں تمام آثار بلوغت نمایاں ہوتے ہیں۔ جس طرح سے قند وغیرہ کے شربت میں خمیرہ شراب کے ملا دینے سے اس میں کچھ عرصہ جوش و ہیجان کے تغیرات پیدا ہوتے ہیں۔ بعینہٖ اسی طرح سے جوہر کلاہ گردہ خون و دیگر رطوبات جسم میں مل کر بلوغت اور جوانی کا جوش پیدا کر دیتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر اس غدّہ کے جوہر کو جوہر جوانی سے تعبیر کیا جائے تو کچھ بیجا نہیں اگر بلوغت کے بعد اس غدّہ کے قشری حصّہ میں رسولی وغیرہ ہو جائے تب بھی تقریباً اسی قسم کی ملیکن ذرا مختلف علامات پیدا ہوتی ہیں مثلاً اگر بیس سالہ عورت کو ایسی بیماری پیدا ہو جائے تو اس کے جسم پر بال زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے داڑھی اور مونچھیں نکل آتی ہیں۔ نیز اس کی آواز مردوں کی طرح بھاری ہو جاتی ہے۔ عضلات جسم بھی سخت اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں مردانہ خصائل پائے جاتے ہیں۔ ایسی عورتیں ڈاڑھی اور مونچھیں منڈواتی ہیں۔ انہیں حسن و زیبائش کی پرواہ نہیں رہتی اور نہ ہی زنانہ جذبات اُن میں موجود ہوتے ہیں۔ انگریزی میں ایسی عورت کو ویری رلسٹ یعنی مرد صورت عورت کہتے ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جوہر کلاہ گردہ کا اثر نہ صرف جسمانی نشوونما اور بلوغت پر پڑتا ہے بلکہ دماغی نشوونما اس کی بالیدگی پر بھی اس کا خاص اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ جب حاملہ عورت میں کلاہ گردہ کا جزو قشری حمل کے ابتدائی مہینوں میں معمول سے دگنا بڑھ جاتا ہے جس سے جنین کے دماغ کے نشوونما پر خاص اثر پڑتا ہے۔ اور اگر وہ نہ بڑھے تو پھر جنین کا دماغ بھی نہیں بڑھتا بلکہ وہ ناقص یا نابود ہوتا ہے۔

کلاہ گردہ کے جزو لبی یا میڈلری حصہ سے ایڈرینالین جوہر پیدا ہوتا ہے۔ اس سے نہ صرف خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ بلکہ اعصاب کے انتہائی سروں کو بھی تحریک ہوتی ہے۔ اس لیے یہ مقوی قلب ہے۔

نوٹ:۔ ایڈرینالین یا جوہر کلاہ گردہ کو جاپان کے مشہور ڈاکٹر "تاکامین" نے ۱۹۰۱ء میں کلاہ گردہ سے علیحدہ کیا تھا۔ اور ۱۹۰۱ء میں امریکہ کی مشہور دواساز پارک ڈیوس کمپنی نے اس جوہر کو طبی دنیا میں پیش کیا یہ ادویہ جدیدہ میں سے ایک بہترین و مفید دوا ہے۔ جو بہت سے امراض میں نہایت مفید ثابت ہوئی ہے۔ (اس کے مفصل حالات دیکھو علم الادویہ میں)

حالبین

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
گردوں کی نالیاں	حالبین	یورٹرز Ureters

گردوں کی نالیاں تعداد میں دو ہوتی ہیں اور اپنے اپنے گردے کے درمیانی جوف حوض گردہ سے شروع ہو کر مثانہ تک پہنچتی ہیں۔ یہ ترچھے طور پر نیچے اور اندر کی طرف جا کر مثانے کے پیندے کے برابر اس کے طبقات کے درمیان سے ایک ترچھے طور پر گزر کر اس کے اندرونی بلغمی جھلی کے طبق میں کھلتی ہیں۔ گردوں میں جو پیشاب بنتا ہے۔ وہ ان نالیوں کے ذریعے مثانہ میں جا کر جمع ہوتا رہتا (تصویر ۱۲۵ پر دیکھو) ہے۔ ہر ایک نالی ۱۶ سے ۱۸ انچ لمبی اور بطخ کے پر کے برابر موٹی اور کھوکھلی ہوتی ہے اس نالی کا وہ حصہ جو مثانے کے طبقات کے درمیان سے گزرتا ہے۔ اس کے باقی کل

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

حصّوں کی نسبت تنگ ہوتا ہے۔

پیڑو

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
پیڑو	جوفِ عانہ	پیلوِس Pelvis

پیڑو کا جوف درحقیقت جوفِ شکم کا نیچے والا حصّہ ہے۔ اس کے پیچھے ڈھڈی اور دُمچی کی ہڈیاں وغیرہ دونوں جانب پیڑو کی بڑی کی بلندیاں وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ اُوپر کی طرف یہ جوفِ شکم سے ملا رہتا ہے۔ اور نیچے کی طرف اس میں مقعد کے عضلات وغیرہ لگے رہتے ہیں اس جوف میں مثانہ سیدھی آنت اور اعضائے تناسل مردانہ و زنانہ ہوتے ہیں۔

مثانہ

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
مثانہ	مثانہ	بلیڈر Bladder

مثانہ یا پیشاب کی تھیلی جس میں پیشاب جمع ہوتا ہے پیڑو کے جوف میں اس کے سامنے واقع ہے یہ غشائی اور عضلی طبقات سے مرکب ہے (تصویر ۴۱ صفحہ ۱۶۴ دیکھو) مردوں میں اس کے سامنے سیدھی آنت مگر عورتوں میں رحم اور اندام نہانی ہوتی ہے بچپن میں مثانے کی شکل مخروطی ہوتی ہے۔ اور وہ پیٹ میں ناف سے ذرا نیچے رہتا ہے۔ جوانی میں مثانہ خالی ہونے کی حالت میں چھوٹا موٹا اور مثلث شکل کا ہوتا ہے اور پیڑو کے جوف میں رہتا ہے۔ جب تھوڑا پُر ہو تو گول اور جب بہت پُر ہو تو بیضوی شکل کا ہو جاتا ہے۔ اور پیڑو سے اُوپر ناف تک چلا جاتا ہے پُر ہونے کی حالت میں اس کی چوڑائی کی نسبت اس کا طول زیادہ ہوتا ہے۔ مگر عورتوں میں اس کے برخلاف ہوتا ہے متوسط درجے پر ہونے کی حالت میں مثانہ پانچ انچ لمبا اور تین انچ چوڑا ہوتا ہے۔ اور اس میں دس چھٹانک پیشاب جمع ہوتا ہے پانچ رباطات یعنی بندھنوں کے ذریعہ مثانہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ مثانہ کے یہ چار حصّے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہوتے ہیں۔ ۱۔ مثانہ کی چوٹی (قلتہ المثانہ۔ فنڈس آفدی بلیڈر) ۲۔ مثانہ کا مدہ (قاعدۃ المثانہ (بیس آفدی بلیڈر) ۳۔ مثانہ کی گردن عنق المثانہ) نیک آفدی بلیڈر) ۴۔ مثانہ کا بیرونی حصہ (جسم مثانہ باڈی آف دی بلیڈر) مثانے میں تین سوراخ ہوتے ہیں۔ دو دونوں حالبین یا گردوں کی نالیوں کے سوراخ ہیں جن کا ذکر آچکا ہے تیسرا سوراخ مجری بول یعنی پیشاب کی نالی کا ہوتا ہے۔ جس کے ذریعے پیشاب مثانے سے خارج ہوتا ہے مثانے کی گردن پر جو ایک تنگ حصہ ہوتا ہے۔ اور جس سے پیشاب کی نالی شروع ہوتی ہے۔ ایک گول عضلہ لگا رہتا ہے جو عموماً سکڑا رہتا ہے۔ اور پیشاب کو مثانے سے ہر وقت خارج نہیں ہونے دیتا۔ لیکن جب مثانہ پیشاب سے پُر ہو جاتا ہے۔ اور پیشاب کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ عضلہ ڈھیلا ہو ہو جاتا ہے۔ اور مثانے کی دیواریں بھی سکڑنے لگتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔ گردوں میں پیشاب متواتر پیدا ہوتا رہتا ہے اور بذریعہ حالبین یا گردوں کی نالیوں کے مثانہ میں قطرہ قطرہ ٹپکتا رہتا ہے لہٰذا مثانہ میں صرف پیشاب جمع رہتا ہے۔ اور وقت حاجت خارج ہو جاتا ہے۔ گردوں کی نالیوں سے جب پیشاب مثانہ میں آتا ہے۔ تو اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی لیکن مثانہ سے پیشاب اُن نالیوں میں واپس نہیں جا سکتا۔ کیونکہ ایک تو طبقات مثانہ میں اُن کی رفتار ترچھی ہوتی ہے۔ دوسرے نالیوں کے اختتامی سوراخوں پر اسنزی جھلی کی بلندیاں مثل کواڑیوں کے ہوتی ہیں۔ جو پیشاب کے واپس جانے کو روکتی ہیں۔

اخراج بول۔ جب مثانہ پیشاب سے پُر ہو جاتا ہے۔ تو اعصاب کی وجہ سے اس میں (دغدغہ یا گدگداہٹ) ہو کر اس کا تناؤ محسوس ہوتا ہے۔ جس سے انسان اپنی قوت ارادی کو کام میں لا کر پیٹ کے عضلات کو مثانہ پر دباتا ہے۔ اور ساتھ ہی مثانہ کا عضلی طبقہ بھی سکڑتا ہے۔ جس سے پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔

بول (یا) قارورہ

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
پیشاب	بول۔ قارورہ	یورن Urine

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

نوٹ:۔ قارورہ اصل میں اس شیشی کو کہتے ہیں جس میں مریض کا پیشاب رکھ کر طبیب کو دکھاتے ہیں لیکن مجازاً قارورہ کا اطلاق پیشاب پر ہوتا ہے یہ تسمیہ باسم محل ہے ۔

صفاتِ بول:۔ بحالت صحت پیشاب عنبری یا ہلکے زرد رنگ کا صاف شفاف سیال ہوتا ہے جس کا وزن مخصوص آب خون کے برابر لیکن پانی سے کسی قدر زیادہ ہوتا ہے یعنی ۱۰۲۰ ہوتا ہے۔ بحالت صحت (اس میں ایسڈ فاسفیٹ آف سوڈیم کی موجودگی کے سبب اس کی کیفیت کسی قدر ترش ہوتی ہے۔ یعنی جس وقت بول خارج ہوتا ہے۔ اُس وقت وہ کسی قدر ترش ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ کچھ عرصہ پڑا رہتا ہے۔ تو وہ کھاری ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں تغیر و فساد سے نوشادر پیدا ہو جاتا ہے جس سبب سے اُس کی بو تیز ہو جاتی ہے۔ اور اس میں سے نوشادر کی دھانس آنے لگتی ہے ۔

ترکیب بول:۔ بول کی ترکیب میں (۱) زیادہ تر پانی (۲) آرگینک یا حیوانی مواد جن میں سے زیادہ تر یوریا اور کسی قدر یورک ایسڈ ہوتا ہے (۳) معدنی نمکیات خاص کر سوڈیم کلورائیڈ اور سوڈیم و پوٹے سیم و کیلشیم اور میگ نیشیم کے سلفیٹس اور فاسفیٹس ہوتے ہیں (۴) رنگین مادہ جس کی ماہیت تاہنوز ٹھیک معلوم نہیں (۵) گیسز یعنی ہوائی مواد جن میں زیادہ تر کاربانک ایسڈ گیس اور تھوڑی سی نائٹروجن اور نہایت تھوڑی سی آکسیجن ہوتی ہے۔

مقدار بول:۔ ایک تندرست جوان آدمی ایک دن یعنی ۲۴ گھنٹے میں تقریباً ۲۴ پائنٹ یا ڈیڑھ سیر پیشاب خارج کرتا ہے۔ جس سے تقریباً ۲ فی صدی یا نصف چھٹانک سے زیادہ یوریا۔ مادۂ بول، اور اسی قدر دیگر نمکیات ہوتے ہیں۔ یوریا یا مادۃ البول کی ترکیب میں تقریباً نصف نائٹروجن ہوتی ہے۔ اور روزانہ غذا میں جس قدر نائٹروجن داخل جسم ہوتی ہے۔ تقریباً اسی قدر براہ پیشاب خارج ہو جاتی ہے۔ پیشاب کی روزانہ مقدار میں قوت۔ موسم۔ غذا کی بیشی اور اس کی نوعیت سے بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ موسم گرما میں جب پسینہ زیادہ آتا ہے تو پیشاب کم آتا ہے۔ لیکن اگر پانی۔ شربت۔ دودھ یا لسی وغیرہ زیادہ پی لی جائے تو اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ وغیرہ ۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

یوریا۔ حقیقت میں بدن کا ایک فضلہ ہے۔ جو تحلیل اعضاء سے پیدا ہوتا ہے اور جس کا بدن سے خارج ہونا نہایت ضروری ہے۔ ورنہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے دیگر اجزاء بول کی طرح یوریا بھی پیشاب میں محلول ہوتا ہے۔ لیکن کیمیاوی تحلیل وتجزیہ سے جب اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ انجمادی شکل اختیار کر لیتا ہے چنانچہ اس کی بے رنگ یا زرد یا گندمی رنگ کی باریک باریک یا مثلث یا مربع شکل کی قلمیں ہوتی ہیں۔ جن میں کسی قسم کی بو نہیں ہوتی ہے۔ لیکن مزہ مخصوص نمک کی مانند ہوتا ہے۔ یہ قلمیں ہوا کی نمی سے خود بخود پگھل جاتی ہیں۔ اور اپنے سے کم سرد پانی میں حل ہو جاتی ہیں۔

سبزی کھانے سے کم لیکن گوشت کھانے سے یوریا زیادہ پیدا ہوتا ہے نیز عورتوں کی نسبت مردوں میں اور بچوں و بوڑھوں کی نسبت جوانوں میں یہ زیادہ پیدا ہوتا ہے بالعموم پیشاب کی زیادتی کے ساتھ یوریا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض امراض میں اس کی مقدار کم و بیش بھی ہو جاتی ہے۔

جیسا کہ افعال جگر میں مذکور ہوا یوریا دو طریق پر پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو امینو ایسڈز یعنی حیوانی اغذیہ کے وہ اجزاء جو تغذیہ میں صرف نہیں ہوتے۔ وہ جگر میں خون سے یوریا کی شکل میں تبدیل ہو کر براہ پیشاب خارج ہو جاتے ہیں دوسرے اس مادہ کی مقدار اعضاء کی تحلیل سے حاصل ہوتی ہے۔

نوٹ: تفصیل کے لیے دیکھو افعال جگر۔

یورک ایسڈ۔ یا حمض بولی بحالت صحت پیشاب کے اندر نہایت قلیل ہوتا ہے لیکن سنگ گردہ و مثانہ کے مریضوں میں اس کی مقدار بہت بڑھ جاتی ہے اسی لیے اس کو مادۃ الحصاۃ یا پتھری کا مادہ کہتے ہیں۔ کیونکہ سنگ گردہ و مثانہ میں اکثر یہ مادہ پایا جاتا ہے۔ حیوانی اغذیہ مثلاً انڈے گوشت وغیرہ کھانے سے بھی یہ زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اکثر بخاروں اور دموی امراض میں اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اور مرض نقرس (گاؤٹ) کا باعث بھی یہی مادہ ہوتا ہے۔

میٹوکسن [illegible] مادہ۔ بحالت صحت پیشاب میں کچھ بلغمی رطوبات بھی پائی جاتی ہیں۔ جو مجاری [illegible] اندر دی [illegible] سے تراوش [illegible] پیشاب سرد ہو جاتا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہیئے۔ تو انہیں رطوبات کے سبب وہ مکدر و متغیر اور فاسد ہو جاتا ہے۔

بحالت صحت پیشاب کے اندر مواد مذکورہ بالا کے علاوہ کچھ اور حیوانی مواد اور نمکیات بھی پائے جاتے ہیں۔ مگر نہایت تھوڑی مقدار میں۔ اس لیے انہیں کچھ زیادہ اہمیت نہیں۔ لیکن بحالت مرض پیشاب کے اندر بعض اور مواد مثلاً صفرا، شکر رطوبت بیضیہ پیپ اور خون وغیرہ بھی پائے جاتے ہیں ؛

نوٹ: بہ تفصیل کے لیے دیکھو میرا رسالہ نادرہ ؛

مجرئ بول (یا) نائزہ

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
پیشاب کی نالی	مجری البول	یورتھرا Urethra

پیشاب کی نالی کو فارسی میں نائزہ کہتے ہیں۔ یہ ایک غشائی نالی ہے جو مثانہ کی گردن سے شروع ہو کر قضیب کے اخیل یعنی سوراخ بول (می ٹیلس یورینری) میں ختم ہوتی ہے۔ مردوں میں اس کی لمبائی آٹھ یا نو انچ ہوتی ہے۔ اس میں دو خم ہوتے ہیں، اور اس کے یہ تین حصے ہیں۔

(۱) غدۂ مذی والا حصہ (۲) غشائی حصہ (۳) اسفنجی حصہ چنانچہ (۱) جزء قدامی جو غدۂ مذی کے درمیان سے گزرتا ہے تقریباً سوا انچ لمبا ہوتا ہے۔ یہ حصہ دیگر حصص کی نسبت زیادہ فراخ اور قابل تمدد و انبساط ہوتا ہے۔ لیکن دونوں سروں پر کسی قدر تنگ ہوتا ہے۔ انگریزی میں اس کو پراسٹیٹک پورشن کہتے ہیں اس کے صحن میں ایک لمبا ابھار نظر آتا ہے۔ جو منی کو مثانہ میں جانے سے روکتا ہے۔ اس کو حسن مشابہت کے سبب عربی میں عرف جبلی اور انگریزی میں دیرومانٹینم کہتے ہیں اس کے دونوں جانب اور سامنے ایک ایک خفیف نشیب پایا جاتا ہے۔ چنانچہ جانبی نشیبوں کو جن میں غدۂ مذی کی نالیاں کھلتی ہیں عربی میں جیب المذی اور انگریزی میں پراسٹیٹک سائنس کہتے ہیں اور سامنے والے نشیب کو جس میں دونوں [illegible] کہتے ہیں عربی میں جیب المنی اور انگریزی میں سائنس [illegible]

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کہتے ہیں (۲) جزء غشائی (میمبرینس پورشن) یہ اس نالی کا نہایت تنگ حصّہ ہے۔ جو غدۂ مذی کے سرے اور جسم اسفنجی کے پھیلاؤ کے درمیان واقع ہے یہ بھی سوا انچ لمبا ہوتا ہے۔ (۳) جزو اسفنجی (سپنجی پورشن) یہ سب سے زیادہ دراز حصّہ ہے جو تقریباً چھ انچ لمبا ہوتا ہے۔ اور جز غشائی سے شروع ہوکر سوراخ بول میں ختم ہوتا ہے۔ یہ اپنے اگلے اور پچھلے سروں پر کشادہ ہوتا ہے۔ اس کے اگلے سرے کے کشتی نما پھیلاؤ کو حفرۂ زورقیہ (فاسا نیوی کولیرس) کہتے ہیں۔ اس کے پچھلے سروں کے پھیلاؤ میں غدّہ دُدی کی نالیوں کے سوراخ پائے جاتے ہیں۔ مجری بول کا بیرونی سوراخ جس کو احلیل یا سوراخ بول کہتے ہیں۔ اس کا تنگ حصّہ ہوتا ہے۔

نوٹ:۔ عورتوں میں مجری بول صرف ڈیڑھ انچ لمبا ہوتا ہے۔ اور اس میں کوئی خم نہیں ہوتا ❊

اعضاءِ تناسل (یا) آلاتِ تناسل

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
نسل کے اعضاء	اعضائے تناسل	جینی ٹیو آرگنز Generative Organs
نسل بڑھانیوالے اعضاء	آلات تناسل	ری پروڈکٹو آرگنز Reproductive Organs

اعضائے تناسل جو بقائے نوع کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ قدرت نے تمام حیوانات کو عطاء کیے ہیں۔ یہ اعضاء دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) اعضاء فاعلہ جو کہ نر میں موجود ہوتے ہیں۔ اور (۲) اعضاء قابلہ جو کہ مادہ میں موجود ہوتے ہیں۔ پس مردوں اور عورتوں کے اعضاء تناسل بھی علیحدہ علیحدہ ہیں جو کہ ذیل میں بیان کیے جاتے ہیں۔

مردوں کے اعضاءِ تناسل

مردوں کے اعضاء تناسل میں مندرجہ ذیل چھ اعضائے شامل ہیں (۱) غدہ مذی (۲) ادعیہ منی (۳) مجری منی یہ تینوں جوف عانہ یعنی پیڑو کے اندر واقع ہیں۔ اور (۴) قضیب

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(۵) خصیتین (۶) غدد ودی یہ تینوں جوف عانہ سے باہر واقع ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ بیان کیا جاتا ہے۔

غدۂ مذی

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
مذی کی گلٹی	غدۂ مذی	پراسٹیٹ گلینڈ
مثانے کی گلٹی	غدۂ قدامیہ۔ غدۂ مثانہ	Prosiate Gland

تسمیہ۔ چونکہ یہ غدہ مثانہ کے آگے واقع ہے اس لیے عربی میں اس کو غدۂ قدامیہ یا غدہ مثانہ کہتے ہیں۔ چونکہ اس کی رطوبت کو مذی کہتے ہیں اس لیے اس کو غدہ مذی کہتے ہیں۔

یہ سپاری کی مانند مخروطی شکل کی ایک چھوٹی اور سخت گلٹی ہے۔ جو مثانہ کی گردن کے آگے اور پیشاب کی نالی کے مبداء کے گرد مقعد کے اوپر واقع ہے۔ اس کا طول ایک انچ عرض ڈیڑھ انچ موٹائی پون انچ اور وزن چھ ڈرام (۶) ڈرام یا ایک تولہ ماشہ ہوتا ہے۔ مجریٰ بول یعنی پیشاب کی نالی اس کی بالائی سطح کے قریب اس کے درمیان سے گزرتی ہے خود اس غدہ میں پندرہ سے بیس تک باریک باریک نالیاں ہوتی ہیں جو کہ پیشاب کی نالی میں کھلتی ہیں۔ اس غدہ یا گلٹی میں ایک سفید رطوبت پیدا ہوتی ہے جسے مذی کہتے ہیں جو بقول اطباء بوقت انزال مجریٰ بول کو تر کر دیتی ہے اور بقول ڈاکٹران منی کی اصطلاح کرتی اور اس کے ساتھ خارج ہوتی ہے۔

غدد ودی

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
ودی کی گلٹیاں	غدد ودی	گوپرز گلینڈز Gopers Gland

یہ دو چھوٹی چھوٹی گول دانہ مٹر کے برابر زرد رنگ کی گلٹیاں ہیں جو مجریٰ بول کے جزء غشائی کے اگلے حصے کے عین نیچے واقع ہوتی ہیں۔ ان کی نالیاں تقریباً ایک انچ لمبی ہوتی ہیں۔ یہ مجریٰ بول کے جزء غشائی کے اسی اگلے حصے میں کھلتی ہے۔ ان گلٹیوں میں ایک خاص قسم کی رطوبت پیدا ہوتی ہے۔ جس کو ودی کہتے ہیں جس کا فائدہ یہ ہے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کہ وہ پیشاب کے وقت پیشاب کی نالی کو تر کر دیتی ہے۔ تاکہ پیشاب کی حدت یا تیزی محسوس نہ ہو اور وہ آسانی سے خارج ہو جائے ۔

خصیتین (اور) اُن کے متعلقات

خصیے دو چھوٹی چھوٹی بیضوی شکل کی منی پیدا کرنے والی گلٹیاں ہیں جو خصیہ کی ڈوری کے ذریعے فوطہ کی تھیلی میں آویزاں ہوتی ہیں جنین میں یہ گلٹیاں پیٹ کے اندر پائیلون جھلی کے پیچھے اور گردوں کے نیچے رہتی ہیں۔ لیکن پیدائش سے ڈیڑھ دو ماہ قبل یہ چڑے کی اندرونی نالی (نقبۂ عانیہ۔ انگوئینل کینال) کی راہ سے فوطوں میں آجاتی ہیں اور اپنی راہ میں چند طبقات سے ملفوف ہو جاتی ہیں۔ جو کہ دیوار شکم کی موٹی اور باریک جھلیوں اور عضلات وغیرہ سے بنتے ہیں جن کے علاوہ فوطہ کی جلد بھی ہوتی ہے۔

(خصیتین کا مفصل بیان دیکھو اگلے صفحہ ۱۷۹ پر)

فوطہ

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
فوطہ	صفنن	سکروٹم Scrotum

فوطہ ایک جلدی تھیلی ہے جس میں خصیے آویزاں ہوتے ہیں۔ یہ بذریعہ ایک ابھرے ہوئے درمیانی خط کے جس کو ریفی کہتے ہیں۔ دو جانبی حصّوں میں منقسم ہے یہ خط سامنے کی جانب ذکر کی زیریں سطح کے درمیانی خط تک اور پیچھے کی طرف سیون کے درمیانی خط سے گزرتا ہوا مقعد تک جاتا ہے۔ بایاں فوطہ بہ نسبت دائیں کے لمبا ہوتا ہے۔ کیونکہ بائیں خصیہ کی ڈوری لمبی ہوتی ہے۔ فوطوں کی بیرونی سطح کی حالت مختلف حالات سے مختلف ہوتی ہے۔ چنانچہ سردی، جوانی اور قوت کی حالت میں فوطے سکڑے ہوئے شکن دار اور خصیوں سے پیوستہ ہوتے ہیں۔ برخلاف ازیں گرمی بڑھاپے اور ضعف کی حالت میں ڈھیلے اور لمبے ہوتے ہیں۔ فوطہ کی ساخت میں دو طبقات ہوتے ہیں۔ بیرونی طبقہ جلد کا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہے۔ جو نہایت پتلی اور دیگر مقامات کی جلد سے زیادہ سیاہ ہوتی ہے۔ اس میں بہت سے شکن ہوتے ہیں۔ اور چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں۔ جن کی جڑیں ترچھی اور ابھری ہوتی ہیں۔ اندرونی طبقہ سرخی مائل سکڑنے والی ریشہ دار ساخت (ڈارٹوس) کا ہے۔ جو بیرون اور چڑے کی دبیز جھلی (سوپر فیشیل فیشیا) سے ملا ہوا ہے۔ اس طبقہ کی اندرونی سطح سے ایک اور درمیانی پردہ (فاصل الصفن سیپٹم سکروٹائی) سے پیدا ہو کر فوطہ کی تھیلی کو دو حصوں یا جوفوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ جن میں ہر دو خصیے الگ الگ رہتے ہیں۔ یہ درمیانی پردہ فوطہ کے درمیانی خط سے ذکر کی زیریں سطح اور اس کی جڑ تک ہوتا ہے۔

خُصْیَتَیْن اَنثَیَیْن

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
خصیے	خُصْیَتَیْن	ٹیسٹی کلز
بیضے	اُنثَیَیْن	Testicles

جیسا کہ مذکور ہوا خصیے دو چھوٹی چھوٹی بیضوی گلٹیاں ہیں جن میں منی پیدا ہوتی ہے۔ یہ خصیے کی ڈوری (حبل المنی۔ سپرمیٹک کارڈ) کے ذریعے فوطہ کی نالی میں آویزاں ہوتے ہیں۔ ہر ایک خصیہ دونوں جانب سے بیضوی اور پیچھے سے ذرا دبا ہوا ہوتا ہے۔ اور ہر ایک خصیہ ڈیڑھ انچ لمبا ایک انچ چوڑا اور سوا انچ موٹا ہوتا ہے۔ اور قریب نصف چھٹانک کے وزنی ہوتا ہے۔ بایاں خصیہ دائیں کے نسبت قدرے بڑا ہوتا ہے۔

خصیے کے پچھلے کنارے پر ایک لمبا چپٹا تنگ جسم ہوتا ہے۔ جس کو خصیہ فوقانی عربی میں بُرَنج یا اغدیدس یونانی میں اور انگریزی میں ایپی ڈیڈی مس کہتے ہیں۔ اس کے تین حصے ہوتے ہیں۔ (۱) درمیانی بڑا حصہ جس کو جسم کہتے ہیں (۲) بالائی موٹا سرا (گلوبس میجر) (۳) زیریں پتلا سرا (گلوبس مائینر) اس بالائی موٹا سرا خصیے کے بالائی سرے سے اور زیریں پتلا سرا خصیے کے زیریں سرے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سے پیوستہ ہوتا ہے۔ مجریٰ منی اس کے زیریں سرے سے شروع ہو کر اوپر کو جاتی ہے۔ ہر ایک خصیہ پر یہ تین جھلیاں بطور غلاف چڑھی ہوتی ہیں۔ جو باہر سے اندر کی طرف شمار کی جاتی ہیں۔ (۱) بیرونی یا غلافی طبقہ (طبقہ غمدیہ۔ ٹیونیکا ویجائنیلس) یہ درحقیقت پارلیطون (پیری ٹونیم) جھلی کا بڑھاؤ ہے جب خصیہ پیٹ سے فوطے میں اترتا ہے تو اس کے ساتھ مثل تھیلی یا غلاف کے نیچے اترتا ہے۔ دیگر آبدار جھلیوں کی طرح اس طبقہ میں بھی دو پرت پائے جاتے ہیں۔ جس میں سے ایک خصیہ کی بیرونی سطح کو ملفوف کرتا ہے اور دوسرا فوطہ کی اندرونی جانب استر لگاتا ہے۔ ان دونوں طبقات کے مابین ایک رطوبت ہوتی ہے۔ جو ان کو تر اور چکنا رکھتی ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ رطوبت طبعی مقدار سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو فوطوں میں پانی بھر جاتا ہے۔ یعنی مرض قیلۃ المایا ہائیڈروسیل ہو جاتا ہے۔ یہ طبقہ اگرچہ پیٹ کی آبدار جھلی (باریطون) کا بڑھاؤ ہے۔ لیکن پیدائش کے بعد اس کا درمیانی علاقہ مسدود ہو جاتا ہے۔ پس فوطہ اور جوف شکم میں کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ (۲) درمیانی یا سفید طبقہ (طبقہ بیضاء۔ ٹیونیکا البوجینیا) یہ ایک سفید نیلگوں مضبوط اور دبیز ریشہ دار طبقہ ہے۔ جو خصیئے کے ہمراہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس پر چمٹا رہتا ہے۔ یہ کسی اور ساخت یا جھلی کا بڑھاؤ نہیں۔ اس کی پچھلی سطح سے ایک چنٹ یا بڑھاؤ نکل کر اور خصیہ کے اندر داخل ہو کر مثل ایک پردہ کے حائل ہوتا اور اس کی تنصیف کرتا ہے اس لیے عربی میں اس کو غشاء منصف الخصیۃ اور انگریزی میں میڈیاسٹائنم ٹسٹیز کہتے ہیں۔ یہ پردہ خصیہ کے عروقی جال کو سہارا دیتا ہے نیز اس سے شاخ ہائے درخت کی مانند بیشمار شاخیں یا زوائد (ٹریبی کیولی) نکل کر خصیہ کی ساخت میں پھیلتی ہوئیں اس کو بہت سے چھوٹے چھوٹے لوتھڑوں یا مجموعوں (فصیصات لابولز) میں منقسم کر دیتی ہیں۔ خصیئے کے یہ قاش کا چھوٹے چھوٹے لوتھڑے (لابیولز) جن کی تعداد تقریباً چار سو ہوتی ہے۔ درحقیقت ایک قسم کی نالی دار لچکدار غدی ہیں جن کے اندر منی پیدا ہوتی ہے۔

(۳) اندرونی یا عروقی طبقہ (طبقہ مشیمیہ۔ ٹیونیکا ویسکولوسا) یہ خصیہ کا عروقی طبقہ ہے۔ اس میں عروق بکثرت پائے جاتے ہیں جن سے خصیہ کی پرورش ہوتی ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

خصیہ کی تشریح دقیق

اگر ایک خصیہ کو چیر کر دیکھا جائے۔ تو اس میں لحم غدوی یا غدی مادہ پایا جاتا ہے۔ جو مثل گردہ کے ملائم اور رنگت میں سرخی و زردی مائل ہوتا ہے۔ جیسا کہ مذکور ہوا خصیہ کے درمیانی یا سفید طبقہ میں سے بیشمار زوائد یا نکال نکل کر اور خصیہ کے اندر پھیل کر اس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے قاش نما لوتھڑے (لابیولز) بنا دیتے ہیں۔ جن کے چوڑے سرے خصیہ کی بیرونی سطح کی طرف اور نوکیلے سرے خصیہ کے درمیانی پردہ کی جانب ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے لوتھڑے یا لابیولز تعداد میں اڑھائی سو سے چار سو تک ہوتے ہیں۔ ہر ایک ایسے قاش نما لوتھڑے میں سوت کے لچھے کی مانند پیچیدہ منی کی نالیاں (اناپیب المنی۔ ٹیوبیولائی سیمینفرائی) ہوتی ہے۔ یہ منی کی نالیاں یا عروق منی ہر ایک خصیہ میں تین سو سے آٹھ سو تک ہوتی ہیں۔ ہر ایک نالی دو اڑھائی فٹ لمبی اور ۲ انچ موٹی ہوتی ہے یہ نالیاں لابیولز کی نوکوں کے قریب ایک دوسری سے ملتی ہوئیں بیس تیس موٹی اور سیدھی نالیاں (عروق مستقیم) ٹیوبیولائی رکٹائی) بناتی ہیں۔ جو پیچیدہ نالیوں سے دو چند موٹی ہوتی ہیں۔ پھر یہ نالیاں خصیہ کے درمیانی پردہ میں داخل ہو کر اس کی کل درازی میں ایک جال (شبکۃ الخصیہ۔ ریٹی ٹیسٹس) بناتی

تصویر خصیہ



اس تصویر میں خصیہ کو سیدھا بیچ میں سے تراش کر اس میں منی کی باریک نالیوں کا انتظام دکھایا گیا ہے (۱) منی کی باریک پیچیدہ نالیاں (۲) منی کی سیدھی نالیاں (۳) خصیئے کا جال (عروق مخروطیہ) (۵) اندید دس (۶) مجریٔ منی یا منی کی نالی۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہوئی اس کے بالائی سرے تک پہنچتی ہیں۔ انہیں میں منی بنتی اور بہتی ہے۔ ہر ایک منی کی باریک نالی ایک باریک جھلی کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ جس کے اندر کی طرف اپنی تھیلی ٹل سیلز کا استر ہوتا ہے انہیں سیلز سے حیوانات منی بنتے ہیں اور انہیں نالیوں میں خون سے منی بنتی ہے مذکورہ بالا تینوں قسم کی منی کی نالیاں خصیہ کے سفید طبقہ کے اندر واقع ہیں اور خصیہ گویا تمام انہی کا بنا ہوا ہے۔ مگر اس سے آگے چل کر دس بیس اور نالیاں ہیں۔ جو کہ منی کو خصیہ سے خصیہ فوقانی تک لے جاتی ہیں۔ ان کو عربی میں عروق مخرجہ اور انگریزی میں واسا ایفرنشیا کہتے ہیں۔ یہی نالیاں باہم مل کر خصیہ فوقانی کا بالائی موٹا سرا (گلوبس میجر) بناتی ہیں۔ جس کو خصیہ فوقانی کی نالی (مجری برنج اپیڈی ڈیڈی مس کینال کہتے ہیں۔ یہ نالی جو تقریباً بیس فٹ لمبی اور بستا موٹی ہوتی ہے۔ پیچیدہ ہو کر خصیہ فوقانی کا جسم اور اس کا نچلا کنارہ یا دم (گلوبس مائنر) بناتی ہوئی منی کی نالی (مجری منی۔ واس ڈیفرنس میں تمام ہو جاتی ہے۔ اس کا بیان دیکھو خصیہ کی ڈوری کے بعد۔

معالیق خصیہ (۱) خصیہ کی ڈوری

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
خصیئے کی ڈوری	معالیق خصیہ	سپرمیٹک کارڈ
منی کی ڈوری	حبل المنی	Spermatic Cord

نوٹ:۔ معالیق جمع ہے۔ معلاق کی جس کے معنی ہیں۔ لٹکانے والا اور چونکہ خصیئے ان کے ساتھ فوطوں میں لٹکتے ہیں۔ اس لیے یہ نام رکھا گیا اور چونکہ خصیہ کی اس ڈوری کے درمیان منی کی نالی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو منی کی ڈوری یعنی حبل المنی بھی کہتے ہیں۔

خصیئے کی ڈوری کے ذریعے ہر ایک خصیہ فوطہ میں آویزاں ہوتا ہے۔ یہ ڈوری درحقیقت منی کی نالی (مجری منی۔ واس ڈیفرنس) اور اس کے متعلقہ عروق واعصاب کے باہم ملنے سے بنتی ہے۔ یہ بائیں ڈوری بہ نسبت دائیں کے قدرے لمبی ہوتی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہے۔ اس لیے بائیں جانب کا خصیہ کسی قدر نیچا معلوم ہوتا ہے۔ یہ ڈوری تین غلافوں میں ملفوف ہوتی ہے۔ اور شکم میں مجری اُریہ کے اندر ترچھے طور پر گزرتی ہوئی شکم کے بیرونی سوراخ سے نکل کر فوطہ میں داخل ہوتی ہے ؛

مجرئ منی

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
منی کی نالی	مجرئ منی	واس ڈیفرینس Vas Deferens

یہ منی کی نالی یا خصیہ کی نالی تقریباً دو فٹ لمبی ہوتی ہے۔ یہ دو نالیاں ہوتی ہیں۔ ایک دائیں طرف اور دوسری بائیں طرف ہر ایک نالی خصیہ فوقانی یا۔ سر نج (اغدیدوس۔ ایپی ڈیڈی مس کی نچلی طرف (دُم) سے شروع ہو کر اُوپر عروق واعصاب خصیہ کے ساتھ ایک غلاف میں ملفوف ہو کر اُوپر کو جاتی ہے۔ اور شکم کے بیرونی سوراخ (ایکسٹرنل ابڈومی نل رنگ) کی راہ پیڈے کی نالی (مجری اُریہ اینگوئنل کینال) میں داخل ہوتی ہے۔ اور نالی مذکور کو طے کرتی ہوئی شکم کے اندرونی سوراخ (انٹرنل ابڈومی نل رنگ) سے جوف شکم میں داخل ہو کر اور اپنے ہمراہ ہی عروق واعصاب سے علیحدہ ہو کر دودہ مستقیم اور مثانہ کے درمیان سے گزرتی ہوئی خم کھا کر ادعیہ منی کی نالی سے مل کر قاذف المنی یا قنات واقفہ منی (اجاکولیٹری ڈکٹ) بن جاتی ہے۔ اور مجری بول کے جزر قدامی یعنی پہلے حصہ میں جیب المنی کے اندر کھلتی ہے۔

خزائن منی

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
خزانہ منی	خزائن منی۔ ادعیہ منی	ویسی کیولی سیمی نیلز
منی کی تھیلیاں	حویصلۃ المنی۔ کیسات المنی	Vesiculae Seminales
ظروف منی	مستقر المنی	

ادعیہ منی۔ مخروطی شکل کی دو خانہ دار غشائی تھیلیاں ہیں۔ جو مثانہ اور

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مَعاء مستقیم کے مابین غدۂ مذی کے پیچھے اور مجریٔ منی کے باہر کی طرف واقع ہیں۔ ان کے درمیان منی جمع رہتی ہے۔ نیز ان میں سے ایک مخصوص رطوبت تراوش پاکر اور منی کے ساتھ مل کر اس کی اصلاح وتعدیل کرتی ہے۔ اگرچہ بظاہر ان کی شکل مخروطی ہوتی ہے۔ لیکن درحقیقت یہ مذکورا بالا منی کی دو نالیاں ہیں۔ جو پیچدار ہوکر اور پھول کر دو چھوٹی چھوٹی تھیلیاں یا کیسے بن گئی ہیں۔ یہ ایک مضبوط ریشہ دار جھلی میں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ چنانچہ اگر اس جھلی کو کھول دیا جائے۔ تو یہ لمبی ہوکر ایک ایک نالی بن جاتی ہے۔ ان میں عضلاتی ریشوں کی وجہ سے انقباضی قوت ہوتی ہے۔ جس سے انزال کے وقت منی کو دکر خارج ہوتی ہے۔ طبعی حالت میں یہ ہر ایک تھیلی تقریباً اڑھائی انچ لمبی اور نصف انچ چوڑی ہوتی ہے۔ لیکن غیر پیچیدہ صورت میں یعنی جب اس کو کھول دیا جائے۔ تو یہ پانچ چھ انچ لمبی نالی ہوتی ہے۔ جو ایک پتلے قلم یا بلطخ کے پر کے برابر موٹی ہوتی ہے۔ اس کی بالائی سطح خانہ دار جھلی کے ذریعے مثانہ کے ساتھ خوب چسپاں ہوتی ہے۔ اور اس کی زیریں سطح ردودۂ مستقیم اور مثانے والے فیشیا (دبیز جھلی) ایک شاخ کے ذریعے ردودۂ مستقیم سے علیحدہ رہتی ہے۔ اس کا چوڑا سرا پیچھے اور تنگ سرا سامنے ہوتا ہے۔ جو غدۂ مذی کی جڑ کے قریب اپنی جانب کے مجری منی کے ساتھ مل کر قادف (منی یا قناۃ واقفہ منی) یا کوئیری ڈکٹ بناتا ہے۔ چنانچہ وقتِ ضرورت، اسی نالی کے ذریعے منی مجری بول میں گرتی ہے۔

افعالِ منی۔ ادعیہ منی یا خزائن منی کے متعلق دو افعال ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان میں منی جمع رہتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ان سے ایک خاص رطوبت پیدا ہوتی ہے۔ جو منی کے ساتھ مل کر اس کی اصلاح وتعدیل کرتی ہے۔ ان کا یہ دوسرا فعل زیادہ اہم خیال کیا جاتا ہے کیونکہ گھوڑے، بیچھو اور کئی ایک وغیرہ بعض حیوانات میں یہ خزائن منی بہت بڑے ہوتے ہیں۔ باوجود اس امر کے کہ منی کی دونوں نالیاں ان میں آکر کھلتی ہیں۔ بلکہ براہ راست مجری بول میں جاکر کھلتی ہیں۔ ایسی صورت میں نہ تو ان کے اندر منی جمع ہوتی ہے۔ اور نہ ہی ان کو خزائن منی کہا جاسکتا ہے۔ بلکہ ان میں ایک خاص قسم کی رطوبت پیدا ہوتی ہے۔ جو بوقتِ انزال منی کے ساتھ ہی خارج ہوتی ہے جب کسی آدمی کا ایک خصیہ نکال دیا جاتا ہے۔ تو اس کا اس طرف

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کا خزانہ منی لاغر نہیں ہو جاتا حالانکہ اس وقت کا وہ فعل باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی اُس میں منی جمع نہیں ہوتی ۔

یہ بات کہ خزائن منی کی مخصوص رطوبت منی کی اصلاح و تعدیل کرتی ہے۔ اس سے بھی ظاہر و ثابت ہے۔ کہ جو حیوانات میں مستی کے دن مقرر ہیں۔ یعنی سال بھر میں صرف ایک ہی بار گرماتے ہیں۔ تو جس طرح سے اُن دنوں اُن کے خصیے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اُن دنوں میں اُن کے خزائن منی بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔

نوٹ:۔ بعض حیوانات مثلاً کتے میں خصیے تو ہوتے ہیں۔ لیکن خزائن منی نہیں ہوتے؟ اور کیوں نہیں ہوتے؟ یہ بات ابھی تک معلوم نہیں ہوئی ۔

منی

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
منی	منی۔ نطفہ	سیمن Semen

جیسا کہ مذکور ہوا منی خصیوں میں پیدا ہوتی ہے یعنی خصیوں کی غدوی ساخت جو تمام منی کی باریک باریک نالیوں سے بنی ہوئی ہے۔ اُن میں خون سے منی بنتی ہے بالغ ہونے کے بعد خصیہ کی باریک باریک نالیوں میں منی ہر وقت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ لیکن شہوات نفسانیہ کے علاوہ دیگر اوقات میں اس کی پیدائش کم اور تدریجی ہوتی ہے۔ خصیوں میں منی پیدا ہو کر منی کی دونوں نالیوں کے ذریعے خزائن منی واقع منی، میں جا کر جمع ہوتی رہتی ہے۔ پھر وہاں سے بوقت انزال دفعتہً زیادہ مقدار میں خارج ہو جاتی ہے۔ ورنہ مذی اور مجری بول کی رطوبت کے ساتھ مل کر پیشاب کے ذریعے تھوڑی تھوڑی خارج ہوتی رہتی ہے۔ یا رفع حاجت یعنی پاخانہ کے وقت پیشاب کے ہمراہ خارج ہو جاتی ہے ۔

منی ایک قسم کی گاڑھی سفیدی مائل رطوبت ہے۔ جس میں ایک خاص قسم کی بو ہوتی ہے۔ اس کے یہ دو حصے ہیں ایک آب منی در طوبت منویہ۔ لائیکوار سیمی نیلس، جو انڈے کی سفیدی کی طرح شفاف اور لیدار ہوتا ہے۔ اور دوسرے دانہائے منی (ذرات منویہ۔ سیمنل گرے نیولز) جو چھوٹے چھوٹے گول ذرات یا دانے ہوتے ہیں جن

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سے منی کے کیڑے (اجسام منویہ حیوانات منویہ سپرمیٹازوا) بنتے ہیں۔ ہر ایک منی کے کیڑے کا ایک گول سر ایک درمیانی جسم اور باریک دُم ہوتی ہے۔ جو خوردبین کے بغیر دکھائی نہیں دیتے۔ انسان کی پیدائش انہی منی کے کیڑوں پر منحصر ہے۔ جس کا بیان دیکھو صفحہ ۸ پر یہ منی کے کیڑے آب منی کے اندر اپنی دُم کے ذریعے حرکت کرتے رہتے ہیں۔ عورت کے اندر ان کی حرکتیں دو تین روز اور کبھی سات آٹھ روز تک اور باہر تقریباً ایک روز تک قائم رہتی ہیں ٭

قضیب (یا) آلت

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
آلت	قضیب۔ ذکر	پینس
اندری	عضو تناسل	Penus

تسمیہ۔ قضیب کے لغوی معنی ہیں۔ شاخ درخت یا ٹھنڈ۔ پس اسی مشابہت سے یہ نام رکھا گیا۔ فارسی میں اس کو نرہ اور انگشت شکم بھی کہتے ہیں۔ ہندی میں اندری کہتے ہیں قضیب مخصوص عضو جماع ہے۔ اس میں سے مجریٰ بول کا بہت سا حصہ گزرتا ہے۔ اس کے بہ تین حصے ہوتے ہیں۔ (۱) جڑ (۲) جسم (۳) سر چنانچہ ذیل میں اُن کا علیحدہ علیحدہ بیان کیا جاتا ہے۔

(۱) بیخ آلت۔ (اصل القضیب۔ روٹ آف دی پینس) چوڑی ہوتی ہے۔ اور دو مضبوط لیفی نکالوں یا ساقین (ساقین القضیب۔ کروراء) کے ذریعے پیڑو کی ہڈی (عظم العانہ) اور نشست گاہ کی ہڈی (عظم الورک) سے چسپاں ہوتی ہے۔

(۲) جسم آلت۔ جو آلت کی جڑ اور اُس کے سر کے درمیان واقع ہے۔ یہ مرکب ہے۔ دو متوازی استوائی مجوف اجسام (اجسام اجوف کارپورا کیورنوسا) سے جو آلت کے اُوپر کی طرف واقع ہیں۔ اور ایک جسم اسفنجی (کارپورا اسفنجی اوسم) سے جو نیچے کی طرف واقع ہے۔ اور جس سے مجریٰ بول یعنی پیشاب کی نالی گزرتی ہے ٭

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(۳) سر آلت یا سپاری (حشفہ۔ گلینس پینس) یہ سپاری کی شکل کا قدرے گول اور مخروطی شکل کا ہوتا ہے۔ اس کے سرے پر سوراخ بول (جلیل۔ می ٹیٹس یورری نری) ہوتا ہے۔ اس کی جڑ پر ایک گول کنارہ ہوتا ہے جس کو سپاری کی لگر یا تاج حشفہ (اکلیل الحشفہ کورونا گلینڈس کہتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے گردن کی طرح تنگ حصّہ ہوتا ہے جس کو گردن آلت (سروکس آندی پینس کہتے ہیں تاج حشفہ اور گردن آلت پر بے شمار چھوٹی چھوٹی گلٹیاں پائی جاتی ہیں۔ جن میں سے ایک قسم کی بودار رطوبت ترادش پاتی ہے۔ حشفہ کے اوپر جو چوٹی کی مانند جلد ہوتی ہے۔ اُسے اردو میں گھونگٹ عربی میں قلفہ اور انگریزی میں پری پیوس یا فور سکن کہتے ہیں۔ حشفہ کے نچلی طرف چنٹ ہوتی ہے۔ جو کہ اس کو قلفہ سے ملائے رکھتی ہے اس کو عربی میں قیدالقلفہ اور انگریزی میں فرینم پری پیوسائی کہتے ہیں۔

جلد۔ آلت کی جلد نہایت ڈھیلی اور رنگت میں سیاہی مائل ہوتی ہے اس میں چربی بالکل نہیں پائی جاتی۔ یہ پیچھے کی طرف آلت کی جڑ پر پیڑو اور فوطہ کی جلد سے ملی رہتی ہے۔ اور سامنے کی طرف حشفہ کا گھونگٹ بناتی ہے۔

ترکیب آلت۔ آلت مرکب ہے۔ تین لمبے لمبے متخلل اجسام سے دو جسم اجوف ہیں۔ جو جسم اسفنجی کی بالائی سطح پر پہلو بہ پہلو واقع ہیں۔ اور حشفہ کی جڑ تک جاتے ہیں آلت کا زیادہ حصّہ انہیں سے بنتا ہے۔ ان دونوں اجسام کی بالائی سطح کو جس میں ایک لمبا نشیب نظر آتا ہے پشتہ آلت وظہر القضیب۔ ڈارسم آندی پینس کہتے ہیں۔ اس نشیب میں آلت کی ایک دریدر ہتی ہے۔ ان کے نچلی طرف اور ان کے مابین جسم اسفنجی کے ملاپ کے لیے ایک دوسری نالی ہوتی ہے۔ ان ہر دو جسم اجوف کا اگلا تین چوتھائی حصّہ باہم ملا رہتا ہے۔ لیکن پچھلا ایک چوتھائی حصّہ ایک دوسرے سے علیحدہ رہتا ہے۔ یہی حصّہ آلت کی جڑ کے دونوں پاؤں یا ساق بنا کر عظم عانہ عظم ورک پر چسپاں رہتا ہے جسم اسفنجی جس میں پیشاب کی نالی کا زیادہ حصّہ ہے۔ بذریعہ ایک پھیلاؤ کے آلت کی دونوں ساقوں کے درمیان اور نیچے سے شروع ہو کر دونوں جسم اجوف کی زیریں نالی سے گزرتا ہوا حشفہ میں ختم ہوتا ہے۔ یعنی جسم اسفنجی کا آخری سرا ہی پھیل کر حشفہ یا سپاری بن جاتا ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تشریح دقیق (اور) ماہیّت انتشار

ہر دو جسم اجوف اور جسم اسفنجی کی ساخت متخلل یعنی خانہ دار ہے۔ اس لیے آلت قابل انتفاخ وانتشار ہے۔ چنانچہ ہر ایک جسم اجوف ایک نہایت مضبوط اور دبیز جھلی سے ملفوف ہوتا ہے۔ جس کی ہزاروں شاخیں جسم اجوف کے اندر پھیل کر اس میں چھوٹے چھوٹے خانے بنا دیتی ہیں۔ جن کی ساخت میں سرخی مائل لچکدار ریشے یعنی تنے والا مادہ (نسیج انتصابی۔ ارکٹائل ٹشو) پایا جاتا ہے۔ جس میں ایک خاص قسم کا رگوں کا جال ہوتا ہے۔ یعنی ان چھوٹے چھوٹے خانوں میں چھوٹی چھوٹی وریدیں ہوتی ہیں۔ اور ان خانوں کی دیواروں پر شرائین کی باریک باریک شاخیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ نعوظ یا انتشار کی حالت میں یعنی جب آلت ایستادہ ہوتا ہے۔ تو یہ وریدیں اور شریانیں خون سے بھر جاتی ہیں۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے خانے پُر ہو جاتے ہیں۔ اور نسیج انتصابی تن کر ان عروق پر دباؤ ڈالتی ہے جس کے سبب خون واپس نہیں جا سکتا اور آلت پھول کر تن جاتا ہے۔ اسی حالت کو خیزش یا انتشار۔ نعوظ اور انگریزی میں ایریکشن کہتے ہیں۔

نوٹ:۔ آلت کی جڑ میں ایک عضلہ آلت خیز (ناصبۃ الذکر ایریکٹر پینس) ہوتا ہے۔ جو وقت نعوظ تن کر آلت کی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جڑی وریدوں کو دبائے رکھتا ہے۔ جس سے خون رُکا رہتا ہے اور انتشار قائم رہتا ہے۔

عورتوں کے اعضاء تناسل

عورتوں کے اعضاء تناسل بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اندرونی جو کہ پیڑو کے جوف کے اندر واقع ہیں۔ اور دوسرے بیرونی جو کہ پیڑو کے جوف کے باہر واقع ہیں۔ عورتوں کے ان بیرونی اعضاء تناسل کو ہی اُردو فارسی میں شرمگاہ یا اندام نہانی کہتے ہیں۔

شرمگاہ

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
اندام نہانی	اعضاء استحیائیہ	پیوڈنڈم Pudendum

اندام نہانی میں مندرجہ ذیل چھ اعضاء شامل ہیں۔ (۱) رکب (۲) فرج کے بڑے لب (۳) فرج کے چھوٹے لب (۴) بَظر (۵) سوراخ مجری البول (۶) سوراخ فرج۔ چنانچہ ذیل میں ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ مفصل بیان کیا جاتا ہے۔

رکب (یا) کوہِ زہرہ

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
کوہ زہرہ	جبل الزہرہ	مانس وینرس Mons Veneris

پیڑو کی ہڈی کے سامنے فرج کے اُوپر یہ ایک گول بلندی ہے۔ جس پر ایام بلوغت میں بال پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس بلندی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جلد کے نیچے بہت سی چربی ہوتی ہے۔

نوٹ:۔ قدیم یونانی و رومی چونکہ وینس یعنی زہرہ کو عشق و محبت کی دیوی مانتے تھے۔ اس لیے انہوں نے عورت کی شرمگاہ کی اس بلندی کا نام مانس وینرس یعنی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کوہ زہرہ تجویز کیا۔

بڑے لب

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
بڑے لب	شفران کبیران	لبیا میجورا Labia Majora

فرج کے بڑے لب حقیقت میں جلد کی وہ ابھری ہوئی شکنیں ہیں جو کوہ زہرہ سے شروع ہو کر نیچے اور پیچھے کو گزرتی ہوئیں مقعد کے قریب یعنی اس سے ایک انچ آگے سیون میں تمام ہو جاتی ہیں۔ ان دونوں لبوں کے درمیانی ہلالی شگاف میں فرج کا سوراخ اور مجریٰ بول کا سوراخ واقع ہیں۔ ان لبوں کے اگلے اور پچھلے سرے باہم ملے رہتے ہیں۔ چنانچہ اگلے سروں کے مقام اتصال کو عربی میں مجمع متقدم اور انگریزی میں اینٹیریئر کمشیر کہتے ہیں۔ اور پچھلے سروں کے مقام اتصال کو عربی میں مجمع مؤخر اور انگریزی میں پوسٹیریئر کمشیر کہتے ہیں۔ مجمع مؤخر کی اندرونی سطح پر ایک آڑی اور ہلالی صورت کی چنٹ پائی جاتی ہے۔ جو بالعموم پہلے وضع حمل کے وقت پھیٹ جاتی ہے اس چنٹ کو عربی میں قید الفرج اور انگریزی میں نوریشیٹ کہتے ہیں۔ اس چنٹ کے عین نیچے یا پیچھے ایک چھوٹا سا کشتی نما تشنیب ہوتا ہے۔ جسے عربی میں حفرۃ زورقیہ اور انگریزی میں فاسا نیوی کولیرس کہتے ہیں۔ مجمع مؤخر اور سوراخ مقعد کے مابین کی وسعت کو جو تقریباً ایک انچ کبی ہوتی ہے۔ اردو میں سیون عربی میں عجان انگریزی میں پرینم کہتے ہیں۔

ان لبوں کی ساخت میں بیرونی جانب جلد اور اندرونی جانب لعابدار جھلی کا استر ہوتا ہے۔ اور ان کے درمیان چربی عروق و اعصاب اور چھوٹے چھوٹے غدد پائے جاتے ہیں۔ ان لبوں کی بیرونی سطح پر بال ہوتے ہیں۔ اور عورتوں میں یہ مردوں کے فوطوں کی بجائے ہوتے ہیں۔ ان کے فوائد یہ ہیں کہ ایک تو یہ اعضاء نازک و ذکی الحس کو پوشیدہ کر کے انہیں صدمہ اور خراش سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور دوسرے وضع حمل کے وقت یہ خود ٹھپ کر فرج کو کشادہ کر دیتے ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

چھوٹے لب

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
چھوٹے لب	شفران۔ صغران	لبیا مائنورا Labia Minora

نوٹ:۔ اس کو انگریزی میں نمفی بھی کہتے ہیں۔ نمفا کے لغوی معنی ہیں۔ حورِ معشوق صنم۔

یہ لعاب دار جھلی کی دو چھوٹی چھوٹی چنٹیں ہیں۔ جو کہ بڑے بڑے لبوں کے مابین اندرونی جانب واقع ہیں۔ ہر ایک لب تقریباً دو انچ لمبا ہوتا ہے۔ یہ بظر سے شروع ہو کر ترچھے طور پر نیچے اور باہر آ کر فرج کے سوراخ میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک چھوٹا لب اُوپر کی طرف دو حصّوں یا چنٹوں میں تقسیم ہو کر بظر کو گھیرتا ہے۔ چنانچہ دو بالائی چنٹوں کے ملاپ سے بظر کا گھونگٹ (قلفہ بظر) پری پیوسم کلیٹورس بنتا ہے۔ اور زیریں دو چنٹیں حشفہ بظر سے ارتباط کر کے لجام بظر و قیا لبظر فرینم کلیٹورس بناتی ہیں۔

نوٹ ۱:۔ فرج کے یہ چھوٹے لب عموماً بڑے لبوں کے اندر رہتے ہیں۔ اور ان سے بڑھ کر باہر نہیں نکلتے۔ ان کا رنگ گلگوں ہوتا ہے۔ اور نوجوان میں یہ قابلِ انتفاخ ہوتے ہیں۔ یعنی ان میں نعوظ ہو کر یہ تن جاتے ہیں۔ بچہ و عورتوں میں یہ کسی قدر بڑے ہو جاتے ہیں اور فرج سے باہر نکلے رہتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کی رنگت میں بھی فرق آ جاتا ہے۔

وظائف ۔ یہ وقتِ مباشرت تن کر باعث لذتِ جماع ہوتے ہیں۔ پس عورتوں میں حظ مباشرت بہت کچھ ان کی درستی پر منحصر ہے۔

بظر

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
ٹ۔ن۔ا	بظر	کلی ٹوریس Clitoris

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

فارسی میں اس کو منقارس کہتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا مستطیل شکل کا عضو ہے۔ جو عورتوں میں منزلہ قضیب کے ہوتا ہے۔ یہ بڑے لبوں کے مجمع مقدم کے نیچے اور چھوٹے لبوں کی بالائی چنٹوں کے مابین سوراخ فرج کے اوپر واقع ہے۔ قضیب کی طرح یہ بھی دو جسم اجوف سے مرکب ہے۔ جو الگ الگ جڑوں کے ذریعے پیڑو کی ہڈی کے شعبوں سے شروع ہو کر باہم ملتے ہیں۔ اس کے اگلے سرے کو جو گول اور آزاد ہوتا ہے۔ اور چھوٹے لبوں کی بالائی چنٹوں میں چھپا ہوتا ہے۔ بظر کی سپاری (حشفہ بظر۔ کلی ٹورس) کہتے ہیں۔ اور ان بالائی چنٹوں کو جو اُسے چھپاتی ہیں بظر کا کمپونگٹ (قلفہ بظر۔ پری پیوسیم کلی ٹوس) کہتے ہیں۔ قضیب کی طرح بظر کا بھی ایک رباط معلق اور چھوٹے چھوٹے ایستادہ کرنے والے عضلات (ناصبۃ البظر ارکٹر کلی ٹورڈیس) ہوتے ہیں۔ اور قضیب کے اجسام اجوف کی طرح اس کے اجسام اجوف بھی بنتے اور پھولنے والی ساخت کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔

بظر عورت کا خاص عضو شہوت ہے۔ اور چونکہ اس کی ساخت اسفنجی اور اور قابل انتعاظ ہے۔ اس لیے خیالات و تصورات شہوانیہ سے نیز لمس یا رگڑ سے اس میں تحریک ہو کر یہ حالت نعوذ میں آجاتا ہے۔ یعنی ایستاہ ہو جاتا یا تن جاتا ہے۔ بظر کا طول ہر عورت اور نسل میں یکساں نہیں ہوتا۔ بعض عورتوں بالخصوص بعض حبشی عورتوں کا بظر بڑا ہوتا ہے۔ اور فرج کے بڑے لبوں کے باہر نکلا رہتا ہے۔ اور شاذ و نادر اتنا بڑا ہوتا ہے۔ کہ پانچ چھ انگشت تک لمبا ہوتا ہے۔ چنانچہ جن عورتوں کا بظر اس قدر لمبا ہوتا ہے۔ وہ مردوں کی طرح عورتوں سے سلوک کرتی ہیں۔ اور زن دوست ہوا کرتی ہیں۔ اسی قسم کی عورت کو اکثر لوگ کہا کرتے ہیں۔ کہ خدا کی قدرت سے عورت مرد بن گئی۔

افریقہ کی بعض اقوام کی عورتوں میں چونکہ بظر بالعموم بڑا ہوتا ہے۔ اسلئے وہاں پر نوجوان لڑکیوں کے بظر پر ختنہ کیا جاتا ہے۔ اور ایسی ختنہ کرنیوالی عورت کو آسیہ یا زنانہ جراح کہتے ہیں۔

دہلیز فرج

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
دہلیز	دہلیز	ویسٹی بیولی Vestibulae

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

بظر کے نیچے۔ سوراخ فرج کے اُوپر۔ اور فرج کے چھوٹے لبوں کے مابین ایک سہ گوشہ وسعت یا فضاء ہے۔ جس کو دہلیز فرج کہتے ہیں۔ اس کے وسط میں مجریٰ بول کا سوراخ نظر آتا ہے۔ جو بظر سے ایک انچ کے فاصلہ پر ہے۔

غُدَدِ دہلیز

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
غُدَدِ دہلیز	بَصَلۃُ الدہلیز	بلبائی ویسٹی بیولائی Bulbj Vestibuli

دہلیز فرج کے ہر دو جانب بظر سے لے کر سوراخ فرج تک چھوٹے لبوں سے قدرے پیچھے لعابدار جھلی سے پوشیدہ ایک ایک گلٹی سی پائی جاتی ہے جس کی لمبائی تقریباً ایک انچ ہوتی ہے۔ یہ شکل میں گاؤدُم ہوتی ہے۔ اس کا نوکیلا سرا بظر کی طرف اور چوڑا سرا پیچھے کو مائل ہوتا ہے۔ اس کی ساخت میں نسیج انتصابی جو حقیقت میں وریدی جال سے مرکب ہے۔ ایک مہین ریشہ دار جھلی میں لپٹا ہُوا پایا جاتا ہے یہ حقیقت میں غدد یا گلٹیاں نہیں۔ بلکہ یہ قضیب کے جسم اسفنجی کے قائم مقام ہیں۔

غُدَدِ وَدی

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
وَدی کی گلٹیاں	غُدَدِ وَدی	بارتھولائن ڈکٹ Bartnowline Duct

یہ مٹر کے برابر گول یا قدرے بیضوی شکل کی سُرخ زردی مائل رنگ کی دو گلٹیاں ہیں جو سوراخ فرج کے ہر دو طرف چھوٹے لبوں کے اندرونی جانب واقع ہیں۔ یہ مردوں کے غدد ودی (کوپرز گلینڈز) کی مانند ہوتی ہیں۔ ان غدد کی نالیاں جو آدھ انچ سے ذرا لمبی ہوتی ہیں۔ پردۂ بکارت کے باہر چھوٹے لبوں کی اندرونی سطح پر کھلتی ہیں۔ اور ان سے ایک قسم کی قدرے زردی مائل شفاف رطوبت پیدا ہوتی ہے۔ جو فرج کو تر رکھتی ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مجریٰ بول

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
پیشاب کی نالی	مجریٰ بول	یُورِیتھرا Uretra

عورتوں میں پیشاب کی نالی فرج کے سوراخ کے عین اُوپر واقع ہوتی ہے اور صرف تقریباً ڈیڑھ انچ کے لمبی ہوتی ہے۔ اس کی ساخت بھی مجریٰ بول کی طرح ہوتی ہے اس کا منہ ایک چھوٹا سا گول سوراخ ہوتا ہے جسے سوراخ بول کہتے ہیں

احلیل (یا) سوراخِ بول

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
سُوراخِ بَول	ثُقبۂ مجریٰ بول	می ٹس یوری نیریس Meatus Urinarius

عورتوں میں پیشاب کی نالی کا سوراخ دہلیز فرج میں بظر سے تقریباً ایک انچ نیچے سوراخ فرج کے عین اُوپر واقع ہوتا ہے۔ اس سوراخ کے گرد کی لعابدار جھلی۔ بلغمی گلٹیوں (میوکس فالیکلز) کے سبب قدرے اُونچی ہوتی ہے۔

نوٹ:۔ اس سوراخ کا جاننا ایک نہایت ضروری امر ہے کیونکہ جب عورت کا پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ تو اس سوراخ میں سلائی داخل کر کے پیشاب نکالا جاتا ہے۔

سُوراخ فرج

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
فرج کا سُوراخ	فَتحۃُ المَہبَل	آری فس آندی ویجائنا Aurifis of the Vagina
فرج	فرج	وُلوا Vulva

فرج کے دونوں چھوٹے لبوں کے مابین سوراخ بول کے نیچے ایک بیضوی شکل

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کا سوراخ ہوتا ہے۔ جسے فرج کا سوراخ کہتے ہیں۔ بحالت بکارت ایک باریک جھلی یعنی پردۂ بکارت سے یہ سوراخ کم و بیش بند رہتا ہے۔

نوٹ:۔ (۱) فرج کے لغوی معنی ہیں شگاف یا سوراخ پس (۱) بڑے لبوں کے درمیانی بلالی شگاف کو بھی فرج کہتے ہیں۔ اور (۲) چھوٹے لبوں کے درمیانی بیضوی سوراخ کو بھی فرج کہتے ہیں نیز (۳) عام طور پر اس غشائی وعضلاتی نالی (مہبل۔ ویجائنا) کو بھی جو کہ سوراخ فرج سے شروع ہو کر رحم تک جاتی ہے۔ فرج کہتے ہیں۔ اور اکثر اردو طبی مؤلفین ومصنفین نے بھی اسی نالی یعنی مہبل کو فرج لکھا ہے۔ اس لیے مہبل کے بیرونی سوراخ کو فرج کا سوراخ لکھا ہے۔ لیکن جدید عربی طبی کتب مطبوعہ مصر وشام میں مہبل کو فرج لکھا۔ بلکہ سوراخ مہبل کو فرج لکھا ہے۔ اور یہی صحیح ہے۔

(۲) انگریزی لفظ ولوا (Vulva) کے لغوی معنی ہیں دروازہ۔ لیکن یہ فرج بمعنی شگاف کا مترادف ہے۔ مہبل کا مترادف نہیں پس ولوا کے معنی ہیں۔ (۱) وہ بلالی شگاف جو کہ بڑے لبوں کے درمیان ہوتا ہے اور بالخصوص وہ بیضوی سوراخ (فرج) جو کہ چھوٹے لبوں کے درمیان ہوتا ہے۔

فرج کو انگریزی میں ولوا اور مہبل کو ویجائنا Vagina کہتے ہیں

پردۂ بکارت

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
پردۂ بکارت	غشاؤ البکارت	ہائمن Hymen

یہ فرج کی لعاب دار جھلی کی ہلالی شکل کی ایک باریک چنٹ یا پردہ ہے جو فرج کے سوراخ کے نیچے کے حصے میں اس طرح سے لگا رہتا ہے۔ کہ اس کا مقعر کنارہ اوپر پیڑو کی طرف ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ فرج کے سوراخ کو بالکل بند کر دیتا ہے۔ اور یہ کبھی بیچ میں سوراخ دار ہوتا ہے۔ اور کبھی اس میں کئی سوراخ ہوتے ہیں۔ یہ پردۂ بکارت عموماً پہلے جماع سے پھٹ جاتا ہے۔ اور اس کے پھٹے ہوئے کنارے چھوٹی چھوٹی گول بلندیوں کی شکل میں فرج کو

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

گھیر لیتے ہیں۔ جن کو انگریزی میں کرن کیولی مرٹیفارمیز کہتے ہیں۔ لیکن کبھی یہ پردۂ بکارت اس قدر نرم و سست ہوتا ہے۔ کہ یہ مانع جماع نہیں ہوتا۔ اور کبھی یہ پیدائشی طور پر بالکل موجود ہی نہیں ہوتا۔ اور بعض لڑکیوں میں کثرت حیض یا سیلانِ ابیض کے سبب یہ زائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا نہ ہونا بکارت یا عدم بکارت کی قطعی دلیل ہرگز نہیں ہو سکتا۔

کبھی یہ پردۂ بکارت اس قدر مکمل ہوتا ہے۔ کہ سوراخ فرج کو بالکل بند کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس میں سے خونِ حیض بھی نہیں نکل سکتا۔ ایسی صورت میں خونِ حیض کے جمع ہو جانے سے حمل کا دھوکا ہونے لگتا ہے چنانچہ ایک شریف باعصمت باکرہ لڑکی پر جس کا خون اسی طرح سے بند تھا۔ حمل کا شبہ کیا گیا۔ لیکن بعد میں صحیح تشخیص کرنے پر معلوم ہوا کہ پردۂ بکارت نے سوراخ فرج کو بالکل بند کر رکھا ہے۔ جس سبب سے خونِ حیض رُک کر پیٹ بڑھ گیا ہے۔ چنانچہ پردۂ بکارت میں شگاف دینے سے خونِ حیض خارج ہو گیا۔ اور اس شریف لڑکی کی عصمت پر کوئی داغ نہ آیا۔

اندرونی اعضاء تناسل

عورتوں کے اندرونی اعضاء تناسل یہ ہیں (۱) فرج (۲) رحم (۳) قاذف (۴) خصیۃ الرحم اور اس کے متعلقات۔

فرج (یا) مہبل

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
فرج	مہبل۔ عُنُقُ الرحم	ویجائنا Vagina

نوٹ:۔ عُنُق الرحم کے معنی ہیں گردنِ رحم اصطلاح طب میں مہبل کو عنق الرحم کہتے ہیں۔ اور گردن کو رقبۃ الرحم کہتے ہیں۔

فرج ایک غشائی و عضلاتی نالی ہے۔ جو سوراخ فرج سے شروع ہو کر گردن

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

رحم تک جاتی ہے۔ اور بوقتِ جماع مردوں کے عضو کو قبول کرتی ہے۔ اور بوقتِ ولادت جنین اسی راستے سے خارج ہوتا ہے۔ یہ پیڑو کے جوف میں مثانہ اور رودۂ مستقیم کے مابین واقع ہے۔ یہ خمدار بھی ہے۔ اور اس کا خم آگے اور نیچے کی طرف ہے۔ اس کی اگلی دیوار تقریباً چار انچ اور پچھلی دیوار تقریباً پانچ یا چھ انچ لمبی ہوتی ہے۔ شروع میں یہ نالی تنگ و درمیان میں کشادہ اور پچھلے حصے میں کسی قدر تنگ ہوتی ہے۔ اور چونکہ اس کی اگلی دیوار سے اس کی پچھلی دیوار زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ اس لئے گردن رحم کا پچھلا حصہ زیادہ چھپا رہتا ہے۔ یہ مندرجہ ذیل تین طبقات سے مرکب ہے۔ (۱) بیرونی طبقہ نسیج انتصابی کا (۲) درمیانی طبقہ عضلانی اور (۳) اندرونی طبقہ لعابدار جھلی کا ہوتا ہے۔ جو اوپر کی طرف رحم کی استری جھلی سے اور نیچے کی طرف بڑے لبوں کے کناروں کے برابر جلد سے ملی رہتی ہے۔ فرج کے اندرونی جانب اس کی اگلی اور پچھلی دیواروں پر ایک ایک عمودی ابھار یا کھڑا خط ہوتا ہے۔ جس کو عمود فرج (کالم آف ویجائنا) کہتے ہیں ان عمودی ابھاروں کے دونوں جانب سے بہت سی آڑی متوازی شکنیں یا لکیریں (حمل الفرج۔ رُوگیز) پائی جاتی ہیں۔ جن میں بے شمار چھوٹے چھوٹے لعابی غدد ہوتے ہیں۔ جن سے بوقتِ جماع ایک لعابی رطوبت ترادش پاتی ہے۔ نیز ان شکنوں کا یہ بھی فائدہ ہے۔ کہ وقتِ ولادت فرج طولاً بڑھ جاتی ہے۔

رحم

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
ناف۔ رحم	رحم	یوٹرس

نوٹ:۔ انگریزی میں رحم کو میٹرکس Matrix میٹرا Metra ہسٹیریا Hystera اور وومب Womb بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ میٹرا Metra سے میٹرائیٹس Matritis بمعنی ورم رحم اور ہسٹیریا Hysterya سے ہسٹیرا Hysteros بمعنی اختناق الرحم وغیرہ اصطلاحات وضع کی گئی ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

رحم وہ عضو ہے۔ جس میں حمل قرار پاتا ہے۔ اور میاد مقررہ بالعموم نو مہینے تک جنین اس میں پرورش پاتا ہے۔ اور ولادت کے وقت اسے خارج کر دیتا ہے۔ رحم پیڑو کے جوف میں مثانہ اور رودہ مستقیم کے مابین واقع ہے اور چند رباطات (رباط عریض ورباط مستدیر) کے ذریعے اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ باکرہ لڑکیوں میں نیز ایام حمل کے علاوہ دیگر اوقات میں اس کی شکل امرود یا کشمیری ناشپاتی کی سی ہوتی ہے۔ اور یہ تین انچ لمبا دو انچ چوڑا ایک انچ موٹا اور نصف سے پون چھٹانک تک وزنی ہوتا ہے۔ تسہیل بیان کے لیے یہ تین حصے کیے گئے ہیں۔

(۱) قعر رحم (۲) جسم رحم (۳) گردن رحم ۔

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
(۱) قعر رحم	قاع الرحم	فنڈس یوٹرائی Fundus Uteri

یہ رحم کا بالائی چوڑا محدب سرا یا طرف ہے۔ جو پیڑو کے جوف کے بالائی دائرہ سے قدرے نیچے ہوتی ہے۔ آبدار جھلی (بارلیٹون۔ پیری ٹونیم) اس حصے کو چاروں طرف ملفوف کرتی ہے۔

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
(۲) جسم رحم	جسم رحم	باڈی آف دی یوٹرس Body of the Uterus

یہ رحم کا درمیانی حصہ ہے یعنی قعر رحم اور گردن رحم کے مابین کا حصہ ہے جسم رحم

تصویر رحم وخیشہ الرحم وغیرہ

(۱) نظام نباتی کا بالائی حصہ جو فم رحم کے متصل ہے (۲) فم رحم (۳) عنق الرحم (۴) رحم کا بالائی حصہ (۵) خیشہ الرحم (۶) عورت کا انڈا بیضہ (شیر دار) رحم کا گول بند (۸) قناۃ نالی (۹) قناۃ نالی کا جھالر دار حصہ ۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کی اگلی سطح چپٹی ہوتی ہے۔ جس کے بالائی ۳/۴ حصے کو آبدار جھلی ملفوف کرتی ہے۔ اور جو چھوٹی آنتوں کے ذریعے مثانہ سے علیحدہ رہتی ہے۔ لیکن اس کا زیریں ۱/۴ حصہ مثانہ سے متصل ہوتا ہے۔ جسم رحم کی پچھلی سطح محدب ہوتی ہے اور ساری پر آبدار جھلی لگی ہوتی ہے۔ جسم رحم کے دونوں پہلوی کنارے مقعر ہوتے ہیں جن کے بالائی جانب قاذف نالی۔ اس کے نیچے اور سامنے کی طرف گول بند اور ان دونوں کے مابین رباط خصیۃ الرحم چسپاں ہے۔

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
(۳) گردنِ رحم	عنق الرحم	کروکیس یوٹرائی Corvix Uteri

یہ رحم کا زیریں تنگ اور گول حصہ ہے۔ جس کو فرج کا بالائی حصہ گھیرے ہوئے ہے۔ گردنِ رحم کے درمیان ایک جوف یا نالی ہے جو تقریباً تہائی یا نصف انچ کے لمبی ہے۔ یہ نالی اپنے اگلے اور پچھلے سروں پر تنگ اور درمیانی حصہ میں کشادہ ہوتی ہے۔ اس نالی کے اگلے سوراخ یعنی گردنِ رحم کے بیرونی سوراخ کو رحم کا منہ (فم رحم آس یوٹرائی) کہتے ہیں۔ جو باکرہ میں گول اور بعد وضع حمل کے آڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے اور پیچھے دو لب ہوتے ہیں۔ چنانچہ فم رحم کا اگلا لب چھوٹا اور دبیز اور پچھلا لب لمبا اور پتلا ہوتا ہے۔ گردنِ رحم کی درمیانی نالی کے بالائی یا پچھلے سوراخ کو جو جوف رحم سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ رحم کا اندرونی منہ (فم رحم باطن آس یوٹرائی انٹرنم) کہتے ہیں۔

جوف رحم۔ رحم کا اندرونی جوف مثلث ہوتا ہے۔ جس کا قاعدہ یعنی چوڑا سرا بالائی جانب ہوتا ہے۔ اور تنگ سرا زیریں جانب ہوتا ہے۔ قاعدہ کے ہر دو جانب گوشوں پر قاذف نالیوں کے باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں۔ اور زیریں جانب اس کا اندرونی سوراخ ہوتا ہے۔ جو گردنِ رحم کی نالی کے پچھلے سوراخ سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ جس کو رحم کا اندرونی منہ (فم رحم باطن) کہتے ہیں۔ یہ جوف جوانی کی حالت میں ۲ ½ انچ ہوتا ہے۔ لیکن ایام حمل میں ۹ سے ۱۲ انچ تک ہوتا ہے۔

رباطات رحم۔ رحم آٹھ رباطات یا بندشوں کے ذریعے اپنی جگہ پر قائم رہتا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہیں۔ ان آٹھ رباطات میں سے دو حقیقی اور چھ غیر حقیقی ہوتے ہیں۔ جو دراصل آبدار جھلی کی چنٹیں ہیں۔ رحم کے دو اگلے بند (رباط مثانی رحمی) دو ہلالی چنٹیں ہیں۔ جو رحم کی اگلی سطح اور مثانہ کی پچھلی سطح کے مابین واقع ہیں۔ دو پچھلے بند (رباط رحمی مستقیمی) رحم اور رودۂ مستقیم کے مابین واقع ہیں۔ دو جانبی بند جن کو چوڑے بند (رباطِ عریض۔ کراڈ لیگمنٹ) بھی کہتے ہیں۔ یہ رحم کے پہلو سے پیڑو کے جوف کی پہلوی دیوار تک جاتے ہیں۔ ہر ایک رباط کی دونوں تہوں کے درمیان قاذف خصیۃ الرحم۔ گول بند اور عروق رحم رہتے ہیں۔

ساخت رحم۔ رحم کی ساخت میں تین طبقات ہوتے ہیں (۱) بیرونی طبقہ آبدار جھلی (۲) درمیانی طبقہ عضلاتی ریشوں کا جو نہایت سخت اور دبیز ہوتا ہے اور (۳) اندرونی طبقہ لعاب دار جھلی (عشا مخاطی۔ میوکس ممبرین) کا رحم کے جوف میں استر لگاتی ہوئی بالائی جانب پر قاذف نالیوں کی لعابدار جھلیوں سے اور زیریں جانب فرج کی استری لعابدار جھلی سے ملی ہوئی ہے۔ اس جھلی میں جا بجا بلغمی نالیدار گلٹیاں (یوٹرائن فالیکلز) پائی جاتی ہیں۔

شکل وجسامت رحم۔ رحم کی شکل وجسامت عمر کے مختلف حصوں میں اور دیگر مختلف حالتوں میں مختلف ہوتی ہے۔ چنانچہ جنین کا رحم بجائے پیڑو کے جوف شکم میں رہتا ہے۔ نوجوان باکرہ عورتوں میں اور ایام حمل کے علاوہ رحم کی شکل امرود یا کشمیری ناشپاتی کی سی ہوتی ہے۔ اور وزن تقریباً نصف چھٹانک ہوتا ہے۔ حیض آنے کے وقت اور اس کے بعد رحم بڑھ جاتا ہے۔ ایام حمل میں فم رحم بند ہو جاتا ہے۔ اور اس کا وزن تین پاؤ سے ڈیڑھ سیر تک ہو جاتا ہے۔ اور وہ بڑھ کر ناف کے مقام تک چلا جاتا ہے۔ وضع حمل کے بعد رحم سکڑ کر چھٹانک ڈیڑھ چھٹانک وزن کا رہ جاتا ہے۔ بڑھاپے میں فم رحم بند ہو جاتا ہے اور رستے اب جذب ہو جاتے ہیں

ملحقات رحم

رحم کے ملحقات دو ہیں (۱) قاذف نالی اور (۲) خصیۃ الرحم۔ چنانچہ رحم کے ہر دو

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جانب ایک ایک قاذف نالی اور خصیۃ الرحم ہیں۔ جو رباطِ عریض کے اندر پوشیدہ رہتے ہیں ٭

قاذف (دبا) تفیر

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
نفیری نالی	نفیر۔ نفیرین	فیلوپین ٹیوب
قاذف نالی	قاذف۔ قاذفان	Fallopian Tube
خصیۃ الرحم کی نالی	معبر بیضہ۔ بوق	آوی ڈکٹ Oviduct

نوٹ:۔ چونکہ اس نالی کی شکل بوق یا نفیر یعنی شہنائی کی مانند ہوتی ہے۔ اس لیے عربی میں اس کے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ اور چونکہ خصیۃ الرحم سے نکل کر بیضہ (انثیٰ ادم) اس کی راہ یعنی اس کو عبور کر کے رحم میں جاتا ہے۔ اس لیے عربی میں اس کو معبر بیضہ بھی کہتے ہیں ٭

قاذفان یا نفیرین دو پتلی پتلی نالیاں ہیں۔ جو رحم کے دونوں جانب خصیۃ الرحم اور رحم کے مابین واقع ہیں۔ اور خصیۃ الرحم سے عورت کا مادہ تولید (بیضہ انثیٰ۔ ادم) لے کر رحم تک پہنچاتی ہیں۔ ہر ایک نالی تقریباً چار پانچ لمبی ہوتی ہے۔ اور رحم کے بالائی گوشہ سے شروع ہو کر رحم کے چوڑے بند کے درمیان سے گزر کر خصیۃ الرحم کے اوپر کی طرف ختم ہو جاتی ہے۔ پس اس کا ایک طرف رحم کے پہلوی حصے کے بالائی جانب اور دوسرا طرف پیٹ کی آبدار جھلی باریطون کے جوف میں کھلتا ہے جائے آغاز پر یہ نالی تنگ ہوتی ہے۔ لیکن اس کا آخری نصف حصہ بتدریج کشادہ ہو کر نفیر یا شہنائی کے مانند پھیل جاتا ہے۔ اس لیے اس کو عربی میں نفیر یا بوق کہتے ہیں۔ اس کے آخری پھیلے ہوئے سرے پر جھالر کی مانند بہت زوائد (حمیرات) محیط ہوتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سرے کو جھالردار سرا (طرف مشرشر فمبری ٹیٹڈ ایکسٹریمیٹی) کہتے ہیں۔ ان زوائد میں سے ایک خصیۃ الرحم کی بیرونی طرف سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ جب عورت کا مادہ تولید یعنی عورت کا انڈا (بیضہ انثیٰ ادم) خصیۃ الرحم سے خارج ہوتا ہے۔ تو یہ جھالردار سرا اُسے سنبھالتا اور رحم تک

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

پہنچاتا ہے۔ رحم کی مانند قاذف نالی کی ساخت میں بھی تین طبقات ہوتے ہیں۔(۱) بیرونی طبقہ آبدار جھلی کا (۲) درمیانی طبقہ عضلاتی اور (۳) اندرونی طبقہ بعابدار جھلی کا جو اندرونی سرے پر رحم کی بعابدار جھلی سے اور بیرونی سرے پر برخلاف عام قاعدہ کے آبدار جھلی (پیری ٹونیم) کی اندرونی سطح سے ملی رہتی ہے۔

خصیۃ الرحم (یا) مبیضین

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
رحم کا خصیہ	خصیۃ الرحم	اوویریز
عورتوں کا خصیہ	خصیۃ النساء	Ovaries

نوٹ:۔ چونکہ خصیۃ الرحم میں عورت کا بیضہ یا انڈا پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اسے مبیض اور دونوں کو مبیضین بھی کہتے ہیں۔

یہ دو چھوٹی سفید بادامی شکل کی گلٹیاں ہیں۔ جو عورتوں میں مردوں کے خصیوں کی بجائے ہوتی ہیں۔ ہر ایک خصیۃ الرحم ڈیڑھ انچ لمبا۔ پون انچ چوڑا۔ تہائی انچ موٹا اور دو ڈرام وزنی ہوتا ہے۔ اور رباط عریض کے اندر پچھلے حصہ میں قاذف نالی کے بیرونی سرے کے پیچھے اور ذرا نیچے واقع ہے۔ یہ اندرونی جانب بذریعہ ایک ڈوری کے جو رباطی وعضلاتی ریشوں سے مرکب ہے۔ اور تقریباً ڈیڑھ انچ کے لمبی ہے۔ رحم کے بالائی کونہ سے متصل ہے۔ اور بیرونی جانب بذریعہ ایک چھوٹی اور باریک ڈوری کے قاذف کے جالر دار سرے سے چسپاں ہے۔

ساخت:۔ خصیۃ الرحم کا بیرونی غلاف آبدار جھلی کا ہوتا ہے۔ اس کے نیچے ریشہ دار جھلی کا ایک مخصوص غلاف (طبقہ بیضہ۔ ٹیونیکا البیوجینیا) ہوتا ہے۔ اگر خصیۃ الرحم کو چیر کر دیکھا جائے تو اس کی اندرونی ساخت جس کو سٹرومہ کہتے ہیں۔ ایک طرح کی خانہ دار اور ریشہ دار سرخی مائل سفید بناوٹ ہے۔ جس میں ذرات ریگ کی مانند نہایت چھوٹے چھوٹے دانے یا بلبلے (چھوٹی تھیلیاں) پائے جاتے ہیں۔ جن کو تولیصل گراف (گرافین ویسیکلز) کہتے ہیں۔ اور جن کے اندر مادۂ تولید

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

واقع ہے۔ ہر ایک ایسے بُلبُلے یا حویصل گراف کا ایک غلاف ہوتا ہے۔ اور غلاف کے اندر ایک زرد سا پانی بھرا رہتا ہے۔ اور اس پانی کے اندر عورت کا انڈا (بیضۂ انثیٰ اودم) بحفاظت تمام رہتا ہے۔ ان حویصلات کا نشوونما بلوغت کے بعد شروع ہوتا ہے یعنی ایام جوانی میں یہ دانے یا بُلبُلے یا حویصلات پختہ ہو کر پھٹتے ہیں۔ جن کا مادہ مردوں کے مادۂ تولید سے مل کر حمل قرار پاتا ہے

خصیۃ الرحم میں یہ دانے یا بُلبُلے یا حویصلات بچپن سے لے کر اس وقت تک جب تک کہ عورت میں اولاد پیدا کرنے کی قابلیت قائم رہتی ہے۔ برابر بنتے اور پختہ ہوتے رہتے ہیں۔ ہر ایک خصیۃ الرحم میں ایسے ہزاروں دانے یا حویصلات ہوتے ہیں۔ جو خردبین کے بغیر دکھائی نہیں دیتے۔ بلوغت سے پہلے یہ دانے خام ہوتے ہیں۔ لیکن ایام بلوغت میں یہ نشوونما پا کر بڑے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اور رائی کے دانہ سے لے کر مٹر کے دانہ کے برابر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بالغ عورتوں میں ہر ایک خصیۃ الرحم کی بیرونی سطح میں ایسے دس پندرہ دانے بغیر خردبین کے بھی دکھائی دیتے ہیں ؛

شروع میں یہ دانے یا حویصلات خصیۃ الرحم کے اندر بہت گہرے ہوتے ہیں۔ مگر جوں جوں یہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ خصیۃ الرحم کے قریب آتے جاتے ہیں اور جب پختہ ہو کر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو خصیۃ الرحم کی بیرونی سطح پر چھوٹے چھوٹے دانوں یا ابھار کی مانند دکھائی دیتے ہیں۔ اور پھر مختلف اوقات میں پورے طور پر نضج پا کر یعنی بالکل پختہ ہو کر ٹوٹا کرتے یا پھٹ جاتے ہیں۔ ہر ایک ایسے دانے یا بُلبُلے میں عورت کا مادۂ تولید ہوتا ہے۔ اور جب وہ پھٹتا ہے۔ تو مادۂ تولید یعنی بیضۂ انثیٰ (اودم) مع سیال حصّہ کے قناۃ یا نالی سے گزر کر رحم میں چلا جاتا ہے ؛

عورتوں کا مادۂ تولید یا مادۂ منویہ

جیسا کہ مذکور ہوا مردوں کے خصیوں کی طرح عورتوں کے خصیۃ الرحم نالیدار نہیں ہوتے۔ یعنی عورتوں میں نہ تو مجازی منی ہوتی ہے۔ اور نہ خزائن منی اور نہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اُن میں مردوں کی منی کی طرح منی پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ عورتوں کا مادۂ تولید خصیۃ الرحم کی بیرونی سطح میں آبلے یا دانے یا حویصل کی طرح پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ آبلہ یا حویصل ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے اندر جو مادۂ تولید یا مادۂ منویہ ہوتا ہے۔ وہ قاذف نالی کی راہ رحم کی طرف چلا جاتا ہے۔ پس عورتوں کا مادۂ تولید یا مادۂ منویہ وہی مذکورہ رطوبت ہے۔ جو خصیۃ الرحم کے آبلے یا حویصل کے پھٹنے سے خارج ہوتی ہے۔ اسی رطوبت میں بیضۂ انثیٰ یعنی عورت کا انڈا ہوتا ہے۔ جو مرد کے مادۂ تولید یعنی کرم منی کے ساتھ مل کر حمل قرار پاتا ہے۔

نوٹ: تفصیل کے لیے دیکھو پیدائش انسان کتاب کے شروع میں ۔

مادۂ تولید (یا) حیض

بہت سے دُودھ پلانے والے جانوروں میں سے یہ مادۂ تولید صرف مقررہ اوقات میں پختہ ہو کر خارج ہوا کرتا ہے چنانچہ ایسی صورت میں مادہ گرمائی ہے اور اس کی اندام نہانی سے ایک خاص قسم کی رطوبت آتی ہے۔ پس جن ایام میں مادہ کو ہیجانِ شہوت ہوتا ہے۔ یعنی وہ گرماتی ہے۔ اور نر کو طلب کرتی ہے۔ ان ایام کو ایامِ مستی کہتے ہیں۔ اگر ان دنوں میں نر و مادہ کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ تو حمل قرار پا جاتا ہے۔ ورنہ مادہ تولید بیکار اور ضائع ہو جاتا ہے۔ یہی حال عورتوں کا ہے۔ یعنی عورتوں میں بھی مادۂ تولید بالعموم ایام معینہ میں پختہ ہو کر خارج ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ عورتوں کا مادۂ تولید ہر ۲۸ روز یا ماہ قمری میں پختہ ہو کر خارج ہوا کرتا ہے۔ اور انہیں دنوں میں عورت کو حیض آیا کرتا ہے۔ گویا عورتوں کا مادۂ تولید بالعموم حیض میں پختہ ہو کر خارج ہوا کرتا ہے۔ کیونکہ جب مادۂ تولید پختہ ہونے کو ہوتا ہے۔ تو اس وقت عورت کے اندرونی اعضاء تناسل میں اجتماع خون ہوتا ہے۔ تاکہ مادۂ مذکرہ جلد پختہ ہو جائے۔ چنانچہ حیض جاری ہونے سے کئی دن پہلے خصیۃ الرحم کے حویصلات میں سے ایک حویصل کی اندرونی رطوبت بڑھنے لگتی ہے۔ جس سبب سے وہ پھول کر پھٹ جاتا ہے اور بیضۂ انثیٰ (اووم)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اس میں سے نکل کر براہ قاذف رحم میں چلا جاتا ہے۔ جس وقت حویصل پھٹ کر خصیۃ الرحم سے بیضہ الگ جدا ہوتا ہے۔ اس وقت قاذف اور رحم کی اندرونی استری جھلی (غشاء مخاطی میٹوکس ممبرین) میں اجتماعِ خون ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ جس کو عام طور پر حیض آنا کہتے ہیں۔ اور اس خون کو خونِ حیض کہتے ہیں۔

حیض

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
حیض	طمث	مین سیز Menses

حیض کا آنا عورتوں میں بالعموم بلوغت یا قابلیت تولید کی ایک معتبر علامت ہے۔ لیکن یہ قطعی دلیل نہیں کیونکہ اگر کسی وجہ سے حیض آنے میں تاخیر ہو جائے تو یہ بات مانع بلوغت نہیں ہوتی کیونکہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ کہ بعض نوجوان لڑکیوں میں حیض آنے سے پہلے حمل قرار پا گیا۔ اور بعض عورتیں ایسی بھی دیکھی گئی ہیں کہ انہیں کبھی حیض نہیں آیا۔ لیکن وہ صاحب اولاد ہوئیں۔

سرد ممالک میں بالعموم پندرہ سولہ سال کی عمر میں اور گرم ممالک میں گیارہ بارہ سال کی عمر میں لڑکیوں کو حیض آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی اس سے پیشتر بھی آنے لگ جاتا ہے۔ اور بعض مصنفین نے تو لکھا ہے۔ کہ شاذ و نادر پانچ چھ سال کی لڑکیوں کو بھی حیض آیا اور بالعموم ۴۵ سال کی عمر میں حیض کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ لیکن شاذ و نادر ۵۵ بلکہ ۵۷ سال کی عمر تک بھی حیض آتا ہے بحالتِ صحت حیض ہر چہار ہفتہ یا ۲۸ روز کے بعد آیا کرتا ہے۔ لیکن بعض عورتوں کو ۲۴ روز بعد اور بعض کو ۳۲ روز بعد بھی آیا کرتا ہے۔ اور حیض تین دن سے پانچ دن تک اور بالعموم چار دن تک شاذ و نادر سات دن تک جاری رہتا ہے۔ ایام حمل اور ایام رضاعت یعنی دودھ پلانے کے زمانے میں حیض علی العموم بند ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی کچھ عرصہ تک تھوڑا تھوڑا جاری بھی رہتا ہے۔

خون حیض میں رحم اور مہبل کی بلغمی رطوبات کے مل جانے سے اس میں تغیر

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اور بدبُو پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ اور وہ عام خون کی طرح سے جمنے نہیں پاتا۔

پستان

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
سینہ، چھاتی	ثدی، ثدیان	میمری گلینڈز Mummery Glands

پستان بھی دو گلٹیاں۔ جن میں ایام رضاعت میں بچے کی پرورش کے لیے دُودھ پیدا ہوتا ہے۔ یہ عورتوں میں کامل اور مردوں میں برائے نام ہوتی ہیں مختلف عورتوں میں اور عمر کے مختلف حصّوں میں ان کی جسامت مختلف ہوتی ہے چنانچہ بلوغت سے پہلے یہ چھوٹی ہوتی ہیں۔ اور بلوغت تک اعضائے تناسل کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑھتی رہتی ہیں۔ حمل اور ایام رضاعت میں یہ بہت بڑھ جاتی ہیں۔ اور بڑھاپے میں مُرجھا جاتی ہیں۔ ہر ایک پستان کی چوٹی پر ایک بلندی ہوتی ہے۔ جسے اُردو میں گھنڈی، عربی میں حلمہ اور انگریزی میں نپل کہتے ہیں۔ اس کے گرد ایک سُرخ سیاہی مائل حلقہ (ایری اولا) ہوتا ہے۔ جو باکرہ لڑکیوں میں گلابی رنگ کا ہوتا ہے۔

پستان کی بناوٹ میں غددی مادے کے چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے حصّے پائے جاتے ہیں۔ جو التحاقی ریشوں، عروق اور نالیوں کے ذریعے باہم ملے رہتے ہیں۔ ہر ایک ٹکڑا چند گول گول دانوں کے اکٹھا ہونے سے بنتا ہے۔ اور ان گول گول دانوں سے دُودھ پیدا کرنے والی نالی کی باریک باریک شاخیں نکلتی ہیں۔ اور چند ایسی شاخیں باہم مل کر ایک بڑی نالی بن جاتی ہے۔ اور ایسی پندرہ بیس دودھ کی نالیاں (دانا بیب لبنیہ۔ ٹیوبولائی لیکٹی فرائی) پستان کی چوٹی کے قریب والے سیاہ حلقے کے نیچے فراخ ہو کر ایک چھوٹا سا حوض بناتی ہیں اور پھر تنگ ہو کر حلمہ۔ گھنڈی۔ میں ختم ہوتی ہے۔

اعضاء نفسانیہ (یا) نظام عصبی

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
نظام عصبی	نظام عصبی	نروس سسٹم Nervous System

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اعضاء نفسانیہ سے مراد وہ اعضاء ہیں جن کا تعلق نفس یا عقل سے ہے۔ یہ اعضاء دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مراکز عصبیہ یعنی دماغ و نخاع جو مبدأ قوت حس و حرکت ہیں یعنی بدن میں یہ قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور دوسرے اعصاب جو ان قوتوں یعنی حس و حرکت کو مختلف حصص جسم میں پھیلاتے ہیں۔ ان سب کو یعنی مراکز عصبیہ و اعصاب کو بحیثیت مجموعی نظام عصبی بھی کہتے ہیں۔ اور جس طرح سے ایک بادشاہ کسی ملک پر بادشاہت کرتا ہے۔ اسی طرح نظام عصبی مملکت جسم کا حکمران ہے۔ پس دماغ جسم کا بادشاہ ہے۔ اور نخاع یا حرام مغز دماغ کا خلیفہ یا نائب ہے۔ اور اعصاب ان دونوں کے خادم ہیں۔ جسم کی ہر ایک حرکت خواہ وہ ارادی ہو یا غیر ارادی نظام عصبی ہی کے کسی نہ کسی حصے سے انجام پاتی ہے۔ پس نظام عصبی نفس اور جسم کے درمیان واسطۂ فعل و انفعال ہے۔ نظام عصبی کے دو حصے ہیں۔ ایک نظام دماغی و نخاعی اور دوسرے نظام شرکی (۱) نظام دماغی و نخاعی میں دماغ و نخاع اور ان کے متعلقہ اعصاب ہوتے ہیں چونکہ قوت حس و حرکت عقل و فہم حواس خمسہ ظاہری و حواس خمسہ باطنی اس نظام کے متعلق ہیں۔ اسی لیے اس کو نظام حیات حیوانی بھی کہتے ہیں (۲) نظام شرکی میں عصبی عقدہ کرہین اور ان کے متعلقہ اعصاب ہوتے ہیں۔ چونکہ اس نظام کے متعلق حرکت قلب۔ دوران خون۔ حرکت تنفس حرارت جسم پیدائش رطوبات غدد۔ ہضم غذا اور پرورش جسم کے افعال کا انتظام ہے۔ اس لیے اس کو نظام حیات عضوی بھی کہتے ہیں *

اب پہلے نظام عصبی کی مختصر تشریح بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کے وظائف یا افعال کا بیان کیا جائے گا۔

دماغ کے پردے

اردو نام	عربی نام		انگریزی نام
دماغ کی جھلیاں	اغشیۂ دماغ	مے نینجز	Meninges
دماغ کے پردے	اُمّ دماغ۔ سُحایا	(واحد) مے ننکس	Meninx

نوٹ:۔ مے نینجز جمع ہے مے ننکس یا مانجس کی مانجس ایک یونانی لغت ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اور جس کے معنی ہیں پردہ یا جھلی مانخس کا معرب، مانخیس ہے پس مانخیس کے کے بھی معنی ہیں پردۂ دماغ یا غشاء دماغ لیکن مولانا نفیس اس کا اطلاق اُمّ غلیظ پر کرتے ہیں۔ اور صاحب اقسرائی اُمّ غلیظ اور ام رقیق دونوں پر جو صحیح نہیں۔

دماغ کے پردے یا دماغ کی جھلیاں جو اس کی حفاظت وغیرہ کے لیے اس پر لپٹی ہوئی ہیں۔ تعداد میں تین ہیں۔ جن میں سے (۱) بیرونی جھلی دبیز (۲) درمیانی جھلی مکڑی کے سفید جالے کی مانند جس میں مکڑی انڈے دیتی ہے نہایت نازک اور (۳) اندرونی جھلی باریک ہوتی ہے۔ ذیل میں ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ مختصر بیان کیا جاتا ہے۔

غشاء صُلب (یا) اُمّ غلیظ

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
موٹا پردہ۔ چھوٹی جھلی	اُمّ غلیظ۔ اُمّ صُلب	ڈیورا میٹر Duramater
دبیز پردہ۔ دبیز جھلی	اُمّ جافیہ۔ اُمّ صفیق	

یہ ایک سفید یا قدرے خاکی مائل سفید دبیز مضبوط اور ریشہ دار جھلی ہے جو کھوپری کی اندرونی سطح کو استر کرتی ہے۔ اس جھلی کی بیرونی سطح جو کھوپری کی ہڈیوں سے چسپاں ہوتی ہے۔ کھردری اور ریشہ دار ہوتی ہے۔ لیکن اس کی اندرونی سطح صاف اور چکنی ہوتی ہے۔ اس جھلی سے یہ تین بڑھاؤ یا نکاں نکل کر کھوپری کے جوف کو تقسیم کرتے ہیں۔ اور دماغ کے مختلف حصّوں کو سہارا دیتے ہیں (۱) اگلا درمیانی پردہ جس کو عربی میں فاصل مُقدّمہ یا طی مُقدّمہ اور انگریزی میں فلکس سیری برائی کہتے ہیں۔ جو درانتی کی مانند ایک چپٹا گاؤدُم خمیدہ نکال ہے۔ اور دماغ کے اگلے دونوں نصف کروں کے مابین واقع ہے۔ اس کے بالائی چسپیدہ کنارے کے اندر کھوپری کی بالائی وریدِ مستطیل (سوپیریئر لانجی ٹیوڈی نل سائنس) اور زیرین مقعر آزاد کنارے کے اندر زیرین وریدِ مستطیل (انفیریئر لانجی ٹیوڈی نل سائنس) ہوتی ہے۔ (۲) پچھلا درمیانی پردہ جس کو عربی میں فاصل مؤخر اور انگریزی میں فلکس سیری بیلائی کہتے ہیں۔ مؤخر دماغ (دُمیغ۔ سیری بیلم) کے دونوں جانبی لوتھڑوں کے مابین

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

واقع ہے۔ اور ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھتا ہے۔ (۳) خیمۂ دماغ جس کو عربی میں فاصل بین البطنین اور انگریزی میں ٹن ٹوریم سیری بیلائی کہتے ہیں۔ جو بڑے دماغ کے پچھلے لوتھڑوں کے بوجھ سے محفوظ رکھتا ہے۔

غشاء عنکبوتی

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
مکڑی کے جالے سی جھلی	غشاء عنکبوتی	Arachnoid Membrain ارکنائڈ ممبرین

یہ مکڑی کے سفید جالے کی مانند ایک نہایت باریک اور نازک آبدار جھلی ہے۔ جو اُمّ غلیظ اور اُمّ رقیق کے مابین واقع ہے۔ اس جھلی کے دو پرت ہوتے ہیں۔ بالائی پرت اُمّ غلیظ کا استر بناتا ہے۔ لیکن بعض مقامات پر اس سے جُدا رہتا ہے۔ پس ان خلاؤں کو بطون کا ذیہ یا بطون تحت اُمّ غلیظ (سب ڈیٹول سپیس) کہتے ہیں۔ اس کا زیریں پرت اُمّ رقیق پر حاوی ہوتا ہے۔ لیکن کہیں کہیں اس سے علیحدہ رہتا ہے۔ پس ان خلاؤں یا وسعتوں کو بطون تحت العنکبوتیہ (سب ارکنائڈل سپیس) کہتے ہیں۔ جو دماغ کی بالائی سطح پر تنگ اور اس کی زیریں سطح کشادہ ہوتی ہے۔ اور دماغ کے بطن مؤثر سے ارتباط رکھتی ہے۔ ان خلاؤں یا فضاؤں میں ایک قسم کی صاف شفاف نمکین رطوبت (رطوبت دماغیہ) سیریبرو سپائنل فلوئڈ پائی جاتی ہے۔ جو دماغ کو بیرونی صدمات سے محفوظ رکھتی ہے۔ واضح ہو کہ یہ پردہ (غشاء عنکبوتی) دماغ کے اُوپر کی طرف باریک اور شفاف ہوتا ہے۔ لیکن دماغ کے پیندے پر قدرے دبیز اور دھندلا ہو جاتا ہے۔

غشاء لیّن (یا) اُمّ رقیق

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
باریک پردہ	اُمّ رقیق	پایا میٹر Pia mater
باریک جھلی	اُمّ حنونہ	

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

نوٹ:۔ چونکہ اس پردہ میں مشیمیہ کی مانند عروقی جال ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو غشاء مشیمی کہتے ہیں۔ یہ دماغ کا سب سے اندر والا غلاف ہے۔ یہ نرم اور باریک ہوتا ہے۔ اور دماغ کے نشیب وفراز کو اختیار کرتا ہے۔ اس میں خون کی باریک باریک رگوں کا جال ہوتا ہے۔ جس سے دماغ کی پرورش ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو پایا میٹر یعنی پاک مال کہتے ہیں۔ اس جھلی کی ایک شاخ دماغ کے آڑے شگاف کی راہ اس کے اندر داخل ہو کر بطون دماغ کا نشر بانی جال (ضفیرۂ مشیمیہ) کورائڈ پلیکس بناتی ہے۔

دماغ

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
دماغ	دماغ	برین Brain
بھیجا	مخ	انکیفے لان Encepalon

دماغ اعضاء نفسانیہ میں سے عضو رئیس ہے۔ اور کھوپری کے جوف میں واقع ہے۔ دماغ کا اوسط وزن ایک آدمی میں ۴۹½ اونس (قریب ڈیڑھ سیر انگریزی) اور ایک جوان عورت میں ۴۴ اونس ہوتا ہے۔ لیکن بعض عالی دماغ اشخاص کے دماغ کا وزن ۶۳ بلکہ ۶۴ اونس تک ہوتا ہے۔ اور برخلاف ازیں مادر زاد پاگل آدمیوں کا دماغ بہت چھوٹا صرف بائیس تیس اونس ہوتا ہے۔ بالعموم انسانی دماغ کا وزن اس کے جسم کا بہترا حصہ ہوتا ہے۔ مگر مچھ اور ہاتھی کے سوا باقی کل حیوانات کے دماغوں سے آدمی کا دماغ بھاری ہوتا ہے۔ مگر جسمانی تناسب کے لحاظ سے مگرمچھ اور ہاتھی کے دماغ سے بھی آدمی کا دماغ بھاری ہوتا ہے۔ غرضیکہ قدرت نے جتنا وزنی دماغ انسان کو مرحمت فرمایا ہے۔ اتنا کسی اور حیوان کو عطاء نہیں کیا۔ کیونکہ انسان قدرت کاملہ کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی اعلیٰ دماغی طاقتوں کے سبب دیگر سب حیوانات کو اپنا فرمانبردار بنا لیتا ہے۔ چالیس سال کی عمر تک دماغ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اور پھر اس عمر کے بعد ہر دس سال میں تقریباً نصف چھٹانک دماغ وزن میں کم ہوتا جاتا ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تصویر دماغ



(۱) دائیں نصف کرۂ دماغ کی بلندیاں دکھائی گئی ہیں (۲) چھوٹا دماغ (۳) راس النخاع (گردن کے کٹے ہوئے مہروں کے جسم (۴) ان کے نگہ دار حصص (۵) حرام مغز اور راس کے اعصاب۔

دماغ ہی محلِ حواس و قوائے عقلیہ ہے یعنی اس میں ذہنی یا عقلی قوتیں موجود ہوتی ہیں۔ جن کے سبب حضرت انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔

تسہیل بیان کے لیے دماغ کو مندرجہ ذیل چار حصوں میں منقسم کیا گیا ہے۔

(۱) **بڑا دماغ**۔ جو کھوپری کے اگلے اور درمیانی جوفوں میں رہتا ہے۔ اور وزن میں سارے دماغ کا ۹/۱۰ حصہ ہے۔

(۲) **چھوٹا دماغ**۔ جو بڑے دماغ کے پچھلے حصے کے نیچے کھوپری کے پچھلے جوف میں رہتا ہے۔

(۳) **درمیانی دماغ** یا پل دماغ جو کہ عصبی مادہ کا ایک چوڑا بند یا پل ہے۔ جو کہ حرام مغز کے گرد گھومتا ہوا بڑے دماغ کے دونوں جانبی نصف کروں کو باہم ملاتا ہے۔

(۴) **سر حرام مغز**۔ جو کہ دماغ کے حرام مغز کے ساتھ جوڑا یا ملا ہوا ہے۔

اب ان میں سے ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ مفصل بیان کیا جاتا ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com



Fig. 164.—The Human Brain.

A, cerebrum; B, cerebellum; C, pons Varolii; D, medulla oblongata. The parts are represented as separated from one another somewhat more than is natural so as to show their relation better.

اس تصویر میں دماغ کے چاروں حصص (۱) بڑا دماغ (۲) چھوٹا دماغ (۳) پُل دماغ (۴) سرحرام مغز دکھائے گئے ہیں۔ لیکن اصلی حالت کی نسبت ذرا ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے دکھائے گئے ہیں تاکہ بخوبی سمجھ میں آجائیں۔

مقدم دماغ (یا) بڑا دماغ

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
اگلا دماغ	مقدم دماغ	سیری برم
بڑا دماغ	مخ۔ مخ کبیر	Cerebrum

مقدم دماغ کو بعض مقدم اور جزء مقدم بھی کہتے ہیں۔ یہ دماغ کا سب سے بڑا اور مقدم حصّہ ہے۔ جو کھوپری کے سامنے درمیانی اور پچھلے جوفوں میں رہتا ہے یہی محل قوائے عقلیہ ہے دیگر تمام حیوانات کی نسبت انسان میں یہ حصّہ دماغ بہت بڑا ہے۔ بلکہ اعلیٰ انسانی نسلوں اور افراد میں یہ نسبتاً بڑا ہوتا ہے۔ اس کی بالائی سطح بیضوی آگے کی نسبت پیچھے چوڑی اور محدب ہوتی ہے درمیانی سطح چپٹی اور زیرین سطح ناہموار ہوتی ہے۔

دماغ کی بالائی سطح

دماغ کی بالائی سطح پر بہت سی چھوٹی چھوٹی بلندیاں یا لپیٹیں پائی جاتی ہیں۔ اور ان بلندیوں کے مابین چھوٹی چھوٹی پیچیدہ نالیاں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ دماغ کی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تصویر دماغ



The Upper Surface of the Cerebrum, showing its division into two Hemispheres, and also the Convolutions.

اس دماغ کی بالائی سطح کی بلندیاں دکھائی گئی ہیں۔

ان چھوٹی چھوٹی بلندیوں یا لپیٹوں کو عربی میں تلافیف الدماغ اور انگریزی میں کن وولیوشنز کہتے ہیں اور ان کی درمیانی نالیوں کو عربی میں فرجات انگریزی میں سلکائی کہتے ہیں مختلف حیوانات کے دماغوں کے امتحان کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ ان دماغی بلندیوں اور لپیٹوں (تلافیف) کی تعداد اور بناوٹ ہر ایک حیوان میں اس کی عقل کے تناسب سے ہوتی ہے۔ چنانچہ چھوٹے چھوٹے حیوانات کے دماغوں میں یہ بلندیاں بہت کم ہوتی ہیں۔ البتہ بڑے بڑے حیوانات کے دماغوں اور بالخصوص بڑے بندر کے دماغ میں چند ایک بلندیاں پائی جاتی ہیں۔ لیکن انسانی دماغ میں یہ بلندیاں زیادہ ہوتی ہیں اور پھر مختلف انسانوں کے دماغوں کی ان بلندیوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ زیادہ عقلمند انسانوں میں جو کہ دنیا میں بڑے بڑے یا خاص خاص کام کرتے ہیں۔ یہ دماغی بلندیاں نسبتاً زیادہ ہوتی ہیں یا ان کے دماغوں میں کوئی کوئی خاص خاص بلندی بڑی یا زائد ہوتی ہے۔ کیونکہ قوائے عقلیہ کا دارومدار انہی بلندیوں پر ہوتا ہے۔ بڑا دماغ ایک گہرے درمیانی طولانی شگاف (فرجۂ طولیہ) کے سبب دو برابر پہلوی حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جن میں سے ہر ایک کو نصف کرۂ دماغ کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں پہلوی حصے درمیان میں ایک سفید آڑے بند کے ذریعے

ل اخروٹ کے مغز میں ویسے ہی تشبیب و فراز ہوتے ہیں۔ جیسے کہ انسانی مغز میں ۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جسے عربی میں جسم صلب اور انگریزی میں کارپس کلوزم کہتے ہیں باہم جڑے رہتے ہیں۔ ہر ایک نصف کرۂ دماغی کی بیرونی سطح پر پانچ لوتھڑے (وضوص لوبز) اور تین گہرے شگاف (فرجات۔ فشرز) نظر آتے ہیں۔ جن کی مختصر تشریح حسب ذیل ہے۔

بڑے دماغ کے شگاف

پہلا شگاف: جس عربی میں فرجہ اولیٰ اور انگریزی میں فشر آف سلوی یس کہتے ہیں۔ یہ دماغ کی زیریں سطح سے شروع ہو کر اس کی بیرونی سطح پر پہنچ کر دو شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک اوپر کو جا کر پیشانی کے لوتھڑے میں غائب ہو جاتی ہے اور دوسری آڑی شاخ پیچھے کو جا کر تالو کے لوتھڑے میں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ شگاف پیشانی کے لوتھڑے کو دماغ کے کنپٹی کے لوتھڑے وغیرہ سے علیحدہ کرتا ہے۔

دوسرا شگاف: جس کو عربی میں فرجہ ثانیہ اور انگریزی میں فشر آف رولینڈز کہتے ہیں نصف کرہ کی بیرونی سطح کے وسط میں واقع ہے۔ یہ شگاف طولانی سے شروع ہو کر سامنے اور نیچے کو جاتا ہوا پہلے شگاف کی آڑی شاخ کے اوپر کی جانب ختم ہو جاتا ہے۔ اور پیشانی کے لوتھڑے کو تالو کے لوتھڑے سے علیحدہ کرتا ہے۔

تیسرا شگاف: جس کو عربی میں فرجہ ثالثہ اور انگریزی میں ایکسٹرنل آکسی پٹو پرائٹل فشر کہتے ہیں۔ دراصل نصف کرہ کے شگاف طولانی کا بڑھاؤ ہے۔ جو دوسرے شگاف اور دماغ کے پچھلے کنارے کے وسط میں دکھائی دیتا ہے۔ اور تالو کے لوتھڑے کو گدی کے لوتھڑے سے جدا کرتا ہے۔

مذکورہ بالا تین شگافوں سے ہر ایک نصف کرۂ دماغی میں مندرجہ ذیل پانچ لوتھڑے بن جاتے ہیں

بڑے دماغ کے لوتھڑے

(۱) **پیشانی لوتھڑا:** اس کو عربی میں فص جبہی اور انگریزی میں فرانٹل لوب کہتے ہیں۔ یہ پہلے شگاف کے بائیں طرف اور دوسرے شگاف کے سامنے واقع ہے اس کی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زیریں سطح جو پیشانی کی ہڈی پر رہتی ہے۔ چشم خانہ کا لوتھڑا کہلاتا ہے۔

(۲) تالو کا لوتھڑا:۔ اس کو عربی میں فص یا فوخی اور انگریزی میں پیرائٹل لوب کہتے ہیں۔ یہ پیشانی اور گدی کے لوتھڑوں کے مابین واقع ہے۔ اس کے سامنے دوسرا شگاف پیچھے تیسرا شگاف اور نیچے پہلے شگاف کی آڑی شاخ ہے۔

(۳) گدی کا لوتھڑا:۔ اس کو عربی میں فص قمحدی اور انگریزی میں آکسی پٹیل لوب کہتے ہیں۔ یہ مقدم دماغ کا تکونہ حصہ ہے۔ جو تالو و گدی کے شگاف کے پیچھے واقع ہے اور دو چھوٹے شگافوں کے ذریعے بالائی درمیانی اور زیریں حصوں میں منقسم ہے۔

(۴) کنپٹی وغیرہ کا لوتھڑا:۔ اس کو عربی میں فص صدغی وتدی اور انگریزی میں ٹیمپر وسفی نائڈل لوب کہتے ہیں۔ یہ دماغ کا وہ حصہ ہے۔ جو کھوپری کے درمیانی نشیب میں داخل ہے۔ یہ سامنے اور اوپر کی طرف پہلے شگاف سے محدود ہے اور پیچھے تالو و گدی کے لوتھڑے سے ملا ہوا ہے اور دو چھوٹے شگافوں کے ذریعے بالائی درمیانی وزیریں تین حصوں میں منقسم ہے۔

(۵) مرکزی لوتھڑا:۔ اس کو عربی میں فص مرکزی اور انگریزی میں آئی لینڈ آف ریل کہتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے۔ جو پہلے شگاف کے جائے آغاز پر واقع ہے۔

نصف کرۂ دماغ کی اندرونی سطح

اگر بڑے دماغ کے دونوں نصف کروں کو مقام اتصال سے کاٹ کر دیکھا جائے۔ تو ہر ایک نصف کرہ کی اندرونی سطح پر بھی جو دوسری جانب کے مقابل سطح سے ملی رہتی ہے۔ مندرجہ ذیل پانچ شگاف اور چھ لوتھڑے پائے جاتے ہیں۔

(۱) کنارے کے شگاف:۔ (کے لوزمارجی نل فشر) یہ شگاف سامنے کنارے کے آگے نظر آتا ہے۔ اور جسم صلب کے سامنے سرے کی زیریں سطح سے شروع ہو کر دماغ کے دوسرے شگاف (فشر آف رولینڈو) کے بالائی سرے کے پیچھے کی طرف ختم ہو جاتا ہے۔

(۲) اندرونی تالو گدی کا شگاف:۔ (فرز جٹ پاریٹو آکسی پٹل فشر)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

یہ دراصل بیرونی تالو گدی کے شگاف کا اندر کی طرف بڑھاؤ ہے۔ یہ گدی کے لوتھڑے کو مربع لوتھڑے سے الگ رکھتا ہے۔

(۳) **دوشاخہ شگاف** (گیل کے رائن فشر)۔ یہ نصف کرہ دماغ کے پچھلے کنارے سے عموماً دو شاخوں کے ذریعے شروع ہو کر جسم صلب کے پچھلے سرے پر ختم ہو جاتا ہے۔

(۴) **متوازی شگاف** (فرجہ متوازیہ۔ کولیٹرل فشر)۔ یہ دوشاخہ شگاف کے متوازی اور اس کے نیچے واقع ہے۔ یہ دماغ کی پچھلی طرف سے شروع ہو کر سامنے کی طرف دماغ کے پہلے شگاف (سلوین فشر) سے مل جاتا ہے۔

(۵) **دندانی شگاف**۔ (ڈن ٹیٹ فشر)۔ یہ جسم صلب کے پچھلی طرف سے شروع ہو کر گدی کنپٹی کے سامنے شگاف پر ختم ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل چھ بلندیاں یا چھ لوتھڑے (فصوص۔ لوبز) اس سطح پر دکھائی دیتے ہیں:۔

(۱) **جسم صلب والی بلندی** (تزاید جسم صلب۔ گائرس فارنی کے ٹس)۔ یہ بلندی جسم صلب کے اوپر اور حاشیہ کے لوتھڑے (مارجی نل لوب) کے نیچے واقع ہے۔

(۲) **حاشیہ کا لوتھڑا** (فص الحاشیہ۔ مارجی نل لوب)۔ یہ لوتھڑا دماغ کے حاشیہ یا کنارہ پر کنارے کے شگاف کے اوپر کی طرف واقع ہے۔ اور شگاف مذکورہ کے جائے اختتام پر پہنچ کر معدوم ہو جاتا ہے۔

(۳) **چوکونہ لوتھڑا** (فص مربع کواڈریٹ لوب)۔ یہ لوتھڑا دماغ کے بالائی کنارے پر کنارے کے شگاف کے پیچھے اور تالو گدی کے شگاف کے سامنے اور جسم صلب والی بلندی کے اوپر واقع ہے۔

(۴) **تکونہ لوتھڑا**:۔ (فصیص قحدوی۔ کیونی ٹیٹ لوب)۔ یہ مثلث شکل کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے۔ جو تالو گدی کے شگاف اور دوشاخہ شگاف کے درمیان واقع ہے۔

(۵) **گدی کنپٹی کی اندرونی بلندی** (تزاید قحدوی صدغی انسی ٹیمپورل گائرس)۔ اس بلندی کے اوپر دوشاخہ شگاف اور دندانی شگاف ہوتے ہیں۔ اور نیچے متوازی شگاف ہوتا ہے۔ اس کے سامنے سرے پر ہک کی مانند (کراچٹ) ایک ٹیڑھا حصہ نیچے کی طرف مڑا ہوا نظر آتا ہے۔

گدی کنپٹی کی بیرونی بلندی:۔ تزاید قحدوی صدغی وحشی۔ ایکسٹرنل آکسی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

پیٹیو ٹمپرل کنوولیوشن) یہ متوازی شگاف اور اپنی ہمنام اندرونی بلندی کے نیچے واقع ہے۔

دماغ کی زیرین سطح

بڑے دماغ کی یعنی اس کے دونوں نصف کرہ کی زیریں سطح ناہموار ہوتی ہے اور مندرجہ ذیل تین حصوں پر منقسم ہے۔

(۱) اگلا لوتھڑا (فص مقدم۔ اینٹیریر لوب) جو تقریباً مثلث شکل کا چشم خانہ کے اوپر واقع ہے۔

(۲) درمیانی لوتھڑا (فص متوسط۔ مڈل لوب) جو اگلے لوتھڑے سے زیادہ نمایاں اور کھوپری کے پیندے کے درمیانی گڑھے میں واقع ہے۔

(۳) پچھلا لوتھڑا (فص مؤخر۔ پوسٹیریر لوب) جو غشاء خیمی یا فاصل بین البطنین کے اوپر اور گدی کی ہڈی کے بالائی گڑھے میں رہتا ہے۔

دماغ کی زیرین سطح پر مندرجہ ذیل ضروری مقامات نظر آتے ہیں

(۱) شگاف طولانی (فرجۂ طولیہ۔ لانجی ٹیوڈی نل فشر) یہ درحقیقت وہ گہرا درمیانی شگاف ہے۔ جو بڑے دماغ کے دو حصے کر دیتا ہے۔ اس میں دونوں سامنی دماغی شرائین ہوتی ہیں۔

(۲) جسم واصل (جسم صُلب یا جسم الاحِسّ لا۔ کارپس کلوزم) یہ شگاف طولانی کے پیچھے کی طرف دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ وہ سیمیہ بند ہے۔ جو بڑے دماغ کے دونوں نصف کُرّوں کو باہم ملائے رکھتا ہے۔

(۳) خاکی طبقہ (صفیحہ رمادیہ۔ لے مینا سائی نیریم) یہ ایک خاکی مادہ کا طبق ہے جو جسم صُلب اور حدبہ رمادیہ (ٹیوبر سائی نیریم) کو باہم ملاتا ہے۔

(۴) اعصاب شامہ (زوائد علمیہ الفیکٹری نروز) یہ خاکی اور ملائم قسم کے اعصاب ہیں۔ جو شگاف طولانی کے ہر پہلو میں اگلے لوتھڑوں کی زیرین سطح پر واقع ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

یہ قوتِ شامہ یعنی سونگھنے کے خاص اعصاب ہیں۔

(۵) **پہلا شنگاف** (فرجۂ اولیٰ۔ فشر آف سلویوس) یہ گہرا شگاف دماغ کی زیرین سطح سے شروع ہوتا ہے۔ اور دماغ کے اگلے لوتھڑے (فص مقدم) اور اس کے درمیانی لوتھڑے (فص مؤخر) کے درمیان واقع ہے۔ اور ان کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔

(۶) **اگلی سوراخدار وسعت** (خلا منثقب مقدم۔ لکس پرفوریٹس انٹائیکس) یہ ہر دو جانب ایک ایک سفید سہ گوشہ وسعت ہے جو پہلے شگاف کے اندرونی کنارے پر عصبہ باصرہ کی جڑ کے آگے اور عصبہ شامہ کی جڑ کے ٹھیک پیچھے واقع ہے اس میں بہت سے باریک سوراخ ہوتے ہیں۔ جن کی راہ باریک شرائین دماغ کے اندر داخل ہوتی ہیں اور جسم مصنع کا پس سرائی پیتم میں پھیلتی ہیں۔

(۷) **مجمع نور** (مجمع البصر یا تقاطع عصبی آپٹک کیزم) یہ اعصاب باصرہ یعنی اعصاب نورانی کے ملاپ کا مقام ہے۔

دماغ کی زیرین سطح کی تصویر اور اس کے ضروری مقامات



اس تصویر میں دماغ کی زیرین سطح پر چند ضروری مقامات دکھائے گئے ہیں (۱) دماغ کا شعبہ مقدم (ب) شعبہ متوسط (ج) شعبہ مؤخر (۵) چھوٹا دماغ (۶، ۷) سہ گرام مغز (۸) جسم لاحس (۱۰) ورنز طویل (۲) عصب شم (۳) ورنز سلویوس (۴) تقاطع صلیبی (۵) خاکی ابھار (۶) قیف (۷) غدہ بلغمیہ (۸) سفید ابھار (۹) بڑے دماغ کے پاؤں (۱۰) پل دماغ چھوٹے دماغ کے پاؤں اور ریڑھ کی ہڈی سے ایک (۱) سے بارہ XII بارہ جوڑے دماغی اعصاب

The Under Surface of the Brain, showing the Origins of the Twelve Pairs of Nerves.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جو خاکی طبقہ کے پیچھے اور خاکی اُبھار کے سامنے واقع ہے۔

(۸) **خاکی اُبھار** (حُدبۂ رمادیہ۔ ٹیوبر سائی نیریئم) یہ ایک خاکی مادہ کا اُبھار ہے۔ جو مجمع نور کے پیچھے واقع ہے۔ اس اُبھار سے ایک نالی دار زائدہ نکلتا ہے جس کو قیف یا قمع کہتے ہیں۔

(۹) **قیف** (قمع آنفنڈی بُولم) یہ ایک قیف نما یعنی مخروطی نالی ہے۔ جو غدہ نخامیہ یا غدہ بلغمیہ سے شروع ہو کر خاکی اُبھار میں ختم ہوتی ہے۔ اس کی نالی دماغ کے تیسرے بطن (بطن اوسط) میں کھلتی ہے۔

(۱۰) **بلغمی گلٹی**۔ اس کو عربی میں غدۂ بلغمیہ۔ غدۂ مُستدیرہ۔ غدۂ نخامیہ یا جسم نخامی بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں پیچوٹٹری گلینڈ کہتے ہیں۔ یہ سُرخی مائل خاکی رنگ کی بیضوی شکل کی ایک چھوٹی سی گلٹی ہے۔ جو دس گرین یا پانچ گرین رتی وزنی ہوتی ہے۔ یہ دماغ کے پنجرے کی عظم وتدی کی بالائی سطح کے اگلے نشیب میں رہتی ہے۔ اس میں اگلے اور پچھلے دو لوتھڑے ہوتے ہیں۔ جن میں سے اگلا بڑا اور مستطیل ہوتا ہے اور پچھلا گول ہوتا ہے۔ مذکورہ بالا قیف نما نالی کے ذریعے یہ گلٹی تیسرے بطن کے صحن سے ملی رہتی ہے۔ یہ چھوٹی سی گلٹی بقاء حیات کے لیے نہایت ضروری ہے اور اس کے منافع اور وظائف بھی نہایت اہم ہیں۔ جن کا آئندہ مفصل بیان کیا جائے گا

(۱۱) **سفید اُبھار۔ غدۂ ترمسیہ**۔ ان کو عربی میں اجسام ابیضیہ یا اجسام ثدیہ نیز غدۂ ترمسیہ بھی کہتے ہیں۔ اور انگریزی میں کارپورا البی کینٹیا یا کارپورا مے لیریا کہتے ہیں یہ گول اور سفید مٹر کی صورت کے دو اُبھار ہیں۔ جو خاکی اُبھار کے پیچھے اور ساقین دماغ کے مابین واقع ہیں۔

(۱۲) **پچھلی سوراخدار وسعت** (خلاء منثقوب مؤخر۔ لکس پرفوریٹس پوسٹاٹیکس) یہ ایک چھوٹی سفید خاکی مائل وسعت ہے۔ جو ساقین دماغ کے مابین اور غدۂ ترمسیہ کے پیچھے واقع ہے۔ اس میں بہت سے باریک سوراخ ہوتے ہیں۔ جن کی راہ باریک شرائین دماغ کی پرورش کے لیے جاتی ہیں۔

(۱۳) **دماغ کی ٹانگیں** (ساقین الدماغ یا فخذین الدماغ۔ کروراسیری برائی) یہ سفید عصبی مادہ کی بنی ہوئی پون انچ لمبی دو ٹانگیں یا رانیں سی ہوتی ہیں۔ جو پُل دماغ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(جزءِ اوسطِ دماغ) سے نکل کر اور ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر سامنے اور باہر جا کر دماغ کے جانبی کُرّوں میں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر ایک ساق کے اندرونی جانب سے تیسرا جوڑا اعصاب دماغی کا نکلتا ہے۔ اُن کے تراشنے پر اُن کی اندرونی خاکی ساخت جو زیادہ سیاہ رنگ کی نظر آتی ہے۔ اس کو عربی میں محل اسود اور انگریزی میں لوکس نائیگر کہتے ہیں۔

بڑے دماغ کے مذکورہ بالا ضروری مقامات کے علاوہ دماغ کی زیریں سطح پر یہ چند اور مقامات بھی نظر آتے ہیں۔

اوسط دماغ۔ پل دماغ ۔ اس کو عربی میں دہلیز البطنین بطن اوسط جزء متوسط اور جدید عربی میں جسر رویتوس اور انگریزی میں پانز ویرولائی یا صرف پانز کہتے ہیں۔ یہ دماغ کا وہ حصہ ہے۔ جو بڑے اور چھوٹے دماغ کی ساقوں کے باہم ملاپ سے بنا ہے۔ یہ بڑے دماغ کے دونوں نصف کُرّوں کے مابین اور سر حرام مغز کے آگے واقع ہے۔ اس کا مفصل بیان دیکھو اگلے صفحات میں۔

چھوٹے دماغ کی ساقین (ساقین الدّماغ کُرّوا یری بیلائی یہ حقیقت میں پل دماغ کے پہلوی پچھلے حصص ہیں۔ جو سکڑ اور سمٹ کر چھوٹے دماغ کے دونوں پہلوی لوتھڑوں میں داخل ہوتے ہیں۔

سر حرام مغز (راس النخاع۔ میڈلا اوبلانگیٹا) یہ اوسط دماغ اور حرام مغز کے درمیان واقع ہے۔ پس یہ دماغ کو حرام مغز سے ملاتا ہے۔ اس کا مفصل بیان بھی دیکھو آگے۔

دماغ کا اندرونی بیان

اور

بطون دماغ

اگر بڑے دماغ کے ہر دو نصف کُرّوں کو بآہستگی ایک دوسرے سے جدا کر کے دیکھیں۔ تو ان کے مابین ایک سفید ساخت دکھائی دیتی ہے۔ جس کو عربی میں

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جسم واصل یا جسم صُلب یا جسم لاحس لہٗ اور انگریزی میں کلوزم کہتے ہیں۔
اگر دماغ کے ہر دو نصف کروں کو جسم واصل سے نصف انچ اوپر تراش کر دیکھا جائے تو اس میں ایک بیضوی شکل سفید بناوٹ دکھائی دیتی ہے۔ جو خاکی مادہ سے محدود ہوتی ہے۔ اور اس میں بیشمار چھوٹے چھوٹے سُرخ رنگ کے نقاط دکھائی دیتے ہیں۔ جو دراصل شکستہ عروق دمویہ کے نشانات ہوتے ہیں۔ اس سفید بناوٹ کو اردو میں چھوٹا بیضوی مرکز عربی میں مرکز بیضی اصغر اور انگریزی میں سینٹرم اوویلی مائنر کہتے ہیں۔ اگر ہر دو نصف کروں کو جسم واصل کی سطح کے برابر سے تراشیں تو پھر ایک بہت بڑی سفید بیضوی بناوٹ دکھائی دیتی ہے۔ جسے اردو میں بڑا بیضوی مرکز عربی میں بیضی اکبر اور انگریزی میں سینٹرم اوویلی میجس کہتے ہیں۔ جس کے وسط میں شگاف طولانی کے دونوں سروں کے درمیان ایک سفید آڑا بند نظر آتا ہے۔ جو بڑے دماغ کے نصف کروں کو باہم ملاتا ہے۔ یہی جسم واصل یا کارپس کلوزم ہے۔

اوپر سے تراشے ہوئے دماغ کی تصویر



— Section through the Cerebral Hemispheres, showing the arrangement of the White and Grey Matter

(۱) خاکی مادہ سے محدود (۲) سفید بیضوی شکل کا مقام اور (۳) اس کے درمیان میں سفید آڑا بند یعنی کلوزم نظر آتا ہے۔

جسم واصل یا سخت جسم۔ اس کو عربی میں جسم واصل یا جسم صلب یا جسم لاحس لہٗ اور انگریزی میں کارپس کلوزم کہتے ہیں۔ یہ ایک دبیز سفید آڑا بند ہے جو آڑے ریشوں سے مرکب ہے۔ اور تقریباً چار انچ لمبا ہے۔ اس کے اگلے گول مددرے کو چونچ (منقار گیبو) اور پچھلے دبیز اور چوڑے سرے کو رکبہ سلینیم) کہتے ہیں۔ اور اس کے درمیانی سیدھے خط کو ریقی کہتے ہیں۔ اس کا اگلا سرا جو دماغ کے پہلے شگاف میں گم ہو جاتا ہے۔ صفیحہ ریادیہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سے ملا رہتا ہے۔ اور پچھلا سرا قبرہ (فارنکس) کے پچھلے کنارے سے چسپیدہ ہوتا ہے اب اگر اس جسم واصل کی ریفی کے نصف انچ باہر کی طرف دونوں جانب شگاف دیں۔ تو دماغ کے دو جانبی بطن نمودار ہوتے ہیں ان دونوں جانبی بطون کے درمیان ایک شفاف پردہ (فاصل لامع سپیٹم لوسیڈم) حائل رہتا ہے۔ یعنی دونوں بطون کی اندرونی دیوار بنا کر ایک دوسرے سے جدا رکھتا ہے۔ اس شفاف پردہ کے دو پرت ہوتے ہیں۔ جن کے درمیان ایک ذرا سا جوف ہوتا ہے۔ جس کو دماغ کا پانچواں بطن بطن خامس دفنتھ وینٹریکل) کہتے ہیں۔

جانبی بطون (بطون جانبیہ۔ بطنین مقدمین۔ لیٹرل وینٹریکلز) یہ درحقیقت دماغ کے عام جوف کا بالائی حصہ ہے۔ جو بذریعہ شفاف پردہ کے دو حصوں میں منقسم ہے چنانچہ ہر ایک حصے کو بطن جانبی (بطن مقدم) کہتے ہیں۔ ہر ایک بطن کے درمیان ایک جوف ہوتا ہے۔ جس کو درمیانی جوف تجویف مرکزی سنٹرل کیویٹی) کہتے ہیں اور اس جوف کی تین شاخوں یا زوائد کو تین سینگ یا قرن (کارنو) کہتے ہیں۔ چنانچہ اگلا قرن دماغ کے اگلے لوتھڑے میں۔ دوسرا درمیانی میں تیسرا پچھلے لوتھڑے میں داخل ہوتا ہے۔ بطون جانبیہ کی چھت جسم واصل سے بنتی ہے۔ اُن کی اندرونی دیوار فاصل لامع سے اور بیرونی دماغ کے اُبھاروں سے بنتی ہے۔ ہر ایک بطن جانبی کے فرش میں مندرجہ ذیل ساختیں پائی جاتی ہیں۔ (۱) جسم مضلع (۲) رباط ہلالی (۳) سریر بصری (۴) ضفیرہ مشیمیہ (۵) جسم مشرشر (۶) ازج اب ان میں سے ہر ایک کا مختصر بیان کیا جاتا ہے۔

خاکی ابھار (جسم مضلع۔ کارپس سٹرائی ٹیٹم) یہ ایک خاکی رنگ کا گاؤدم ابھار ہے جو سریر بصری کے آگے واقع ہے۔ اس کا اگلا سرا دبیز اور ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ لیکن پچھلا سرا باریک اور ایک دوسرے سے متفادت ہیں۔ اس کے پچھلے سرے کی اندرونی جانب سریر بصری واقع ہے۔ اس کو بڑے دماغ کا بالائی عقدۂ عصبہ (گینگلیا) کہتے ہیں۔

ہلالی ڈوری (رباط ہلالی۔ تو۔ ہلالی ٹینیا سیمی سرکولیرس) یہ ایک سفید ہلالی رنگ کی ڈوری ہے۔ جو خاکی ابھار اور سریر بصری کے مابین واقع ہے۔

عروقی جھالر (شبکۂ مشیمیہ۔ ضفیرہ مشیمیہ۔ کورائڈ پلیکس) یہ ایک کثیر العروق جھلی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہے۔ جو بطن جانبی میں جھالر کی مانند لٹکتی ہے۔ اس کا اگلا پتلا اور نوکیلا سرا بذریعہ ایک بھنوی سوراخ (سوراخ منزو) کے دوسری جانب کی ایسی جھلی سے ملا رہتا ہے اور پچھلا سرا بطن کے قرن متوسط میں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جھلی بذریعہ آڑے شگاف کے اُم رقیق سے مل جاتی ہے۔

جھالردار جسم۔ جسم مشترز۔ کارپس فیمبری ایٹم)۔ یہ ایک سفید ڈوری سی ہے یہ دراصل ارزج یا قبہ (فارنکس) کا پتلا پہلوی کنارہ ہے۔ جو سکۂ مشیمیہ کے پیچھے واقع ہے۔ اور اس کے ہمراہ قرن متوسط میں داخل ہو کر اور سر بر بصری کے پیچھے سے گھوم کر دماغ کے درمیانی لوتھڑے میں غائب ہو جاتا ہے۔ یہاں تک بطن جانبی کے درمیانی حرف کا بیان ہوا۔ اب اس کے تینوں کرنوں یا سینگھوں کا بیان کیا جاتا ہے۔

اگلا سینگھ (قرن مقدم انٹیریر کارنو)۔ یہ بطن مقدم کا اگلا بڑھاؤ ہے۔ جو مثلث شکل کا جوف ہے۔ یہ بڑے دماغ کے اگلے لوتھڑے میں آگے اور بیرونی جانب کو خمیدہ ہوتا ہے۔ اس کے آگے اور اوپر جسم واصل اور پیچھے جسم مضلع واقع ہے۔

پچھلا سینگھ (قرن مؤخر۔ پوسٹریر کارنو)۔ چونکہ یہ ایسا جوف ہے۔ جیسے انگلی کے دباؤ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو عربی میں تجویف اصبعی اور انگریزی میں ڈیجی ٹل کیویٹی بھی کہتے ہیں۔ یہ قرن مقدم کی نسبت بڑا ہے اور بڑے دماغ کے پچھلے لوتھڑے میں پیچھے اور اندرونی جانب کو خمیدہ ہوتا ہے۔ اس کے صحن میں ایک خفیف ابھار نمایاں ہوتا ہے جس کو لطیف مناسبت کے سبب مینڈھے کا چھوٹا سینگھ (قرن کبشی الصغر۔ ہپو کیمپس مائنر) کہتے ہیں۔

درمیانی سینگھ (قرن متوسط۔ مڈل کارنو)۔ یہ مذکورہ بالا اگلے اور پچھلے سینگھ یا جوفوں کی نسبت بہت بڑا جوف ہے۔ جو دماغ کے درمیانی لوتھڑے میں پہلے پیچھے پھر باہر اور پھر نیچے اور اندر کی طرف خمیدہ ہوتا ہے۔ اس کی چھت پر سر بر بصری اور اس کے صحن میں (۱) خمیدہ سینگھ (۲) سفید ابھار (۳) دندانہ دار جھلی (۴) آڑے شگاف پائے جاتے ہیں۔ جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

(۱) **خمیدہ سینگھ** (قرن کبش اکبر۔ حافر اکبر ہپو کیمپس میجر)۔ یہ مینڈھے کے سینگھ کی شکل کا ایک سفید خمیدہ نکال ہے۔ جو کرن متوسط کے جوف کی کل درازی میں واقع

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہے۔ اس کا نچلا سرا پھیل کر جانور کے پنجہ کی شکل بن جاتا ہے۔

(۲) **سفید ابھار** (بروز ابیض) یہ قرن متوسط و مؤخر کے جائے اتصال پر واقع ہے۔

(۳) **دندانہ دار جھلی** (لفافہ مسنتہ فیشیا ڈنٹیٹا) یہ درحقیقت بڑے دماغ کے درمیانی لوتھڑے کے خاکی مادہ کا کنارہ ہے۔

(۴) **آڑا شگاف** (فرجہ مستعرضہ۔ ٹرنسورس فشر) یہ درحقیقت وہی آڑا شگاف ہے جو جسم واصل کے پچھلے سرے اور سریر بصری کے مابین واقع ہے۔ یہ جسم مشرشر کو سریر بصری سے علیحدہ کرنے پر دکھائی دیتا ہے۔ ام رقیق اسی شگاف کی راہ بطون دماغ تک پہنچتا ہے۔ جس سے دونوں بطون جانبی کی عروقی جھالر بنتی ہے۔

(۵) **شفاف پردہ** (فاصل لامع سیپٹم لوسیڈم) یہ ایک سفید باریک اور قدرے شفاف پردہ ہے۔ جو بطون جانبی کے اگلے حصہ کے مابین واقع ہے۔ یہ پردہ اپنے بالائی کنارے پر جسم واصل سے اور زیریں کنارے پر قبہ یا ازج (فارنکس) سے چسپاں ہے۔ یہ شکل میں مثلث آگے چوڑا اور پیچھے تنگ ہوتا ہے۔ اور اس کے دو پرت ہوتے ہیں۔ جن کے درمیان ایک خفیف سا جوف ہوتا ہے۔ جسے دماغ کا پانچواں بطن (بطن خامس فنتھ وینٹریکل) کہتے ہیں۔

(۶) **محراب** (ازج۔ قبوہ۔ فارنکس) یہ ایک سفید مثلث شکل کی ریشہ دار ساخت ہے جو جسم واصل اور شفاف پردہ کے نیچے اور عروقی جھلی (شقہ متوسط۔ ویلم انٹر پاریٹم) کے اوپر واقع ہے۔ اس کے اگلے اور پچھلے سروں سے دو دو زوائد یا نکال نکلتے ہیں جنہیں ساقِ محراب (ساقین الازج یا قائمہ۔ کروراقارنی۔ مس) کہتے ہیں چنانچہ اگلی ساقین تیسرے بطن کے اندرونی پہلو سے گزر کر دماغ کے تلہ میں خمیدہ ہو کر سفید ابھار (غدہ ترمیسہ۔ کارپورا البی کنیشیا) کا بیرونی حصہ بناتی ہیں۔ اور پچھلی ساقین بطن مقدم کی درمیانی نالی سے نیچے جا کر جھالر دار جسم بناتی ہیں۔

عروقی جھلی (شقہ متوسط۔ ویلم انٹر پاریٹم) یہ ایک کثیر العروق جھلی ہے۔ جو ام رقیق کا بڑھاؤ ہے۔ اور آڑے شگاف کی راہ اندر داخل ہو کر تیسرے بطن کی چھت بناتی ہے۔ یہ دیکھنے میں رسہ گوشہ اور پہلوؤں پر شبکہ مشیمیہ سے ملی ہوتی ہے اس کے اوپر جسم واصل اور قبہ اور نیچے اجسام ربا عیہ غدہ صنوبریہ اور سریر بصری

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

واقع ہیں۔

بینائی کا ابھار (سریر بصری۔ آپٹک تھیلیمس) یہ دیکھنے میں سفید اور مستطیل صورت کے دو ابھار ہیں۔ جو درحقیقت ساق دماغ سے بنے ہیں اور خاکی ابھار (جسم مخلف) کے ہر دو کشادہ حصّوں کے مابین واقع ہیں۔ اور تیسرے بطن (بطن ثالث یا البطن اوسط) کی پہلوی دیوار بناتے ہیں۔

بطن اوسط (یا) تیسرا بطن

نوٹ:۔ جو لوگ بطون جانبی یا اگلے دونوں بطنوں کو ایک شمار کرتے ہیں۔ وہ بطن اوسط کو بطن ثانی کہتے ہیں۔ اور جو انہیں دو شمار کرتے ہیں وہ اسے بطن ثالث کہتے ہیں

دماغ کا تیسرا بطن ایک چھوٹا سا جوف یا خانہ ہے۔ جو دونوں سریر بصری کے مابین واقع ہے۔ اس کی چھت عروق جھلی (لفیفہ متوسط) سے اور صحن خاکی ابھار قیف۔ سفید ابھار اور پچھلی سوراخدار وسعت سے بنا ہے۔ اس کے پہلوی جانب بینائی کا ابھار و سریر بصری اور سامنے ازج (فارنکس) اور پیچھے چوتھے بطن کا راستہ ہوتا ہے۔ اس تیسرے بطن کے اندر تین ڈوریاں (مجامع نقاطع کشر) پائی جاتی ہیں۔ جن میں سے اگلی پچھلی سفید مادہ کی اور درمیانی خاکی مادہ کی بنی ہوئی ہے۔

اگلی ڈوری مجمع متقدم۔ اینٹیریر کمشر) یہ ایک گول سفید ڈوری ہے جو محراب (ازج) کی دونوں اگلی ساقوں کے سامنے واقع ہے۔ یہ ایک جسم مخطط (کارپس سٹرائی ٹم) سے نکل کر دوسرے میں داخل ہوتی ہے۔

درمیانی ڈوری۔ مجمع متوسط۔ مڈل کمشر) یہ خاکی مادہ کی بنی ہوئی اور ذرا چپٹی ہوتی ہے۔ اور دونوں سریر بصری کو ملاتی ہے۔

پچھلی ڈوری (مجمع خلفی پوسٹیریر کمشر) یہ درحقیقت ایک چپٹا رباط ہے جو سفید ریشوں سے بنا ہوا ہے۔ اور دونوں سریر بصری کو پیچھے سے ملاتا ہے۔

نوٹ:۔ بطن اوسط کے پیچھے صنوبری گلٹی ہے۔ جو چار ابھار (اجسام رباعیہ) پر واقع ہے

صنوبری گلٹی (غدۂ صنوبریہ۔ پائنیل گلینڈ) یہ سرخی مائل خاکی رنگ صنوبر

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کے پھل کی طرح یعنی مخروطی شکل کا ایک ابھار ہے۔ جو عروق حلّی (ثقہ متوسط کی زیریں سطح سے چسپاں ہے۔ اور مجمع خلفی کے پیچھے اور چار ابھاروں کے اگلے جوڑے (البیضین) کے اوپر واقع ہے۔ اس کا قاعدہ دماغ سے بذریعہ چند آڑے ریشوں اور دماغ کے جوہر ابیض یا سفید مادہ سے بذریعہ چار باریک ساقوں (پیڈنکلز) کے ملا ہوا ہے۔ اس کی چار ساقوں میں سے دو بالائی ہیں۔ جو سریر بصری کے بالائی اور اندرونی کناروں کی طرف جاتی ہیں۔ اور ازج یعنی محراب کی دونوں اگلی ساقوں سے مل جاتی ہیں۔ اور دو زیریں سریر بصری کے پچھلے اور اندرونی حصے پر جاتی ہیں

چار ابھار (اجسام رباعیہ۔ کارپورا جے نی کیولیٹا) یہ چار گول ابھار ہیں۔ جو ایک چلیپا نشیب کے سبب ایک دوسرے سے علیحدہ رہتے ہیں۔ اور تیسرے بطن اور اس کی پچھلی ڈوری کے پیچھے واقع ہیں۔ ان چاروں ابھاروں میں سے اگلے دو ابھاروں یا اگلے جوڑے (زوج مقدم) کو جو پچھلے جوڑے سے بڑے لمبوترے اور خاکی رنگ کے ہوتے ہیں۔ چوتڑ (البیتین نیٹیز) کہتے ہیں۔ اور پچھلے دو ابھاروں یا پچھلے جوڑے (زوج خلفی) کو جو گول نسبتاً چھوٹے اور سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ خصیئے (خصیتین ٹیسٹیز) کہتے ہیں۔ یہ چاروں ابھار دونوں سریر بصری کے پچھلے حصے اور ساق دماغ سے ملے رہتے ہیں۔

صمام المؤخر (صمام الدّمیغ۔ والو آف ویوسنس) یہ حقیقت میں ایک سفید بہت باریک اور نازک پردہ ہے۔ جو چوتھے بطن کے راستے کے بالائی جانب واقع ہے۔ اور بطن مذکور کی چھت کا کچھ حصہ بناتا ہے۔ یہ آگے اور پیچھے چوڑا ہوتا ہے۔ اور چھوٹے دماغ کے زائدہ دودیہ سے متصل ہے۔

گرہدار اجسام (اجسام معقدہ۔ کارپورا جینی کولیٹا) یہ بھی تعداد میں چار ہوتے ہیں۔ اور ہر ایک جانب دو ہوتے ہیں۔ ان میں ایک عصبہ مجوفہ کے بڑھاؤ کے باہر اور دوسرا اندر کی طرف واقع ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

بطون دماغ

جیسا کہ مذکور ہوا جسم واصل یا جسم سخت اور دماغ کی چند مذکورہ بالا ساختوں کے مابین ایک وسعت پائی جاتی ہے جسکا بالائی حصہ شفاف پردہ (مناصل لامع) کے ذریعے دو جانبی بطون (بطنین متقدمین) میں منقسم ہوتا ہے۔ اور زیریں حصہ بطن اوسط یا بطن ثالث بناتا ہے۔ چھوٹے دماغ اور سرحرام مغز کے مابین چوتھا بطن ہے جس کا مفصل بیان دیکھو اگلے صفحہ میں) اور شفاف پردہ (فاصل لامع) کے دونوں پرتوں کے درمیان جو خفیف یا جوف ہے وہ دماغ کا پانچواں بطن ہے۔

اس تصویر میں دماغ کا پچھلا بطن اصہ تیسرا چوتھا بطن اور اُن کے درمیانی نالی دسوراخ بتائے گئے ہیں۔

(۱) جانبی بطن کا اگلا قرن (ب) نچلا کرن (ج) پچھلا کرن (د) جانبی بطن (ہ) قنات سلویوس تیسرے بطن کو چوتھے بطن سے ملاتی ہے (۳) تیسرا بطن (۴) چوتھا بطن (۵) سوراخ مرو جو جانبی بطن کو تیسرے بطن سے ملاتا ہے (۶) حرام مغز کی درمیانی نالی جو چوتھے بطن میں کھلتی ہے۔ دونوں جانبی بطنوں کے درمیان جو حاجز شفاف پردہ واقع ہوتا ہے اسکی دونوں پرتوں کے درمیان پانچواں بطن دماغ بنتا ہے

نوٹ:۔ بعض لوگ دماغ کی بطون بہ بالا گلے دونوں بطنین کو ایک شمار کرتے ہیں اسلئے وہ بطن اوسط کو بطن ثانی کہتے ہیں۔

دماغ کے یہ بطن آپس میں ایک دوسرے سے ملے رہتے ہیں چنانچہ جانبی بطنوں بذریعہ سوراخ مرو (ثقبہ بیضویہ فورمین آف منرو) تیسرے بطن کے ساتھ اور تیسرا بطن قنات سلویوس (اکوڈکٹ آف سلویوس) کے ذریعے چوتھے بطن کیساتھ اور چوتھا بطن نیچے کیطرف حرام مغز کی درمیانی نالی (سنٹرل کینال) کیساتھ ملا رہتا ہے پانچواں بطن جو بین میں دماغ کے تیسرے بطن کیساتھ ملا رہتا ہے لیکن جوانی میں یہ دماغ کے دیگر بطنوں سے بالکل علیحدہ رہتا ہے۔

نوٹ:۔ واضح ہو کہ دو جھلیاں (تیسری مہرمن) جو کہ دماغ کے پردہ عنکبوتیہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں دماغ کے پانچوں بطنوں یا جوفوں کو استر کرتی ہیں چنانچہ ایک بڑی جھلی تو دونوں جانبی اور تیسرے و چوتھے بطنوں کو استر کرتی ہے۔ اور دوسری بہت ہی چھوٹی جھلی صرف پانچویں بطن میں واقع ہے۔ ان جھلیوں سے شفاف رقیق رطوبت تراوش پا کر ان بطنوں کو تر رکھتی ہے۔

ساخت دماغ۔ دماغ کی ساخت میں خاکی مادہ (گرے میٹر) باہر کی طرف ہوتا ہے اور سفید مادہ (وہائٹ میٹر) اندر کی طرف یہ خاکی مادہ سفید مادے کے اوپر شال چھال کے ہوتا ہے یعنی جس طرح سے کدو کے گودہ کے اوپر اسکا چھلکا ہوتا ہے اسی طرح سے دماغ کے سفید مادہ کے اوپر اسکا خاکی محیط ہوتا ہے۔ اسی لیے عربی میں اسکو قشرۃ الدماغ اور انگریزی میں کارٹکس سیری برائی کہتے ہیں خاکی مادہ میں عصبی کیسے (نرو سیلز) ہوتے ہیں اور سفید مادہ میں عصبی ریشے (نرو فائبرز) ہوتے ہیں جو یا تو خاکی مادہ کے ایک حصہ سے دوسرے حصہ کو جاتے ہیں یا خاکی مادہ سے حرام مغز کو یا حرام مغز سے خاکی مادہ کو جاتے ہیں۔ خاکی مادہ میں خیالات پیدا ہوتے ہیں اور سفید مادہ میں انکی تکمیل ہوتی ہے۔ اس سفید مادہ میں بھی کہیں کہیں خاکی مادہ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پائے جاتے ہیں جنکو جزیرے کہنگلیاں کہتے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کہتے ہیں جو بدن میں سے یہ ۱۲ تین ضروری ہیں (۱) سر یعنی (آپٹک تھیلے مس (۲) احساس ربا عیسہ کارپورا کوڈراجیمنیا (۳) جسم مقطع (کارپس سٹرائی ایٹم) ۔

۱۸۷۰ء سے قبل یہ مانا جاتا تھا۔ کہ بڑا دماغ ہی محل قوائے عقلیہ ہے یعنی اس میں عقل فہم و ادراک و ارادہ وغیرہ قوتیں ہوتی ہیں کیونکہ جب اسکو نکال ڈالا جائے۔ تو یہ سب قوتیں بالکل زائل ہو جاتی ہے۔ لیکن مابعد کے مشاہدات و تجربات سے معلوم ہوا کہ جب بڑا دماغ کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے یا اس پر کوئی معمولی آفت یا ضرب پہنچتی ہے جو صرف اسکے خاکی مادہ ہی پر موثر ہوتی ہے تب بھی قوائے عقلیہ و افعال ذہنیہ کم و بیش مختل و موقوف ہو جاتے ہیں جس سے یہ یقینی نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ دماغ کا خاکی مادہ ہی محل قوائے عقلیہ ہے (دماغ کے افعال و وظائف کا بیان دیکھو صفحہ پر)

موخر دماغ (فیا) چھوٹا دماغ

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
پچھلا دماغ چھوٹا دماغ	موخر دماغ بطن موخر دمیغ ۔ مخیخ	سیری بیلم Cerebellum

نوٹ ۱۔ دمیغ ۔ دماغ کا صیغہ تصغیر ہے اور مخیخ مخ کا صیغہ تصغیر ہے۔ اگرچہ دماغ اور مخ کا اطلاق سارے دماغ پر ہوتا ہے جیسے متقدم اوسط دماغ اور موخر دماغ شامل ہیں لیکن ان الفاظ کا اطلاق متقدم دماغ یا بڑے دماغ پر ہوتا ہے ایسی صورت میں چھوٹے دماغ کے لیے دمیغ یا مخیخ کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔

چھوٹا دماغ بڑے دماغ کے پچھلے حصے اور عشارہ نخاعی (وہ پردہ جو ان دونوں کے درمیان حائل ہے) کے نیچے گدی کی ہڈی کے زیریں دونوں گڑھوں میں واقع ہے جوانی میں چھوٹے دماغ کا وزن ۵ اونس اور تین چھٹانک ہوتا ہے۔ اور مردوں کی نسبت عورتوں میں یہ بھاری ہوتا ہے بچپن میں یہ بہت ہی چھوٹا لیکن ۲۵ سے ۴۰ سال کی عمر تک یہ عمر کے باقی حصوں کی نسبت زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ یہ شکل میں مستطیل اور چپٹا ہوتا ہے اسکی لمبائی ۴½ انچ چوڑائی تقریباً ۲½ انچ اور موٹائی تقریباً ۲ انچ لیکن کناروں پر صرف ½ انچ ہوتی ہے۔ بڑے دماغ کی طرح چھوٹے دماغ پر نشیب و فراز یعنی بلندیاں نہیں ہوتیں بلکہ بہت سی مصفی دراڑیں یا لکیریں ہوتی ہیں اسکی ساخت میں بھی باہر کی طرف خاکی مادہ (گرے میٹر) اور اندر کی طرف سفید مادہ (وہائٹ میٹر) ہوتا ہے بڑے دماغ کی طرح چھوٹا دماغ بھی بذریعہ ایک درمیانی میانی شگاف کے دو نصف کروں یا پہلوی لوتھڑوں میں منقسم ہے۔ اسکی بالائی سطح کے وسط میں ایک ابھار ہے جسکو بالائی کرم نما ابھار (ورمس سپیریر) کہتے ہیں۔ اسکے ذریعے چھوٹے دماغ کے دونوں لوتھڑے باہم ملے رہتے ہیں چھوٹے دماغ کی نچلی اور پچھلی جانب ایک ایک گہرا کھندا نظر آتا ہے چنانچہ اگلے کھندانہ کو جو چار ابھار اجسام رباعیہ کر چکے سے گھیرے ہے چھوٹے دماغ کا اگلا کھندانہ (ثرم مخیخ متقدم السرور ایسری بالائی بیلائی) ابن میئر کہتے ہیں اور پچھلے کو جس میں چھوٹے دماغ کا پچھلا کھندانہ (ثرم مخیخ موخر السرور ایسری بیلائی پوسٹیریئر) کہتے ہیں اور پچھلے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کو جسمیں چھوٹے دماغ کا اگلا کھنڈانہ درمیانی پردہ (فاصل مؤخر فلکس سیریبلائی) رہتا ہے چھوٹے دماغ کا پچھلا کھنڈانہ (نرم مخیخ مؤخر النسر وراسیری بیلائی پوسٹیریٹر) کہتے ہیں جسکے بیرونی جانب سر پہلوی گڑھے کے آر پار کنارے کی کل درازی میں ایک ایک آڑا شگاف (فرجہ آفیفہ گریٹ ہاری زنٹل نشر) ہوتا ہے جس کے سبب چھوٹے دماغ کا سرا ایک نصف کرہ یا بوتھڑا بالائی زیرین دو حصوں میں منقسم ہو جاتا ہے چھوٹے دماغ کی زیرین سطح پر اس النخاع یا سر اعظم مغز کے قیام کیلئے ایک نشیب پایا جاتا ہے جس کے وسط میں بھی ایک ابھار رہتا ہے جسکو زیریں کرم نما ابھار (زائدہ دودیہ نخلی، انفیریر ورمی فارم پراسس) کہتے ہیں۔

بالائی کرم نما ابھار۔ (اصل نین لوتھڑوں سے مرکب ہے (۱) درمیانی لوتھڑا (فصل مرکزی سنٹرل لوب) جو اگلے کھنڈانہ میں رہتا ہے (۲) ابھرا ہوا لوتھڑا (فصل مرتفع۔ لوبس کلمی نس) یہ کرم نما ابھار کے وسط میں ہوتا ہے (۳) چھوٹا لوتھڑا (مجمع لبسیط۔ لوبس کے کیولی نس) جو پچھلے کھنڈانہ میں واقع ہے۔

زیریں کرم نما ابھار بھی چند اجزاء سے مرکب ہے جنکی ترتیب آگے سے پیچھے تک حسب ذیل ہے۔

(۱) ایک چھوٹا سا ابھار (مجمع قصیر۔ فلاکیولس) جو پچھلے کھنڈانہ میں واقع ہے۔ اس کے بعد (۲) ایک مکور طلی ابھار (زائدہ مخروطیہ۔ لوبس ناڈیولی) ہے اور اس سے آگے ایک اور بڑا ابھار ہے جسکو اس کو اد لمانہ یودولا کہتے ہیں (۳) زائدہ دوگول ابھاروں کے درمیان واقع ہے جنکو (۴) لعتے (لوزتین ایگڈلی) کہتے ہیں جنکے دونوں جانب ایک نشیب ہوتا ہے جس میں خاکی رنگ کی ایک گہری (ریلط مسلم فرد ڈینٹیٹ) ہوتی ہے۔ جو لعاۃ اور لوزتین کو باہم ملاتی ہے۔ زائدہ لعاۃ کے سامنے ایک اور گرہ (عقدہ ناڈیولی) ہے جو درحقیقت کرم نما ابھار کا اگلا سرا ہے جو پچھلے بطن کی چھت بناتا ہے۔ اس گرہ کے دونوں جانب سفید ریشوں کے ہلالی شکل کے طبق کو جو اجزا مذکورہ کو باہم ملاتا ہے عربی میں شقالیہ خلیفہ اور انگریزی میں پوسٹیریر میڈلری ولیم کہتے ہیں۔

چھوٹے دماغ کی بالائی سطح پر دو لوتھڑے ہوتے ہیں ایک مربع شکل کا جو اگے ہوتا ہے اور دوسرا ہلالی شکل کا جو پیچھے ہوتا ہے۔ چھوٹے دماغ کی زیرین سطح ایک دبا یا نشیب کے سبب دو جانبی لوتھڑوں میں منقسم ہے اس نشیب کو وادی (سلکس ویلی کیولی) کہتے ہیں۔ اس نشیب کے اگلے حصے میں سر اعظم مغز رہتا ہے۔ اور اس کے صحن سے زیریں کرم نما ابھار نکلتا ہے۔ زیریں سطح پر مندرجہ ذیل پانچ لوتھڑے پائے جاتے ہیں (۱) پھیپھڑے معدے کا لوتھڑا (فیسر لڑی معدی۔ نیوگیسٹرک لوب) اس مقام سے پھیپھڑے معدے کا عصب (عصب راجع ویگس نرو) نکلتا ہے۔

(۲) لوزہ (عقدہ ناڈیولی) یہ دولی کے ایک طرف واقع ہے۔ اور چوتھے بطن کی چھت بناتا ہے۔

(۳) دو بطنہ لوتھڑا (فیصس۔ ذوبطنین۔ لوبس بائی وینٹریلس) یہ لوزہ سے باہر اور زائدہ مخروطیہ سے متصل واقع ہے۔

(۴) دقیق لوتھڑا (فصس دقیق۔ لوبس ٹیوبرس) یہ دو بطنہ لوتھڑے کے پیچھے اور زائدہ مخروطیہ کے پچھلے حصے اور (مجمع قصیر سے ملا ہوا ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(۵) **پچھلا لوتھڑا** (فص خلفی اسفل۔ لوبس پوسٹریئر انفیریر) یہ چوتھے لوتھڑے کے پیچھے کی طرف واقع ہے ساخت اگر چھوٹے دماغ کے ایک پہلوی حصہ کو تراشیں تو اس میں ایک شاخدار بناوٹ مثلِ درخت کے دکھائی دیتی ہے جسکو زرگر کا درخت (شجرۃ الحیاۃ آربر وائی ٹی) کہتے ہیں اس سفید بناوٹ کے مرکز پر بغور ملاحظہ کرنے سے اس میں ایک چھوٹی خاکی رنگ کی بیضوی جگہ پائی جاتی ہے۔ جو زرد دھبردار مکیر سے محدود ہوتی ہے جسکو دندانہ دار جسم (دنٹیٹ باڈی) یا چھوٹے دماغ کی گانٹھ (عقدۃ الدماغ) کہتے ہیں۔

چھوٹے دماغ کی ٹانگیں۔ چھوٹے دماغ کی چھ ٹانگیں ہوتی ہیں۔ تین ایک طرف اور تین دوسری طرف جنکے ذریعے وہ بڑے دماغ اور حرام مغز سے ملا رہتا ہے چنانچہ (۱) بالائی ٹانگیں اساق علیا۔ سُپیریئر پیڈنکلز) جو چوتھے بطن کے پہلوؤں پر واقع ہیں بڑے دماغ کے چار ابھار (اجسام ربا عیہ) کو چھوٹے دماغ سے ملاتی ہیں (۲) درمیانی ٹانگیں (ساق متوسط۔ مڈل پیڈنکلز) جو نسبتاً موٹی اور بڑی ہیں۔ اور اوسط دماغ کے پچھلے حصے کے سکڑنے سے بنتی ہیں چھوٹے دماغ کے دونوں نصف کو باہم ملاتی ہیں۔ اور اسکے نچلے حصے کے پہلوؤں پر واقع ہیں (۳) نچلی ٹانگیں (ساق سفلی۔ انفیریئر پیڈنکلز) یہ چھوٹے دماغ کو سر حرام مغز سے ملاتی ہیں۔

چوتھا بطن (یا) بطن مؤخر

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
چوتھا بطن	بطن مؤخر۔ بطن رابع	فورتھ وینٹریکل Fourth Ventricle

چوتھا بطن چھوٹے دماغ کا بطن مشہور ہے۔ یہ حرام مغز اور اوسط دماغ (پانز) کی پچھلی سطح پر واقع ہے۔ یہ دیکھنے میں لوزناجو گوشہ جوف ہے۔ جو اوپر سے تنگ اور نیچے کشادہ ہے۔ اسکو دونوں پہلوؤں پر اوپر کی طرف چھوٹے دماغ کی بالائی ساقین۔ سر حرام مغز کے مخروطی وحبلی اجسام اور چھت میں صمام المؤخر چھوٹے دماغ کی زیریں سطح اور صحن میں سر حرام مغز اور اوسط دماغ واقع ہیں۔ اس مقام پر ایک نشیب ہوتا ہے۔ جو اوپر غائب ہو جاتا ہے مگر اس مقام پر نیچے جہاں دونوں مخروط متصل ہیں۔ قلم کتابت کی نوک کی صورت کا ایک نشیب دکھائی دیتا ہے۔ جس کو قلم کتابت (کیلمس سکرپٹوریس) کہتے ہیں۔

اوسط دماغ (یا) پُل دماغ

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
اوسط دماغ	دلیۃ البطنین	پانز ویرولائی Pons Varoli
پُل دماغ	برزخ الدماغ	پانز Pons

اوسط دماغ کو جزو متوسط بھی کہتے ہیں۔ یہ جسامۃً عموماً طور پر ایک انچ اور آڑے طور پر ڈیڑھ انچ چوڑا ہوتا ہے یہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

دماغ کے پیندے کی ہڈی عظم وتدی (سفینائڈ) کے جسم اور گدی کی ہڈی کے زائد مربع پر رہتا ہے۔ اور یہ آگے کی طرف پر حرام مغز کے اوپر پر بڑے دماغ کے دونوں ساقوں کے نیچے اور چھوٹے دماغ کے دونوں نصف حصوں کے مابین واقع ہے پس یہ حرام مغز بڑے دماغ اور چھوٹے دماغ کو باہم ملاتا ہے۔ اس کے ریشے عمودی اور آڑے دو قسم کے ہوتے ہیں آڑے ریشے چھوٹے دماغ کے دونوں حصوں کو ملاتے ہیں اسکی بالائی سطح دماغ کے چوتھے بطن کا صحن بناتی ہے۔ اسکی زیریں سطح پر ایک نالی ہوتی ہے جسمیں دماغ کے پیندے کی شریان شریان قاعدی۔ بیزیلر آرٹری) مقیم ہوتی ہے۔ اسکے دونوں سرے چوڑی کی مانند گول اور موٹے ہوتے ہیں چھوٹے دماغ کے پاؤں یا ساقین کہلاتے ہیں۔ اسکے افعال کا بیان دیکھو آگے افعال دماغ کے بعد پر ؎

راس النخاع (یا) سرحرام مغز

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
سرحرام مغز نخاع مستطیل	راس النخاع اصل النخاع	میڈولا اوبلانگیٹا میڈلا	Medulla oblongata Modalla

یہ درحقیقت حرام مغز کا سر ہے یعنی اسکا بالائی اور موٹا حصہ ہے۔ جو اوپر کی طرف اوسط دماغ پانز میں ختم ہوتا ہے گویا یہ دماغ کو حرام مغز سے ملاتا ہے۔ اسکی شکل مخروطی ہوتی ہے۔ یہ سوا انچ لمبا۔ پون انچ موٹا اور دو ڈرام (۱۲ در ہم یا ۷ ماشہ) وزنی ہوتا ہے۔ اسکی اگلی سطح گدی کی ہڈی کے زائدہ قاعدہ کی نالی (بیزیلر گروو) میں واقع ہے اور پچھلی سطح چھوٹے دماغ کے دونوں حصوں کے درمیان اس طرح واقع ہے کہ چوتھے بطن کا صحن بناتی ہے اس کی اگلی اور پچھلی سطحوں پر دو شگاف ہوتے ہیں جس سے اسکے دو پہلوی یا دائیں اور بائیں حصے ہو جاتے ہیں۔ اگلے شگاف کو جو نسبتاً گہرا ہوتا ہے شگاف وسطی مقدم (اینٹیریر میڈین فشر) اور پچھلے کو شگاف وسطی مؤخر (پوسٹیریر میڈین فشر) کہتے ہیں۔ پھر ہر ایک پہلوی حصہ اور دو لمبے شگافوں کے ذریعے چار حصوں میں منقسم ہو جاتا ہے۔ ہر ایک ایسے حصہ کو ستون یا قائم کہتے ہیں۔ اور یہ حصے آگے حرام مغز تک بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں پس حرام مغز آٹھ ستونوں سے مرکب ہے۔ چنانچہ اگلے ستونوں کو مخروط مقدم اور اس کے باہر والے جانبی کو جسم زیتونی اور پچھلے ستون کو مخروط مؤخر اور اسکے باہر والے جانبی کو جسم حبلی کہتے ہیں۔

حرام مغز کی درمیانی نالی اسکے اندر رکھتی ہے۔ بقائے حیات کیلئے سرحرام مغز ایک نہایت اہم مقام ہے کیونکہ اس میں بہت سے اہم مراکز واقع ہیں۔ اور بارہ جوڑے دماغی اعصاب میں سے آٹھ جوڑے حرام مغز میں سے نکلتے ہیں

ساخت۔ اسکی ساخت بہت پیچیدہ ہے کیونکہ اس میں بہت سے ریشے ہیں۔ جو حرام مغز سے دماغ کو جاتے اور دماغ سے حرام مغز کو جاتے ہیں اور اسکی پچھلی سطح پر حرام مغز کا چوتھا بطن ہے جسمیں خاکی مادہ پایا جاتا ہے اور یہاں سے بہت سے دماغی اعصاب نکلتے ہیں ؎

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سر حرام مغز میں جو عصبی ریشے دماغ سے حرام مغز کو جاتے ہیں۔ وہ باہم متقاطع کرتے ہیں۔ یعنی دائیں طرف کے بائیں طرف کو جاتے ہیں۔ اور بائیں طرف کے دائیں طرف کو۔

افعال۔ سر حرام مغز کے افعال دیکھو صفحہ پر۔

نخاع واغشیہ (یعنی) حرام مغز اور اس کی جھلیاں

دماغ کی طرح حرام مغز کے بھی تین غلاف یا تین جھلیاں ہوتی ہیں۔ جن میں وہ ملفوف ہے۔ انکے بھی وہی نام ہیں جو دماغ کی جھلیوں کے ہیں (۱) بیرونی اُم جافیہ (۲) درمیانی عنکبوتی اور (۳) اندرونی اُم رقیق۔ چنانچہ ذیل میں انکا مختصر بیان کیا جاتا ہے۔

(۱) بیرونی یا دبیز جھلی (اُم غلیظ۔ ڈیورا میٹر) یہ ایک مضبوط ریشہ دار جھلی ہے جو دماغ کی ہمنام جھلی یعنی اُم غلیظ کا بڑھاوا ہے اور گدی کی ہڈی کے بڑے سوراخ سے لیکر دمچی کی ہڈی تک حرام مغز کو ملفوف کرتی ہے یعنی اسکا غلاف بناتی ہے۔ یہ جھلی سوراخ مذکور کے چوگرد اور دمچی کی ہڈی کی نوک اور بریطہ کے پچھلے عام رباط سے چسپاں اور باقی مقامات میں آزاد اور علیحدہ ہوتی ہے۔

(۲) مکڑی کے جالے سی جھلی (غشاء عنکبوتی۔ ارکنائڈ میمبرین) یہ ایک نہایت پتلی اور نازک جھلی ہے جو حقیقت میں دماغ کو غشاء عنکبوتی کا بڑھاوا ہے۔ اس جھلی اور اس کے اوپر والی جھلی اُم غلیظ کے مابین کی وسعت کو جوف تحت اُم غلیظ (سب ڈیورل سپیس) کہتے ہیں۔ یہ وسعت نہایت تنگ ہوتی ہے اور بعض مقامات پر بالکل نہیں ہوتی جہاں پر یہ دونوں جھلیاں باہم چسپاں رہتی ہیں۔ لیکن غشاء عنکبوتی اور اسکے نیچے والی جھلی اُم رقیق کے مابین کی وسعت نہایت فراخ ہوتی ہے۔ اسکو جوف عنکبوتیہ (سب ارکنائڈین سپیس) کہتے ہیں جسمیں ایک قسم کی رطوبت دماغیہ و نخاعیہ یعنی بروسپائنل فلوئڈ پائی جاتی ہے اور یہ وسعت سوراخ مجنڈی کے ذریعے دماغ کے چوتھے بطن کے ساتھ ملی رہتی ہے۔

(۳) اندرونی یا رقیق جھلی (اُم رقیق۔ پایا میٹر) یہ درحقیقت عروقی جھلی ہے۔ جو حرام مغز پر بطور غلاف کے لپٹی ہوئی ہے۔ اسی جھلی کے ذریعے حرام مغز کی پرورش ہوتی ہے۔ یہ اصل میں دماغی جھلی اُم رقیق کا بڑھاوا ہے لیکن دماغ کی نسبت حرام مغز کی یہ جھلی گثیف اور دبیز ہوگئی ہے۔ اور اس میں عروق بھی نسبتاً کم ہوتے ہیں یہ جھلی حرام مغز سے خوب چسپاں ہے۔ اسکے ہر پہلو پر اٹھارہ یا بیس عدد تکونہ نکال یا بڑھاؤ پائے جاتے ہیں۔ جو اپنے چوڑے کے ذریعے حرام مغز کے پہلوؤں سے اور نوکیلے سروں کے ذریعے اُم غلیظ نخاعی کے اندرونی سطح [illegible] ہے ہیں۔ انکو دندانہ دار رباط (رباط مسنن۔ ڈینٹیٹا) کہتے ہیں حرام مغز

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کے اختتام پر یہ جھلی تنگ ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں ایک باریک لمبی ڈوری کی مانند ہو جاتی ہے جسکو آخری ڈوری (رباط انتہائی فائلم ٹرمی نیل) کہتے ہیں۔ جو گھوڑے کی دم تمام نخاع کے نچلے حصے کے اعصاب کے درمیان نیچے کی طرف جاکر عظم العجز کی نالی میں اسکے تیسرے مہرے کے بالمقابل اُم غلیظ سے ملکر بند ہو جاتی ہے۔ اور جسم کی مختلف حرکات کے وقت اسکو اپنی جگہ پر قائم رکھتی۔ اور سہارا دیتی ہے اس لیے اس کو وسطی رباط نخاع (سینٹرل لیگیمنٹ آف دی سپائنل کارڈ) بھی کہتے ہیں:۔

نخاع (یا) حرام مغز

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
حرام مغز	نخاع	سپائنل کارڈ Spinal Cord

حرام مغز "نظام دماغی ونخاعی" کا وہ حصہ ہے۔ جو کہ ریڑھ کے ستون کی نالی میں رہتا ہے۔ یہ گدی کی ہڈی کے سوراخ کے نچلے کنارے سے شروع ہو کر کمر کے دوسرے مہرے تک پہنچ کر بہت سی شاخوں میں منقسم ہو جاتا ہے جسکو گھوڑے کی دم کی مشابہت کے سبب انگریزی میں کاڈا ایکوائسٹا اور عربی میں ذنب الفرس یعنی گھوڑے کی دم کہتے ہیں۔

متوسط قد کے آدمی میں حرام مغز تقریباً ۱۸ انچ لمبا آدھ انچ چوڑا اور ڈیڑھ اونس (پونے چار تولہ) وزنی ہوتا ہے حرام مغز درحقیقت کھوپری سے نیچے کی طرف دماغ ہی کا بڑھا ہوا حصہ ہے یہ گویا عصبی مادہ کا ایک بڑا ستون ہے جسکے دونوں جانب سے بہت سے شاخیں یعنی اعصاب یا پٹھے نکلتے ہیں۔ دماغ کی طرح حرام مغز پر بھی تین غلاف یا پردے ہوتے ہیں۔ (جنکا بیان ہو چکا ہے) حرام مغز اپنی درازی میں دو مقامات پر ایک گردن میں اور دوسرے کمر میں نسبتاً موٹا ہوتا ہے کیونکہ ان مقامات پر اس سے اوپر اور نیچے کے دھڑ کے لیے بہت سے بڑے بڑے اعصاب نکلتے ہیں

حرام مغز بذریعہ دو کھڑے شگافوں کے جو اس کی اگلی اور پچھلی سطح کے وسط میں پائے جاتے ہیں دو جانبی حصوں میں منقسم ہو جاتا ہے۔ اگلی سطح کے شگاف کو اگلا درمیانی شگاف (فرجہ متوسط مقدمہ انٹیریر میڈین فشر) اور پچھلے کو پچھلا درمیانی شگاف (فرجہ متوسط مؤخرہ پوسٹیریر میڈین فشر) کہتے ہیں۔ ان دونوں شگافوں سے اگرچہ حرام مغز کے دو جانبی حصے ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ اپنی کل درازی میں مرکزی مقام پر بذریعہ ایک عصبی جوہر کے جو آٹا ہوتا ہے باہم ملا رہتا ہے اس مقام کو مجمع نخاع کہتے ہیں۔ نخاع کا اگلا درمیانی شگاف پچھلے کی نسبت چوڑا لیکن کم گہرا ہوتا ہے اور وہ بگر حصوں کی نسبت نخاع کے زیرین حصہ پر زیادہ عمیق ہوتا ہے۔ اور نخاع کی ایک تہائی مٹائی تک اسکے اندر جاکر اگلے سفید مجمع (مجمع ابیض مقدم انٹیریر وائٹ کمشر) میں ختم ہوتا ہے۔ اس میں اُم رقیق رہتا ہے جس کے ذریعے عروق نخاع کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ پچھلا درمیانی شگاف اگلے کی نسبت تنگ لیکن زیادہ عمیق ہوتا ہے۔ اور نخاع کے نصف مٹائی تک اس کے اندر جاکر پچھلے سفید مجمع (مجمع ابیض مؤخر پوسٹیریر وائٹ کمشر)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تصویر حرام مغز



اس تصویر میں اکتیس جوڑے اعصاب نخاعی کے دکھائے گئے ہیں۔

میں تمام ہوتا ہے۔ یہ شگاف نیچے کی نسبت اوپر کے حصے میں خوب نمایاں ہوتا ہے اس میں بھی سب سے الحاقی اور عروق رہتے ہیں۔ نخاع کے دونوں پہلوؤں پر نخاعی اعصاب کی دونوں جڑھوں کے مبداء کے نزدیک چھوٹے چھوٹے دو شگاف نظر آتے ہیں جن میں سے سامنے کو جہاں سے نخاعی اعصاب کی اگلی جڑیں شروع ہوتی ہیں **اگلا پہلوی شگاف** (فرجۂ جانبیہ مقدمہ۔ انٹیریر لیٹرل فشر) کہتے ہیں اور پچھلے کو جہاں سے اعصاب کی پچھلی جڑیں شروع ہوتی ہیں **پچھلا پہلوی شگاف** (فرجۂ جانبیہ مؤخرہ۔ پوسٹیریر لیٹرل فشر) کہتے ہیں۔ پس نخاع کے دونوں پہلوؤں کو یہ چاروں شگاف چار ستونوں (کالمز) میں تقسیم کر دیتے ہیں لا سامنا ستون (قائمہ مقدمہ۔ انٹیریر کالم) یہ اگلے درمیانی شگاف اور اگلے پہلوی شگاف کے مابین واقع ہے۔ یہ دراصل سر حرام مغز کے اگلے ستون یا مخروط مقدم کا بڑھاؤ ہے اس سے نخاعی اعصاب کی اگلی جڑیں نکلتی ہیں۔

۲۔ پہلوی ستون (قائمہ جانبیہ۔ لیٹرل کالم) یہ اگلے اور پچھلے پہلوی شگافوں کے مابین واقع ہے اور یہ سر حرام مغز کے جانبی ستون یا قائمہ جانبیہ کا بڑھاؤ ہے جو سب میں بڑا ہوتا ہے

پچھلا ستون (قائمہ خلفیہ۔ پوسٹیریر کالم) یہ پچھلے درمیانی شگاف اور پچھلے پہلوی شگاف کے مابین واقع ہے۔ یہ سر حرام مغز کے جسم جبلی کا بڑھاؤ ہے گردن اور پشت کے حصوں پر اس ستون پر ایک اور لمبا شگاف تمیز ہو سکتا ہے جس کے سبب یہ پچھلا ستون دو حصوں میں منقسم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے اندر والے حصے کو قائمہ خلفیہ (ٹریکٹ آف گول) اور باہر والے حصے کو قائمہ متوسطہ خلفیہ (ٹریکٹ آف برڈچ) کہتے ہیں

مرکزی نالی (مجری مرکزی سینٹرل کینال) حرام مغز کی پوری لمبائی میں ایک باریک نالی ہوتی ہے جو اوپر چوتھے بطن سے ارتباط رکھتی ہے اور نیچے آخری ڈوری یا خیط انتہائی میں تمام ہوتی ہے۔

ساخت حرام مغز۔ اگر حرام مغز کو آڑا تراش کر دیکھا جائے۔ تو اس میں دو قسم کا مادہ نظر آتا ہے۔ باہر کی طرف سفید رنگ کا مادہ و ہائٹ میٹر اور اس کے وسط میں خاکی رنگ کا مادہ (گرے میٹر) خاکی مادہ کی شکل ایسی نظر آتی ہے گویا دو سینگوں کو درمیان سے جوڑ کر رکھا ہو۔ اس سینگ نما خاکی مادہ کے اگلے سرے کو اگلا سینگ (قرن مقدم۔ اینٹیریر کارنو) اور اس کے پچھلے سرے کو پچھلا سینگ (قرن مؤخر۔ پوسٹیریر کارنو) کہتے ہیں۔ خاکی مادہ کے ان قرنوں یا سینگوں کے مذکورہ بالا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اگلے پچھلے سروں میں عصبی کیسوں کے مجموعے ہوتے ہیں۔ اور خاکی مادہ کے یہ دونوں قرن یا سینگ درمیان میں ایک ڈنڈے کی شکل کے خاکی مادہ سے باہم جڑے رہتے ہیں اس درمیانی ڈنڈے سے خاکی مادہ کے بیچ میں ایک باریک نالی ہوتی ہے جسکو مغز کی درمیانی نالی کہتے ہیں۔ اس نالی میں بھی سیری بروسپائنل فلوئڈ یعنی دماغی و نخاعی رطوبت جو درحقیقت ایک قسم کی لمف یا بلغم ہوتی ہے بھری رہتی ہے خاکی مادے کے چاروں طرف سفید مادہ ہوتا ہے دوسرے کی نسبت بیچ زیادہ موٹا ہوتا ہے۔ اگر مغز کو مختلف مقامات پر آڑا تراش کر دیکھا جائے تو خاکی اور سفید مادہ کا تناسب مختلف ہوتا ہے چنانچہ گردن کے مقام پر جہاں کہ مغز نسبتاً موٹا اور چپٹا ہوتا ہے اسمیں خاکی مادہ کا سینگ بڑا نمایاں ہوتا ہے مگر پشت میں جہاں کہ مغز نسبتاً باریک ہوتا ہے اسمیں خاکی مادہ کے یہ سینگ بھی باریک ہوتے ہیں۔ اور پھر کمر والے حصہ مغز میں یہ ذرا بڑے اور نمایاں ہوتے ہیں جیسا کہ ان تصاویر سے بخوبی ظاہر ہے۔

آڑے تراشے ہوئے حرام مغز کی تصویر

پشت کا حصہ حرام مغز

(۱) اگلا سنگاف (ب) پچھلا سنگاف (۱) سفید مادہ (۲) خاکی مادہ (۳) اگلا سینگ (۴) پچھلا سینگ (۵) حرام مغز کی درمیانی نالی۔

یہاں تک تو مراکز عصبیہ کا تشریحی بیان ہوا۔ اب پہلے اعصاب دماغی مراکز عصبیہ کے افعال و منافع کا بیان کیا جاتا ہے اسکے بعد اعصاب دماغی و اعصاب نخاعی اور اعصاب تنزی کا بیان کیا جائیگا اور پھر حواس خمسہ کا۔

اعصاب یا پٹھے

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
پٹھے	اعصاب	نروز Nerves

اعصاب کی ایک قسم کی سفید باریک یا موٹی تاریں ہیں جو دماغ یا نخاع یا عصبی عقدے سے مل کر تمام جسم میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اعصاب باریک نالیدار ریشوں سے مرکب ہیں جن میں ایک خاص قسم کا مادہ بھرا رہتا ہے یہ ریشے بال کی لٹوں کی طرح منسوج کئے جاتے ہیں یا آپس میں ملکر جال بناتے ہیں نیز دیکھو صفحہ ۱۸ جسم انسان میں سب سے بڑا عصب ورید پیڑو کا بڑا عصب (عصب در کی کمپیر) ہے جو چھنگلیا کے برابر موٹا ہے۔ اور نہایت چھوٹے چھوٹے اعصاب تو اس قدر باریک ہوتے ہیں کہ خردبین کے بغیر دکھائی نہیں دیتے۔ اور حسی اعصاب کی نہایت باریک باریک شاخیں تو تمام جلد وغیرہ میں اسقدر پھیلی ہوئی ہیں۔ کہ اگر کہیں سوئی کی نوک بھی لگ جائے تو وہ کسی نہ کسی عصبی شاخ پر لگتی ہے۔ جس سے درد محسوس ہوتا ہے۔

اعصاب کا کام عصبی تاثرات کو پہنچانا ہے۔ جس کی مندرجہ ذیل دو صورتیں ہیں:۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(۱) اعصاب کے بیرونی سروں میں یا انکے درمیانی حصوں میں جو تاثرات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ انہیں عصبی مرکز تک پہنچاتے ہیں جس سے متوسط دماغ نفس یا عقل کو انکا ادراک یا احساس ہوتا ہے۔ اسی کو قوت حس کہتے ہیں اور ان اعصاب کو جو تاثرات کو مراکز عصبیہ تک پہنچاتے ہیں۔ اعصاب حس (سنسری نروز) کہتے ہیں انہیں اعصاب کے ذریعے تمام خارجی محسوسات دماغ تک پہنچتی ہیں۔ جو اس خمسہ ظاہری یعنی دیکھنا۔ سننا۔ سونگھنا۔ چکھنا۔ چھونا کے اعصاب بھی اس قسم کے حسی اعصاب ہیں ان کا بیان اس باب کے آخر میں کیا گیا ہے۔

(۲) عصبی مرکز یعنی دماغ و نخاع وغیرہ میں جو تاثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اعصاب انہیں ان حصص تک میں پھیلاتے ہیں جہاں کہ وہ خود پھیلتے ہیں جس سے ان حصص میں حرکت واقع ہوتی ہے۔ اسی کو قوت حرکت کہتے ہیں اور ان اعصاب کو جو تاثرات کو مراکز عصبیہ سے اعضاء تک پہنچاتے ہیں۔ اعصاب حرکت (موٹر نروز) کہتے ہیں پس فعل کے لحاظ سے اعصاب دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) حسی اعصاب یا اعصاب حس جنہیں انگریزی میں سنسری نروز یا افرینٹ نروز کہتے ہیں۔ (۲) حرکتی اعصاب یا اعصاب حرکت جنہیں انگریزی میں موٹر نروز یا افرینٹ نروز کہتے ہیں اعصاب حس اسی وقت تک اپنا فعل احساس انجام دے سکتے ہیں جب تک کہ انکا تعلق عصبی مرکز سے قائم رہے لیکن اعصاب حرکت میں عصبی مرکز سے تعلق منقطع ہو جانیکے بعد بھی کچھ دیر تک قوت تحریک قائم رہتی ہے۔ چنانچہ اگر کسی عضلے کے عصب کو کاٹ کر اسکے اس سرے میں تحریک پیدا کی جائے۔ جو اس عضلے سے متصل ہے۔ تو اس عضلے میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اعصاب حس و اعصاب حرکت کے مؤثرات مختلف ہیں چنانچہ اعصاب حس طبعی طور پر بیرونی تاثرات سے متاثر ہوتے ہیں اور اعصاب حرکت قوت ارادہ یا دیگر مؤثرات سے متفعل ہوتے ہیں۔

عصبی ریشوں کے عام افعال حس و حرکت کے جس عصبی ریشے میں تحریک پیدا کیجائے وہ مسلسل اسی ریشے میں جا سکتی ہے۔ آس پاس کے دوسرے ریشوں میں نہیں جا سکتی کیونکہ ہر عصبی ریشہ نالیدار ہوتا ہے اور اسکا اندرونی مادہ (ایکسس سلنڈر) دوسرے ریشے کے اندرونی مادہ سے علیحدہ رہتا ہے۔ اور ریشوں کی بیرونی جھلی درمیان میں حائل رہتی ہے یعنیہ جس طرح سے کہ بجلی کی تار پر ربر لپیٹ دیا جاتا ہے۔ تو برقی قوت دوسری تار یا جسم میں سرایت کرنے نہیں پاتی عصبی ریشوں میں تاثرات نہایت تیزی سے سرایت کرتے ہیں چنانچہ اعصاب حس میں قوت حس ایک سو چالیس فیٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے دوڑتی ہے۔ اور اعصاب حرکت میں قوت تحریک ایک سو گیارہ فیٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے دوڑتی ہے۔ ہر قسم کے عصبی ریشے چند قسم کے تاثرات کو روانہ نہیں کرتے بلکہ صرف ایک ہی قسم کے اثر کو روانہ کرتے ہیں۔ مثلاً اعصاب حس صرف حسی تاثرات کو اور اعصاب حرکت صرف محرک اثرات یا تحریکات کو روانہ کرتے ہیں اسی طرح سے حواس خمسہ کے اعصاب مخصوصہ مثلاً عصب بصر یا عصب سمع صرف اپنے اپنے مخصوص محسوسات کو دماغ تک پہنچاتے ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تو طی حسی اعصاب اور حرکی اعصاب اپنی جڑوں کے پاس تو بیشک ممیز و ممتاز ہوتے ہیں لیکن اسکے بعد دونوں قسم کے مخلوط ہو کر اعضاء میں پھیلتے ہیں پس آنکھ۔ کان۔ ناک اور زبان کے اعصاب کے سوا باقی تقریباً تمام اعصاب دونوں قسم کے ریشوں سے مرکب ہوتے ہیں۔ اسی لیے انہیں اعصاب مرکبہ یا اعصاب ممزوجہ کہتے ہیں۔

اعصاب حس میں نقل حس۔ جن حصص جسم میں حسی اعصاب پھیلتے ہیں صرف انہیں حصص سے محسوسات کے کردہ اثر عصبی مرکز تک پہنچاتے ہیں جس سے وہ شروع ہوتے ہیں۔ یا جس میں وہ ختم ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب کوئی حسی عصب کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو اس کے سرے میں تحریک کی جاتی ہے۔ جو کہ عصبی مرکز سے متصل ہوتا ہے تو عصبی مرکز میں احساس واقع ہوتا ہے جسکے اثر سے متعلقہ عضلات میں انعکاسی تحریک (ریفلیکس ایکشن) صادر ہوتی ہے اور جب اس کٹے ہوئے عصب کے اس سرے کو چھیڑا جاتا ہے جو کہ عصبی مرکز سے جدا ہوتا ہے۔ تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا یعنی کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب کسی حسی عصب کے درمیانی حصے میں تحریک کیجاتی ہے تو اسکا اثر صرف اسی حصے میں نہیں ہوتا۔ بلکہ جن اعضاء میں اس عصب کے ریشے پھیلتے ہیں۔ ان سب میں انکا احساس ہوتا ہے جہاں وہ شاخ جاتی ہے۔ چنانچہ جب ہم کہنی کے عصب (الزرد) کو کہنی کے اندر کی طرف بازو کی ہڈی کے اندرونی ابھار کے پیچھے دباتے ہیں۔ تو چھن یا صدمہ ان مکانات میں محسوس ہوتا ہے جہاں اس عصب کے ریشے پھیلتے ہیں یعنی ہتھیلی اور پشت دست میں چھوٹی انگلی اور اسکے پاس کی انگلی کے نصف حصے میں لیکن اگر دباؤ زیادہ دیا جاتا ہے۔ تو کلائی میں بھی احساس ہوتا ہے۔ اور اگر دباؤ کا طریق اور اسکی رفتار بدل دی جائے تو کبھی چھن یا ضرر کا احساس بھی مختلف ہوتا ہے یعنی جن عصبی ریشوں پر دباؤ پڑتا ہے۔ انہیں کیطاق چھن یا درد کا احساس ہوتا ہے۔

پس یہ اسی قاعدہ کے مطابق ہے کہ جب کسی عصب کے کٹنے یا دبنے سے وہ مقامات بیحس ہو جاتے ہیں جہاں کہ وہ عصب پھیلتا ہے تو اس عصب کے اس حصے کو تحریک کرنے سے جو دماغ سے متصل ہے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا احساسات اسی حصے میں پیدا ہو رہے ہیں۔ جہاں اس عصب کی آخری شاخیں پھیلی ہیں۔ اس طرح مرض فالج کے بعض مریضوں میں کبھی ہاتھ پاؤں بالکل بیحس ہو جاتے ہیں۔ مگر اس عصب کے تنے کے صحیح حصوں کی تحریک سے جو کہ ابھی دماغ سے متصل ہے۔ یا عصبی مرکز کے ان مقامات کی تحریک سے جہاں کہ ہاتھ پاؤں کے اعصاب نکلتے ہیں ہاتھ پاؤں میں سخت درد پیدا ہوتا ہے اسی سبب کبھی درد اعصاب میں اعصاب کا کاٹنا بے فائدہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ درد کا سبب کبھی عصبی مرکز میں یا عصب کے اس حصے میں ہوتا ہے جو کٹے ہوئے مقام سے اوپر اور مرکز کے نزدیک ہوتا ہے۔ البتہ کاٹنے سے اتنا فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ اس عصب کی آخری شاخیں جس حصے میں پہنچتی ہیں۔ وہاں کے تاثرات کا احساس نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب کسی سبب سے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہاتھ یا پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو اعصاب مقطوعہ کے بقیہ حصوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کاٹے ہوئے ہاتھ یا پاؤں میں احساس ہو رہا ہے اور زخم کے مندمل ہو جانے کے بعد بھی درد اور ٹیس کا احساس ان اعضاء میں ہوتا ہے درحقیقت کاٹ ڈالے گئے ہوں مثلاً پاؤں کاٹ ڈالا ہوا ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ درد گویا پاؤں کے انگوٹھے یا تلوے میں ہو رہا ہے۔

اعصاب حواس خمسہ میں نقل حس۔ سونگھنے۔ دیکھنے۔ سننے اور چکھنے کے اعصاب میں بھی توصیل اسی طرح سے منتقل ہوتی ہے جس طرح سے کہ عام اعصاب حس میں لیکن انکے اثرات یا محسوسات میں چند خصوصیات ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہ مختلف تحریکات جو کہ ایک معمولی عصب حس میں احساس درد کا باعث ہوتی ہیں۔ اگر وہ تحریکات عصب بصر پر پیدا کی جائیں۔ تو اس میں بجائے درد کے کان بجنے لگتے ہیں یعنی ان میں آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ چنانچہ بعض دماغی امراض یا بخارات وغیرہ میں اندرونی اعصاب مذکورہ میں تحریکات ہو کر اس قسم کے احساسات پیدا ہو جاتے ہیں۔

اعصاب حرکت میں نقل حرکت۔ جس طرح سے قوت حس اعصاب حس میں منتقل ہوتی ہے اسی طرح سے قوت حرکت اعصاب حرکت میں منتقل ہوتی ہے پس اعصاب حرکت کا طریق عمل اکثر امور میں اعصاب حس کی مانند ہے مثلاً جس عصبی مرکز سے اعصاب حرکت نکلتے ہیں اس سے قوت حرکت یا محرک اثرات لچھے کے کردہ ان عضلات تک پہنچاتے ہیں جن میں وہ ختم ہوتے ہیں چنانچہ جب کسی عصب حرکت کو کاٹ دیا جاتا ہے اور اسکے اس سرے میں تحریک پیدا کی جاتی ہے جو کہ عضلات سے متصل ہے تو عضلات سکڑنے لگتے ہیں لیکن اگر اسکے اس سرے میں تحریک پیدا کی جاتی ہے جو کہ دماغ سے یا عصبی مرکز سے متصل ہے تو اسکا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اسی طرح جب کسی عصب حرکت میں تحریک پیدا کی جاتی ہے۔ تو اس مقام تحریک سے نیچے کے عصبی ریشے جن عضلات میں جاتے ہیں وہ تمام عضلات سکڑنے لگتے ہیں لیکن وہ عضلات نہیں سکڑتے جن میں اس مقام تحریک سے اوپر کے عصبی ریشے جاتے ہیں۔ علی ہذا جب ایک عصبی جال (عقدہ بلکس) میں ایک عصب حرکت کے ریشے دیگر اعصاب کے ریشوں کیساتھ ملکر ایک عصبی تنہ بناتے ہیں جو کہ اس عصبی جال سے نکلتا ہے تو قوت حرکت اس سارے عصبی تنے میں نہیں جاتی۔ بلکہ صرف انہیں ریشوں میں جاتی ہے۔ جو کہ اس عصب حرکت سے نکلے ہوئے ہیں۔ غرضیکہ جب کسی عصب حرکت کے ریشے میں تحریک پیدا کی جاتی ہے۔ تو اس سے صرف وہی ریشہ متاثر ہوتا ہے یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ سارے عصب میں سرائت کر جائے:

اعصاب حرکت دو قسم کے ہوتے ہیں ایک اعصاب محرکہ، موٹر نروز اور دوسرے اعصاب ممانعہ (ان ہیبری نروز) پھر مختلف اعضاء کو مختلف حرکات دینے کے سبب اعصاب محرکہ مندرجہ ذیل آٹھ قسم کے ہوتے ہیں:

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(۱) محرک عضلات (مسکولر موٹر) وہ اعصاب جو عضلات جسم کو حرکت کرتے ہیں ۔
(۲) محرک عروق دمویہ (واسو موٹر) وہ اعصاب جو خون کی رگوں کو حرکت کرتے ہیں ۔
(۳) محرک شعر (پائلو موٹر) وہ اعصاب جو بالوں کی جڑوں کے عضلات کو حرکت دیتے ہیں ۔
(۴) محرک قصبہ (برانکو موٹر) وہ اعصاب جو قصبہ ریہ اور اسکی شاخوں پر قابو رکھتے ہیں ۔
(۵) محرک احشاء (وسرو موٹر) وہ اعصاب جو احشاء یعنی اندرونی اعضاء پر قابو رکھتے ہیں ۔
(۶) محرک رطوبات (سیکریٹو موٹر) وہ اعصاب جو رطوبات کی تراوش پر قابو رکھتے ہیں ۔
(۷) مولد حرارت (کنٹر مجیٹنگ) وہ اعصاب جو حرارت جسم کی پیدائش وغیرہ پر قابو رکھتے ہیں ۔
(۸) محرک تغذیہ (ٹرافک) وہ اعصاب جو تغذیہ و پرورش جسم پر قابو رکھتے ہیں ۔

اعصاب حاوی (ان ہیبٹری نروز) بھی مندرجہ ذیل دو قسم کے ہوتے ہیں ۔
(۱) تمانع (انہیبیٹری) (واسو ہیبٹری) وہ اعصاب جو عروق دمویہ کی حرکات کو سست کرتے ہیں ۔
(۲) مانع احشاء (وسرو ہیبٹری) وہ اعصاب جو حرکات قلب وکش وغیرہ کو سست کرتے ہیں ۔

اقسام اعصاب ۔ جیسا کہ مذکور ہوا فعل کے لحاظ سے تو اعصاب دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) اعصاب حس (۲) اعصاب حرکت جن کا بیان ہو چکا ہے ۔ لیکن مقام خروج کے لحاظ سے اعصاب تین قسم کے ہوتے ہیں (۱) اعصاب دماغی (۲) اعصاب نخاعی (۳) اعصاب مشترکی چنانچہ ان سب کا بیان تشریح مراکز عصبیہ کے وظائف واعمال کے بعد کیا جائے گا جس کو دیکھو صفحہ ۲۷۰ تا ۲۷۵ پر ۔

مراکز عصبیہ کے وظائف

جیسا کہ مذکور ہوا مراکز عصبیہ سے مراد (۱) دماغ (۲) نخاع اور (۳) عصبی عقد ہیں ۔ جو کہ دماغ و نخاع سے تعلق رکھتی ہے یا اعصاب مشترکہ سے ملی رہتی ہیں مراکز عصبیہ کے افعال کی وسعت ان عصبی ریشوں کی تعداد پر منحصر ہوتی ہے ۔ جو مرکز اور اعضاء کے درمیان یا دیگر مراکز عصبیہ کے درمیان واسطہ اتصال و ارتباط ہوتے ہیں تمام مراکز عصبیہ میں کچھ مشترک اوصاف پائے جاتے ہیں چنانچہ تمام مراکز عصبیہ داخلی یا خارجی مؤثرات سے متاثر ہو کر عضلات میں تحریک پیدا کرتے ہیں جس کے بغیر اکثر طبعی افعال حیات انجام نہیں پا سکتے ۔ چنانچہ یہ ممکن نہیں کہ دماغ یا دیگر مراکز عصبیہ کسی داخلی یا خارجی مؤثر کے بغیر کوئی تحریک پیدا کریں بلکہ ہر تحریک سے پہلے کسی قسم کے احساس وانفعال کا ہونا لازمی ہے ۔ پھر تاثرات کے پہنچنے کے بعد مراکز عصبیہ کیا کرتے ہیں ؟ یہ انکے افعال و وظائف کے معلوم ہونے سے بخوبی واضح ہو جائیگا ۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مراکز عصبیہ کے وظائف و اعمال حسب ذیل ہیں جو ترتیب وار بیان کیے جائیں گے۔

(۱) ایصال تاثیر (کنڈکشن) (۲) تحویل تاثیر (ٹرینس فرینس) (۳) عکس تاثیر (ری فلیکشن) (۴) حرکت ذاتی یا غیر ارادی (آٹومیٹزم) (۵) ازدیاد تاثیر (اگومین ٹیشن) (۶) منع تاثیر (ان ہی بی شن) چنانچہ ذیل میں ہر ایک کا بیان کیا جاتا ہے

(۱) ایصال تاثیر (یا) کنڈکشن

تمام مراکز عصبیہ ایک اثر کو جو کسی حسی عصب کے ذریعے اُن تک پہنچتا ہے۔ دیگر عصبی مرکز تک پہنچا دیتے ہیں جس کی مثال یہ ہے کہ غذا دانتوں کے ایک خاص حصے کی انتہائی جھلی کے حسی اعصاب میں اثر کرتی ہے۔ اور وہ اثر ان اعصاب کے ذریعے اُس پاس کے اعصاب مشترکہ کے عصبی عقدہ تک پہنچتا ہے اور معمولی حالات میں ان عصبی عقد پر اس اثر کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ دانتوں کے اُس خاص حصے اور اُس کے آس پاس کے حصص کے طبقہ عضلیہ میں انعکاسی حرکت واقع ہوتی ہے لیکن اگر غذا میں کسی قسم کی تیزی ہو تو اس کا احساس بڑھ جاتا ہے جو آس پاس کے عصبی عقد کے توسط سے دُور دُور کے عصبی عقد تک پہنچتا ہے جن سے انعکاسی تحریک پیدا ہو کر دانتوں میں دُور تک شدید حرکت پیدا کرتی ہے اور کبھی۔ اثر اور اُس کا احساس حرام مغز کے حسی عقد تک اور ان سے حرام مغز تک پہنچتا ہے جس سے پیٹ کے عضلات بھی سکڑنے لگتے ہیں یہاں تک کہ کبھی اس سے مروڑ اور اینٹھن پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی یہ کیفیت مرضیہ حرام مغز کے ذریعہ دماغ تک پہنچتی ہے جس سے عقل کو ادراک ہو جاتا ہے

علیٰ ہذا اسکے برعکس کبھی نفسانی تاثرات دماغ سے حرام مغز میں اور حرام مغز سے عصبی عقد میں پہنچتے ہیں۔ جو اعضاء ہضم وغیرہ پر اثر ڈالتے ہیں اور انکی رطوبات کی مقدار و خاصیت کو بدل دیتے ہیں:

(۲) تحویل تاثیر (یا) ٹرینس فرینس

پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جب کسی حسی عصب کے ریشے میں کوئی اثر ہوتا ہے۔ تو وہ آخر تک اُسی ریشے میں جاتا ہے اور آس پاس کے دوسرے ریشوں میں منتقل نہیں ہوتا بلکہ عصبی مراکز میں جو اثرات انکے حسی ریشوں کے ذریعے آتے ہیں وہ کبھی اُن اثرات کو دیگر عصبی ریشوں میں منتقل کر دیتے ہیں۔ مثلاً کولھے کے مرض میں گھٹنے میں درد ہوتا ہے۔ پس ایک ایسے مقام میں درد کا محسوس ہونا جہاں کہ اصل مرض نہیں اسی کو تحویل تاثیر کہتے ہیں عصبی مراکز میں جو اثرات انکے حسی ریشوں کے ذریعے آتے ہیں۔ وہ جیسا کہ مذکور ہوا اُن اثرات کو دیگر عصبی ریشوں میں منتقل کر دیتے ہیں جنکی یہ دو صورتیں ہوتی ہیں کہ یہ اثرات (۱) تو حسی ریشوں میں منتقل ہوتے ہیں یا (۲) حرکتی ریشوں میں جب حسی ریشوں کی طرف اثر منتقل ہوتا ہے۔ تو اسکی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں یعنی تو اثر منتقل ہوتا ہے اور کبھی آس پاس کے اجزاء میں موثر ہوتا ہے جیسے درد گردہ کی مسیں رانوں و خصیہ تک جاتی ہیں۔ یا ایک دانت کا درد سارے دانتوں میں پھیل جاتا ہے اور کبھی وہ اثر دیگر عصبی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زیادہ منتشر ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کبھی سارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔ جیسے کسی مہیب صورت کے دیکھنے سے یا کسی خوفناک آواز کے سننے سے سارے جسم میں لرزہ محسوس ہوتا ہے اور (۲) کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حسی اعصاب کے ذریعے ایک مقام سے کوئی اثر مرکز تک پہنچتا ہے۔ پھر وہ اثر دوسرے مقام میں جا پہنچتا ہے جو اس پاس کے اجزاء میں پھیلتا نہیں۔ بلکہ صرف اسکا مقام بدل جاتا ہے یا پہلا مقام بھی قائم رہتا ہے اور دوسرا بھی مثلاً گردے کے مرض گھٹنا بھی درد کرنے لگتا ہے کیونکہ گردے کے جوڑ کے اعصاب میں جو درد ہوتا ہے وہ حسی اعصاب کے ذریعے مرا مغز تک پہنچتا ہے پھر حرام مغز سے یہ درد ان مرکزی رشتوں میں پھیل جاتا ہے جو گھٹنے کے اردگرد پھیلتے ہیں وہاں سے حسی اعصاب کے ذریعے وہ دماغ تک پہنچتا ہے اور دماغ کے وسط سے نفس یا عقل کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ درد اور مرض گھٹنے میں ہے۔ اور کبھی اصل مقام مرض سے بھی درد کا اثر دماغ تک پہنچتا ہے جس سے دونوں مقامات میں ایک ساتھ درد معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہرا کی نالی کے بعض حصوں میں تحریک پیدا کی جاتی ہے تو حسی اعصاب کے ذریعے اس کا اثر اس النخاع میں جاتا ہے وہاں سے وہ اثر اعصاب حنجرہ میں منتقل ہو جاتا ہے اور حنجرہ میں گدگداہٹ ہوتی ہے تو جسکا شعور دماغ کو ہوتا ہے۔ تب کھانسی آتی ہے اسی طرح سے جب سورج وغیرہ کی تیز روشنی آنکھوں میں پہنچتی ہے۔ تو اس سے کبھی ناک میں گدگدی محسوس ہو کر آخر کار چھینک آجاتی ہے۔

(۳) عکس تاثیر یا ری فلیک شن

یہ بتایا جا چکا ہے کہ جو اثرات حسی اعصاب کے ذریعے مرکز عصبیہ تک پہنچتے ہیں وہ ان مراکز سے دیگر اعصاب حس کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبھی وہ اثرات ان مراکز عصبیہ سے اعصاب حرکت کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ تمام مراکز عصبیہ میں یہ فعل عام ہے اور اس سے جو حرکات عضلات وغیرہ میں پیدا ہوتی ہیں انکو حرکاتِ منعکسہ ری فلیکشن ایکشنز کہتے ہیں۔ کیونکہ پہلے اثر حسی اعصاب سے مرکز عصبی میں پہنچتے ہے پھر وہاں سے حرکی اعصاب میں منعکس ہوتا یا لوٹ جاتا ہے۔ حرکتِ منعکس وہ حرکت ہے جو کسی تاثر یا تحریک کے نتیجہ میں فوراً سرزد ہوتی ہے۔ گویا حرکت منعکس کسی تحریک کا فوری جواب ہے چنانچہ اگر ہرا کی نالی میں ذرا سا روٹی کا ٹکڑا یا پاول کا دانہ یا ذرا سا پانی چلا جائے تو فوراً اچھو آنے لگتا ہے یا آنکھوں کے سامنے اچانک کوئی چیز آجائے۔ تو آنکھیں فوراً بند ہو جاتی ہیں وغیرہ یہی حرکاتِ منعکسہ ہیں اور تقریباً تمام جسمانی حرکات درحقیقت حرکات منعکسہ ہیں۔ حرکاتِ منعکسہ کے انجام پانے کیلئے چار چیزوں کا ہونا لازمی ہے (۱) کوئی حسی عصب موجود ہو جو اپنے محسوس یا اثر کو عصبی مرکز تک پہنچائے (۲) ایک عصبی مرکز ہو جو اس اثر کو قبول کرے اور پھر اس اثر کو اعصاب حرکت کی طرف منتقل کرے (۳) کوئی عصب حرکت ہو جسکے ذریعے وہ اثر عصبی مرکز سے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

منتقل ہو کر (۴) اس عضلہ یا عضو متحرک تک پہنچے جس کی حرکت سے وہ فعل انجام پاتا ہے پس اگر ان چار چیزوں میں سے ایک بھی ناقص یا زائل ہو تو پھر حرکت منعکسہ انجام نہیں پا سکتی ؛

نوٹ :۔ مذکورہ بالا اجزاء چہارگانہ کو بحیثیت مجموعی قوس منعکس وری فلیکس آرک کہتے ہیں ؛

حرکات منعکسہ اگرچہ فی نفسہ طبعی ہوتی ہیں بلا ارادہ سرزد ہوتی ہیں مگر اکثر حرکات منعکسہ میں ارادہ کو بھی کچھ دخل و تصرف ہوتا ہے جس سبب سے ہم ان حرکات کی نوعیت بدل سکتے ہیں ان پر قابو پا سکتے ہیں اور انہیں روک سکتے ہیں مثلاً ایک سوتے ہوئے شخص کے تلوے کو سہلایا جائے تو وہ اپنے پاؤں کو کھینچ لیتا ہے لیکن اگر کسی جاگتے ہوئے شخص کے پاؤں کو گدگدایا جائے تو وہ اپنے ارادہ سے اپنے پاؤں کو اسی جگہ قائم رکھ سکتا ہے ۔

حرکات منعکسہ کی غرض و غایت بحالت صحت صاف ظاہر ہے کہ ان میں بدنی فوائد ہیں چنانچہ طبعی حرکات منعکسہ مثلاً حرکت قلب سے جسم میں دوران خون ہوتا ہے حرکت تنفس سے خون صاف ہوتا ہے حرکت معدہ و امعاء سے غذا ہضم ہوتی ہے وغیرہ لیکن بحالت مرض اکثر یہ حرکات بیفائدہ و بے فائدہ ہوتی ہیں جیسا کہ مرض صرع یا مرض کزاز وغیرہ میں تشنجی حرکات ہوتی ہیں ؛

(۴) ذاتی حرکت دیا، آٹو میٹزم

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عصبی مراکز میں بغیر کسی قسم کی تحریک کے ذاتی طور پر عصبی تاثرات و تحریکات کو پیدا کرنے اور انہیں منتقل و منعکس کرنیکا خاصہ بھی ہے پس بقول انکے ذاتی حرکت ایک قسم کی غیر ارادی حرکت ہے ۔ جو کسی عصبی مرکز میں بغیر کسی قسم کی تحریک کے خود بخود پیدا ہوتی اور جاری رہتی ہے جیسے حرکت قلب و حرکت تنفس وغیرہ لیکن اسکی صحیح مثالیں بخار و دماغ یعنی چھوٹے دماغ کے افعال میں بیان ہونگی ؛

نوٹ :۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ تمام جسمانی حرکات درحقیقت حرکات منعکسہ ہیں اور طبعی حرکات منعکسہ مثلاً حرکت قلب و حرکت تنفس وغیرہ اگرچہ بالارادہ واقع ہوتی ہے لیکن کوئی نہ کوئی اندرونی تاثر یا تحریک انکی ابتداء کا موجد ہوتی ہے اور اس قسم کی اکثر جسمانی حرکات ابتداء میں تو قوت ارادی سے شروع ہوتی ہے لیکن بعد کو بلا ارادہ خود بخود ہوتی رہتی ہیں جیسا کہ آگے چل کر اعضاء کے افعال میں بیان ہوگا ؛

(۵) ازدیاد تاثیر دیا، آگمینٹیشن
(۶) امتناع تاثیر دیا، ان ہی بی شن

عصبی کیسے یا ذرات (نرو سیلز) عصبی تحریکات کو صرف قبول و منعکس ہی نہیں کرتے تیز بعض صورتوں میں وہ عصبی تحریکات کو صرف پیدا ہی نہیں کرتے بلکہ ان میں عصبی تحریکات کے ازدیاد اور انکے امتناع کی قابلیت بھی ہے چنانچہ اعصاب حرکت کے اقسام میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ اعصاب محرک عروق (واسوموٹر عروق) وہ یہ ہیں تعلیق یا تمدد

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

پیدا کرتے ہیں اور اعصاب مما نع عرق دموی (راسوان ٹیشو) انکے برخلاف عمل کرتے ہیں۔ یہاں تک تو عصبی مراکز کی خصوصیات اور انکے عام مشترک وظائف کا بیان ہوا اب ہر ایک عصبی مرکز کے وظائف علیحدہ علیحدہ بیان کیا جاتا ہے

(۱) حرام مغز کے افعال و وظائف

(اسکی تشریح دیکھو صفحہ ۲۴۳ پر) عصبی مراکز کے جو مذکورہ بالا مشترک وظائف ہیں۔ وہی حرام مغز کے خاص وظائف ہیں یعنی عصبی مراکز کی مذکورہ بالا تمام خصوصیات حرام مغز میں پائی جاتی ہیں یعنی یہ بھی (۱) ایصال تاثیر (۲) تحویل تاثیر اور (۳) عکس تاثیر کے وظائف انجام دیتا ہے۔ چنانچہ :-

(۱) ایصال تاثیر (کنڈکشن) ایصال تاثیر سے یہ مراد ہے کہ حرام مغز اپنے حسی اعصاب کے ذریعے بیرونی تاثرات کو دماغ تک پہنچاتا ہے اور اپنے حرکتی اعصاب کے ذریعے دماغ سے محرک اثرات لے کر انہیں عضلات تک پہنچاتا ہے گویا یہ عصبی تاثرات و تحریکات کی گذرگاہ ہے یعنی اسکے ذریعے بیرونی تاثرات دماغ تک جاتے ہیں۔ اور دماغ سے محرک اثرات عضلات تک آتے ہیں لیکن اس مقصد کیلئے حرام مغز کا صحیح و تندرست ہونا لازمی ہے ورنہ اگر اسکا کوئی حصہ آپریشن جائے یا کسی سبب سے خراب ہو جائے تو اس کے خراب یا خراب شدہ حصے کے نیچے کے سارے اعصاب بیکار ہو جاتے ہیں۔ اور دماغ سے انکا کوئی تعلق نہیں رہتا اسلیے وہ تمام عضلات یا اعضاء جن میں یہ اعصاب جاتے ہیں وہ سب بیکار ہو جاتے ہیں یعنی انکی حس و حرکت زائل ہو جاتی ہے چنانچہ حرام مغز کے ماؤف ہو جانے سے استرخاء جسم اسفل (پیرالیجیا) ہو جاتا ہے اور یہ مذکورہ بالا حالت کی ایک بہترین مثال ہے۔

ایصال تاثیر کے مختلف طریق: یہ بھی یاد رہے کہ حس و حرکت کے لے جانے کے کیلئے حرام مغز کے تمام حصص یکساں قابل و مستعد نہیں ہوتے بلکہ جس طرح حس و حرکت کیلئے اعصاب جدا جدا ہیں اسی طرح حس و حرکت پہنچانے کیلئے حرام مغز کے حصے الگ الگ ہیں یعنی اس میں ایصال تاثیر کے مختلف طریق ہیں چنانچہ حسی تاثرات اسکے خاکی مرکزی جوہر (گرے میٹر) کے ذریعے جاتے ہیں۔ اور محرک اثرات سفید ریشوں کے ذریعے ۔

نوٹ :- یہ یاد رہے کہ خود خاکی مرکزی جوہر میں قوت حس نہیں ہوتی کیونکہ حسی اعصاب میں جس قسم کے اختتامی سرے ہوتے ہیں وہ اس میں نہیں ہوتے۔ لیکن حسی تاثرات اسی میں تقاطع کر کے اوپر کو جاتے ہیں۔

حسی تاثیوات (سنسیری امپریشنز) حرام مغز میں پچھلی عصبی جڑوں کے ذریعے داخل ہوتے ہیں اور حس طرف سے داخل ہوتے ہیں اسی طرف سے دماغ تک نہیں جاتے بلکہ اس کے مخالف جانب پہنچکر اسی مخالف جانب سے دماغ تک جاتے ہیں یعنی حرام مغز میں دائیں طرف کے حسی اثرات بائیں طرف اور بائیں طرف سے دائیں طرف پہنچکر پھر اوپر کو دماغ کی طرف جاتے ہیں۔ اور پھر وہ بھی حسی اثرات کی نوعیت کے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

بموجب دو قسم طریق سے اُوپر دماغ کی طرف جاتے ہیں۔ چنانچہ:

(۱) احساس الم۔ حرام مغز کے جانبی ستون کے ایک حصے کے ذریعے اُوپر کو جاتا ہے

(۲) احساس لمس پچھلے وسطی ستون میں پہنچکر اور تقاطع کرکے دوسری جانب جاکر اُوپر کو جاتا ہے۔

(۳) احساس عضلات۔ جس طرف داخل ہوتا ہے غالباً اسی طرف سے اُوپر کو جاتا ہے یہ تقاطع نہیں کرتا۔

(۴) احساس حرارت۔ جانبی ستون میں غالباً احساس الم کے قریب سے اُوپر کو جاتا ہے۔

پس مختلف نوعیت کی محسوسات کیلئے حرام مغز میں مختلف قسم کے ریشے پائے جاتے ہیں جو خاکی مادہ میں تقاطع کرنے کے بعد دماغ تک پہنچتے ہیں۔

تحریک اثرات (موٹر امپلسز) محرک اثرات دماغ سے بذریعہ اگلے اور جانبی ستون کے نیچے کی طرف آتے ہیں۔ کیونکہ ان کے قطع کرنے سے ارادی تحریک بند ہو جاتی ہے۔

جسّی تاثرات کے ریشوں میں جیسا کہ مذکور ہوا حرام مغز کے اندر ہی تقاطع واقع ہوتا ہے لیکن محرک اثرات کے ریشوں میں تقاطع حرام مغز کے اندر نہیں ہوتا۔ بلکہ سر حرام مغز کے اگلے حصے کے اندر خاص کراس کے اگلے دونوں مخروط میں ہوتا ہے جو بڑھ کر حرام مغز کے پہلوی ستون سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ دماغ سے محرک اثر پہلے سر حرام مغز کے دونوں مخروط میں پہنچتا ہے وہاں پر تقاطع کرکے حرام مغز کے دونوں جانبی ستونوں اور قریب کے خاکی مادے میں۔ پھر حرام مغز کے اگلے ستونوں اور قریب کے خاکی مادے میں جاتا ہے پس اسلئے جب اگلے دونوں مخروط مقام تقاطع کے پاس کاٹے جاتے ہیں تو اس سے نیچے کے تمام اعضاء کی حرکت بند ہو جاتی ہے اور جب اس مقام سے اُوپر کا کوئی حصہ کاٹا جاتا ہے تو اسی جانب کے اعضاء کی حرکت بند ہو جاتی ہے۔

اگر حرام مغز کو لمبائی میں درمیان سے کاٹ دیا جائے تو جس طرف کا نصف حرام مغز کاٹا جاتا ہے اس طرف کے عضلات کی حرکت اور اس کے مخالف جانب کی جلد کی حسّ زائل ہو جاتی ہے۔

تحویل تاثیر (ٹرینس فرینس) تحویل تاثیر سے مراد ہے۔ کہ حرام مغز ایک مقام کے حسّی تاثرات کو دوسرے مقام میں منتقل کر دیتا ہے جس کی مثالیں صفحہ ۲۴۳ پر بیان کی جا چکی ہیں اور یہ امر کہ تحویل تاثیر حرام مغز میں واقع نہیں ہوتی۔ ان مثالوں سے بخوبی ثابت کیا جا چکا ہے کہ کولہے کے مرض میں گھٹنے کے اندر درد معلوم ہوتا ہے کولہے میں نہیں ہوتا سنگ مثانہ میں درد مجری بول یا حشفہ میں معلوم ہوتا ہے۔ مثانہ میں معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر پہلی اور دوسری دونوں تاثیریں دماغ میں پیدا ہوتیں۔ تو پھر دونوں مقامات میں یکساں درد محسوس ہوتا ہے۔

عکس تاثیر (ری فلیکشن باری فلیکس ایکشن) عکس تاثیر سے یہ مراد ہے کہ حرام مغز حسّی تاثرات

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کو حرکتی پٹھوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے جس سے عضلات سکڑنے لگتے ہیں عکس تاثیر کا مختصر بیان صفحہ ۲۴۰ پر بھی کیا جا چکا ہے یہاں دماغ کے متعلق اب یہ بتانا ہے کہ اسکا تعلق دیگر مراکز عصبیہ سے مختلف نہیں۔ جیسا کہ مذکور ہوا حرکات منعکسہ فی نفسہ طبعی یعنی غیر ارادی وغیرہ اختیاری ہوتی ہیں مگر بعض حرکات منعکسہ میں ارادہ و اختیار کو بھی کچھ دخل و تصرف ہوتا ہے چنانچہ ذیل کے تجربات و امثلہ سے یہ بخوبی معلوم ہو جائیگا۔

(۱) اگر ایک مینڈک کو لے کر اس کے دماغ کو کاٹ دیا جائے۔ تو اسکے تمام دماغی افعال بند ہو جاتے ہیں یعنی وہ اپنے ارادہ یا مرضی سے کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ لیکن اس سے حرکات منعکسہ (ری فلیکس ایکشنز) جو کہ حرام مغز کے متعلق ہوتی ہے انجام پا سکتی ہیں۔ چنانچہ جب اسکا سر کاٹ دیا جاتا ہے تو پہلے وہ کچھ عرصہ بالکل بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے [illegible] چھیڑنے سے بالکل حرکت نہیں کرتا گویا بالکل مردہ ہو جاتا ہے لیکن کچھ عرصہ بعد وہ اپنی تقریباً [illegible] سمت اختیار کر لیتا ہے اور وضع بدلنے پر پھر طبعی وضع اختیار کر لیتا ہے اور اگر اسے پانی میں ڈالدیں تو وہ تیرنے لگتا ہے اگر اسے ایک ڈھلوان تختی پر رکھ دیا جائے تو وہ اوپر کو چڑھنے لگتا ہے۔ اگر اسکے پاؤں یا ٹانگ کو چھیڑا جائے تو وہ اسے سکیڑ لیتا ہے اور اگر الٹا لیٹے کے بل لٹا کر اور جاذب کاغذ یا بلاٹنگ پیپر کا ذرا سا ٹکڑا سر کہ یا کسی اور ترشی میں تر کر کے اسکے پیٹ یا پیٹھ یا جلد پر لگایا جائے تو وہ اس اثر کو دور کرنے کے لیے پاؤں ہلانے لگتا یا لاتیں مارنے لگتا ہے ان باتوں کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ دماغ کے الگ ہونے پر بھی شاید اس مینڈک میں شعور اور ارادہ کی قوت باقی رہتی ہے تو اپنا کام کرتی رہتی ہے لیکن درحقیقت ایسا نہیں ہوتا یہ حرکات منعکسہ صرف اسکے حرام مغز سے انجام پاتی ہیں۔

(۲) اگر کسی شخص کا حرام مغز پشت کے درمیان آڑے طور پر پورا کاٹ دیا جائے یا وہ اس طرح سے زخمی یا ماؤف ہو جائے جس سے دماغ کا تعلق اس سے نچلے اعضاء کیساتھ قائم نہ رہے۔ تو بالعموم یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کٹے ہوئے یا ماؤف مقام کے نیچے کے اعضاء کے چھیڑنے سے تشنجی حرکات پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ اگر ایسے شخص کے تلوے کو گدگدایا جائے۔ تو وہ اپنے پاؤں کو سکیڑ لیتا ہے حالانکہ اسے اس حرکت کا بالکل علم نہیں ہوتا پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عکس تاثیر کی قوت حرام مغز میں دماغ سے علیحدہ ہونے پر بھی قائم رہتی ہے اور یہ کہ اس کا تعلق عقل و شعور اور ارادہ سے نہیں ہوتا۔

(۳) امتناعِ حرکتِ منعکسہ یعنی حرکت منعکسہ کو روکنا۔ اگر کسی سوتے ہوئے آدمی کے پاؤں کو گدگدایا جائے تو سوتے ہوئے ہی اپنے پاؤں کو سکیڑ لیتا ہے اور اگر جاگتے ہوئے اسکے پاؤں کو گدگدایا جائے تب بھی وہ اسے سکیڑ لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ نہ سکیڑنا چاہے تو وہ نہیں بھی سکیڑتا کیونکہ جاگنے کی حالت میں اسکی قوتِ ارادی بھی اپنا کام کرتی ہے یعنی اس حالت

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

میں عقل اُس گدگدی اہٹ سے باخبر ہوتی ہے۔ اور عضلات کے فعل کو فوراً روک لیتی ہے اسی طرح سے جب ایک سوتے ہوئے بچے کی ہتھیلی کو سہلاتے ہیں تو بچہ اپنی انگلیوں کو سکیڑ لیتا ہے لیکن جب وہ جاگتا رہتا ہے تو اسی طرح ہتھیلی کو چھونے سے وہ اپنی انگلیوں کو نہیں سکیڑتا کیونکہ اسوقت اُسکی عقل اس حقیقت سے واقف ہوتی ہے کہ عضلات کی یہ حرکت اسکے ارادہ سے رک جاتی ہے اسی طرح سے اور بہت سی حرکات منعکسہ ہیں جن پر قوت ارادی کی کم و بیش اختیار و اقتدار حاصل ہے یا جو ارادہ سے بالکل روک دی جاتی ہیں پس حرام مغز یا دیگر مراکز عصبیہ کی حرکات منعکسہ کو دماغ روک سکتا ہے چنانچہ (۱) درد میں گریہ و زاری کی حرکت منعکسہ دانتوں کو باہم زور سے دبانے یا کسی چیز کو زور سے پکڑے رکھنے سے اکثر رک جاتی ہے (۲) چھینک بھی قوت ارادی سے روکی جا سکتی ہے (۳) اگر پاؤں کے تلوے کو گدگدایا جائے تو بجائے پاؤں کے سکیڑ لینے کے مضبوط ارادہ سے اسے اسی طرح قائم رکھا جا سکتا ہے (۴) جب سر پر اچانک چوٹ لگنے کا احتمال ہوتا ہے یا آنکھوں میں کسی چیز کے پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو آنکھیں فوراً بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایسی صورت میں وہ قوت ارادی سے کھلی بھی رکھی جا سکتی ہے (۵) اگر اتفاقاً کسی کا ہاتھ آگ پر پڑ جائے تو طبعی حرکت منعکسہ اُسے فوراً ہٹا لیتی ہے۔ لیکن یہ مشہور ہے کہ ایک شخص مسمی کریمر نے اپنے ہاتھ کو شعلہ آتش پر رکھ کر جلا دیا تھا۔

مذکورہ بالا بیان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ حرکات منعکسہ جو کہ حرام مغز کے ذریعے صادر ہوتی ہیں بالکل ذاتی طور پر دماغ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بلکہ کبھی دماغ کے حرام مغز سے جدا ہونے پر بھی مکمل طور پر حرام مغز سے ہی ظاہر ہوتی ہیں۔ لیکن باوجود اسکے پھر بھی ان تمام حرکات منعکسہ پر سوائے شاذ و نادر صورتوں کے بتوسط دماغ قوت ارادی کا کچھ اختیار و اقتدار رہتا ہے۔ اور چونکہ حرام مغز کی حرکات منعکسہ بلا شعور و ارادہ جاری رہتی ہیں بغیر ارادہ کا بھی اس میں [illegible] دخل و تصرف ہوتا ہے اسلئے بدنی اغراض و مقاصد کے لحاظ سے یہ حرکات منعکسہ بہت مناسب ہوتی ہیں جسکی بہترین مثال حرکات تنفس ہیں جو عام خواب میں جبکہ انسان بہرہ [illegible] یعنی عقل و [illegible] برے مشاغل میں جبکہ خیال اور طرف ہوتا ہے۔ یعنی عقل دیگر [illegible] سے حرکات تنفس برابر جاری رہتی ہیں۔ لیکن جب ضرورت پڑتی ہے۔ مثلاً انسان بولنا [illegible] یا اخراج بول و براز کے لیئے نفس سے امداد لینا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں وہ حرکات [illegible] بھی پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ گانے اور کوٹھے میں رہ تھوڑی دیر [illegible] لیتا ہے وغیرہ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ طبعی حرکات منعکسہ و تنفس ورزش [illegible] حرکات تنفس وغیرہ چونکہ ذاتی طور پر انکا دماغ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اسلیے ان [illegible] سے تکان بھی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ تکان وغیرہ کا احساس تو صرف دماغ میں ہوتا ہے ۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

بعض لوگ حرام مغز کی حرکاتِ منعکسہ میں ایسی تمام حرکات کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جو کہ بلا شعور وفروع پذیر ہوتی ہیں۔ مثلاً چلنا پھرنا۔ دوڑنا۔ لکھنا اور اسی طرح کی دیگر حرکات۔ کیونکہ یہ درحقیقت غیر ارادی حرکات ہوتی ہیں۔ اسمیں شک نہیں کہ یہ حرکات شروع میں ارادی ہوتی ہیں لیکن بعد کو دماغی مزاولت سے جب انمیں کمال پیدا ہوجاتا ہے۔ تو پھر ارادہ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ بلا شعور بھی اس قسم کی حرکات واقع ہوتی ہیں لیکن ارادہ کی حکومت ان پر ہمیشہ رہتی ہے اسلئے اس بات کا مشکل سے یقین ہوتا ہے کہ یہ حرکاتِ فی نفسہٖ غیر ارادی ہیں۔ کیونکہ ارادہ سے یہ حرکات شروع ہوتی ہیں۔ ارادہ سے ان میں سستی یا چستی پیدا کی جاتی ہے یا انہیں روک دیا جاتا ہے لیکن انکے فی نفسہٖ غیر اختیاری ہونے پر یہ دلیل ہے۔ کہ یہ حرکات اسوقت بھی جاری رہتی ہیں۔ جبکہ عقل پورے طور پر دیگر مشاغل میں منہمک ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ سچ ہے کہ بعض لوگ نیند میں چل کر کہیں سے کہیں جا پہنچتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ امر بھی مسلمہ ہے کہ جب کوئی شخص قوت ارادی سے ان حرکات کو توجہ اور احتیاط سے انجام دیتا ہے۔ تو وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے یعنی وہ ارادہ کو ہر ہر قدم پر مسلط کر دیتا ہے۔ تو پھر اس کی پہلی سی چال نہیں رہتی۔ اور نہ ہر ہر قدم میں پہلا سا تناسب رہتا ہے۔ بلکہ وہ تصنع اور تکلف کی چال کہلاتی ہے۔ کیونکہ چال میں جو چلنے بے تکلف اور بیخود انہ انداز تھا وہ جاتا رہتا ہے۔

مرضی حرکاتِ منعکسہ۔ بالعموم تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ کہ اگر تاثیر یا تحریک خفیف ہو تو حرکتِ منعکسہ بھی خفیف ہوتی ہے۔ اور اگر تحریک شدید یا قوی ہو تو حرکتِ منعکسہ بھی شدید ہوتی ہے لیکن مرض کی حالت میں حرام مغز کی حرکات منعکسہ نہایت شدید تاثیر ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ کسی حسی عصب سے تاثر سے بھی بڑی وسیع حرکات منعکسہ پیدا ہوتی ہیں۔ جیسا کہ مرض کزاز (ٹیٹنس) میں جلد کو ذرا چھو جانے سے بھی سارے بدن کے عضلات میں تشنج ہونے لگتا ہے اسی طرح مرض تصلب تخاع جانبی (لیٹرل سکلیروسس) جس میں کہ حرام مغز کا فعل بھی صحیح نہیں رہتا اور نہ جلد کے ذرا چھو جانے سے یا بستر کی خفیف حرکت سے وہ ایسی تشنجی حرکات پیدا نہ کرتا۔

اقسام حرکات منعکسہ

انسان میں جو حرکات منعکسہ پائی جاتی ہیں۔ وہ عصبی امراض کی تشخیص میں نہایت ضروری ہیں حرام مغز کے بعض امراض میں اسکی بعض خاص خاص حرکات منعکسہ ناقص یا باطل ہو جاتی ہیں۔ حرکات منعکسہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ (۱) سطحی حرکاتِ منعکسہ یا جلدی حرکاتِ منعکسہ جو کہ جلد میں تحریک کرنے سے پیدا ہوتی ہیں (۲) عمیق حرکاتِ منعکسہ یا وتری حرکات منعکسہ جو کہ عضلاتی نسوں میں تحریک کرنے سے پیدا ہوتی ہیں

(۱) جلدی حرکاتِ منعکسہ۔ جلد میں خفیف سی تحریک کرنے یا اُس کو چھونے سے اس قسم کی حرکات منعکسہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان سے بالعموم اس مقام کی جلد کے نیچے کے عضلات متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن اس مقام

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سے دور کے عضلات بھی متاثر ہو جاتے ہیں چنانچہ گھٹنے کے قریب سوئی چبھونے سے ٹانگ تو دُور بلا اختیار حرکت منعکسہ سے اوپر پیٹ کی طرف سکڑ جاتی ہے ان حرکات منعکسہ میں سے مندرجہ ذیل حرکات نہایت ضروری ہیں

(۱) تلوے کی حرکت منعکسہ (پلانٹری فلیکسن) جب تلوے کو گدگدایا جاتا ہے تو پاؤں اوپر کو سکڑ جاتا ہے (۲) چوتڑ کی حرکت منعکسہ (گلوٹیل ری فلیکس) جب چوتڑ کی جلد میں تحریک کیجاتی ہے تو چوتڑ کے عضلات سکڑتے ہیں (۳) خصیہ کی حرکت منعکسہ (کری میٹرک ری فلیکس) جب ران کے اندر کی طرف جلد میں خراش یا تحریک کی جاتی ہے تو خصیے حرکت کرتے ہیں (۴) پیٹ کی حرکت منعکسہ جب پیٹ کے پہلو یعنی تہیگاہ یا کوکھ کو زور سے چھیڑا جاتا ہے یعنی اس میں انگلی یا کوئی اور چیز ماری جاتی ہے تو دیوار شکم کے عضلات سکڑ جاتے ہیں اور اس حرکت کے بالائی حصہ سے فم معدہ کے مقام عضلات سکڑ جاتے ہیں (۵) اسی قسم کی حرکات منعکسہ عضلات لبشت وغیرہ میں بھی پیدا کی جا سکتی ہے (۶) دماغی اعصاب کے مقام میں جو نہایت ضروری حرکات منعکسہ ہیں وہ آنکھ کی حرکات منعکسہ ہیں چنانچہ الف ملتحمہ کی حرکت منعکسہ جب آنکھ کے ڈھیلے کو سامنے سے چھوا جاتا ہے تو آنکھ کے پپوٹے بند ہونے لگتے ہیں اور جب روشنی کی طرف دیکھا جاتا ہے تو آنکھ کی پتلی سکڑ جاتی ہے اور جب گردن کی جلد پر تحریک پیدا کی جاتی ہے تو پتلی پھیل جاتی ہے۔

(۲) وتری حرکات منعکسہ۔ جب عضلات تھوڑے سے تنے ہوئے ہوں۔ تو انکی نسوں پر ہلکی سی چوٹ لگانے سے وہ عضلات زور سے سکڑتے ہیں۔ وتری حرکات منعکسہ جو بالعموم امتحان کیجاتی ہیں۔ تین ہیں (۱) گھٹنے کا جھٹکا (۲) ٹخنے کا جھٹکا (۳) ٹخنے کی اینٹھن۔

(۱) گھٹنے کا جھٹکا (انی جرک) جب ایک گھٹنے کو دوسرے گھٹنے پر رکھا جاتا ہے۔ تو ران کا سامنا چار سر عضلہ (رباعیۃ الرؤس۔ کواڈری سیپس) کسی قدر تن جاتا ہے ایسی صورت میں چینی کی نس پر ہلکی سی چوٹ لگانے سے پاؤں میں آگے کی طرف حرکت ہوتی ہے۔ جیسا کہ اگلے صفحہ کی پہلی تصویر میں خطوط تقاطعی میں ظاہر کیا گیا ہے۔ بحالت صحت یہ علامت موجود ہوتی ہے۔

(۲) [illegible] کا جھٹکا (انکل جرک) یہ نہایت ضروری ہے کیونکہ ایسے امراض میں جیسا کہ مرض سُرَال النخاع (لوکو موٹر اٹیکسی) جسمیں کہ وتری حرکات منعکسہ باطل ہو جاتی ہیں ٹخنے کا جھٹکا بالعموم گھٹنے کے جھٹکے سے پہلے ہی جاتا رہتا ہے۔ اور یہ اس طرح سے پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک گدی والی کرسی پر مریض اپنا ایک گھٹنہ ٹیک دے اور کرسی کے سہارے دوسری ٹانگ پر کھڑا ہو جائے تو گھٹنہ ٹیکی ہوئی ٹانگ کی پنڈلی کے عضلات کسی قدر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں پس ایڑی کی نس پر ذرا چوٹ لگانے سے ٹخنے میں جھٹکا پیدا ہوتا ہے۔

(۳) ٹخنے کی اینٹھن (انکل کلونس) یہ اس طرح پیدا کی جاتی ہے جیسا کہ اگلے صفحہ پر تصویر میں دکھایا گیا ہے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ٹخنے کی اینٹھن امتحان کرنے کی تصویر

ٹخنے کا جھٹکا امتحان کرنے کی تصویر

پاؤں کے تلوے پر ہاتھ رکھ کر اور پنجے کو پکڑ کر پاؤں کے اوپر کی طرف دبایا جاتا ہے ایسا کرنے سے پنڈلی کے عضلات میں کھچاؤ ہوتا ہے اور سکڑتے ہیں۔ اگر دباؤ کچھ عرصہ تک قائم رکھا جائے۔ تو پھر عضلات میں تشنج بھی متواتر ہوتا رہتا ہے۔ مگر بحالت صحت یہ حرکت بآسانی پیدا نہیں ہوتی ؛

حرام مغز میں مخصوص حرکاتِ منعکسہ کے مندرجہ ذیل مراکز ہیں۔

(۱) عضلات کو تناؤ میں رکھنے کا مرکز (۲) بازوؤں کو ہلانے کا مرکز (۳) تنفس یعنی سانس لینے کا چھوٹا مرکز (۴) پتلی کو پھیلانے کا چھوٹا مرکز جو اسکے گردن والے حصے میں ہوتا ہے (۵) خون کی رگوں کو سکیڑنے کا مرکز (۶) اخراج بول یعنی پیشاب کرنے کا مرکز (۷) براز یعنی پاخانہ کرنے کا مرکز (۸) اخراج جنین یا ولادت کا مرکز (۹) لعوط یعنی عضو تناسل کی ایستادگی کا مرکز (۱۰) اخراج منی کا مرکز (۱۱) پسینے کا مرکز ؛

نوٹ:۔ اخراج جنین کے لیے جو حرکات رحم سے وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ وہ عورت کی بیہوشی اور بے خبری میں بھی واقع ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر اُسے دارو وغیرہ سے بیہوش کر دیا جائے تب بھی رحم کے سکڑنے سے جنین خارج ہو جاتا ہے ؛

(۲) سرحرام مغز کے افعال و وظائف

(اسکی تشریح دیکھو صفحہ ۲۳۱ پر) سرحرام مغز اور حرام مغز کے افعال و وظائف میں کچھ بڑا فرق نہیں حرام مغز کی طرح اسکے بھی دو افعال ہیں (۱) ایصال تاثیر اور (۲) عکس تاثیر علاوہ اسکے متعلق (۳) ذاتی حرکت (آٹومیٹزم) کا فعل بھی ہے جس سے نبض غیر ارادی وغیرہ اختیاری مسلسل حرکاتِ منعکسہ مثلاً حرکت تنفس وغیرہ انجام پاتی ہیں ؛

ایصال تاثیر (کنڈکشن) حرام مغز کے سارے حسی تاثرات اور دماغ کے سارے محرک اثرات سر

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

حرام مغز کے ذریعے ہی اوپر نیچے آتے جاتے رہتے ہیں۔ پس سرحرام مغز ان حسی تاثرات کا جو کہ حرام مغز سے دماغ کو جاتے ہیں۔ اور ان محرک اثرات کا جو کہ دماغ سے حرام مغز کو جاتے ہیں گذرگاہ ہے نیز اکثر دماغی اعصاب کی جڑیں بھی چونکہ سرحرام مغز ہی سے شروع ہوتی ہیں۔ اسلئے انکے تاثرات بھی اسی مرکز کے توسط سے گزرتے ہیں۔ پس سرحرام مغز کا یہ فعل ایصال تاثیر بمقابلہ دیگر مراکز عصبیہ کے نہایت وسیع ہوتا ہے۔

عکس تاثیر (ری فلیکشن) سرحرام مغز عکس تاثیر کے لحاظ سے اگرچہ حرام مغز کے مشابہ ہے لیکن ان دونوں میں بڑا بھاری فرق ہے۔ کہ سرحرام مغز سے حرکات منعکسہ انجام پاتی ہیں۔ مثلاً حرکات تنفس یا حرکت ازدرا (یعنی نگلنا وغیرہ وہ بقائے حیات پائندگی کے لیے نہایت اہمیت رکھتی ہیں چنانچہ ادنیٰ رتبے کے حیوانات پر مکرر تجربات کرکے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ سارے دماغ کو رفتہ رفتہ ٹکڑے ٹکڑے کرکے نکال دینے پر بھی حیوان کچھ عرصہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اور اسکا تنفس بھی بند نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اگر حرام مغز کو نیچے سے اوپر کی طرف تھوڑا تھوڑا کرکے وہاں تک کاٹ دیا جائے جہاں سے کہ عصب دیافرغما (فرنے نک نرو) نکلتا ہے تب بھی کچھ عرصہ تک حیوان زندہ رہ سکتا ہے۔ ان حیوانات میں جو کہ خشکی اور تری دونوں میں زندگی بسر کر سکتے ہیں مثلاً مینڈک وغیرہ ان میں اگر حرام مغز کو سرحرام مغز تک بھی کاٹ دیا جائے۔ اور اوپر سے انکا دماغ بھی نکال دیا جائے تب بھی وہ کچھ دیر تک وہ زندہ رہ سکتے ہیں برخلاف ازیں اگر کسی حیوان میں سرحرام مغز کو زخمی کیا جائے خصوصاً اسکا وہ حصہ جو دونوں عصب راجع (نیموگیسٹرک نروز) کی جڑ کے پاس واقع ہے تو حرکات تنفس بند ہو جاتی ہیں۔ اور وہ حیوان دم گھٹ کر مر جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے سوا دماغ اور حرام مغز کے کسی حصے میں بالکل کچھ نقصان یا ضرر نہیں ہوتا۔

حیوانات پر تجربات کرنے سے جو باتیں ثابت ہوئی ہیں وہی باتیں انسان میں بھی اسکے امراض و آفات سے ثابت ہوئی ہیں چنانچہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سرحرام مغز کے صدمہ یا اذیت سے فوراً موت واقع ہوتی ہے۔ گردن کے بالائی مہروں کے کھل جانے سے یا ہڈی کے ٹوٹ جانے سے جو موت واقع ہوتی ہے اسکا سبب بھی اکثر یہی ہوتا ہے کہ سرحرام مغز پر اسکا صدمہ پہنچتا ہے یا اس کے اس حصے میں صدمہ پہنچتا ہے جو اسکو حرام مغز کے عصب دیافرغمائی جڑ سے ملاتا ہے۔

اس میں بہت سے حرکات منعکسہ کے مراکز ہیں جو [illegible] ضروری ہیں۔

(۱) آنکھ کو بند کرنیکا (۲) چھینکنے کا (۳) کھانسنے کا (۴) [illegible] کا (۵) خوراک چبانیکا (۶) لقمہ کو نگلنے کا (۷) لعاب دہن کو رسانیکا (۸) قے کرنیکا (۹) حرکت کو باقاعدہ رکھنے کا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اس میں بہت سے ایسے مراکز بھی ہیں جو خود بخود کام کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً
(۱) مرکز تنفس یعنی سانس لینے کا مرکز (۲) مرکز اقتباض قلب یعنی دل کی رفتار سست کرنیکا مرکز (۳) مرکز انقباض عروق دمویہ یعنی خون کی رگوں کو سکیڑنے کا مرکز (۴) مرکز عرق یعنی پسینے کا مرکز (۵) مرکز تشنج یعنی تشنج پیدا کرنیکا مرکز (۶) مرکز ذیابیطس یعنی پیشاب میں شکر پیدا کرنے کا مرکز

بڑے دماغ اور چھوٹے دماغ کے افعال سے ظاہر ہے کہ اگر وہ مثلاً سے عرض ہو جائیں یا ان پر کوئی صدمہ یا ضرب پہنچے تو افعال دماغی میں ضرور قصور اور قصور واقع ہوتا ہے مگر موت واقع نہیں ہوتی لیکن سر حرام مغز پر اگر کوئی ضرب پہنچے یا وہ خراب ہو جائے تو موت واقع ہوتی ہے کیونکہ اس میں مرکز تنفس اور مرکز حرکت قلب ہے۔ پس اگر یہ ماؤف ہو جائے تو دم بند ہو کر موت فوراً واقع ہوتی ہے۔

(۳) چھوٹے دماغ کے افعال و وظائف

(اسکی تشریح دیکھو صفحہ ۲۸۱ پر) متقدمین اطباء چھوٹے دماغ (مؤخر دماغ) کو قوت حافظہ اور اکثر ارادی حرکات کا مرکز مانتے تھے۔ لیکن تحقیقات سے بات ثابت ہوئی ہے کہ چھوٹے دماغ میں نہ تو قوت عقل و شعور ہے اور نہ قوت ارادہ ہے اور نہ ہی بقاء حیات کیلئے ضروری ہے بلکہ یہ بڑے دماغ اور حرام مغز کے افعال کا معاون ہے۔ اسکا بڑا بھاری کام یہ ہے کہ یہ عضلاتی حرکات کا منتظم ہے اسی کے ذریعے عقل کو جسم کے تمام عضلات کے مراتب اور انکی منظم و پیچیدہ حرکات مثلاً سانس لینا۔ دوڑنا یا تیرنا وغیرہ کا علم ہوتا ہے اور اسی کی قوت منتظمہ کے ذریعے عضلات کی پیچیدہ حرکات کا انتظام اور تناسب اور جسم کا توازن قائم رہتا ہے چھوٹے دماغ پر صدمہ پہنچنے سے حواس زائل نہیں ہوتے اور نہ قوت ارادی موقوف یا معطل ہوتی ہے چنانچہ مختلف حیوانات مثلاً پرندوں یا کتوں وغیرہ پر جو تجربات کیے گئے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے دماغ کو نکال دینے سے موت واقع نہیں ہوتی۔ بلکہ بعض ایسے حیوانات جنکا چھوٹا دماغ نکال دیا گیا ایک ایک سال تک زندہ رہے وہ ارادی حرکات پر قادر تھے۔ انکی عقل حیوانی یا شعور میں بھی چنداں فرق نہیں آیا تھا۔ انکے جذبات حیوانیہ بھی تقریباً ٹھیک رہے۔ البتہ اگر ان میں کسی قسم کا فرق آگیا تھا۔ تو وہ یہ تھا کہ انکے عضلاتی افعال کی ترتیب و تنظیم اور قوت میں فرق آگیا تھا۔ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے بلکہ جسم کو گھسیٹ کر چلتے تھے۔ غرضیکہ چھوٹے دماغ میں حرکات عضلات کے صرف نظم کی قوت ہے۔ یہ انکی باہمی حرکات مثلاً دوڑنا۔ کودنا اور تیرنا وغیرہ میں بیقاعدگی کو روکتا ہے اور جسم کے توازن کو قائم رکھتا ہے لیکن یہ بخوبی یاد رہے کہ اس میں بذات خود عضلات کو متحرک کرنے کی کوئی طاقت نہیں بلکہ اس میں ان کے حرکات کے صرف نظم کی قوت ہے جس کو ہم ذیل میں ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ڈاکٹر فلورینس (جسکے تجربات کی تصدیق کئی اور محقق ڈاکٹروں نے بھی کی ہے) نے بعض پرندوں کے چھوٹے دماغ کو ایک ایک طبقہ کر کے کاٹا جس سے نہایت عجیب نتائج ظاہر ہوئے اور وہ یہ کہ بیرونی طبقات کے کاٹنے کے بعد عضلی حرکات کمزور اور کسی قدر بے ترتیب ہو گئیں درمیانی طبقات کے کاٹنے سے وہ حیوانات لڑکھڑانے لگے انکی حرکات دشوار اور بیقاعدہ ہو گئیں لیکن دیکھنے اور سننے کی قوتیں درست رہیں اور جب پچھلے دماغ کا اخیر حصہ کاٹ دیا گیا تو انکی اڑنے چلنے کھڑے ہونے۔ اپنی وضع کو قائم رکھنے اور بچنے کی قوتیں بالکل جاتی رہیں۔ اور جب ایسی صورت میں ایک جانور کو پشت پر ڈال دیا جاتا تھا۔ تو وہ اپنی وضع پر لوٹ نہیں سکتا تھا وہ اپنے بازوؤں کو پھڑکاتا تھا اور بیہوشی کے عالم میں نہیں پڑا رہتا تھا بلکہ وہ دیکھتا تھا کہ دشمن سر پر ہے۔ اور اس سے بچنے کا ارادہ کرتا تھا لیکن وہ ایسا کرنے پر قادر نہ تھا۔ اس بنا پر ڈاکٹر موصوف کہتا ہے کہ مذکورہ بالا حالات سے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اس جانور میں ارادہ احساس کی قوتیں زائل نہیں ہوئی تھیں۔ بلکہ صرف عضلات کے حرکات کی باہمی ترکیب کی قوت باطل ہو گئی تھی اور اسکی اپنے جسم کے توازن کو قائم رکھنے کی کوشش ویسی ہی تھی جیسے کہ ایک متوالا آدمی لڑکھڑاتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔

ہر قسم کے حیوانات پر مزید تجربات کرنے سے یہی نتائج برآمد ہوئے۔ پس اس سے ڈاکٹر موصوف نے نتیجہ نکالا کہ چھوٹے دماغ میں نہ تو قوتِ حس ہے اور نہ قوتِ عقل۔ اور نہ ہی وہ حرکات ارادیہ کا سرچشمہ ہے۔ بلکہ وہ نظم حرکات کا یا عضلات کے مشترکہ فعل کو تیز کرنیکا مخصوص عضو ہے۔

ڈاکٹر فودبی کا یہ خیال ہے کہ چھوٹا دماغ حسِ عضلانی کا خاص عضو ہے یعنی چھوٹا دماغ وہ عضو ہے جس کے توسط سے عقل عضلات کے حالات اور انکے مراتب کو پہنچاتی ہے جس سے قوت ارادیہ کو انکے تحریک کی قدرت حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ عضلی حرکات اس امر پر بھی موقوف ہیں۔ کہ عضلات کی حالت کا بلحاظ وضع و اعتبار مقدار انقباض علم اور پہچان ہو ورنہ قوت ارادی ان میں کس طرح کام کر سکتی ہے چنانچہ جب چھوٹے دماغ میں کوئی صدمہ یا اذیت پہنچتی ہے۔ تو حرکات کا تناسب و انتظام قائم نہیں رہتا۔ خواہ اس کی وجہ یہ ہو کہ چھوٹا دماغ عضلی حرکات کے احساسات کا سرچشمہ ہے۔ یا یہ کہ وہ عضلی حرکات کی ترکیب و ترتیب کا مرکز ہے یہی سبب ہے کہ ان تجربات و مشاہدات سے ڈاکٹر فلورینس کے یا ڈاکٹر فودبی کے مذہب کی ترجیح ثابت نہیں ہوتی۔

المختصر یہ کہ چھوٹا دماغ بذاتہ نہ حس ہے نہ اس میں قوتِ عقل ہے۔ نہ قوتِ احساس اور نہ قوتِ ارادیہ بلکہ یہ محض نظم حرکات کا مخصوص مرکز ہے لیکن یہ اپنے فعل کو کس طرح انجام دیتا ہے؟ وہ اس طرح سے کہ اپنے پاؤں یا ٹانگوں (پیڈنکلز) کے ذریعے بڑے دماغ اور حرام مغز سے ملا رہتا ہے پس جسم کے مختلف مقامات سے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جو عصبی تاثرات (نروام پکسر) بذریعہ حرام مغز اس تک پہنچتی ہیں۔ یہ ان کو اپنے ساقوں یا پیڈنکلز کے ذریعے بڑے دماغ (مقدم دماغ۔ سیری برم) کے مخالف جانب نصف کرہ (سیری برل ہیمی سفیر) میں بھیج دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے دونوں حصے جانب مخالف کے عضلات سے تعلق رکھتے ہیں اور دونوں جانب کی حرکات کے باہمی تناسب کے وقت دونوں حصے ساتھ کام کرتے ہیں۔ کیونکہ جب اسکی کوئی ایک ساق کاٹ دیجاتی ہے۔ یا جب سر حرام مغز یا حرام مغز سے اس کا تعلق ایک طرف سے قطع کر دیا جاتا ہے۔ تو عجیب و غریب بیقاعدہ حرکات واقع ہو کر جس طرف کا حصہ کٹا ہوتا ہے۔ اسکے مخالف جانب حیوان گر پڑتا ہے۔ اور اس کا بدن متواتر گردش کرتا رہتا ہے۔ اور یہ گردش اس حیوان کے محور طویل کے گرد ہوتی ہے۔ اور بالعموم اسی طرف سے شروع ہوتی ہے جس طرف سے چھوٹے دماغ کا تعلق قطع کر دیا جاتا ہے بقول ڈاکٹر مجنڈی یہ گردش بھی ایک منٹ میں ساٹھ مرتبہ ہوتی ہے اور کبھی چند دنوں تک قائم رہتی ہے اسی قسم کے مشاہدات انسان میں بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر لیسر برتے لکھا ہے کہ ایک شخص اسی قسم سے گردش کرتا تھا۔ اس کے چھوٹے دماغ کی دائیں ساق میں مرض سکتہ کے سبب خون کا انصباب ہوا تھا اسی طرح سے ڈاکٹر بلھوٹی نے لکھا ہے کہ ایک عورت کا بھی یہی حال ہوا تھا۔ جس میں ہڈی کے ورم (ورم عظمی ایکزاس ٹوسس) سے چھوٹے دماغ کی بائیں ساق پر دباؤ پڑتا تھا۔

علاوہ ازیں جیسا کہ صفحہ ۲۲۸ پر لکھا جا چکا ہے چھوٹے دماغ کا اگلا کھنڈ یا چار ابھار (اجسام ربا عیہ کارپورا کوا ڈری جیمنیا) کو پیچھے سے گھیرتا ہے۔ اور جیسا کہ صفحہ ۲۲۶ پر تحریر ہوا چار ابھار دونوں مسربر لبری کے پچھلے حصے اور ساق دماغ سے ملتے رہتے ہیں۔ اور ان چار ابھاروں میں سے جو دو اگلے ہیں۔ انکا تعلق قوت لبر کے ساتھ ہے اور جو دو پچھلے ہیں۔ انکا تعلق قوت سمع کے ساتھ ہے پس اس طرح سے چھوٹے دماغ کا تعلق بینائی اور شنوائی سے بھی ہے لہذا ان چار اعضاء (۱) جلد (۲) عضلات (۳) آنکھ اور (۴) کان کے ذریعے مختلف قسم کے عصبی تاثرات چھوٹے دماغ تک پہنچتے رہتے ہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی تاثر یا تحریک چھوٹے دماغ تک ٹھیک طور پر پہنچے۔ تو پھر اس کے فعل میں فرق آجاتا ہے عضلات کی حرکات کا انتظام ٹھیک قائم نہیں رہتا۔ اور اگر ان میں سے کوئی عصبی تاثر یا تحریک چھوٹے دماغ تک بالکل نہ پہنچے۔ تو پھر جسم کا توازن خراب ہو جاتا ہے۔

مذکورہ بالا عصبی تاثرات (نروام پلسز) جو چھوٹے دماغ تک پہنچتی ہیں حسب ذیل ہیں:

(۱) تحریک لمسی جو جلد کی قوت لامسہ کے ذریعے چھوٹے دماغ تک پہنچتی ہے چنانچہ اگر کسی جانور کے پاؤں کے تلوے کی جلد کو کسی طریق سے بحس کر دیا جائے تو وہ ٹھیک طور پر چل نہیں سکتا باوجودیکہ اسکے پاؤں کے حرکتی اعصاب ٹھیک ہوتے ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(۲) **تحریک عضلاتی**۔ جو عضلات سے چھوٹے دماغ تک پہنچتی ہے یعنی وہ حس جس سے یہ محسوس یا معلوم ہوتا ہے کہ جسم کے کونسے عضلات سکڑے ہیں مثلاً ایک شخص ہاتھ کو ہلائے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ ہاتھ کو ہلا رہا ہے لیکن اگر یہ حس کسی طرح سے ضائع ہو جائے جیسا کہ مرض سیری برل اٹیکسیا میں ہو جاتی ہے تو پھر چھوٹے دماغ کے فعل میں خرابی آجاتی ہے۔ یعنی عضلاتی حرکات کا انتظام بگڑ جاتا ہے ؛

(۳) **تحریک بصری** جو بذریعہ بصارت آنکھ کے چھوٹے دماغ تک پہنچتی ہے جب یہ تحریک بھی کسی طرح سے چھوٹے دماغ تک نہیں پہنچتی تو حرکات عضلات غیر منتظم ہو جاتی ہیں چنانچہ مرض لوکوموٹر اٹیکسی میں مریض آنکھ بند کر کے کھڑا نہیں ہو سکتا ؛

(۴) **تحریک سمعی** جو سماعت یا کان کے ذریعے چھوٹے دماغ تک پہنچتی ہے۔ جب کان کے اندرونی حصے میں جو تین نیم دائرہ نالیاں ہوتی ہیں اگر وہ کسی طرح سے خراب ہو جائیں تو عضلات کی حرکات کے انتظام میں فتور آجاتا ہے چنانچہ کان کی انہیں نالیوں کی خرابی سے مسٹر ڈیزیز یا دوار سمعی ہو جاتا ہے اگر کسی جانور کے کان کی ان تینوں نالیوں میں سے متوازی الافق نالی کو ضائع کر دیا جائے تو ایسے جانور کا سر ادھر ادھر ہلنے لگتا ہے۔ اور اگر عمودی نالی کو کاٹ دیا جائے تو سر نیچے سے اوپر کو ہلنے لگتا ہے اگر کسی کبوتر کے کان کی یہ تینوں نالیاں کاٹ دی جائیں تو وہ نہ بیٹھ سکتا ہے نہ لیٹ سکتا ہے اور نہ اڑ سکتا ہے یعنی کسی صورت میں اس بیچارے کو چین نہیں ہوتا بلکہ وہ پلٹیاں کھانے لگتا اور تڑپنے لگتا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ کان کے اندر کی نیم دائرہ نالیاں (یعنی سرکولر کینال) سے بھی تحریکات چھوٹے دماغ تک پہنچتی ہیں جس کی وجہ سے جسم کا توازن قائم رہتا یعنی وہ تلا رہتا ہے۔

نوٹ۔ بقول اطباء یونانی حواس خمسہ ظاہری یعنی (۱) قوت باصرہ (۲) قوت سامعہ (۳) قوت شامہ (۴) قوت ذائقہ (۵) قوت لامسہ بیرونی محسوسات یا معلومات کو بذریعہ حس مشترک (جو حواس خمسہ باطنی میں سے پہلی قوت حس ہے اور جسکا مقام دماغ کے بطن مقدم کا اگلا حصہ ہے) دماغ تک پہنچاتی ہیں۔ لیکن متاخرین و موجودہ اطباء یورپ کی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا حواس خمسہ ظاہری میں سے حواس ثلاثہ یعنی (۱) قوت باصرہ (۲) قوت سامعہ اور (۵) قوت لامسہ بیرونی محسوسات کو چھوٹے دماغ کے ذریعے بھی بڑے دماغ تک پہنچاتی ہیں۔

(۴) اوسط دماغ کے افعال و وظائف

(اسکی تشریح دیکھو صفحہ ۲۳۰ پر) اوسط دماغ چونکہ تمام اجزاء دماغیہ کے درمیان واقع ہے اسلئے اسکا یہ کام ہے کہ تاثرات کو مختلف اجزاء دماغ و نخاع میں پہنچاتا ہے۔ اسکے عمودی اور آڑے ریشوں کی ساخت سے بھی یہ صاف ظاہر ہے۔ کہ یہ تاثرات و تحریکات کی گزرگاہ ہے یعنی اس میں سے تاثرات یا تحریکات گزر کر ایک حصہ سے دوسرے حصہ دماغ و نخاع میں جاتی ہیں ؛

اوسط دماغ کے امراض کی تشخیص میں یہ امر نہایت قابل لحاظ ہے کہ اسکے ماؤف ہونے سے مختلف قسم کا فالج مصلب (کراسڈ پیرالیسس) ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر اسکا نچلا حصہ ماؤف ہو تو اس جانب لقوہ ہوتا ہے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

لیکن اسکے مخالف جانب فالج ہی ہوتا ہے۔ اگر اسکا بالائی نصف حصہ ماؤف ہو تو جس طرف لقوہ ہوتا ہے۔ اسی طرف فالج بھی ہوتا ہے۔

نوٹ۔ یونانی اطباء کا یہ خیال ہے کہ اوسط دماغ قوت واہمہ متصرفہ کا مقام ہے لیکن ڈاکٹران یورپ ان تمام قوی کو مقدم دماغ میں مانتے ہیں سلفاً اوسط دماغ کو یہ خصوصی کرزما نتے ہیں۔ اور نہ کسی دماغی قوت کا مقام خیال کرتے ہیں اسی لیے اسکو دماغی و نخاعی تاثرات و تحریکات کی صرف گزرگاہ مانتے ہیں اسی لیے اسکو پُل دماغ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔

(۵) بڑا دماغ اور اُس کے نشیب فراز

(اسکی تشریح دیکھو صفحہ پر) یہ بتایا جا چکا ہے کہ ایک جوان آدمی کا دماغ بہم سے ۵۰ اونس یا تقریباً تین پونڈ یا ڈیڑھ سیر وزنی ہوتا ہے اور سوائے مگرمچھ اور ہاتھی کے باقی تمام حیوانات کے دماغوں سے آدمی کا دماغ بھاری ہوتا ہے لیکن جسمی تناسب سے یہ ان کے دماغوں کی نسبت بھی وزنی ہوتا ہے۔

نوزائیدہ بچوں میں دماغ کا وزن ۱۰ سے ۱۴ اونس ہوتا ہے سات برس کی عمر میں بالاوسط ۴۴ اونس اور چودہ سال کی عمر میں تقریباً ۴۸ اونس ہوتا ہے۔ چالیس سال کی عمر کے بعد ہر دس سال میں دماغ ایک اونس وزن میں کم ہوتا جاتا ہے۔ عورت کا دماغ مرد کے دماغ سے ہر عمر میں چھوٹا ہوتا ہے چنانچہ جوانی میں یہ پانچ اونس وزن میں کم ہوتا ہے پس ایک جوان عورت کا دماغ بالاوسط ۴۴ اونس وزن میں ہوتا ہے پیدائشی پاگلوں یا دیوانوں کا دماغ اوسط سے بہت کم ہوتا ہے اور بعض کا تو ۱۶ اونس سے بھی کم ہوتا ہے۔ بن مانس یا بڑے بندر کا دماغ تقریباً ۱۵ اونس وزنی ہوتا ہے۔ جو ایک نوزائیدہ بچے کے دماغ سے تقریباً برابر ہوتا ہے۔

دماغ اور عقل۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جس شخص کا سر یا دماغ بڑا ہو اُسکی عقل بڑی ہوتی ہے یہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کا مقدم دماغ بڑا ہوتا ہے اور کہ جس شخص کے دماغ میں نشیب و فراز زیادہ ہوتے ہیں یعنی دماغی بلندیاں پیچیدہ اور زیادہ نمایاں ہوتی ہیں (جس صورت میں کہ دماغ کے بالائی مطبق یا کارٹکس میں خاکی مادہ زیادہ ہوتا ہے) وہ آدمی زیادہ عقلمند ہوتا ہے یعنی دماغ میں جس قدر نشیب و فراز زیادہ ہوتے ہیں اسی قدر دماغی قوتیں اچھی ہوتی ہیں بعض ادنیٰ درجے کے حیوانات کے دماغوں میں تو نشیب فراز ہوتے ہی نہیں اور بعض میں بہت کم ہوتے ہیں۔ لیکن بڑے حیوانات کے دماغوں بالخصوص بڑے بندر کے دماغ میں چند ایک بلندیاں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح بچپن میں جبکہ دماغی قوتیں کمزور ہوتی ہیں۔ دماغ کے نشیب و فراز زیادہ پیچیدہ نہیں ہوتے لیکن جس قدر عمر اور عقل بڑھتی جاتی ہے اور دماغی قوتیں ترقی کرتی جاتی ہیں۔ اسی قدر دماغی بلندیاں زیادہ پیچیدہ اور بڑی ہوتی جاتی ہیں اور

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

پھر بڑھاپے میں جبکہ دماغی قوتوں میں فتور آجاتا ہے۔ تو دماغی بلندیاں بھی چپٹی اور چھوٹی ہو جاتی ہیں۔

(۶) بڑے دماغ کے افعال و وظائف

یونانی اطبا کا تو یہ خیال ہے کہ حواس خمسہ باطنی میں سے (۱) قوت حس مشترک اور (۲) قوت خیال تو مقدم دماغ میں ہوتی ہیں (۳) قوت واہمہ اور (۴) قوت متخیلہ اوسط دماغ میں اور (۵) قوت حافظہ مؤخر دماغ میں ہوتی ہے جسکے لیے وہ یہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ ان مقامات کے امراض و آفات سے ان قوتوں میں خرابی آجاتی ہے لیکن ڈاکٹران یورپ یہ مانتے ہیں کہ تمام مذکورہ بالا دماغی قوتیں بلکہ قوت ارادیہ اور عقل و فہم یہ سب مقدم دماغ یعنی بڑے دماغ ہی میں ہوتی ہیں چنانچہ اگر بڑے دماغ ضائع کر دیا جائے۔ تو یہ تمام قوتیں اور انکے متعلقہ افعال و وظائف سب باطل اور زائل ہو جاتے ہیں۔ اور جب بڑا دماغ کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے یا جب اسکو کوئی اذیت پہنچتی یا اس پر چوٹ لگتی ہے تب بھی قوائے عقلیہ کم و بیش مختل ہو جاتے ہیں۔ اور جب دماغ کو سخت صدمہ پہنچتا ہے۔ تو تمام ارادی و اختیاری حرکات موقوف و مسدود ہو جاتی ہیں اور آدمی بیہوش پڑا رہتا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ تمام مذکورہ بالا قوتیں یعنی عقل و فہم اور ارادہ وغیرہ سب بڑے دماغ ہی میں ہوتی ہیں۔

اگرچہ ہم کو اس بات کا صحیح علم نہیں کہ دماغ میں خیالات کس طرح پیدا ہوتے ہیں؟ لیکن اس میں شک نہیں کہ خیالات کی پیدائش کا سبب گذشتہ یا موجودہ محسوسات ہی ہوتے ہیں اور کہ خزانہ عقل میں کچھ جمع ہے۔ وہ سب محسوسات کا ایک ذخیرہ ہے۔ اسی لیے متقدمین اطباء یونان نے بھی قوت خیال کو حس مشترک کا خزانہ قرار دیا ہے یعنی حس مشترک اپنی ساری محسوسات کو جو کہ وہ حواس خمسہ ظاہرہ سے لیتی ہے خزانہ خیال میں محفوظ رکھتی ہے۔ تاکہ وقت ضرورت وہ پھر یاد آسکیں۔

(۷) بڑے دماغ میں مراکز وظائف کا تعین

دماغ اور اسکے خاکی مادہ کے بالائی طبق (کارٹیکس) کے مختلف مقامات جسم کے مختلف اعضاء و عضلات کی حرکات سے متعلق ہیں۔ مثلاً دایاں نصف کرہ دماغ جسم کی بائیں جانب کی حرکات ارادیہ پر حکمران ہے۔ اور بائیں جانب سے حسی تاثرات قبول کرتا ہے۔ اور بایاں نصف کرہ برخلاف ازیں یعنی دماغ کا ہر ایک نصف کرہ یا اپنے متصل جانب کے نصف حصہ جسم پر حکمران ہے کیونکہ جیسا کہ مذکور ہوا دماغ کے ہر ایک نصف کرہ یا نصف حصہ کے عصبی ریشے سوحوام مخ میں تقاطع کر کے دائیں طرف کے بائیں جانب اور بائیں طرف کے دائیں جانب کو چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا وہ تاثرات جو مقدم دماغ کے دونوں حصوں تک پہنچتے ہیں۔ یا اس سے شروع ہوتے ہیں۔ وہ اسکے مرکزی حصہ میں تقاطع کر کے دائیں جانب سے بائیں جانب اور بائیں جانب سے دائیں جانب گزرتے ہیں۔ پس یہی وجہ ہے کہ دماغ کا بایاں نصف کرہ جسم کے دائیں نصف حصہ پر اور دایاں نصف کرہ جسم کے بائیں نصف حصہ پر حکمران ہوتا ہے۔ چنانچہ جب دماغ کے ایک نصف کرہ میں برقی تحریک پہنچائی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جاتی ہے تو جسم کے مخالف جانب میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ یا اگر دماغ کا کوئی ایک نصف حصہ خراب کر دیا جائے۔ تو حس و حرکت ارادیہ بدن کے دوسرے حصے میں سے معدوم ہو جاتی ہے اور اسی لیے مرض فالج میں جس طرف کا حصہ مفلوج ہوتا ہے۔ اسکے مخالف جانب کا نصف کرۂ دماغ بیکار و معطل ہوتا ہے۔ دماغ

پھر ہر ایک نصف کرۂ دماغ میں مخصوص مقامات یا رقبات ہیں چنانچہ حرکتی رقبے (موٹر ایریاز) ان ارادی تحریکات کا مبداء ہیں جو کہ عضلات میں حرکات پیدا کرتی ہیں اور حسی رقبے (سنسری ایریاز) حسی تاثرات کو قبول کرتے ہیں پہلے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ دماغ کے خاص خاص مقامات میں خاص خاص افعال ذہنیہ و بدنیہ کے مراکز ہیں لیکن بعد کے محققانہ تجربات سے اس بات کا بھی علم و یقین ہو گیا ہے چنانچہ مختلف حیوانات بالخصوص کتوں و بندروں کو داروئے بیہوشی سے بیہوش کر کے اور انکے دماغوں کے مختلف مقامات میں برقی رو سے تحریک (سٹیمولیشن) پیدا کر کے یا بعض مقامات دماغ کو کاٹ کر (ایکسٹرا ایپیشن) سے جو تجربات کیے گئے نیز انسان میں امراض دماغیہ مثلاً سکتہ یا صرع وغیرہ میں جو مشاہدات کیے گئے ان سے یقینی طور پر معلوم ہوا ہے کہ دماغ کے مختلف مقامات میں جسم کے مختلف افعال کے مراکز ہیں جن کی تحریک سے مختلف حرکات و افعال انجام پاتے ہیں:

ان حقائق سے قبل عالمانِ وظائف الاعضاء (فزیالوجسٹ) صرف یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ "دماغ بحیثیت مجموعی کام کرتا ہے" اگرچہ اب ہم اس فقرہ کے وہ معنی نہیں لیتے جو متقدمین فزیالوجسٹ لیتے تھے لیکن پھر بھی اس میں صداقت ہے۔ چنانچہ کسی چیز کی صرف ایک خاص صفت کا تصور یا احساس ناممکن ہے مثلاً یہ ممکن نہیں ہے کہ نارنگی کی صرف بُو کا احساس کیا جائے اور اسکی دیگر صفات مثلاً رنگ و ذائقہ و شکل وغیرہ کا احساس نہ ہو کیونکہ ایک قسم کا احساس جو کہ دماغ کے ایک خاص مقام یا رقبہ کے ذریعے محسوس ہوتا ہے وہ دیگر حسی حرکتی مقامات یا رقبوں کی اور انکے درمیانی سلسلہ کی تحریک کا باعث بھی ہوتا ہے پس اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دماغ بحیثیت مجموعی کام کرتا ہے، کیونکہ اس کے بہت سے اجزاء ایک ساتھ ہی کام کرتے ہیں اگرچہ سارے دماغ کا ان جزئی احساسات و ارادات کیساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا جو کہ کسی خاص ذہنی حالت سے مشترک ہوتے ہیں:

سارے دماغ میں کوئی بھی ایسا مقام نہیں کہ جہاں پر اعصاب کا صرف ایک مجموعہ ہو اور اس میں عصبی ریشے آتے جاتے ہوں۔ بلکہ دماغ کا ہر ایک مقام یا موقع دیگر مقامات یا مواقع کے ساتھ بہت سے تعلقات رکھتا ہے۔ نیز وہ عصبی ریشے جو اسکے درمیان سے گزرتے ہیں۔ وہ اسکے تمام آس پاس کے اجزاء کو بھی ملحق لیتے ہیں۔ اسلئے اگر دماغ کے ایک محدود رقبہ کو بھی کاٹ کر نکال دیا جائے۔ تو بہت سے عصبی طریق یا راستے منقطع ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے نقصان وسیع حصہ میں ہوتا ہے۔

۱۸۷۰ء سے قبل یہ مانا جاتا تھا کہ سارا مقدم دماغ ہی محل قوائے عقلیہ ہے۔ یعنی مقدم دماغ کے تمام اجزاء ہی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

میں عقل وفہم وادراک وارادہ وغیرہ قوتیں ہوتی ہیں کیونکہ جب اسکو ضائع کر دیا جاتا یا نکال دیا جاتا ہے تو یہ سب قوتیں بھی زائل ہو جاتی ہیں لیکن مابعد کی تحقیقات وتجربات سے معلوم ہوا کہ جب مقدم دماغ کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے جس سے اسکے صرف خاکی مادہ (کارٹکس) پر دباؤ پڑتا یا تحریک ہوتی ہے۔ جیسے مرض صرع وغیرہ میں یا اسکو ایسی اذیت یا ضرب پہنچتی ہے جو اسکے صرف کارٹکس پر ہی موثر ہوتی ہے تب بھی قوائے عقلیہ وافعال ذہنیہ کم وبیش مختل وموقوف ہو جاتے ہیں جس سے یہ یقینی نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ دماغ کے بالائی خاکی مادہ (کارٹکس) میں اعلیٰ دماغی مراکز ہیں ۔

چونکہ بڑے دماغ کا تمام خاکی مادہ (قشرہ۔ کارٹکس) جو کہ عقل کا آلہ ہے تمام حسی تاثرات یا محسوسات کیلئے مخصوص ہے یعنی یہ وہ مقام ہے کہ جس میں ہر ایک حس ایک خاص مقام پر اگر محسوس ہوتی ہے اور پھر منعکس ہو کر قوت حرکت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پس جبکہ تمام خاکی مادہ (کارٹکس) حسی تاثرات کیلئے مخصوص ہے جسمیں کہ وہ منعکس ہوتے ہیں تو پھر یہ کہنا بھی بجا نہیں کہ تمام خاکی مادہ میں محرک اثرات بھی پیدا ہوتے ہیں پس یہ امر مسلمہ ہے کہ خاکی مادہ میں اعلیٰ دماغی مراکز ہیں لیکن خاص خاص افعال کی قوتوں کے خاص خاص مراکز یا مقامات ہیں چنانچہ اگر کسی خاص حصہ دماغ کو تحریک پہنچائی جائے تو اس حصہ کا خاص متعلقہ فعل بھی فوراً صادر ہو جاتا ہے چنانچہ اگر کسی شخص کے دماغ کے اگلے حصے یعنی پیشانی والے حصے کی تیسری بلندی یا مرکز تکلم (سپیچ سنٹر یا بروکا کنوولیوشن) کو ضائع کر دیا جائے تو اس شخص کو زوال تکلم (افیزیا) کی شکایت ہو جاتی ہے یعنی اسکی قوت گویائی زائل ہو جاتی ہے۔

نوٹ:۔ اس مرکز تکلم کو ایک فرانسیسی ڈاکٹر مسمی بروکا نے دریافت کیا تھا۔ اس نے یہ معلوم کیا کہ جو لوگ جریان خون دماغ یا مرض سکتہ سے اور جو مرنے سے قبل زوال تکلم میں مبتلا ہوئے انہیں تشریح کے بعد دماغ میں یہ پایا گیا کہ مذکورہ بالا دماغی بلندی (سپیچ سنٹر یا بروکا کنوولیوشن) میں جریان خون واقع ہوا تھا اسمیں مرض تکلم کے متعلق یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ یہ صرف ایک ہی طرف ہوتا ہے یعنی دماغ کے صرف بائیں طرف ہوتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو کہ بائیں ہاتھ سے سب کام کرتے ہیں یعنی لکھتے اور بستے ہیں ان میں مرض تکلم دماغ میں دائیں طرف ہوتا ہے مرکز تکلم کے دماغ میں صرف بائیں طرف ہونے پر یہ دلیل بھی لاتے ہیں کہ دائیں جانب کے فالج سے جو دماغ کے بائیں حصے کی خرابی سے ہوتا ہے۔ مریض برابر گفتگو کرتا رہتا ہے۔

مرض تکلم (افیزیا) دو قسم کا ہوتا ہے (۱) زوال تکلم حرکتی (موٹر افیزیا) جسمیں مریض اشیاء کو دیکھ اور سمجھ تو سکتا ہے لیکن الفاظ میں انہیں ادا نہیں کر سکتا (۲) مرض تکلم حسی (سنسری افیزیا) جس میں مریض الفاظ کو تو ٹھیک ادا کر سکتا ہے لیکن جو چیز دیکھتا یا سنتا ہے اس کو ٹھیک سمجھ نہیں سکتا اس لیے تب وہ کسی چیز کے متعلق گفتگو کرتا ہے یا دریافت کرنے پر جواب دیتا ہے تو اسکا جواب اکثر غلط ہوتا ہے۔

یا پیشانی والے حصہ میں ذہنی افعال کے مراکز ہیں اسلیے اسکو ذہنی دقبہ کہتے ہیں۔ وسطی حصہ دماغ جس میں مختلف اعضاء جسم کی حرکات کے مراکز ہیں۔ اسکو دماغ کا حرکتی رقبہ کہتے ہیں۔ اور آخری حصہ دماغ جسمیں سماعت وبصارت وغیرہ حواس کے مراکز ہیں۔ اسکو دماغ کا حسی دقبہ کہتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ مذکور ہوا دماغ کے بالائی خاکی مادہ (کارٹکس) میں ہی سب اعلیٰ ودماغی مراکز واقع ہیں ۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

غرضیکہ بڑے دماغ کے ہر ایک نصف کرہ میں مختلف قوی و افعال کے مختلف مراکز ہیں چنانچہ اگلے بائیں نصف کرہ دماغ کی بیرونی تصویر



(۱) دماغ کا اگلا حصہ (۲) وسطی حصہ
(۳) آخری حصہ (۴) کنپٹی والا حصہ
(۵) دوسرا شگاف (۶) تیسرا شگاف
(۷) مرکز حرکات جسم (۸) مرکز تکلم
(۹) مرکز ذائقہ وشم (۱۰) مرکز سماعت
(۱۱) مرکز تحریک بصری وسمعی (۱۲) مرکز تحریک لمسی وعضلی (۱۳) دماغ کا حرکتی رقبہ
(۱۴) حسی رقبہ

جسم مضلع وسریر بصری ڈاکٹر ہٹرنگ کی تحقیقات سے قبل یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جسم مضلع (کارپس سٹرائی ٹیٹم) بڑا مرکز حرکت (موٹر سنٹر) ہے اور سریر بصری (آپٹک تھیلے مس) بڑا مرکز حس (سنسری سنٹر) ہے۔ اور یہ خیال کہ قاعدہ دماغ کے یہ عقد (بیسل گینگلیا) اسقدر اہمیت رکھتے تھے۔ بعض ایسے مردہ اشخاص کے دماغوں کا امتحان کرنے سے پیدا ہوا تھا۔ جو مرض سکتہ سے مر گئے تھے کیونکہ انکے دماغوں کے ملاحظہ سے معلوم ہوا کہ اگر جسم مضلع (کارپس سٹرائی ٹیٹم) میں اذیت ہوئی یعنی وہاں پر جریان خون ہوا تو استرخاء (ہمی پریلے سس) ہو گیا اور اگر سریر بصری (آپٹک تھیلے مس) میں نقصان یا جریان خون واقع ہوا تو خدر (سنسری پریلے سس) واقع ہو گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کا استرخا یا خدر بیسل گینگلیا کی اذیت یا نقصان سے واقع نہیں ہوتا۔ بلکہ متصلہ انٹرکیپسول کے ضائع ہو جانے سے واقع ہوتا ہے۔ اس انٹرکیپسول کی ساخت میں آگے کی طرف وہ حرکتی ریشے ہوتے ہیں جو کہ دماغ کے کارٹکس سے نیچے کی طرف آکر حرام مغز میں جاتے ہیں۔ اور اس میں پیچھے کی طرف وہ حسی ریشے ہوتے ہیں۔ جو کہ حرام مغز سے نکل کر اوپر کارٹکس کی طرف جاتے ہیں اسلئے اگر مرض سکتہ میں جریان خون سے یہ ریشے ضائع ہو جائیں تو پھر ضرور استرخا یا خدر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر جریان خون یا صدمہ اسقدر محدود ہو کہ جس سے صرف بیسل گینگلیا ہی متاثر و ماؤف ہو اور مذکورہ بالا عصبی ریشوں میں کوئی نقصان نہ ہو۔ تو پھر خفیف استرخا یا خدر واقع ہوتا ہے یا کبھی ہوتا ہی نہیں ہے۔

پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیسل گینگلیا کے وظائف کیا ہیں؟ یہ درحقیقت معاون یا ماتحت مراکز ہیں۔ چنانچہ کارپس سٹرائی ٹیٹم ماتحت مرکز حیات ہے اور آپٹک تھیلے مس ماتحت مرکز حس نیز اس میں قوت حس بصر ہے جیسا کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے۔

جس طرح ایک جرنیل کے ماتحت کرنیل میجر اور کپتان اور انکے ماتحت صوبیدار و جمعدار وغیرہ عہدہ دار

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہوتے ہیں۔ جو ایک ایک فوج یا فوج کے دستوں پر حکومت کرتے ہیں۔ یا ایک گورنر کی ماتحت وزیر چیف سیکرٹری کمشنر اور ڈپٹی کمشنر وغیرہ حکام ہوتے ہیں۔ اسی طرح بڑے دماغی مراکز کی ماتحت چھوٹے چھوٹے دماغی مراکز ہوتے ہیں۔ جو اپنے اپنے حلقہ اثر میں بڑے مراکز کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں اسی طرح حسی تاثرات میں بھی یہی انتظام ہے۔ یعنی وہ بھی ماتحت مراکز کے توسط سے بڑے مراکز تک پہنچتے ہیں جس طرح سے کہ ایک سپاہی یا ایک ادنیٰ ملازم دیسیا حکام کے توسط سے اعلیٰ حکام سے عرض ومعروض کر سکتا ہے۔ پس یہی صورت مذکورہ بالا ماتحت مراکز حیات دیمرکز حس کی ہے ؛

اجسام رباعیہ و اجسام معقدہ انکی تشریح دیکھو صفحہ ۲۲۶ پر اجسام معقدہ دو چھوٹے چھوٹے لمبوترے گرہدار ابھار ہیں جو اجسام رباعیہ کے باہری طرف واقع ہیں ان میں سے ایک عصبہ مجوفہ کے بڑھاؤ کے باہر اور دوسرا اندر کی طرف واقع ہے ؛

اجسام رباعیہ قوت بصر کیلئے بڑے مراکز سمجھے جاتے ہیں کیونکہ انکے نکال دینے سے قوت بینائی زائل ہو جاتی ہے۔ اور وہ امراض دماغی جن میں کہ یہ اجسام ضائع ہو جاتے ہیں ان امراض کیساتھ بالعموم نابینائی بھی ہوتی ہے۔ اور آنکھوں کی لاغری کے ساتھ یہ اجسام بھی لاغر ہو جاتے ہیں نیز جب ان اجسام رباعیہ میں سے کوئی ایک جسم ضائع کر دیا جاتا ہے تو مخالف جانب کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے نیز ان اجسام کو نکال ڈالنے سے صرف نابینائی ہی پیدا نہیں ہوتی ہے اور کوئی آفت نہیں آتی البتہ انکی تحریک سے طبقہ عنبیہ سکڑ جاتا ہے جس سب سے آنکھ کی پتلی بھی سکڑ جاتی ہے اور انکے نکال ڈالنے سے وہ پھیل جاتا ہے اور پتلی بھی پھیل جاتی ہے اس سے ظاہر ہے کہ یہ اجسام طبقہ عنبیہ (آئرس) کی حرکات کیلئے عصبی مراکز ہیں اور بیرونی تاثرات کے مطابق جو طبقہ تشکیہ (ریٹینا) اور عصبہ مجوفہ (آپٹک نرو) سے آتے ہیں۔ اس طبقہ کے حرکات کو قابو میں رکھتے ہیں:

نوٹ:۔ اجسام رباعیہ زیادہ تر خاکی مادہ سے بنے ہوئے ہیں انکے ہر ایک بالائی جسم سے سفید ریشوں کا ایک بنڈل اوپر کو اجسام معقدہ کے آگے کی طرف چلا جاتا ہے اور اسطرح کے آپٹک ٹریکٹ سے مل جاتا ہے۔ اجسام رباعیہ کے خاکی سطح پر جو سفید طبق ہے وہ ہر آپٹک ٹریکٹ سے نکلتا ہے یہ ریشے تشکیہ سے آتے ہیں اور اجسام رباعیہ کے خاکی مادہ کے گرد شاخ در شاخ ہو کر ختم ہوتے ہیں ؛

غدہ نخامیہ (دماغ) پچوٹیری باڈی۔ اسکو غدہ بلغمیہ۔ غدہ مستدیرہ یا جسم نخاعی بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں پچوٹیری گلینڈ بھی کہتے ہیں اسکی تشریح دیکھو صفحہ ۲۲۰ پر۔ چونکہ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ چھوٹی سی گلٹی بھی نہایت اہمیت رکھتی ہے اسلیے اسکے وظائف ومنافع کا بیان خصوصیت سے ذیل میں کیا جاتا ہے۔

جیسا کہ اسکی تشریح میں بیان کیا جا چکا ہے اس گلٹی کے دونوں لوتھڑے (لوبز) ہوتے ہیں جو کہ ماہیت اور ساخت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اگلا لوتھڑا تو ساخت میں غدوی ہے پچھلے لوتھڑے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کے دو حصے ہیں۔ ایک عصبی حصہ۔ (پارس نر ورسا) اور دوسرا وسطی حصہ جو کہ عصبی حصہ سے ملحق اور قدرے اسکے گرد محیط ہوتا ہے۔ وظائف کے لحاظ سے یہ دونوں حصے متحد ہوتے ہیں لیکن پچھلا لوتھڑا اگلے لوتھڑے سے وظائف وافعال میں بالکل مختلف ہوتا ہے۔ مشاہدات وتجربات سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اگر یہ ساری گلٹی یا اسکا اگلا لوتھڑا نکال دیا جائے تو چند روز میں موت واقع ہوتی ہے لیکن اگر اسکا صرف پچھلا لوتھڑا نکال دیا جائے تو حیوان زندہ رہتا ہے پس بقائے حیات کیلئے اسکا اگلا لوتھڑا نہایت ضروری ہے کہ جن حیوانات میں جب کسی مرض کے سبب اس گلٹی میں کچھ نقصان واقع ہو جاتا ہے یا جب اسکا کوئی حصہ کاٹ کر نکال دیا جاتا ہے۔ تو اس حیوان کے نشوونما میں کم وبیش فرق پڑ جاتا ہے۔ اعضاء تناسل کی ترقی قطعی مسدود ہو جاتی ہے اور اکثر جسم میں چربی ہو جاتی ہے۔ قوائے ذہنیہ کی ترقی میں اسقدر فتور نہیں آتا جسقدر کہ نقص غدۂ درقیہ میں آتا ہے جب انسان میں غدہ نخامیہ کا نشوونما رک جاتا ہے تو جسمانی اور عقلی ترقی بھی مسدود ہو جاتی ہے اس حالت کو حالت طفلی (ان فینٹیے لزم) سے تعبیر کرتے ہیں جسمانی اور تناسلی نشوونما کا انسداد اس غدہ کے نقص فعل کے سبب واقع ہوتا ہے پچھلے حصہ کے نقص سے جسم میں چربی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے جب انسان میں اس غدہ کا اگلا حصہ غیر طبعی طور پر بڑھ جاتا ہے۔ تو مریض کا جسم بالکل بھدا ہو جاتا ہے یعنی مرض ایکرومیگیلی ہو جاتا ہے جسمیں جسم کی ہڈیاں بالخصوص ہاتھ پاؤں اور چہرہ کی ہڈیاں بھدے طور پر بڑھ جاتی ہیں اور جلد بھینس کی طرح موٹی ہو جاتی ہے قوت باہ خواہش جماع کم ہو جاتی ہے اور اکثر پیشاب میں شکر آنے لگ جاتی ہے اگر کسی گلٹی کے اگلے حصے میں بچپن ہی میں نقص آجائے قبل اسکے لمبی ہڈیوں کے سرے رجو دونوں طرف جلتے ہیں، انکے جسموں کیساتھ بڑھ جائیں اور ہڈیاں مکمل ہو جائیں ایسی صورت میں لمبی ہڈیاں یعنی ٹانگوں اور بازوؤں کی ہڈیاں بہت لمبی ہو جاتی ہیں جس سے انسان غیر معمولی طور پر دراز قامت مثل دیو کے ہو جاتا ہے جس حالت کو انگریزی میں (گیگنیٹزم) کہتے ہیں۔

اس گلٹی کا جو ہرجسکو پیچوی ٹیٹرین (نخامین) کہتے ہیں آج کل کئی ایک امراض میں استعمال کیا جاتا ہے بالخصوص وضع حمل کے وقت یا اس کے بعد انقباض کیلئے اور تقویت کیلئے مرض دمہ میں ایڈری نالین کے ہمراہ اس کو دیتے ہیں جیسا کہ مذکور ہوا بڑے دماغ کے کسی حصہ کے وظائف کو معلوم کرنے کیلئے دو امتحانی طریق ہیں ایک تحریک پیدا کرنے (سٹیمولیشن) سے اور دوسرے اس دماغ کو کاٹ ڈالنے (ایبلیشن ٹریشن) سے چنانچہ دماغ کے حسی کمی (قبہ (موٹر ایریا۔ رولینڈک سیریا) میں تحریک کرنے سے جسم کے مخالف جانب کے بعض حصوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے مختلف حیوانات مثلاً کتوں اور بندروں کے دماغوں پر اس قسم کے تجربات کر کے دماغ میں خاص خاص مقامات یا مراکز حرکت معین ومخصوص کیے گئے ہیں چنانچہ اگر دماغ کے ان مقامات یا قبات

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کو کاٹ کر نکال دیا جائے تو پھر انکے متعلقہ عضلات یا اعضاء مفلوج ہو جاتے ہیں اسی طرح سے دماغ کے حسی رقبہ (سینسری ایریا) میں تحریک کرنے سے ان کے عضلات متعلقہ میں تو کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی بلکہ معمول کو ان حسی تاثرات کا ذاتی احساس ہوتا ہے لیکن اس سے حرکات منعکسہ پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ رقبہ سمعی میں تحریک کرنے سے کان کھڑے ہو جاتے ہیں رقبہ بصری (وژوئل ایریا) میں تحریک کرنے سے معمول دیکھنے کے لیے اپنے سر اور آنکھوں کو پھیرتا ہے لیکن یہ حرکات منعکسہ ہوتی ہیں مستقیمہ نہیں ہوتی اور یہ بات اس درمیانی وقفہ سے بھی ثابت ہوتی ہے جو کہ تحریک اور حرکت کے درمیان واقع ہوتا ہے دماغ کے حسی رقبہ کو کاٹ ڈالنے سے مقام متعلقہ کی قوت حس زائل ہو جاتی ہے یعنی وہ مقام سُن ہو جاتا ہے۔ اور بعض امراض دماغی میں بھی یہی صورت پیدا ہو جاتی ہے جیسا سکتہ دماغیہ میں چنانچہ اگر سکتہ میں جریان خون انٹرکیپشول کے مقام میں ہو تو وہ تاعصبی ریشے ضائع ہو جاتے ہیں جو کہ جسم کے مخالف جانب کے عضلات سے تعلق رکھتے ہیں اسلئے فالج (ہیمی پلیجیا) ہو جاتا ہے حرکتی یا حسی عصبی ریشوں کے ضائع ہو جانے کے اعتبار سے فالج استرخاء کئی قسم کا ہوتا ہے مثلاً فالج مصلب (کراسڈ ہیمی پلیجیا جس میں جسم کے ایک جانب لقوہ ہوتا ہے اور دوسری جانب فالج اور جیسا کہ مذکور ہوا یہ سر حرام مغز میں تقاطع مخروطی سے اوپر پہنچنے سے ہوتا ہے اور اگر دماغ کی بالائی سطح پر جریان خون دماغ میں ہو تو پھر مجدد یا جرنی استرخاء (مونو پلیجیا) واقع ہوتا ہے چنانچہ اگر دماغ میں بازو کا رقبہ ماؤف ہو تو مخالف جانب کا بازو مسترخی ہو جاتا ہے اگر ٹانگ کا رقبہ ماؤف ہو تو مخالف جانب کی ٹانگ مسترخی ہو جاتی ہے اور اگر حسی رقبہ ماؤف ہو تو پھر مقابل جانب کی حس زائل ہو جاتی ہے ٭

کبھی کبھی بعض دماغی امراض بھی دماغ کے بعض مقامات میں اسی قسم کی تحریک پیدا کر دیتے ہیں جیسے کہ بجلی کی رو سے پیدا کی جاتی ہے پس جب دماغ کے پردوں میں رسولی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ رسولی اگر دماغ کے حرکتی رقبہ کے ایک حصے میں خراش پیدا کرے تو جسم کے مقابل جانب میں غیر ارادی حرکات واقع ہوتی ہیں ان حرکات سے کبھی بازو یا ٹانگ یا جسم کے دیگر حصص میں صرع کی مانند تشنج ہونے لگتے ہیں چنانچہ اس قسم کی صرع (جیکسونین اپی لیپسی) کے بعض مریضوں میں عمل جراحی نہایت مفید علاج ثابت ہوا ہے کیونکہ بعض ڈاکٹروں نے تجاس خاص اعضاء کے تشنج سے دماغ میں مقام مرض کا تعین کر کے اور وہاں پر کھوپری میں سوراخ کر کے رسولی کو نکال دیا اور مریض اچھا ہو گیا اور اگر رسولی سے دماغ کے حسی رقبہ پر دباؤ پڑے تو پھر مریض کے مقام متعلقہ میں خدر پیدا ہو جاتا ہے یعنی وہ مقام بے حس ہو جاتا ہے۔

اگلے صفحہ پر تصویر میں ایک بندر کے دماغ کے وہ مختلف مقامات دکھائے گئے ہیں جن کی تحریک

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سے خاص خاص مقامات کے عضلات میں حرکت پیدا ہوتی تھی بندر کے دماغ میں یہ مراکز حرکت ڈاکٹر فیریر صاحب نے اپنے مشاہدات اور تجربات سے محدود و معین کیے تھے لیکن بعد میں کئی ایک اور محقق ڈاکٹروں نے بھی اس امر کی تائید و تصدیق کی ہے چنانچہ مقام نمبر ۱ کی تحریک سے پچھلے پاؤں میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔


تصویر بندر کے دماغ کے مراکز حرکت

(۲) کی تحریک سے پاؤں باہر کی طرف حرکت کرتا ہے نمبر (۳) کی تحریک سے پچھلے پاؤں اور دم میں حرکت ہوتی ہے نمبر (۴) کی تحریک سے بازو پیچھے اور پیچھے کی طرف حرکت کرتا ہے نمبر (۵) کی تحریک سے بازو آگے کی طرف پھیلتا ہے اور ہاتھ اور کلائی میں حرکت ہوتی ہے نمبر (۶) کلائی سکوڑتی اور پٹھوتی ہے نمبر (۷) بالائی لب اوپر کو اٹھتا ہے۔

(۸) بالائی لب اور زیریں لب دیتا ہے۔ نمبر (۹) منہ کھلتا اور زبان باہر آتی ہے۔ نمبر (۱۰) زبان سکڑتی ہے۔ نمبر (۱۱) چہرہ بہ تمور پڑ جاتے ہیں۔ منہ اور نچلا لب دب جاتے ہیں نمبر (۱۲) بھویں اور پپوٹے اوپر کو اٹھتے ہیں پتلی پھیل جاتی ہے اور سر مخالف جانب کو پھر جاتا ہے۔ نمبر (۱۳) آنکھیں مخالف جانب اوپر کی طرف پھر جاتی ہیں۔ اور پتلی معمولی طور پر سکڑ جاتی ہے۔ نمبر (۱۴) ویسی ہی حرکات ہوتی ہیں۔ لیکن آنکھیں نیچے کی طرف پھر جاتی ہیں۔ نمبر (۱۵) مخالف جانب کا کان کھینچ جاتا ہے (۱۶) اسی طرف کے لب اور نتھنے میں بل پڑ جاتے ہیں۔

چند سال ہوئے کہ ڈاکٹر ہورسلے اور ڈاکٹر بیورز نے بندروں کے دماغوں پر تجربات کیے اور حال میں ڈاکٹر شیر جنٹن اور ڈاکٹر گرڈن بام نے بن مانسوں یعنی قد آدم بندروں مثلاً گوریلا چمپنزی اور اورینگ قسم کے بندروں کے دماغوں پر تجربات کیے اور ان کے نتائج نہایت اہمیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ اگلے صفحہ پر ایک بن مانس کے دماغ کی تصویر ہے اس کے دماغ کے مختلف مقامات پر تحریک کرنے سے جو نتائج برآمد ہوئے یعنی جن جن اعضاء و مقامات کے عضلات میں حرکت پیدا ہوئی وہ مراکز یا مقامات حرکت اس تصویر میں دکھائے گئے ہیں۔ دوسرے بن مانسوں یا قد آدم بندروں مثلاً گوریلا وغیرہ کے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ایک بن مانس کے دماغ کی تصویر جس میں مختلف اعضا جسم کے مراکز حرکت دکھائے گئے ہیں:



دماغوں کے ان مقامات پر تحریک پیدا کرنے سے بھی ٹھیک وہی نتائج نکلے پس اب اس میں شک نہیں رہا کہ اگر انسان کے دماغ کے ان مقامات میں تحریک پیدا کی جائے تب بھی یقیناً یہی نتائج نکلیں گے۔

حرکاتِ منعکسہ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں حرکات منعکسہ خواہ دماغ سے متعلق ہوں یا حرام مغز سے وہ اکثر غیر ارادی وغیر اختیاری ہوتی ہیں لیکن سواد بعض کے پھر بھی ارادہ و اختیار کو ان میں کچھ دخل و تصرف ہوتا ہے اور اس قسم کے افعال و حرکات ابتداء میں تو ارادی ہوتے ہیں لیکن بعد کو عادت ہو جانے پر یا بلکہ بن جانے پر وہ بلا ارادہ و شعور بھی جاری رہ سکتے ہیں کبھی دماغ سے بھی بہت سی ایسی حرکات منعکسہ صادر ہوتی ہیں۔ کہ جن کا دماغ کو بھی کچھ علم نہیں ہوتا مثلاً جب کوئی شخص

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

لیکچر دیتے یا گانے میں محو ہوتا ہے تو اس سے بلا ارادہ بعض ایسی حرکات منعکسہ صادر ہوتی ہیں جیسے انگلی یا ہاتھ سے اشارہ کرنا یا منہ بنانا وغیرہ کہ جن کا اسے کچھ علم نہیں ہوتا اسی طرح سے بہت سے بدنی افعال یا حرکات ایسے ہیں کہ ابتداء میں تو وہ قوتِ ارادیہ سے شروع ہوتے ہیں لیکن بعد میں عادت ہو جانے یا ملکہ بن جانے پر وہ بلا ارادہ اور بغیر علم کے خود بخود ہوتے رہتے ہیں پس ایسی حرکات منعکسہ گویا طبعی افعال بذیر بن جاتی ہیں کیونکہ جب کسی عضو کو کسی متواتر فعل کی عادت پڑ جاتی ہے تو لفجوائے اَلْعَادَۃُ طَبِیْعَۃٌ ثَانِیَۃٌ یا وہ عادت اسکی طبیعت بن جاتی ہے اسی لیے جب بعض کسی افعال کی خوب مشق ہو جاتی ہے یا عادت پختہ ہو جاتی ہے تو وہ بھی خود بخود انجام پانے لگتے ہیں چنانچہ ایک مشاق ستاریا ہارمونیم باجا بجانے والا آنکھیں بند کر کے بھی ستار یا ہارمونیم بجا سکتا ہے (بلکہ ہم نے اندھوں کو بھی بجاتے ہوئے دیکھا ہے) کیونکہ اس کی عادی انگلیاں انہیں مقامات پر جا کر پڑتی ہیں جہاں کہ انہیں پڑنا چاہیے پس غیر طبعی یا کسی افعال کہ جنکی خوب عادت یا مشق ہو جاتی ہے تو وہ بھی مثل طبعی افعال کے رگ و پے میں سرایت کر جاتے ہیں اور جزو بدن بن بن جاتے ہیں چنانچہ ایک پرانے قواعد دان پنشن خوار سپاہی کا کہ جس کے رگ و ریشہ میں قواعد سرایت کر چکی تھی ذکر ہے کہ ایک روز وہ کچھ سودا لیے گھر کو جا رہا تھا کہ اسکے ایک مسخرے دوست نے جسکو اس بات کا علم تھا کہ قواعد اس کے رگ و ریشہ میں سرایت کر گئی ہوئی ہے اسے اچانک پکار کر قواعد کا لفظ اٹینشن (ہاتھ چھوڑ کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ) کہا جس کے سنتے ہی سپاہی کے ہاتھوں سے سودا تو گر پڑا اور وہ بے اختیار ہاتھ چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا جیسا کہ قواعد کرتے کرتے کھڑے ہو جاتے ہیں اس وقت اسکو اتنا سوچنے کا بھی موقع نہ ملا کہ اب وہ فوج میں ملازم نہیں اسکے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے پس جس طرح سے طبیعت بعض غیر طبعی یا کسی افعال کی عادی ہو جاتی ہے اسی طرح سے وہ بعض جسمانی یا نفسانی امراض کی بھی عادی ہو جاتی ہے بالخصوص پرانے یا نوبتی امراض کی چنانچہ عادتی قبض پیٹی چوٹل کا لسٹی پیشن اور عادتی اسقاط (یہی چوٹل ابارشن) اسکی بہترین مثالیں ہیں۔ اس قسم کے اور بھی کئی ایک امراض ہیں جو کہ جسم اور مزاج میں ایسے سرایت کر جاتے ہیں کہ اسکا جزو بدن بن جاتے ہیں ایسی حالت کو طب میں سودا مزاج مستوی اور ڈاکٹری میں کے کیکسیا کہتے ہیں۔ مثلاً ملیریل کے گیگسیا (سودا مزاج ملیریائی) ٹوبر کلر کے کیکسیا (سودا مزاج سلی گا رٹی کے کیکسیا (سودا مزاج نقرسی) وغیرہ اور جسطرح سے طبیعت بعض جسمانی امراض کی عادی ہو جاتی ہے اسی طرح سے بعض نفسانی امراض کی بھی عادی ہو جاتی ہے چنانچہ حسد۔ کینہ۔ بخوت تکبر کذب مکر و حیلہ وغیرہ وغیرہ نفسانی امراض ہیں پس میں فرینالوجی کے مذکورہ بالا مسلمات و حقائق کی بنا پر نوجوان اور بالخصوص مسلمان

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

نوجوانوں کو نہایت تاکید سے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ افعال ـــــ درذیلہ سے اجتناب کریں یعنی بُری باتوں کی ہرگز عادت نہ کریں اور جہاں تک ہو سکے ـــــ نیک کاموں اور نیک باتوں کی عادت ڈالیں تاکہ وہ ملک و ملت کیلئے مفید افراد بن سکیں اور یہ تو میں اس کتاب کے شروع میں ہی بتا چکا ہوں کہ والدین کے شمائل خصائل بذریعہ نطفہ اولاد میں منتقل ہوتے ہیں پس اس میں شک نہیں کہ ایک صوفی کی اولاد کو جسقدر شراب خوری سے طبعاً نفرت ہوگی اسی قدر ایک شرابی کی اولاد کو اسکی طرف رغبت ہوگی لیکن نیک عادت اور نیک صحبت سے اسکی اصلاح ممکن ہے اسی کا نام تہذیب اخلاق ہے ؎

(۸۱) نصیحت گوش کن جاناں کہ از جاں دوست تر دارند ؎ جوانانِ سعادتمند پند پیر نہ نیوشند

پس امید ہے کہ سعادتمند نوجوان میری اس نصیحت کو ضرور مانیں گے ؎

کیفیت ادراک (اور) دماغ و عقل

کیفیت ادراک یا عقل کے متعلق حکماء کے مختلف مذاہب ہیں۔ پس مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حواس کا بیان کرنے سے پہلے اس مسئلہ پر بھی کچھ توجہ کی جائے۔

اس بات پر اکثر مباحث ہوئے ہیں کہ جس طرح سے جگر کے ذرات یا کیموس (سیلز) کے فعل کا نتیجہ صفراء ہے یا جس طرح سے عضلاتی ریشوں کے فعل کا نتیجہ انقباض ہے۔ اسی طرح سے عصبی کیموس یا دماغ کے فعل کا نتیجہ کیفیت ادراک یا عقل ہے لیکن یہ مناسب صادق یا مشابہت حقیقی نہیں تاہم یہ ضرور صحیح ہے (۱) مختلف حواس کے اظہار کا انحصار دماغی کارٹکس کے مخصوص محدود مقامات کی صحت پر ہے (۲) ایسی ادویہ مثلاً شراب و قہوہ اور دوائے بیہوشی (کلورو فارم) وغیرہ جن کا اثر مسلمہ طور پر زندہ اجسام پر ہوتا ہے۔ وہ کیفیت ادراکیہ یا عقل پر بھی اثر کرتی ہیں (۳) امراض یا آفات دماغیہ سے عقل ضرور مختل یا باطل ہو جاتی ہے ؎

لیکن باوجودیکہ عصبی مادہ ہی سے کیفیات ادراکیہ ظہور پذیر ہوتی ہیں تاہم کوئی شخص صحیح طور پر یہ استدلال نہیں کر سکتا کہ عصبی مادہ ہی ان کیفیات کی پیدائش کا موجب ہو سکتا ہے اس بارہ میں حکماء کے مختلف نظریات ہیں۔ چنانچہ بعض کی تو یہ رائے ہے۔ کہ نفس یا عقل جاندار مادہ کے فعل کا نتیجہ ہے اور برخلاف ازیں بعض کا یہ خیال ہے۔ کہ تمام مادہ خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان خود نفس یا روح (مائنڈ) کے فعل کا نتیجہ ہے اکثر یہ مذہب ہے کہ اگر نفس یا روح میں یہ قوت نہ ہوتی تو پھر نہ فہم و ادراک ہوتا اور نہ ان صفات (مثلاً رنگ و بو، آواز، قوت وزن وغیرہ) کا وجود ہوتا جن سے کہ ہمارے غیر ذہنی مادی دنیا مرکب ہے ؎

اس حقیقت کے ماننے میں کہ صفراء جگر کے طبعی فعل کا نتیجہ ہے۔ کوئی دقت نہیں کیونکہ اس صورت میں صفراء

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کی پیدائش طبعی ہے برخلاف ازیں اس بات کا قبول کر لینا دشوار ہے کہ عقل یا قوت ادراک دماغ کے طبعی افعال کا نتیجہ ہے پس اگر ہم جس طرح سے صفرا کو جگر کے طبعی افعال کا نتیجہ مانتے ہیں اسی طرح سے عقل کو بھی دماغ کے طبعی افعال کا نتیجہ مان لیں تو گویا ہم دو قسم کی علامات کو یعنی طبعی و نفسانی علامات کو جن میں سے کہ ایک غیر متصور ارتباط ہے باہم مربوط کرتے ہیں اسلئے بجائے اس امر کے اظہار کریں کہ طبعی قوت ذہنی یا عقلی قوت کی پیدائش کا موجب ہوتی ہے اسکی نسبت یہ خیال کر لینا زیادہ قابل اطمینان ہے کہ وہ دونوں قوتیں باہم عمل کرتیں ہیں اور یہ انکے باہمی تعلق کی حقیقت مبہم یا نامعلوم ہے پس یہ اہم مسئلہ لاجواب و لاینحل ہی رہ جاتا ہے کہ آیا دماغ فاعل ہے اور عقل منفعل یا کہ عقل فاعل ہے اور دماغ منفعل یعنی دماغ عقل پر مؤثر ہے یا کہ عقل دماغ پر اور ان دونوں میں سے یعنی دماغ اور عقل میں سے کون خادم ہے اور کون مخدوم اور چونکہ عصبی مادہ میں جب ایک تغیر واقع ہوتا ہے تو وہ ہر ایک نفسانی یا ذہنی تغیر کا موجب ہوتا ہے پس یہ حالات اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ دماغ (عصبی مادہ) ہی عقل پر مؤثر ہے یعنی حقیقت میں عقل اعصاب ہی کی کیفیت سے منفعل ہوتی ہے اور اعصاب میں یہ کیفیت عموماً بیرونی اجسام سے پیدا ہوتی ہے۔ براہ راست بیرونی اجسام کی کیفیت نفس یا عقل میں نہیں پہنچتی اور یہی بات عالمان وظائف الاعضاء و فزیالوجی کو اس امر کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ کہ نظام عصبی کے اعمال و وظائف کی نہایت دقت و صحت سے تحقیق کریں اور اس امر کا قطعی فیصلہ کریں کہ کن کن عصبی ساختوں کے افعال سے مختلف قسم کی کیفیات اور ایکیہ پیدا ہوتی ہیں۔

ہم مختلف حصص دماغ کے افعال کو خواہ کتنا ہی مکمل طور پر معلوم کر لیں پھر بھی یہ ممکن نہیں کہ ہمیں طبعی و روحانی افعال کے تعلق کا صحیح علم ہو سکے اگر ہم جسم کے ہر ایک عصبی ذرہ یا کیسہ کے فعل کو معلوم کر لیں تب بھی جسم اور روح کے درمیان جو بُعد ہے وہ کم نہ ہوگا پس صرف دماغی افعال کے مطالعہ سے ہم کیفیت ادراک یا عقل کو نہیں سمجھ سکتے۔

اور چونکہ خود جوہر دماغ کو اپنے افعال کا کچھ علم نہیں ہوتا۔ اسلئے بالآخر یہی ماننا پڑتا ہے کہ دماغ نفس یا عقل کا آلہ ہے یعنی نفس یا عقل ہی دماغ پر حکمران ہے جس طرح سے مطبع یا پریس کو جسمیں کہ مختلف علوم و فنون کی کتب طبع ہوتی ہیں۔ ان مطبوعہ مضامین و مسائل کا کچھ علم نہیں ہوتا جو کہ اس میں سے طبع ہو کر نکلتے ہیں لیکن پریس اور پریسمین وغیرہ اس آلہ یا مشین کے اجزاء ضروریں جو کہ ایک خاص انتظام سے کام کرتے ہیں اسی طرح سے جوہر دماغ کو بھی ان محسوسات و افعال کا کچھ علم نہیں ہوتا جو کہ اس سے انجام پاتے ہیں۔ یہ بھی پریس کی طرح سے نفس یا عقل کا ایک آلہ ہے۔

نوٹ:۔ بقول متقدمین اطباء یونان عقل ایک جوہر ہے جو اپنی ذات اور فعل دونوں میں مادہ سے مجرد ہے اور معانی کلیہ اور

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

حقائق معقولیہ کو ادراک کرتی ہے برخلاف اسکے نفس ایک ایسا جوہر ہے جو اگرچہ ذات میں مادہ سے مجرد ہے لیکن اپنے فعل میں مادہ سے تعلق رکھتا ہے یعنی بدن انسان کے ساتھ متعلق ہوکر اس میں تدبیر و تصرف کرتا ہے اسی لحاظ سے اسکو نفس ناطقہ کہتے ہیں لیکن جب اس جوہر کے اس تعلق کو جو کہ اسکو عالم قدس سے حاصل ہے نظر انداز کر دیا جائے تب اسے روح کہتے ہیں لیکن یہ روح روح طبعی نہیں بلکہ یہ بدن سے حکمی ہے جسکا بیان دیکھو صفحہ پر۔

نیند۔ قیام صحت اور بقائے حیات کیلئے جاندار مخلوق کو آرام کرنا لازمی ہے تمام اعضاء جسم جو کہ اپنے طبعی افعال میں مصروف رہتے ہیں کچھ عرصہ کیلئے آرام چاہتے ہیں اور کامل آرام نیند سے جو بدنی اور خصوصاً دماغی تکان کو دور کرنے کیلئے نہایت ضروری ہے پس نیند کیا ہے گویا دماغ کے آرام و سکون کا قدرتی وقت ہے جب طبعی نیند (شبانہ روز میں چھ گھنٹے) حاصل نہیں کی جاتی ہے تو صرف سستی کاہلی۔ دردسر اور ضعف دماغ ہی کی شکایت نہیں ہو جاتی بلکہ متواتر بیخوابی سے جنون اور دیوانگی ہو جاتی ہے وہ اعضا جو شب و روز نگاہ کام کرتے رہتے ہیں چنانچہ دل اپنی ہر حرکت میں تقریباً نصف سیکنڈ کام اور نصف سیکنڈ آرام کرتا ہے۔ اور حرکت تنفس میں عضلات تنفس دلکی نسبت پانچ گنا آرام کرتے ہیں۔ اور چونکہ دماغ کا کام اس قسم کا ہے۔ کہ وہ بحالت بیداری یک لمحہ بھی خارجی تحریکات سے خالی نہیں رہ سکتا۔ اسلئے قدرت نے اسکے آرام و سکون کیلئے ایک خاص مدت مقرر کر دی ہے جسے نیند کہتے ہیں۔

کبھی مرض یا اذیت کے سبب افعال دماغ عارضی طور پر معطل و مسدود ہو جاتے ہیں اور اس حالت کو جو نیند کے مشابہ ہوتی ہے بیہوشی کہتے ہیں یہ بیہوشی دو طرح سے پیدا ہوتی ہے ایک دماغ میں خون کی کمی کے باعث جسکو غشی (سنکوپی) کہتے ہیں۔ اور دوسرے دماغ میں خون کی زیادتی سے جسکو سبات یا قوما کہتے ہیں۔ پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ طبعی نیند میں بھی دماغ کے اندر خون زیادہ جاتا ہے لیکن مابعد کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ طبعی نیند میں دماغ کے اندر خون کم ہو جاتا ہے یعنی (سیری برل انیمیا) ہو جاتا ہے کیونکہ خون دو فوائد تغذیہ و تقویت کے لیے دماغ میں جاتا ہے یعنی ایک تو یہ دماغ کی پرورش کرتا ہے۔ اور دوسرے یہ اسکو قوت دیتا ہے یہی قوت نفسانی ہوتی ہے جو بذریعہ اعصاب باعث حس و حرکت ہوتی ہے نیند کی حالت میں صرف تغذیہ دماغ کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے تقویت کیلئے ضرورت نہیں ہوتی اسلئے خون دماغ میں کم ہو جاتا ہے طبعی نیند کی مدت جیسا کہ مذکور ہوا شبانہ روز کی ایک چوتھائی یعنی چھ گھنٹے ہوتی ہے اور طبعی نیند گراں ہوتی ہے اور سر ہلکی بلکہ معتدل ہوتی ہے لیکن غیر طبعی حالت میں نیند کبھی بہت گہری (خواب غفلت۔ سُبات۔ کوما) اور کبھی بہت ہلکی (خواب بیداری لوم بلنظ۔ سام نمبولزم) ہوتی ہے اور نیند کی بیماری (مرض النوم سلیپنگ سکنیس) میں تو مریض عرصہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تک خواب غفلت میں سوتا رہتا ہے ۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیند کی حالت میں دماغ کے بعض حصے بیدار ہوتے ہیں یا کام کرتے ہیں اور بعض حصے سوتے ہیں یا آرام کرتے ہیں۔ اسلئے نیند میں خواب آتے ہیں اور بعض اوقات نیند میں آدمی چلتا پھرتا ہے اسی حالت کو **نوم یقظہ** (سام نمبولزم) کہتے ہیں ۔

خواب دیکھنا۔ طبعی اور صحیح نیند وہ ہے۔ کہ جس میں آدمی آرام سے سوئے اور نیند میں کوئی خواب نہ دیکھے کیونکہ خواب دیکھنے کی حالت میں دماغ کے کچھ حصے بیدار ہوتے ہیں اور اپنے افعال میں مصروف ہوتے ہیں لیکن چونکہ مرکز حواس (سین سوریم) یا حس مشترک خوابیدہ ہوتی ہے۔ اسلئے فہم یا ادراک سے افعال نفسانیہ کی تصحیح نہیں ہوتی لہٰذا محسوسات کا صحیح علم نہیں ہوتا اور نہ ہی دماغ ایسی نیم خوابی کی حالت میں عضلات ارادیہ کی حرکات منعکسہ پر کوئی محرک اثر ڈال سکتا ہے چنانچہ خواب میں ڈرنا (کابوس ٹائٹ میئر) میں مریض بعض اوقات خواب میں چیختا چلاتا ہے لیکن بے حس پڑا رہتا ہے ۔

جن خیالات میں آدمی سوتا ہے یا سوتے ہوئے جو اسکے گرد و پیش ہوتے ہیں بالعموم اسی قسم کے خواب آیا کرتے ہیں۔ اور بدہضمی اور قبض یا نفخ کی حالت میں اکثر متوحش اور ڈراؤنے خواب آتے ہیں لیکن بعض نیک آدمیوں کو جنکا نفس یا ضمیر نہایت پاک ہوتا ہے عالم رؤیا میں اکثر صحیح خواب آیا کرتے ہیں جسکی پوری حقیقت کو بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں ۔

خواب میں چلنا۔ اسکو عربی میں **نوم یقظہ** اور انگریزی میں سام نمبولزم کہتے ہیں جسکے لغوی معنی ہیں خواب میں چلنا۔ یہ دماغ کی ایک غیر طبعی حالت خواب ہے جس میں سوتا ہوا انسان چلتا پھرتا ہے سیڑھیوں بلکہ درخت پر چڑھ سکتا ہے اور دوسرے مشق کیے ہوئے کام مثلاً لکھنا یا باجا بجانا وغیرہ کر سکتا ہے لیکن جب اسے جگا کر پوچھو تو لاعلمی کا اظہار کرتا ہے اسکا سبب یہ ہے۔ کہ اس حالت میں مقدم دماغ صرف اسقدر بیدار ہوتا ہے کہ وہ فقط ایسی حرکات منعکسہ پیدا کر سکتا ہے جو کہ حرکت کیلئے ضروری ہوتی ہیں لیکن حس عضلی کا عصبی مرکز جو کہ مؤخر دماغ میں ہوتا ہے وہ بالکل بیدار ہوتا ہے مگر مرکز حواس یا حس مشترک ابھی خوابیدہ ہوتی ہے اور تاثرات کا اسقدر احساس نہیں کر سکتی کہ مقدم دماغ کو بیدار کر دے۔ تاکہ وہ محض ذہنی تخیلات و تصورات میں اور ان محسوسات میں جو کہ خارجی اشیاء سے حاصل ہوتے ہیں۔ فرق و تمیز کر سکتے ۔

اعصاب (یا) پٹھے

(انکی تشریح وغیرہ کیلئے دیکھو صفحہ ۱۹ (۲۳۹) پر بتایا جا چکا ہے کہ فعل کے لحاظ سے اعصاب دو قسم کے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہوتے ہیں (۱) اعصاب حسّی (۲) اعصاب حرکت لیکن مبدا ریا مقام آغاز کے لحاظ سے اعصاب تین قسم کے ہوتے ہیں (۱) اعصاب دماغی (۲) اعصاب نخاعی (۳) اعصاب شرکی چنانچہ ذیل میں انکا ترتیب وار بیان کیا جاتا ہے:

(۱) اعصاب دماغی

اُردو نام	عربی نام	انگریزی نام
دماغی بٹھے	اعصاب دماغیہ	کرسے نیل نروز Cranial-Nerves

دماغی اعصاب (کرسے نیل نروز) کے بارہ جوڑے ہوتے ہیں یعنی بارہ عدد اعصاب تر دماغ کے ایک نصف کرہ سے نکلتے ہیں اور آگے پیچھے سے انکے اردو طبی و ڈاکٹری نام۔ آغاز وانجام وافعال وغیرہ حسب ذیل ہیں:

(۱) سونگھنے کا عصب عصب شم آل فیکٹری نرو

یہ قوتِ شامہ کا خاص عصب ہے جو دماغ کے سامنے حصے سے شروع ہوتا ہے۔ اور باریک باریک میں شاخوں کے ذریعے ناک کی اندرونی جھلی میں ختم ہوتا ہے تمام شمی محسوسات یعنی ہر ایک بو اسی کے ذریعے دماغ کو محسوس ہوتی ہے اسکے خراب ہونے سے قوت شامہ زائل ہو جاتی ہے۔

(۲) دیکھنے کا عصب عصب بصر۔ عصبہ مجوفہ آپٹک نرو

یہ قوت باصرہ کا خاص عصب ہے جو دو جڑوں کے ذریعے دماغ سے شروع ہوتا ہے دونوں جانب کے یہ اعصاب دماغ کے بیچ سے پرے آپس میں ملکر تقاطع صلیبی بناتے ہیں اور دائیں طرف کے عصب کے ریشے بائیں آنکھ میں اور بائیں طرف کے دائیں آنکھ میں جاکر آنکھ کا پردہ نورانی۔ شبکیہ۔ ریٹی نا۔ بناتے ہیں اس عصب کے ریشے دماغ میں سریر بصری (آپٹک تھیلے مس) اجسام رباعیہ (کارپورا کواڈرا جیمنیا) اور دماغ کے شعبہ موخری کے خاکی مادہ سے شروع ہوتے ہیں تمام بصری محسوسات یعنی جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں انکا علم اسی کے ذریعے دماغ کو ہوتا ہے

(۳) ڈھیلے کا محرک عصب عصب محرک مقلہ موٹر آکولی نرو

یہ دو جڑوں کے ذریعے پل دماغ کے قریب بڑے دماغ کے پاؤں کے اندرونی پہلو سے شروع ہوتا ہے اور دو شاخوں میں منقسم ہوکر دونوں آنکھوں کے عضلات میں جاتا ہے اور انکو حرکت دیتا ہے نیز پتلی کو سکیڑتا ہے اور بالائی پپوٹے کو حرکت دیتا ہے اسکے ماؤف ہو جانے سے بالائی پپوٹہ مسترخی ہو جاتا ہے یعنی اوپر کو اٹھ نہیں سکتا۔ نیز مریض بھینگا ہو جاتا ہے:

(۴) چرخی نما عصب عصب انتیاقی (بکری) پیتھیٹک نرو

یہ قناۃ سلویوس کے صحن سے یا اجسام رباعیہ (کارپورا کواڈرا جیمنیا) کے نیچے سے نکل کر اور خانہ چشم میں جاکر آنکھ کے بالائی ترچھے عضلہ میں ختم ہوتا اور اسکو حرکت دیتا ہے جسکا کام یہ ہے کہ جب آدمی سیدھا

Optic Nerve — Pathetic Nerve — Motor Oculi Nerve

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

دیکھتا ہے تو یہ آنکھ کو باہر اور نیچے کی طرف گھما دیتا ہے پس اسکے ماؤف ہو جانے سے آدمی بھینگا ہو جاتا ہے

(۵) تین شاخہ عصب عصب ثلاثی وجہی ٹرائی فے شل انرو ۵

یہ کل دماغی اعصاب سے بڑا ہوتا ہے اور دونوں جڑوں کے ذریعے دماغ کے چوتھے بطن کے بالائی حصہ سے شروع ہوتا ہے۔ اسکی اگلی جڑ چھوٹی اور حرکتی ہوتی ہے اور پچھلی جڑ بڑی اور حسی ہوتی ہے چونکہ اسکی ایک جڑ حسی اور دوسری حرکتی ہوتی ہے اسلیے یہ نخاعی اعصاب سے مشابہت رکھتا ہے یہ عصب چہرہ کو قوت حس چبانے کے عضلات کو قوت حرکت اور زبان کو قوت ذائقہ بخشتا ہے۔

(۶) بیرونی عضلہ چشم کا عصب عصب مبعد محلہ ۶ ایب ڈوسینس نرو ۶

یہ عصب دماغ کے چوتھے بطن کے بالائی حصے سے شروع ہو کر اور خانہ چشم میں جا کر آنکھ کے بیرونی ترچھے عضلہ میں ختم ہوتا ہے۔ اور اس کو حرکت دیتا ہے۔ اگر یہ عصب خراب ہو جائے تو آنکھ کا ڈھیلا اندر گھوم جاتا یعنی اندر کی طرف کو بھینگا پن ہو جاتا ہے۔

(۷) چہرے کا عصب عصب الوجہ فے شل نرو ۷

یہ عصب بھی چوتھے بطن کے صحن سے شروع ہوتا ہے اور کان کے عصب کے ہمراہ کان کے اندر جاتا ہے اور پھر کان سے باہر آ کر دو شاخوں میں منقسم ہو جاتا ہے یہ عصب چہرہ کے کل عضلات دہان و حلق و تالو اور کان کے عضلات کو طاقت حرکت دیتا ہے اگر یہ عصب کسی وجہ سے خراب ہو جائے تو مریض نہ تو منہ پھیلا سکتا ہے نہ سیٹی بجا سکتا ہے

(۸) کان کا عصب عصب سمع آڈی ٹری نرو ۸

یہ قوت سامعہ (شنوائی) کا خاص عصب ہے یہ دماغ کے چوتھے بطن کے صحن سے شروع ہو کر آگے بڑھ کر عصب چہرہ کے ہمراہ کان کے اندرونی سوراخ میں داخل ہوتا اور دو شاخوں میں تقسیم ہو کر اندرونی کان میں پھیلتا ہے۔ ہر قسم کی سمعی محسوسات یعنی ہر قسم کی آوازیں اسی کے ذریعے دماغ کو محسوس ہوتی ہیں نیز یہ جسم کے توازن اور اسکی رفتار کو درست رکھنے میں معاون و ممد ہے

(۹) زبان و حلق کا عصب عصب لسانی و حلقی گلوسو فرنجی ان نرو ۹

یہ عصب سر حرام مغز سے نکلتا ہے۔ زبان کے پچھلے حصے اور حلق کے غشاء مخاطی (میوکس ممبرین) کو قوت حس بخشتا ہے لیکن اس میں کچھ حرکتی ریشے بھی ہوتے ہیں جو عضلات حلق کو قوت حرکت دیتے ہیں۔

(۱۰) پھیپھڑے اور معدے کا عصب عصب راجع نیموگیسٹرک نرو ۱۰

یہ بھی حرام مغز سے شروع ہوتا ہے یہ کل دماغی اعصاب کی نسبت لمبا ہوتا ہے یہ آلات تنفس و دوران کو حس و حرکت دیتا ہے اور حلق دری و معدہ کو تیز دل کو قوت حرکت دیتا ہے یہ معدہ کی سامنی اور پچھلی سطح پر ختم ہوتا ہے اسکی گیارہ شاخیں ہوتی ہیں:

Glossopharyngeal Nerve ۹ Pneumogastric Nerve ۱۰ Facial Nerve ۷ Arbitory Nerve ۸

۵ Trifacial Nerve

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(۱۱) عضلاتِ گردن کا عصب عصب نخاعی اضافی سپائنل ایکسیسری نرو[۱]

اس عصب کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصہ تو دماغ میں سرحرام مغز سے شروع ہوتا ہے اور دوسرا حصہ گردن کے پانچویں چھٹے مہرے کے مقابل حرام مغز کے پہلوی حصہ سے شروع ہوتا ہے جو کھوپڑی میں جاکر پہلے حصے سے مل جاتا ہے اور پھر دسویں دماغی عصب کے غلاف کے اندر ہی اندر کھوپڑی سے باہر آکر گردن کے عضلات میں ختم ہوتا ہے جو کہ قوت حرکت کردیتا ہے

(۱۲) زبان کا نچلا عصب عصب تحت اللسان ہائپوگلاسل نرو[۲]

یہ عصب بھی حرام مغز سے شروع ہوتا ہے یہ زبان کے عضلات کو قوت حرکت بخشتا ہے اس عصب کے خراب ہوجانے سے متکلم لیعنی کلام کرتے یا بولنے میں اور زبان کے ہلانے میں فرق آجاتا ہے۔

(۲) اعصاب نخاعی

اردو نام: حرام مغز کے پٹھے — عربی نام: اعصاب نخاعیہ — انگریزی نام: سپائنل نروز Spinal Nerves

یہ اعصاب حرام مغز سے شروع ہوتے ہیں۔ اور تعداد میں اکتیس[۳۱] جوڑے ہوتے ہیں جن میں سے آٹھ جوڑے گردن میں، بارہ جوڑے پشت میں پانچ جوڑے کمر میں پانچ عجز یا ڈھڈی میں اور ایک جوڑا دمچی کی ہڈی میں ہوتا ہے۔ ہر ایک عصب اگلی اور پچھلی دو جڑ کے ذریعے شروع ہوتا ہے۔ ان میں سے اگلی جڑ قوت حرکت کی ہوتی ہے اور پچھلی جڑ قوت حس کی پچھلی جڑ پر ایک عقدہ گنگلیان ہوتی ہے اس گرہ سے باہر کی طرف دونوں جڑیں باہم ملکر نخاعی عصب بناتی ہیں جو ریڑھ کی ہڈی کے سوراخوں سے باہر آکر دو حصوں میں منقسم ہوجاتا ہے ان سب نخاعی اعصاب کے اگلے حصے جسم کی اگلی سطح اور اعضا میں قوت حس و حرکت دیتے ہیں۔ اور پچھلے حصے جسم کی پچھلی سطح میں گردن کا پہلا عصب اور دمچی کا عصب دو شاخوں میں منقسم نہیں ہوتے اور پشت کے نخاعی اعصاب کے اگلے حصے اپنی جائے اختتام تک دوسرے سے علیحدہ رہتے ہیں مگر دیگر نخاعی اعصاب کے اگلے حصے ایک دوسرے کے ساتھ ملکر جال بناتے ہیں:

(۱) گردن کے پٹھے اعصاب العنق سروائیکل نرو[۳]

یہ اعصاب تعداد میں آٹھ ہوتے ہیں۔ انکی پچھلی جڑیں اگلی جڑوں کی نسبت تین گنا موٹی ہوتی ہیں پہلے دوسرے تیسرے اور چوتھے اعصاب کے اگلے حصوں کی شاخیں باہم ملکر ایک عصبی جال بناتی ہیں جسکو گردن کا جال اور صغیرہ عنقیہ۔ سروائیکل پلیکسس کہتے ہیں اس میں سے بہت سی شاخیں نکل کر اور شاخ در شاخ ہوکر کھوپڑی کی جلد گدی، چہرے، بیرونی کان، ہنسلی کندھے اور حجاب حاجز میں پھیل کر قوت حس و حرکت دیتی ہیں۔ گردن کے پانچویں چھٹے۔ ساتویں اور آٹھویں اعصاب اور پشت کے پہلے عصب کی شاخوں

---

[۱] Hypoglosial Nerve [۲] [۳] Cervical

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کے باہم ملنے سے کندھے اور بازو کا عصبی جال بنتا ہے جسکو بازو کا عصبی جال (صفیرۂ عضدیہ) برے کیل کس کہتے ہیں جسکی ۱۲ شاخیں نکلتی ہیں جو بغلی کے نیچے سینے کندھے کے عضلات اور جلد، بازو اور کلائی کے درمیانی اور اندرونی مقامات میں جاتی ہیں کلائی والی دونوں شاخیں پھر شاخ در شاخ ہو کر ہاتھ اور انگلیوں میں جاتی ہیں

(۲) پیٹھ کے پٹھے اعصاب ظہریہ ڈارسل نرو ز [1]

یہ نخاعی اعصاب بارہ جوڑے سے ہوتے ہیں۔ انکی جڑیں بہت چھوٹی چھوٹی اور نازک ہوتی ہر ایک عصب مہروں کے سوراخ سے باہر نکلکر دو شاخوں میں منقسم ہوتا ہے جن میں سے اگلی شاخ کو پسلی کا عصب اور پچھلی کو پشت کا عصب کہتے ہیں یہ سب اعصاب سینے اور شکم کے عضلات اور جلد میں حس و حرکت کرتے ہیں۔

(۳) کمر کے پٹھے اعصاب قطنی لمبر نرو ز [2]

یہ اعصاب پانچ جوڑے ہوتے ہیں۔ ہر ایک عصب دو شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جن میں سے اگلی چار شاخیں باہم ملکر کمر کا جال (صفیرۂ قطنیہ۔ لمبر پلیکس) بناتی ہیں اور چوتھے عصب کی ایک شاخ پانچویں عصب کی شاخ سے ملکر ڈھڈی کا جال (صفیرۂ عجزیہ۔ سیکرل پلیکس) بناتے میں شامل ہوتی ہے۔ ان اعصاب کی شاخیں۔ کمر۔ سرین۔ پیڑو۔ اعضائے تناسل کے عضلات اور جلد میں حس و حرکت دیتی ہیں اور نیز انکی جلدی شاخیں جانگ اور ٹانگ کی جلد میں جاتی ہیں۔

(۴) چوتڑ اور دُمچی کے پٹھے اعصاب عجزیہ و عصب عصعصی سیکرل اینڈ کاکجل نرو ز [3]

چوتڑ کی ہڈی کے متعلق پانچ جوڑے اعصاب اور دُمچی کی ہڈی کے متعلق صرف ایک جوڑا عصب ہوتا ہے چوتڑ کی ہڈی کے پہلے دو سوراخ اور تیسرے اعصاب کے اگلے حصے اُوپر کی طرف کمر اور نشستگاہ کی عصبی ڈوری بناتے ہیں اور نیچے کی طرف چوتھے عصب سے ملکر چوتڑ کا عصبی جال (صفیرۂ عجزیہ سیکرل پلیکس) بناتے ہیں چوتڑ کے عصبی جال سے چھ شاخیں نکلتی ہیں۔ جن میں سے آخری شاخ جسم کے دیگر کل اعصاب سے موٹی اور بڑی ہوتی ہے یہ آخری دونوں شاخیں اور کئی شاخوں میں منقسم ہو کر جانگ ٹانگ اور پاؤں کے عضلات اور جلد میں حس و حرکت پہنچاتی ہیں۔

(۵) پیڑو کا چھوٹا پٹھا عصب ورکی صغیر سمال شیاٹک نرو [4]

یہ نشستگاہ کے عصبی جال سے شروع ہو کر چوتڑ کی ہڈی کے سوراخ کے راستے پیڑو سے باہر آتا ہے اور جانگ کی پچھلی سطح کو طے کر کے گھٹنے کے جوڑ کی پچھلی طرف پہنچتا ہے وہاں سے پنڈلی کے وسط پر پہنچکر آخری دو شاخوں میں منقسم ہو جاتا ہے جو پنڈلی کی جلد میں ختم ہوتی ہیں اس عصب کی شاخیں سرین کے عضلات اور جلد و فوطے ران کے بیرونی حصے اور پنڈلی کی جلد میں آتی ہیں۔

(۶) پیڑو کا بڑا پٹھا عصب ورکی کبیر گریٹ شیاٹک نرو [5]

یہ عصب جسم کے دیگر کل اعصاب کی نسبت بڑا ہوتا ہے اور ۱۳ انچ موٹا ہوتا ہے نشستگاہ کے عصبی جال سے شروع ہو کر چوتڑ

Great Sciatic Nerve

[1] Dorsal Nerve [2] Lumbar Nerves [3] Sacral Cocygeal Nerves [4]

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کی ہڈی کے سوراخ کے راستے پیڑو سے باہر آکر جانگ کی بیرونی اور پچھلی سطح کے درمیان نیچے کو جاکر زیرین ثلث میں پہنچکر دو شاخوں (۱) گھٹنے کا بیرونی عصب اور (۲) گھٹنے کا اندرونی عصب میں منقسم ہو جاتا ہے اور عصب کی شاخیں کولھے کے جوڑ اور گھٹنے میں جاتی ہیں۔

(۷) گھٹنے کا اندرونی پٹھا عصب مابضی السی انٹرنل پاپلیٹل نرو

یہ عصب پیڑو کے بڑے عصب سے شروع ہوتا ہے اور اپنے ہمنام بیرونی عصب سے بڑا ہوتا ہے یہ گھٹنے کے جوڑ کے نیچے جاکر پنڈلی کا پچھلا عصب کے نام سے موسوم ہو جاتا ہے اس عصب سے تین قسم کی شاخیں نکلتی ہیں۔

(۸) گھٹنے کا بیرونی پٹھا عصب مابضی وحشی ایکسٹرنل پاپلیٹل نرو

یہ گھٹنے کے اندرونی پٹھے کی نسبت چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ عظم شظیہ (ٹانگ کی بیرونی ہڈی) کی گردن تک پہنچ کر دو شاخوں میں منقسم ہو جاتا ہے۔ جو ٹانگ کے عضلات اور جلد میں جاتی ہیں۔

(۹) پنڈلی کا پچھلا پٹھا عصب قصبی خلفی انٹرنل پاپلیٹل نرو

یہ گھٹنے کے اندرونی عصب سے شروع ہو کر نیچے کو جاکر اندرونی ٹخنے اور ایڑی کے درمیانی مقام پر پہنچ کر تلوے کی اندرونی اور بیرونی دو شاخوں میں منقسم ہو جاتا ہے اور پھر شاخ در شاخ ہو کر ٹخنے کے جوڑ پاؤں کے تلوے کی جلد اور پاؤں کی انگلیوں وغیرہ میں جاتی ہیں۔

(۱۰) پنڈلی کا بیرونی پٹھا عصب مابضی وحشی ایکسٹرنل پاپلیٹل نرو

یہ پیڑو کے بڑے عصب سے شروع ہو کر ترچھے طور پر باہر کو جاکر پنڈلی کے بالائی حصے میں دو شاخوں پنڈلی کا گلا عصب اور (۲) عضلاتی جلدی عصب میں منقسم ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اس عصب کی اور تین قسم کی شاخیں ہوتی ہیں جن میں سے ایک قسم کی گھٹنے کے جوڑ کے اوپر نیچے اور باہر جاتی ہیں۔ دوسری قسم کی ٹانگ کی پچھلی اور باہر والی جلد میں جاتی ہیں اور تیسری قسم کی دوسرے اعصاب کی شاخوں سے مل جاتی ہیں۔

(۱۱) پنڈلی کا رامنا پٹھا عصب قصبی متقدم ایمن نیئر ٹیبیل نرو

یہ عصب گھٹنے کے بیرونی عصب سے شروع ہو کر پنڈلی کی اگلی سطح پر سے نیچے جاکر ٹخنے کے جوڑ کے سامنے دو شاخوں میں منقسم ہو جاتا ہے جو پھر دو شاخوں میں منقسم ہو کر ٹخنے اور پاؤں کے اندرونی و بیرونی سطح کی جلد میں جاتی ہیں۔

(۳) اعصاب شرقی Sympathetic Nerves

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
اعصاب ہمدردی	اعصاب شرکیہ	سمپے تھے ٹک نروز

نوٹ (۱) اعصاب شرکیہ کو پہلے ایک علیحدہ عصبی نظام خیال کرتے تھے لیکن اب یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ اعصاب شرکیہ بھی نخاعی اعصاب کی حشوی شاخیں ہیں جو کہ استناد میں جاتی ہیں فرق صرف اسقدر ہے کہ ان میں میڈولیٹڈ ریشے بکثرت

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

پائے جاتے ہیں اور ان کے متعلق عصبی عقد کثرت اور الگ الگ ہوتے ہیں۔ کیونکہ اعصاب مرکبہ کی راہ میں مختلف عصبی جوان اعصاب کی عصبی مراکز کہلاتی ہیں متصل ہوتی ہیں (۲) ان اعصاب کو اعصاب شرکیہ اسلئے کہتے ہیں کہ بقول اطباء یونانی جسم کے اعضاء کی باہم شرکت انہی اعصاب کے ذریعے ہوتی ہے اور بعض امراض۔ امراض شرکیہ کا اثر دور کے اعضاء پر انہیں اعصاب کے ذریعہ پہنچ جاتا ہے اور چونکہ جسم کے اکثر طبعی افعال میں یہی اعصاب مؤثر ہوتے ہیں اسلیے انہیں اعصاب افعال طبعیہ بھی کہتے ہیں۔

اعصاب شرکیہ کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ اور ہر ایک قسم عصبی مراکز اور عصبی ریشوں سے مرکب ہے۔

قسم اول میں عصبی عقد کے دو سلسلے یا لڑیں (گلینگلی یٹیڈ کارڈز) اور انکی شاخیں شامل ہیں جو کھوپڑی کی جڑ سے شروع ہو کر دمچی کی ہڈی تک جاتی ہیں اور مہروں کے ستون کے سامنے ان کے ہر دو پہلوؤں پر واقع ہیں۔ نیز ان اعصاب شرکیہ کے وہ جال (پری ورٹی برٹی پلیکس سس) اور انکے عقد (گینگلیان) بھی شامل ہیں جو کہ احساء صدری وبطنی سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً ضغیرہ قلبیہ (کارڈی ٹیک پلیکس) اور اسی قسم میں دو چھوٹے عصبی عقد بھی شامل ہیں جو کہ پانچویں دماغی عصب کی ان شاخوں کیساتھ متصل ہیں جو کہ سر اور گردن کے قریب وجوار میں منقسم ہیں مثلاً عقدہ عنبیہ (اَفتھلمک گینگلیان) عقدہ اذنیہ (اوٹک گینگلیان) عقدہ نذیہ وحنکیہ (سفینو پیلیٹائن گینگلیان) اور عقدہ تحت الفک (سب میگزلری گینگلیان)۔

قسم دوم میں نخاعی اعصاب کی پچھلی حسی جڑوں کے تمام عقد شامل ہیں نیز اس میں وہ عقد بھی شامل ہیں جو کہ عصب سمعی دہلیزی (اکوسٹو جیس) اور عصب راسع (گلوسو فیرنجیل) اور پانچویں دماغی عصب کی بڑی جڑ (گیسیرین گینگلیان) واقع ہیں۔

یہ تمام عصبی عقد اپنی ساخت میں باہم مشابہ ہوتے ہیں کیونکہ ان تمام عقدہ میں (۱) عصبی ریشے دوسرے مراکز سے آکر گزرتے ہیں (۲) کچھ عصبی ریشے ان سے پیدا ہو کر دیگر مقامات میں جاتے ہیں (۳) کچھ عصبی یا عقدی ذرات ہوتے ہیں جن سے کہ یہ عصبی ریشے پیدا ہوتے ہیں (۴) دیگر عصبی جواہر یا جسمات ہوتے ہیں جو آزاد رہتے ہیں یعنی ان سے عصبی ریشے نہیں نکلتے اسی طرح شرکیہ اور انکی شاخوں میں تین قسم کے ریشے پائے جاتے ہیں ایک وہ جو خاص ان عصبی عقدہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ جو دماغی ونخاعی اعصاب سے پیدا ہوتے ہیں اور تیسرے وہ جو دماغ اور زیادہ تر نخاع سے پیدا ہوتے ہیں اور اپنے اعصاب کی جڑوں کیساتھ ساتھ جاتے ہیں۔

(۱) دماغی اعصاب پر جو عقد پائے جاتے ہیں۔ ان سے اعصاب شرکیہ کے بعض ریشے نکل کر دماغ کی طرف جاتے ہیں اور بعض ریشے دماغ سے ان عقائد کی طرف بھی جاتے ہیں۔ لیکن ان عقد کے ریشے زیادہ تر دیگر ساختوں اور اعضاء میں پھیلتے ہیں جن میں سے بعض محرک اور بعض حساس ہوتے ہیں پس اس طرح سے ہر ایک عصبی گویا ایک مستقل عصبی مرکز ہوتا ہے (۲) نخاعی اعصاب کے عقد سے جو ریشے نکلتے ہیں۔ ان میں سے کچھ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تو اسکی پچھلی شاخوں کیساتھ چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ اسکی ان شاخوں کیساتھ جاتے ہیں۔ جنکے ذریعے نخاعی اعصاب شرقی اعصاب سے متصل ہیں اور (۳) اعصاب شرکیہ کے مخصوص عقدیں سے جو ریشے نکلتے ہیں ان میں سے بعض سیدھے احشاء کی طرف چلے جاتے ہیں اور بعض ان شاخوں کی طرف چلے جاتے ہیں جو ان کو نخاعی اعصاب سے ملاتی ہیں جنکو فروغ واصلہ (ریسمائی کمیونی کینٹر) کہتے ہیں۔ پھر یہ نخاعی اعصاب کی شاخوں کیساتھ جاکر انکے ساتھ ہی اعضاء میں منتشر ہو جاتے ہیں پس مذکورہ بالا بیان سے صاف ظاہر ہے۔ کہ اعصاب شرکیہ میں دماغی و نخاعی اعصاب کے کچھ نہ کچھ ریشے ضرور پائے جاتے ہیں لیکن عقد کے جو اعصاب نکلتے ہیں ان میں اعصاب شرکیہ کے ریشے نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں:

اعصاب شرکیہ کے افعال و وظائف

دماغی و نخاعی اعصاب کی طرح اعصاب شرکیہ بھی مختلف تاثرات کو منتقل کرتے ہیں اور وہ دماغ و نخاع کی عقد شرکیہ بھی جو کہ عصبی مرکز کی مانند ہیں۔ تاثرات کو دیگر مراکز عصبیہ تک پہنچاتے اور انہیں منتقل بھی کرتے ہیں پس عصبی عقد کے افعال مراکز عصبیہ کے مذکورہ افعال کے مشابہ ہی ہوتے ہیں کیونکہ ہر عصبی عقد اپنے تمام حرکتی ریشوں کیساتھ گویا ایک مختصر سا عصبی سلسلہ ہوتا ہے جس سے تمام وہ عصبی افعال انجام پاتے ہیں جنکا تعلق عقل و ارادہ سے نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف اعصاب شرکیہ سے ہوتا ہے جن افعال میں اعصاب شرکیہ مؤثر ہیں۔ وہ بظاہر یہ تین ہیں (۱) حرکت طبعیہ (۲) تولید رطوبت (۳) تغذیہ (۱) حرکت طبعیہ۔ وہ اعضاء جن میں دماغی و نخاعی اعصاب جاتے ہیں ان میں کہیں حرکت اختیاری ہوتی ہے اور کہیں حرکت طبعی یا غیر اختیاری مثلاً حرکت تنفس و دیگر حرکات منعکسہ مگر وہ اعضاء جنمیں زیادہ تر اعصاب شرکیہ جاتے ہیں انمیں فقط حرکت طبعی یا حرکت غیر اختیاری ہوتی ہے انمیں حرکت اختیاری بالکل نہیں ہوتی۔ البتہ انفعالات نفسانیہ مثلاً غصہ خوشی اور غم وغیرہ میں یہ حرکات ہیں قلب معدہ اور آنتوں کی حرکات جو کہ محض طبعی حرکات ہیں مذکورہ بالا بیان کی بہترین مثالیں ہیں۔ قلب اور معدہ میں اگرچہ زیادہ تر عصب راجع (ویمو گیسٹرک نرو) سے شاخیں آتی ہیں مگر یہ شاخیں چونکہ راجع کے عقد سے آتی ہیں لہٰذا انہیں بھی اعصاب شرکیہ میں سے شمار کیا جاتا ہے۔

نوٹ:۔ وہ اعضاء جن میں اعصاب شرکیہ محرک ہوتے ہیں جب انہیں دیگر اعصاب شرکیہ کے سلسلہ سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے بلکہ جسم سے باہر نکال لیا جاتا ہے تب بھی وہ اعضاء کچھ دیر تک حرکت کرتے رہتے ہیں۔ اگرچہ یہ حرکت پہلے کی نسبت زیادہ کمزور ہوتی ہے چنانچہ جب دل کو جسم سے نکال لیا جاتا ہے۔ تو دودھ پلانے والے جانوروں میں دل کی ترپ صرف ایک دو منٹ تک قائم رہتی ہے لیکن رینگنے والے جانوروں اور ہوا و پانی دونوں میں زندگی بسر کرنیوالے جانوروں مثلاً مینڈک وغیرہ کے دل کی حرکت بعض اوقات چند گھنٹوں تک قائم رہتی ہے۔ امعاء کی حرکت دودیہ (پیری سٹالٹک شتر) کا بھی یہی حال ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ جن اعضاء میں اعصاب شرکیہ پھیلتے ہیں انکی حرکت کسی حد تک مستقل اور آزاد ہوتی ہے یعنی دماغ اور نخاع کی محتاج نہیں ہوتی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تولید یا تراوش رطوبت پر بھی اعصاب کا اور بالخصوص اعصاب تحریکیہ کا بہت کچھ اثر ہوتا ہے کیونکہ اعصاب تحریکیہ کے اثر سے خون کی باریک رگیں تنگ ہو جاتی ہیں یا پھیل جاتی ہیں جس سے رطوبت پیدا کرنیوالی غدد مثلاً غدد دلعابیہ یا گردے وغیرہ میں خون کی آمد و رفت کم و بیش ہو جاتی ہے نیز ان کا اثر براہ راست غدد و مفرزہ پر بھی ہوتا ہے چنانچہ جب لقمہ منہ میں ڈالا جاتا ہے تو لعاب دہن زیادہ پیدا ہونے لگتا ہے آدمی جب غذا کا اثر متخیل کرتا ہے تو منہ میں پانی بھر آتا ہے دودھ پلانے والی مہربان ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کا خیال کرتی ہے تو بعض اوقات فرط محبت سے دودھ اسکی چھاتیوں سے ٹپکنے لگتا ہے کبھی انفعالات نفسانیہ سے دودھ کی نہ صرف کمیت پر اثر پڑتا ہے بلکہ اس کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے مثلاً رنج و ملال اور غم و غصہ سے کبھی ماں کے دودھ کی کیفیت اسقدر بگڑ جاتی ہے کہ دودھ بچے کیلئے نہایت مضر ثابت ہوتا ہے بلکہ بقول ڈاکٹر کارپنٹر کبھی ایسا زہریلا دودھ نتھنے بچے کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ **قوت تغذیہ** میں بھی اعصاب کا اثر دخل ہے اس فعل میں اعصاب دماغیہ و نخاعیہ اور اعصاب شرکیب شریک ہوتے ہیں اور کبھی اس فعل میں بھی اعصاب دماغی و نخاعی اور شرکی باہم اثر کرتے ہیں۔ اور کبھی صرف ایک ہی قسم کے نیز اس فعل میں اعصاب حسی بھی شریک ہیں۔ اور اعصاب حرکت بھی چنانچہ جب اعصاب حرکت کی اذیت یا آفت سے تغذیہ میں نقص آجاتا ہے تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس عضو کی ریاضت یا حرکت بند ہو جاتی ہے اور وہ عضو بیکار ہو جاتا ہے اور جب صرف اعصاب حسی کی خرابی سے تغذیہ میں نقص آتا ہے تب وہ ان اعصاب کی طرف ہی منسوب کیا جاتا ہے۔ وغیرہ۔

حواس

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
حواس	حواس	سینسز Senses
حواس	حواس	سینسیشنز Sensations

نوٹ:۔ حواس جمع ہے حاسہ کی جس کے معنی ہیں احساس و ادراک کرنیوالی قوت یعنی قوت حس۔

تمام ظاہری و باطنی اثرات و احساسات حواس کے ذریعے ہی محسوس و معلوم ہوتے ہیں یعنی انسان اپنے گرد و پیش کی موجودات واقعات اور انکی ماہیت و حقیقت کو بلکہ خود اپنی ہستی کو حواس کے ذریعے ہی محسوس و معلوم کرتا ہے۔ بغیر حواس کے اس کو کسی بات کا علم نہیں ہو سکتا اگر حواس کلیتہً زائل ہو جائیں تو پھر حیات ممکن نہیں چنانچہ سکر شراب وغیرہ سے یا دماغ پر سخت چوٹ وغیرہ لگنے سے جب بیہوشی واقع ہوتی ہے۔ تو حواس معطل ہو جاتے ہیں اور دماغ پر کسی تاثر یا تحریک کا اثر نہیں ہوتا پس آدمی بیہوش اور بے خبر پڑا رہتا ہے لہٰذا حواس کے ذریعے ہی عقل بیرونی اشیاء کی موجودگی اور اپنے بدن کی حالت سے باخبر اور مطلع ہوتی ہے اور درحقیقت عقل

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اعصاب ہی کو کیفیت سے متصل ہوتی ہے اور یہ کیفیت اعصاب میں بیرونی اجسام سے پیدا ہوتی ہے۔ بیرونی اجسام کی کیفیت براہِ راست نفس یا عقل میں نہیں پہنچتی ؛

حواس دو قسم کے ہوتے ہیں ایک حواس عامہ (کامن سینس) اور دوسرے حواس خاصہ (سپیشل سینسز) جنکو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔

حواس عامہ۔ وہ حواس ہیں جو جسم کے کسی خاص حصہ میں بتین طور پر محدود نہیں کئے جا سکتے مثلاً تکان۔ بے چینی۔ ضعف۔ سیری۔ بھوک۔ پیاس وغیرہ۔ نیز وہ احساسات جو کہ اخراج فضلات کیلئے مختلف اعضاء سے محسوس ہوتے ہیں۔ مثلاً اخراج بول و براز وغیرہ کی حاجت یا اخراج جنین کی حاجت یہ سب بھی حواس عامہ کی تحت میں آجاتے ہیں۔ خارش۔ سرسراہٹ۔ گدگداہٹ سوزش اور درد وغیرہ کے احساسات جو اگرچہ قوت لامسہ سے متعلق ہیں۔ لیکن وہ سب بھی اسی ضمن میں شمار کیے جاتے ہیں ؛

اکثر مذکورہ بالا حواس عامہ اور قوت لامسہ کے درمیان ایک صریح یا ممتاز حد فاصل قائم کرنا محال ہے کیونکہ قوت لامسہ حواس عامہ اور حواس خاصہ کے سلسلہ کی درمیانی کڑی ہے قوت لامسہ اگرچہ عام طور پر حواس خاصہ کے ساتھ شمار کی جاتی ہے اور انہیں کے ساتھ اس کا بیان کیا جاتا ہے تاہم یہ ان سے مختلف ہے اسلیے یہ بہت سے اعصاب کیلئے مشترک ہے یعنی تمام نخاعی حسی اعصاب کے لیے عصب راجع عصب لسانی و حلقی اور پانچوں دماغی اعصاب کیلئے پس اس اعتبار سے اس کے تاثرات بہت سے اعضاء کے ذریعے دماغ تک پہنچتے ہیں :

حواس عامہ کے درمیان حس عضلی (مسکولر سینس) کو بھی شامل کرنا چاہیے اسی حس کے ذریعے ہمیں عضلات جسم کی انعاظی و انبساطی حالت کا علم ہوتا ہے۔ اور مختلف امورات مثلاً کھڑے ہونا۔ چلنا پکڑنا وغیرہ میں ان سب کی مناسب ترتیب کی ضرورتی اطلاع حاصل ہوتی ہے اسی کے ذریعے ہم مختلف اوزان میں معمولی نرقی کو بھی تمیز کر سکتے ہیں مثلاً ایک ہاتھ میں دس چھٹانک اور دوسرے میں ۱۰½ چھٹانک وزن ہو تو ہم منٹ سے اس فرق کو بھی تمیز کر لیتے ہیں اس حس عضلی کو حس اتصال یعنی ملاء اور حس ثقل یعنی دباؤ سے باضابطہ امتیاز کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم زمین کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہی حس اتصال (کانٹیکٹ) یا حس ثقل یا دباؤ ہے جو ہمارے جسم کے وزن سے ہمارے پاؤں زمین زمین کے ساتھ رہنے سے محسوس ہوتی ہے یہ دونوں قوتیں پاؤں کے تلوے کی جلد سے اخذ کی جاتی ہیں اب ہم اگر پاؤں کے انگوٹھے کے بل کھڑے ہو جائیں تو ہمیں حس عضلی کا علم ہوتا ہے جو کہ پنڈلی کے عضلات کے تنے تناؤ سے محسوس ہوتی ہے ؛

1 Common Senses

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

حواس خاصہ۔ (یا حواس ظاہرہ) کل پانچ ہیں (۱) قوت باصرہ (۲) قوت شامہ (۳) قوت سامعہ (۴) قوت ذائقہ (۵) قوت لامسہ ۔

حواس عامہ وخاصہ کا فرق۔ حواس عامہ اور حواس خاصہ کے درمیان بہت بڑا فرق ہے کہ حواس عامہ کے ذریعے ہم اپنے جسموں کے مختلف اعضاء کے خاص حالات سے مطلع ہوتے ہیں اور حواس خاصہ کے ذریعے ہمیں بیرونی دنیا کا علم بھی حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم حس الم اور حس لمس کا مقابلہ کریں تو یہ فرق صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک تیز چاقو کی دھار کو جلد پر رکھیں تو ہم حس لامسہ کے ذریعے اسکو محسوس کرتے ہیں اور اس احساس کو ہم اس چیز کی طرف منسوب کرتے ہیں جس سے کہ وہ پیدا ہوتا ہے لیکن جب ہم چاقو سے جلد کاٹ دیتے ہیں۔ تو ہم فوراً درد کا احساس کرتے ہیں ایک ایسا احساس کہ جسکو ہم کاٹنے والے چاقو کی طرف منسوب نہیں کرتے بلکہ اسکو ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اور جو ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کرتا ہے۔ کہ ہمارے اپنے جسم کی حالت میں ایک تغیر آگیا ہے یعنی زخم ہوگیا ہے۔ درد کے احساس سے ہم نہ تو درد پیدا کرنیوالی چیز کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اور نہ اسکی ماہیت کو معلوم کر سکتے ہیں ۔

مراکز حواس (سین سوریم) علامات و دلائل جسکا مطالعہ کرنے میں بخوبی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ مراکز حواس دماغ ہے اور کوئی عضو مثلاً آنکھ یا کان وغیرہ نہیں کہ جس کے ذریعے حسی تاثر موصول ہوتا ہے اگرچہ عام محاورہ میں یہ کہا جاتا ہے۔ کہ ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ کان سے سنتے ہیں وغیرہ لیکن درحقیقت یہ اعضاء ان تاثرات کو قبول کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ جو کہ اعصاب بصر وسمع کے ذریعے مرکز حواس یا دماغ کو بھیجے جاتے ہیں۔ اور وہاں پر وہ احساس پیدا کرتے ہیں چنانچہ اگر عصب بصارت (آپٹک نرو) کاٹ دیا جائے تو باوجود اس امر کے کہ آنکھ بالکل سلامت ہوتی ہے۔ لیکن بصارت یا بینائی زائل ہو جاتی ہے کیونکہ اب عصب بصارت کے منقطع ہو جانے سے حس بصارت دماغ تک نہیں پہنچتی۔ اسلئے اسکا احساس وادراک نہیں ہوتا۔ جب کسی خاص حس کا احساس ہوتا ہے تو اسکے متعلق جو کچھ ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں وہ صرف یہی ہے کہ دماغ میں مرکز حواس (سین سوریم) متاثر ہوا ہے۔ اور اگر اس کا سبب محرک کوئی خارجی چیز یا بیرونی محسوس ہو۔ جیسا کہ بالعموم ہوا کرتا ہے۔ تو اسکو احساس ظاہری (ایکسٹیرو سین سیشن) کہتے ہیں۔ اور اگر خود دماغ میں کسی قسم کی تحریک ہو کر مرکز حواس متاثر ہو تو اس کو احساس باطنی (اب جیکٹو سین سیشن) کہتے ہیں تمام باطنی احساسات یعنی اندرونی محسوسات اصل مرکز کی طرف منسوب نہیں ہوتے بلکہ نفس کے معتاد ہو جانے کے سبب یا عقل و دانش کی وجہ سے وہ بالعموم بیرونی اجسام کیطرف ہی منسوب کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر حواس ظاہرہ یا حواس خمسہ اندرونی اسباب سے بھی متاثر ہوں۔ تب بھی یہی خیال کیا جاتا ہے۔ کہ زیادہ بیرونی اسباب سے متاثر ہوتے ہیں پس عقل کو انکے احساس

Special Senses Contact Pressure ۲ Sensorium

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

وادراک میں دھوکا (الیوژن) لگتا ہے۔ چنانچہ بحالت طنین وددی (ٹناٹس آریم) یعنی جب کان بجتے ہیں یا کانوں کے اندر سے ہی سائیں سائیں کی آواز آتی ہے۔ تو وہ بھی ایسی معلوم ہوتی ہے گویا کسی دور کے مقام سے آرہی ہے۔ اسی طرح سے وہم بصری (آپٹک الیوژن) میں بے جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں چنانچہ بیابان یا بیابان خمری کی حالت میں عجیب عجیب سے۔ اور مہیب وہمی اشکال دکھائی دیا کرتے ہیں جن کا خارج میں درحقیقت کوئی وجود نہیں ہوتا اسکی وجہ صرف یہی ہے کہ عصب بصر ... کے طور پر اس قسم کے صورت واشکال کو باہر ہی سے قبول کیا کرتی ہے۔ اسی طرح سے قوت شامہ بھی کبھی اندرونی اسباب سے متاثر ہوتی ہے۔ چنانچہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ باہر کوئی بو دار چیز موجود نہیں ہوتی۔ لیکن انسان وہم شمی (انفیکٹری الیوژن) سے اپنے ناک میں بو کا احساس کرتا ہے اسی طرح سے قوت لامسہ کے اعصاب بھی اندرونی اسباب سے متاثر ہوتے ہیں جیسا کہ درد تشنج وغیرہ میں۔

حواس وہمی: یا تصورات کاذبہ (الیوژنز) کے اندرونی اسباب میں سے ایک سبب اجتماع خون ہے جو کہ تمام حواس میں انکے احساسات کو پیدا کرتا ہے چنانچہ شبکیہ (ریٹی نا) میں اجتماع خون سے آنکھوں میں باوجود ان کے بند ہونے کے روشنی اور چمک محسوس ہوتی ہے عصب سامع میں یا کان کے اندر اگر اجتماع خون ہو تو کانوں وغیرہ میں شائیں شائیں وغیرہ کی آوازیں آتی ہیں عصبہ شامہ یا ناک کے پٹھے میں اجتماع خون ہو تو مختلف قسم کی بوئیں آتی ہیں۔ قوت لامسہ کے اعصاب میں اجتماع خون ہو تو درد کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب کوئی مخدر زہر خون میں داخل کیا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی تمام حواس کے اعصاب میں تحریک ہو کر مخصوص علامات پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ آنکھوں کے سامنے روشنی کے شرارے دکھائی دیتے ہیں۔ کان بجتے ہیں یعنی انہیں مختلف قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور جسم پر چیونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوتی ہیں اسی طرح سے بیرونی اسباب میں سے بجلی کا صدمہ اور صدمہ دماغ ہے۔ یعنی دماغ اگر ہل جائے یا اس پر دباؤ پڑے یا ان حواس پر ضرب لگے تو آنکھوں میں روشنی اور مختلف رنگ دکھائی دیتے ہیں۔ کانوں میں زور کی آوازیں سنائی دیتی ہیں زبان میں نمکین یا ترش ذائقہ محسوس ہوتا ہے اور دیگر اعضاء جسم میں پھڑکتا ہوا درد وغیرہ معلوم ہوتا ہے۔

تجربات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حواس خاصہ کے اعصاب میں سے کسی ایک میں بھی اپنی خاص قوت حس کے سوا عام قوت حس نہیں ہوتی۔ چنانچہ ڈاکٹر مجنڈی نے اس امر کا مشاہدہ کیا کہ ایک کتے کے اعصاب شامہ کو برہنہ کر کے جب ان میں سوئی چبھوئی گئی تو کتے نے کسی قسم کے درد کی علامات کا اظہار نہ کیا اور اس کے دیگر تجربات اس امر کے شاہد ہیں کہ شبکیہ یا عصبہ مجوفہ میں بھی درد کا احساس نہیں ہوتا علاوہ ازیں جب عصبہ مجوفہ کو طبقہ شبکیہ سے منقطع کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر عصبہ مجوفہ میں روشنی کی تحریک کا بھی احساس نہیں ہوتا کیونکہ یہ احساس تو صرف شبکیہ میں ہی ہوتا ہے۔ اور پھر دماغ کے توسط سے نفس یا عقل کو اس کا ادراک ہوتا ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

احساس حرکت: خود حرکت کی طرح احساس حرکت بھی دو قسم کا ہوتا ہے ایک قدری یعنی اور دوسرے تموجی تدریجی حرکت کے احساس کی قوت زیادہ تر حواس باصرہ و لامسہ و ذائقہ میں ہوتی ہے یعنی تدریجی حرکات خاص طور پر قوت لامسہ اور قوت ذائقہ سے محسوس ہوتی ہیں۔ چنانچہ جب آنکھ کے پردہ شبکیہ (ریٹی نا) پر کسی متحرک جسم کا عکس ایک مقام پر پڑ کر اس کے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ تو اس عکس یا تصویر کی حرکت سے عقل بیرونی جسم کی حرکت کو سمجھ لیتی ہے۔ یہی حال قوت لامسہ اور قوت ذائقہ کا ہے کیونکہ ان میں بھی سطح عضو پر احساس ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ لیکن حرکت نموجی یا ارتعاشی مثلاً گاڑیوں کی حرکت وغیرہ کا احساس خاص طور پر قوت لامسہ و سامعہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس قسم کی حرکات کی آواز سے قوت سامعہ اور قوت لامسہ زیادہ متاثر ہوتی ہے۔

احساس مادی تغیرات: کیمیاوی یا مادی تغیرات کا احساس قوت ذائقہ قوت لامسہ اور قوت شامہ سے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن بخارات کی مانند اڑنے والے اجسام مثلاً عطر یا مشک یا کافور وغیرہ جو اعضاء میں مادی تغیرات پیدا کر کے اثر کرتے ہیں۔ وہ زیادہ تر قوت شامہ سے محسوس ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض مواد تو صرف اسی قوت سے محسوس ہوتے ہیں۔ دیگر حواس سے انکا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ مثلاً بعض معدنیات اور رصاص یا قلعی کا دھواں وغیرہ اور بعض اڑنے والے مواد صرف قوت شامہ سے ہی محسوس نہیں ہوتے بلکہ قوت ذائقہ و قوت لامسہ سے بھی محسوس ہوتے ہیں۔ مثلاً پسی ہوئی رائی کے انجرات یا کاٹے ہوئے پیاز کی گٹھلیوں کی دھانس وغیرہ جو سونگھائی بھی دیتے ہیں۔ ان کا مزا بھی معلوم ہوتا ہے اور آنکھ کے طبقہ ملتحمہ اور پھیپھڑوں کی اندرونی جھلی کی قوت لامسہ کو بھی متنبہ اور خبردار کرتے ہیں۔

محسوسات و ادراک: اپنے محسوسات کو ہمیشہ بیرونی اسباب کی طرف منسوب کرنے کی عادت سے ہم ان مختلف کیفیات کو بھی جو کہ بیرونی اشیاء ہمارے حواس میں پیدا کرتی ہیں۔ خود ان بیرونی اشیاء کی صفات یا خصائص بتانے لگ گئے ہیں چنانچہ بعض اشیاء کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی بو اور ذائقہ خراب ہے یا اچھا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انکی بو یا ذائقہ صرف ہمیں اچھا یا برا معلوم ہوتا ہے۔ مگر یہ صاف ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بیرونی دنیا کی حقیقت اپنے محسوسات کو بیرونی اشیاء کی طرف منسوب کرنے پر ہی منحصر ہے بالخصوص حس لمس و حس بصر کی حالت میں ان دونوں حواس کی مشارکت اور دیگر حواس کی معاونت سے ہم رفتہ رفتہ روزانہ تجربات مصدقہ سے بیرونی اشیاء کا علم حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمیں ان معلومات کے کامل یقین ہو جاتا ہے۔ اسی کو مشہادت حواس یا حق الیقین کہتے ہیں۔

جب نفس باذہن دوسرے مشاغل میں منہمک ہوتا ہے۔ یا جب تکان وغیرہ کے سبب اسکی توجہ نہیں

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

یعنی آنکھ کا ڈھیلا ہے اور باقی بھویں، پپوٹے اور پلکیں وغیرہ یہ آنکھ کے متعلقات ہیں جو تعداد میں سات ہیں چنانچہ پہلے انہیں متعلقات چشم کا بیان کیا جاتا ہے۔

متعلقات چشم (یعنی) آنکھ کے متعلقات

متعلقات چشم میں (۱) بھویں (۲) پپوٹے (۳) پلکیں (۴) آنسو کی گلٹی (۵) آنسو کی نالی (۶) آنسو کی تھیلی (۷) ناک کی نالی۔ یہ سات اعضاء شامل ہیں۔ لیکن بعض اطباء طبقہ ملتحمہ یعنی آنکھ کی جھلی کو بھی متعلقات چشم میں داخل کرتے ہیں مگر اکثر اطباء اس کو طبقات چشم میں ہی شمار کرتے ہیں۔ اور اسکے لیے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس جھلی کا ایک حصہ دیگر طبقات کی طرح کرہ چشم پر محیط ہوتا ہے۔ اور جو اسے متعلقات چشم میں شمار کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس جھلی کا ایک حصہ پپوٹوں کو اندر کی طرف استر کرتا ہے اسلئے پپوٹوں کے ساتھ یہ بھی متعلقات چشم میں داخل ہے۔ اب ہم ذیل میں متعلقات چشم کا علیحدہ علیحدہ بیان کرتے ہیں۔

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
بھویں	حاجب۔ حواجبین	آئی برو ز Eyebrows

بھویں جلد کے دو ابھرے ہوئے خمیدہ محراب ہیں۔ جو چشم خانہ کے اوپر واقع ہیں اور جن پر بہت سے بال پائے جاتے ہیں اور جلد کے علاوہ انکی ساخت میں تین عضلات بھی شامل ہیں انکا فائدہ یہ ہے کہ یہ آنکھ کو زائد روشنی سے بچاتی ہیں اور گرد وغبار اور پسینے کے آنکھوں میں جانے سے روکتی ہیں۔

پپوٹہ۔ پپوٹے	جفن۔ اجفان	آئی لیڈز Eye Lids

پپوٹے جلد کی دو باریک چٹیں ہیں۔ جو آنکھ کے سامنے واقع ہیں۔ پپوٹے بھی آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں اور وقت دونوں بند ہو کر آنکھ کو چھپا لیتے اور محفوظ رکھتے ہیں۔ اوپر کا پپوٹہ نیچے کے پپوٹے کی نسبت بڑا ہوتا ہے اور زیادہ متحرک ہوتا ہے آنکھ جھپکتے وقت یہی حرکت کرتا ہے اس میں ایک خاص عضلہ بھی ہوتا ہے جو اسے اوپر کو اٹھاتا ہے جب دونوں پپوٹے کھلے ہوتے ہیں تو ان کے دونوں کناروں کے درمیان ایک بیضوی شکل کی وسعت پائی جاتی ہے اور دونوں پپوٹوں کے انصالی مقام پر دو زاویے یا کونے ہوتے ہیں جن میں سے اندرونی کو اندرونی کویہ یا اندرونی گوشہ چشم (مانق انسی۔ انٹرنل کینتھس) کہتے ہیں اور بیرونی کو بیرونی کویہ یا بیرونی گوشہ چشم (مانق وحشی۔ ایکسٹرنل کینتھس) کہتے ہیں بیرونی کویہ اندرونی کویہ کی نسبت اونچا اور تنگ ہوتا ہے اور کرہ چشم سے زیادہ متصل اور چسپاں ہوتا ہے اندرونی کویہ ناک کی طرف ہوتا ہے اس میں دونوں پپوٹے بذریعہ ایک مثلث وسعت کے کرہ چشم سے کسی قدر جدا ہو جاتے ہیں۔ جسکو آنسو کی تھیلی رکیس دمعی لیکس لیکری میلس) کہتے ہیں۔ اس تھیلی کے آغاز کے مقابل ہر ایک آنکھ میں ایک مخروطی ابھار نظر آتا ہے جس

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہوتی۔ تو عصبی تاثرات نفس پر کم اثر کرتے ہیں پس ایسی صورت میں بیرونی محسوسات کا ادراک نہیں ہوتا اور اگر خفیف طور پر ہو بھی تو نفس انہیں فوراً بھول جاتا ہے چنانچہ ایسی حالت میں یہی کہا جاتا ہے کہ توجہ اور خیال اور طرف تھا

طبّی نوٹ:۔ متقدمین اطبا یونان جسم میں تین قوتیں مانتے ہیں (۱) قوتِ طبعی جو جگر میں ہوتی ہے۔ (۲) قوتِ حیوانی جو دل میں ہوتی ہے (۳) قوتِ نفسانی جو دماغ میں ہوتی ہے۔

(۱) قوتِ نفسانی:۔ وہ قوت ہے جس سے تمام اعضاء جسم میں حس و حرکت پیدا ہوتی ہے اسکی دو قسمیں ہیں (۱) قوتِ محرکہ (۲) قوتِ مدرکہ۔ قوتِ محرکہ کی پھر دو قسمیں ہیں۔ (۱) قوتِ باعثہ (۲) قوتِ فاعلہ۔ اور قوتِ مدرکہ کی بھی پھر دو قسمیں ہیں (۱) قوتِ مدرکہ ظاہرہ (۲) قوتِ مدرکہ باطنہ۔ قوتِ مدرکہ ظاہرہ کی پھر پانچ قسمیں ہیں جن کو حواس خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں۔ (۱) قوتِ باصرہ (۲) قوتِ سامعہ (۳) قوتِ شامّہ (۴) قوتِ ذائقہ (۵) قوتِ لامسہ اور قوتِ مدرکہ باطنہ کی پھر پانچ قسمیں ہیں۔ جنکو حواس خمسہ باطنہ کہتے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں۔ (۱) قوتِ حسِّ مشترک (۲) قوتِ خیال (۳) قوتِ متصرفہ (۴) قوتِ واہمہ (۵) قوتِ حافظہ۔

حواس خمسہ ظاہرہ تمام بیرونی محسوسات کو حواس خمسہ باطنہ تک پہنچاتے ہیں چنانچہ حواس خمسہ ظاہرہ کی تمام محسوسات کو پہلے حسِّ مشترک ادراک کرتی ہے اور پھر وہ ان کو خزانہ خیال کے سپرد کر دیتی ہے جو انکو محفوظ رکھتا ہے تاکہ وقت ضرورت یاد آسکیں چنانچہ اسی وقت خیال سے وہ باتیں یاد آتی ہیں جنکا تعلق حواس خمسہ ظاہرہ سے ہوتا ہے اور جنکو طبّی اصطلاح میں صُوَر (صورتیں) کہتے ہیں۔ پھر قوتِ واہمہ ان صُوَر محسوسہ سے معانی جزئیہ کا ادراک کرتی ہے۔ مثلاً کسی دوست اور کسی کو دشمن سمجھنا اسی قوت کا کام ہے۔ پھر قوتِ واہمہ کے ادراک کردہ معانی کو قوتِ حافظہ محفوظ کرتی ہے۔

نوٹ:۔ حسِّ مشترک کے ادراک کردہ صُوَر کو قوتِ خیال محفوظ رکھتی ہے۔ لیکن قوتِ واہمہ کے ادراک کردہ معانی کو قوتِ حافظہ محفوظ رکھتی ہے پھر قوتِ متصرفہ صُوَر اور معانی میں تصرف کرتی ہے اور عام معنی اور کلی مفہوم میں تغیر و تبدل کر کے نفس ناطقہ کے پیش کرتی ہے اسکو مفکرہ اور متخیلہ بھی کہتے ہیں یہ قوت انسانی دماغ کیلئے ہی مخصوص ہے۔

اب حواس خمسہ ظاہرہ میں سے ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ مفصل بیان کیا جاتا ہے:۔

عین و قوتِ باصرہ (یعنی) آنکھ اور بینائی

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
آنکھ	عین	آئی Eye

چشم یا آنکھ تو۔ باصرہ یعنی بینائی کا تماص آلہ ہے یہ چشمہ خانہ (محجر) بجاج۔ آبیٹ) میں بیرونی صدمات و آفات سے محفوظ رہتی ہے اور تمام عضلات کے ذریعے ہر طرف پھر سکتی ہے چشم سے مراد کرہ چشم یعنی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کو آنسو کی بھٹنی (حلمہ دمعیہ لیکری مل پے پلا) کہتے ہیں۔ آنسو کی بھٹنی کی چوٹی پر ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آتا ہے جسکو آنسو کا نقطہ (نقطہ دمعیہ پنکٹم لیکری میلی) کہتے ہیں۔ آنسوؤں کی نالی (مجرئ دمعیہ۔ لیکری مل کینال) کی ابتداء یہیں سے ہوتی ہے۔ پپوٹوں کو پلٹانے سے بلندیاں اور سوراخ متمیز ہو سکتے ہیں۔

ساخت پپوٹہ کی ساخت باہر جلدہ درمیان میں ایک عضلہ اور ایک کرسی اندر کی طرف باریک گلٹیاں اور استرئ جھلی (طبقہ ملتحمہ) ہوتا ہے پپوٹوں کی جلد نہایت باریک اور طبقہ ملتحمہ سے خوب ملی ہوئی ہے۔ پپوٹہ کی کرسی (غضروف الجفن۔ ٹارسل پلیٹ) باریک ریشہ دار غضروفی پرت ہے جسکی لمبائی تقریباً ایک انچ ہوتی ہے بالائی کرسی بڑی اور ہلالی شکل کی ہوتی ہے جسکی اگلی سطح میں پپوٹے کو اٹھانے والے عضلہ کے ریشے چسپاں ہوتے ہیں۔ زیریں کرسی پتلی اور بیضوی ہوتی ہے۔

پپوٹے کی باریک گلٹیاں

(غدد معقدہ۔ مائی یومی ان گلینڈز) یہ باریک باریک یا نہایت چھوٹی چھوٹی گلٹیاں پپوٹوں کی اندرونی سطح پر پپوٹے کی کرسی اور پپوٹے کی استرئ جھلی (طبقہ ملتحمہ) کے درمیان واقع ہیں اور پپوٹوں کو الٹا کر دیکھنے سے طبقہ ملتحمہ میں سے موتیوں کی لڑیوں کی طرح دکھائی دیتی ہیں۔ اوپر کے پپوٹے میں تقریباً ۲۵ ہوتی ہیں۔ اوپر والی گلٹیاں نیچے والی گلٹیوں کی نسبت لمبی ہوتی ہیں اور انکی نالیاں پپوٹوں کے آزاد کناروں پر ختم ہوتی ہیں۔ ان گلٹیوں سے ایک قسم کی چکنی رطوبت خارج ہوتی ہے۔ جو پپوٹوں کے کناروں کو تر رکھتی اور پپوٹوں کو باہم چپکنے سے باز رکھتی ہے جب انکی رطوبت خارج نہیں ہوتی بلکہ بند ہو جاتی ہے۔ تو بعض اوقات یا مائی بومی ان سسٹ کی بیماری ہو جاتی ہے۔

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
پلک۔ پپکیں	ہدب۔ اہداب	آئی لیشز Eye Lashes

مژگاں۔ یہ چھوٹے موٹے ٹیڑھے بال ہیں جو پپوٹوں کے آزاد کناروں پر ہوتے ہیں عموماً بالوں کی دو یا تین قطاریں ہوتی ہیں۔ بالائی پلک کے بال زیریں کی نسبت تعداد میں زیادہ اور لمبے اور اوپر کی طرف مڑے ہوتے ہیں تاکہ پپوٹوں کے بند ہوتے وقت وہ آپس میں الجھ جائیں پلکیں بھی گرد وغبار وغیرہ سے آنکھ کی حفاظت کرتی ہیں۔

اعضاء دمع (یا) آلات اشک

آنسو پیدا کرنیوالے مندرجہ ذیل چار آلات ہیں (۱) آنسو کی گلٹی (۲) آنسو کی نالی (۳) آنسو کی تھیلی اور (۴) ناک کی نالی۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک کا جدا جدا بیان کیا جاتا ہے:۔

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
آنسو کی گلٹی	غدۃ الدامع	لیکری میل گلینڈ Lachrymal Gland

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

یہ بیضوی شکل کی بادام کے برابر ایک گلٹی ہے۔ جو پیشانی کی ہڈی کے بیرونی کونے کے اندر اور نیچے والے نشیب میں یعنی چشم خانہ کے بیرونی کونہ والے نشیب میں رہتی ہے۔ اسکی بالائی سطح محدب اور چشم خانہ کی ہڈی کو جھلی سے چسپاں ہوتی ہے اور اس کی زیریں مقعر سطح آنکھ اور اسکے بالائی دبیرونی عضلات پر مقیم ہوتی ہے۔ عروق واعصاب اس گلٹی کو چھید کر اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اسکی بناوٹ تھوک پیدا کرنیوالی گلٹیوں کے مشابہ ہوتی ہے اس گلٹی کی تقریباً سات نالیاں ہوتی ہیں۔ جو پیچھے طور پر ملتحمہ کے نیچے سے گزر کر اس کے اوپر اور باہر کی طرف ختم ہوتی ہیں اور اپنی رطوبت سے آنکھ کے ڈھیلے کو تر رکھتی ہیں۔ اس گلٹی میں آنسو پیدا ہوتے ہیں۔ جو ڈھیلے کو تر اور ٹھنڈا رکھتے ہیں۔

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
آنسو کی نالی	مجری دمع	لیکریمل کینال Lachrymal Canal

یہ دو نالیاں ہیں ہر ایک نالی اندرونی کونہ کے آنسو کی بھٹی کے نقطہ دمعیہ سے شروع ہوتی ہے بالائی نالی پہلے اوپر کو اور پھر اندر کی طرف بہا کر آنسو کی تھیلی میں کھلتی ہے۔ اور زیریں نالی پہلے نیچے کو اور پھر اندر کی طرف مڑ کر آنسو کی تھیلی میں ختم ہوتی ہے۔

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
آنسو کی تھیلی	کیس الدمع	لیکریمل سک Lachrymal Sac

یہ حقیقت میں ناک کی نالی (مجری الف۔ نیزل ڈکٹ) کا بالائی کشادہ حصہ ہے جو آنسوؤں کی ہڈی کی نالی میں واقع ہے اسکی شکل بیضوی ہوتی ہے۔ اسکا اوپر کا کنارہ گول اور لمبا ہوتا ہے لیکن اسکے نچلے کنارے سے ناک کی نالی شروع ہوتی ہے۔ اس میں مذکورہ بالا دونوں آنسوؤں کی نالیاں آنسو ڈالتی ہیں۔

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
ناک کی نالی	مجری الف	نیزل ڈکٹ Nasal Duct

یہ جھلی کی بنی ہوئی نالی ۱۲/۳ انچ لمبی ہوتی ہے۔ اور آنسو کی تھیلی کے زیریں کنارے سے شروع ہو کر ناک کے پیچھے والے جوف میں کھلتی ہے۔ اسکے منہ پر غشائی چنٹ کا ایک کیواڑ لگا رہتا ہے جو آنسوؤں کی بازگشت کو روکتا ہے۔ اس نالی کے اندرونی جانب غشاء مخاطی استر کرتی ہے۔

ملتحمہ

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
آنکھ کی جھلی	طبقہ ملتحمہ	کن جنک ٹائوا Conjunctive

چونکہ یہ جھلی کرۂ چشم اور پوٹوں کی اندرونی سطح دونوں پر ہوتی ہے۔ اس لیے بعض اطباء اس کو متعلقات چشم میں لیکن اکثر طبقات چشم میں شمار کرتے ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

وجہ تسمیہ۔ عربی لفظ ملتحمہ اور انگریزی لفظ کن جنک ٹائوا دونوں کے لغوی معنی ہیں ملنے یا ملانے والی چونکہ یہ جھلی اس مقام تک ہوتی ہے۔ جہاں عضلاتِ چشم کرۂ چشم سے ملاقی ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ کرۂ چشم وعضلات وغیرہ کو ملاقی ہے یا خود ان سے ملاقی ہوتی ہے اس لیے اس کا یہ نام رکھا گیا۔ آنکھ کی یہ جھلی یا طبقہ ملتحمہ درحقیقت بلغمی جھلی یا غشاء رطب (میوکس ممبرین) ہے۔ جو پپوٹوں کی اندرونی سطح پر اسر پلکنے کے بعد آنکھ کے طبقہ صلبہ کے اگلے حصے اور طبقہ قرنیہ پر پلٹ آتی ہے اسلیے اسکے دو حصے ہو جاتے ہیں۔

(۱) پپوٹوں کی جھلی (ملتحمہ خفیہ۔ پیل پی برل کنجنکٹائوا) جو پپوٹے کی اندرونی سطح پر واقع ہے۔ یہ موٹی اور عروق دموی سے پُر ہوتی ہے۔ اس حصے پر بہت سے چھوٹے چھوٹے اُبھرے ہوئے نقاط دکھائی دیتے ہیں۔ یہی نقاط بالا بھار مرض جرب الاجفان (گرینیولڈنز) کی صورت میں بہت بڑھ جاتے ہیں (۲) ڈھیلے کی جھلی (ملتحمہ عنبیہ۔ آکولر کنجنکٹائوا) یہ اس جھلی کا وہ حصہ ہے۔ جو کہ آنکھ کے ڈھیلے پر واقع ہے۔ اس کا وہ حصہ جو طبقہ صلبہ کے اگلے حصے پر ہوتا ہے وہ نہایت رقیق اور شفاف ہوتا ہے اور خوب چسپاں نہیں ہوتا اور نہ اسمیں ابھرے ہوئے نقاط اور نہ عروق بکثرت ہوتے ہیں۔ قرنیہ کے اوپر یہ جھلی نہایت ہی رقیق اور شفاف اور خوب چسپاں ہوتی ہے۔ بحالت صحت اسمیں عروق دموی نہیں ہوتے لیکن بحالت مرض مثلاً بس (عشاء دہ پتیں) میں اسکے اندر عروق ہو جاتے ہیں پپوٹے اور ڈھیلے کی اس جھلی کے دونوں حصوں کے مقام اتصال پر جو سلوٹیں بنتی ہیں انکو انگریزی میں پیل پی برل فولڈز کہتے ہیں جو تعداد میں دو ہوتے ہیں۔ اس میں بیشمار لعابی گلٹیاں ہوتی ہیں۔

کرۂ چشم

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
آنکھ کا ڈھیلا	مُقلہ	آئی بال Eye Ball

اسکا اوسط قطر قریب ایک انچ کے اور سیدھا قطر ایک انچ سے کم ہوتا ہے یہ ایک پتلی سی جھلی میں ملفوف ہو کر حفاظت چشم کی چربی میں رہتا ہے۔ اور اپنے متعاقبہ عضلات کے ذریعے اوپر نیچے اور دائیں بائیں حرکت کرتا ہے۔ آنکھ کی بناوٹ میں درحقیقت تین پردے اور تین رطوبتیں ہوتی ہیں تین پردے یہ ہیں (۱) سکلیرانک (صلبیہ ۲) کورائیڈ (مشیمیہ) (۳) ریٹی نا (شبکیہ) لیکن پہلے دونوں پردوں کے سامنے حصوں کے مختلف ناموں سے نامزد کرتے ہیں چنانچہ سکلیرانک کے اگلے ۱/۶ حصہ کو جو کہ آٹھنہ کی طرح شفاف ہوتا ہے کارنیہ (قرنیہ) کہتے ہیں اور کورائیڈ کے اگلے ۱/۶ حصہ کو جس میں کہ پتلی ہوتی ہے (آئرس (عنبیہ) کہتے ہیں اسلیے تسہیل بیان کیلئے وہ انکو دو علیحدہ پردے مان کر بجائے تین کے پانچ پردوں کا بیان کیا جاتا ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

طبی نوٹ: متقدمین جمہور اطباء یونانی آنکھ میں یہ سات پردے مانتے ہیں (۱) ملتحمہ (۲) قرنیہ (۳) عنبیہ (۴) عنکبوتیہ (۵) شبکیہ (۶) مشیمیہ (۷) صُلبیہ یہ طبقات ساتھ سے پیچھے تک ترتیب وار بیان کئے گئے ہیں۔ لیکن عام طور پر کتب طبیہ میں انکی ترتیب پیچھے سے آگے کو بیان کی گئی ہے۔

اگرچہ جمہور اطباء آنکھ میں مذکورہ بالا سات طبقات (پردے) مانتے ہیں۔ لیکن بہت سے متقدمین اطباء طبقاتِ چشم کی تعداد میں اختلاف رکھتے ہیں۔ چنانچہ بعض اطباء نے ملتحمہ کو غشاء یعنی جھلی قرار دیتے ہوئے اسکے طبقہ ہونے سے انکار کیا ہے اور بعض نے عنکبوتیہ کو طبقہ شبکیہ کا جزء مانتے ہوئے اسکو مستقل طبقہ نہیں مانا اسی طرح سے بعض نے عنبیہ کو مشیمیہ کا جزو قرار دیا ہے اور بعض کا یہ قول ہے کہ درحقیقت آنکھ کے مستقل طبقات صرف تین ہی ہیں (۱) صُلبیہ (۲) مشیمیہ (۳) شبکیہ باقی قرنیہ وعنبیہ اور عنکبوتیہ انہیں تینوں کے اجزاء ہیں مستقل طبقات یا پردے نہیں۔ اور ساتواں طبقہ یعنی طبقہ ملتحمہ تو درحقیقت غشاء یعنی جھلی ہے طبقہ نہیں اور ہمارے نزدیک بھی یہ آخری قول بالکل صحیح اور قابل تسلیم ہے کیونکہ یہ جدید ڈاکٹری تشریح چشم کے عین مطابق ہے۔

جمہور اطباء کے مذکورہ بالا مسلمہ سات طبقات چشم کی موجودہ ڈاکٹری تشریح سے تطبیق کرتے ہوئے انکی طبی و ڈاکٹری نام حسب ذیل ہیں۔ اور انکا علیحدہ علیحدہ مفصل بیان آگے ہے۔

(۱) ملتحمہ (کن جنکٹائیوا) (۲) قرنیہ (کارنیا) (۳) عنبیہ (آئرس) (۴) عنکبوتیہ (کیپ سول آف دی لینز) (۵) شبکیہ (ریٹی نا) (۶) مشیمیہ (کوراٹیڈ) (۷) صُلبیہ (سکلیراٹک) ملتحمہ (کن جنکٹائیوا) کو ڈاکٹر طبقات چشم میں نہیں بلکہ ملحقات چشم میں شمار کرتے ہیں۔ اور عنکبوتیہ (کیپ سول آف دی لینز) غلاف رطوبت جلیدیہ کو وہ کوئی طبقہ یا پردہ نہیں مانتے اس لیے وہی پانچ بلکہ مذکورہ بالا مسلمہ تین طبقات چشم ہی رہ جاتے ہیں جن میں کسی کو اختلاف نہیں



اس تصویر کے نمبروار مقامات کی تشریح دیکھو اگلے صفحہ پر

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(۱) سکلیرا ملک باصلبیہ (۲) کارنیا یا قرنیہ (۳) کوراٹیڈ یا مشیمیہ (۴) آئرس یا عنبیہ (۵) ریٹی نایا شبکیہ (۶) کیپ سول آفدی لینز یا عنکبوتیہ (۷) کن جنکٹائوا یا ملتحمہ (۸) ایکوئس ہیومر یا رطوبت بیضیہ (۹) کرسٹلائن لینز یا رطوبت جلیدیہ (۱۰) وٹرئس ہیومر رطوبت زجاجیہ (۱۱) آپٹک نرو یا عصبہ مجوفہ (۱۲) سلیری براسس یا زوائد ہدبیہ (۱۳) بلیو سپاٹ یا زرد نقطہ۔

طبقات چشم (یعنی) آنکھ کے پردے

نوٹ:۔ جیسا کہ مذکور ہوا در حقیقت آنکھ تین پردے اور تین رطوبتیں ہیں۔ ان تین پردوں میں سے دو پردوں یعنی بیرونی اور درمیانی پردوں کے اگلے پر حصہ کو دوسرے ناموں سے نامزد کیا جاتا ہے۔ اب ہر ایک پردہ کا علیحدہ علیحدہ مختصر بیان کیا جاتا ہے:۔

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
(۱) سخت پردہ	طبقہ صلبیہ	سکلیرا ٹیکا Sclerotica

یہ سفید اور مضبوط پردہ جو تین رشتوں سے بنتا ہے۔ آنکھ کا بیرونی پردہ اور آنکھ کے بڑے قطر کا پچھلا ۵/۶ حصہ بناتا ہے یہ سامنے کی نسبت پیچھے بہت موٹا ہوتا ہے۔ اسکے پچھلے حصہ میں ایک سوراخ ہوتا ہے جسکے راستے آنکھ کا عصب (عصب مجوفہ۔ آپٹک نرو) اور آنکھ کے عروق داخل ہوتے ہیں۔ اس پردہ کا سامنا کا حصہ شفاف ہوتا ہے جسکو قرنیہ (کارنیا) کہتے ہیں بعض مشرحین نے اسکو ایک علیحدہ پردہ قرار دیا ہے لیکن درحقیقت قرنیہ طبقہ صلبیہ کا سامنا حصہ ہی ہے۔ جسکا بیان ذیل میں کیا جاتا ہے:۔

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
(۱) شفاف پردہ	قرنیہ	کارنیا Cornea

درحقیقت طبقہ صلبیہ کا سامنا کا حصہ ہے جو شیشہ کے شناف ہوتا ہے یہ طبقہ صلبیہ میں ایسے لگا ہوا معلوم ہوتا ہے جیسے جیب گھڑی کا شیشہ گھڑی میں۔ اسکا آڑا قطر اس کے عمودی قطر سے لمبا ہوتا ہے اور اسکی اگلی سطح ابھری ہوئی ہوتی ہے۔ مختلف انسانوں میں اور عمر کے مختلف حصوں میں یہ انحنا کم و بیش ہوتا ہے مثلاً جوانی میں زیادہ اور بڑھاپے میں کم۔ اس میں خون کی رگیں بھی نہیں ہوتیں۔

فائدہ:۔ طبقہ صلبیہ اور طبقہ قرنیہ یہ دونوں طبقات ملکر کرہ چشم کا ایک مضبوط غلاف بناتے ہیں:۔

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
(۲) عروقی پردہ	طبقہ مشیمیہ	کوراٹیڈ Choroid

یہ عروقی سیاہی مائل یا ارغوانی پردہ آنکھ کا درمیانی پردہ ہے۔ جو صلبیہ (سکلیرا) تک اور شبکیہ (ریٹی نا) کے درمیان واقع ہے یہ بھی سامنے کی نسبت پیچھے موٹا ہوتا ہے۔ جہاں کہ آنکھ کے عصب کے گزرنے کیلئے اس میں بھی سوراخ ہوتا ہے اسکے اگلے ۱/۶ حصہ کو جو قرنیہ کے پیچھے رہتا ہے عنبیہ (آئرس) کہتے ہیں

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اور ریٹینا کا درمیانی فاصلہ بجائے ۲۲۶۵ ملی میٹر کے ۲۰ ملی میٹر رہ جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روشنی کی شعاعیں بجائے ریٹینا پر فوکس ہونے کے اس کے پیچھے فوکس ہوتی ہیں یعنی روشنی کی شعاعیں ٹھیک شبکیہ پر نہیں پڑتیں۔ بلکہ چیزوں کا عکس شبکیہ سے کسی قدر پیچھے پڑتا ہے جس وجہ سے نزدیک کی چیزوں دھندلی نظر آتی ہیں اس لیے جن اشخاص کو یہ شکایت ہو ان کو دور کی چیزیں جو بیس فٹ یا اس سے زیادہ فاصلہ پر ہوں معمولی حالت میں بخوبی نظر نہیں آتیں۔ پس اس کو ایسا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ جس سے متوازی شعاعیں ریٹینا پر فوکس ہوں یعنی اس کو اپنے لینز کی طاقت بڑھانی پڑتی ہے۔ جو کہ طاقت ایکا موڈیشن کو استعمال کرنے سے بڑھ سکتی ہے۔ یعنی بعید نظری میں دور کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے زیادہ ایکا موڈیشن استعمال کرنی پڑتی ہے۔ اور نزدیک کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے بھی ایکا موڈیشن استعمال کرنی پڑتی ہے جس سے ظاہر ہے کہ ایسے مریض کو ہمیشہ طاقت ایکا موڈیشن استعمال کرنی پڑتی ہے۔ اس مرض کا بھی یہی علاج ہے۔ کہ محدب شیشوں کی مناسب عینک لگائی جائے جس سے لینز کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اور متوازی شعاعیں بجائے ریٹینا کے پیچھے پڑنے کے ٹھیک اس کے اوپر پڑتی ہیں ؛

خلل بصارت (ایسٹگماٹزم) کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ کے پردہ کارنیا (قرینہ) کی سطح بجائے گول رہنے کے لمبوتری ہو جاتی ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ریٹینا کے اوپر دونوں قسم کی شعاعوں کا ٹھیک فوکس نہیں ہوتا یعنی دونوں قسم کی شعاعیں ریٹینا پر ٹھیک نہیں پڑتیں۔ کیونکہ جو شعاعیں قرینہ کے ایک حصے سے گزرتی ہیں وہ اور مقام پر فوکس ہوتی ہیں اور جو شعاعیں قرینہ کے دوسرے حصے سے گزرتی ہیں۔ وہ کسی دوسرے مقام پر فوکس ہوتی ہیں۔ اس لیے ایسے شخص کو اکثر چیزیں ٹیڑھی اور چپٹی نظر آتی ہیں اس مرض کو ایسٹگماٹزم یا خلل بصارت کہتے ہیں۔ اس مرض کا علاج بھی سیلنڈری کل شیشوں والی عینک لگانے سے ہی کیا جاتا ہے ؛

نوٹ:۔ مذکورہ بالا نقص اگرچہ بالعموم قرینہ (کارنیا) میں ہوا کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی لینز (رطوبت جلیدیہ) میں بھی یہ نقص پیدا ہو جاتا ہے ؛

ایسٹگماٹزم میں کپاؤنڈ گلاس یا مرکب شیشہ کی عینک لگانی پڑتی ہے۔ جس کا نمبر نہایت صحیح ہونا چاہیے پس کسی تجربہ کار ڈاکٹر سے آنکھوں کا امتحان کرا کر ٹھیک نمبر کی عینک بنوالی چاہیئے ؛

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اوپر والے حصہ میں شعاعیں طبقہ شبکیہ (ریٹینا) پر یا اس سے آگے پیچھے فوکس ہوتی دکھائی گئی ہیں



اس تصویر میں شعاعوں کی متوازی شعاعیں آنکھ میں داخل ہو کر طبقہ شبکیہ (ریٹینا) پر فوکس ہو رہی ہیں یعنی اس شبکیہ کے عین اوپر

www.KitaboSunnat.com

حرکات چشم: آنکھ کے چھ عضلات ہیں۔ جو کہ آنکھ کو مختلف حرکات دیتے ہیں ان میں سے چار تو سیدھے (ریکٹس) عضلات ہیں۔ یعنی (۱) بالائی عضلہ جو ڈھیلے کے اوپر لگا ہوا ہے اور اس کو اوپر کی طرف پھراتا ہے (۲) زیریں عضلہ جو ڈھیلے کے نیچے کی طرف لگا ہوا ہے۔ اور اسکو نیچے کی طرف پھراتا ہے (۳) اندرونی عضلہ جو ڈھیلے کو اندر کی طرف پھراتا ہے۔ اور (۴) بیرونی عضلہ جو آنکھ کو باہر کی طرف پھراتا ہے اور دو ترچھے عضلات ہوتے ہیں جن میں سے ایک اوپر کیطرف لگا ہوتا ہے اور دوسرا نیچے کی طرف یہ آنکھ کو اوپر نیچے ترچھا کرتے ہیں۔

دونوں آنکھیں ہمیشہ اکٹھی کام کرتی ہیں اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے۔ جب کہ دونوں آنکھوں کے عضلات مناسبت میں کام کریں۔ لیکن اگر ایک عضلہ دوسرے عضلہ کی نسبت زیادہ کام کرے یا ایک عضلہ دوسرے کی نسبت کمزور ہو جائے اور کم کام کرے تو اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ ایک آنکھ دوسری آنکھ کی نسبت زیادہ گھوم جاتی ہے جس سبب سے آنکھ ترچھی نظر آتی ہے اس حالت کو اردو میں بھینگا پن۔ عربی میں حول اور انگریزی میں سکوئنٹ کہتے ہیں۔

دونوں آنکھوں سے ہر ایک چیز [illegible] دکھائی دیتی ہے

یہ صاف ظاہر ہے کہ آنکھیں دو ہیں اور چیزوں کا عکس بھی ہر ایک آنکھ میں جدا جدا پڑتا ہے مگر پھر بھی ہمیں چیزیں دو دو دکھائی نہیں دیتیں۔ ہر ایک چیز ایک ہی نظر آتی ہے اس کا سبب یہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہے ایک چیز کے دونوں علیحدہ دونوں آنکھوں کے [illegible] کے دو مقابل مقامات یا مطابق نقاط پر پڑتے ہیں جہاں سے دونوں عکس دماغ کے [illegible] کسی مقام پر مل کر ایک ہو جاتے ہیں جس طرح آنکھ کے شبکیہ کا [illegible] حصہ دائیں آنکھ کے شبکیہ [illegible] اور بیرونی حصے کے ساتھ [illegible] کے شبکیہ کے [illegible] حصہ [illegible] کے شبکیہ [illegible] اور اسی طرح دونوں کے [illegible] حصے [illegible] کے نقطے [illegible] کے [illegible] کے [illegible] ک

www.KitaboSunnat.com

اندرونی حصّہ دائیں کے اندرونی حصّے کے مطابق ہے۔ پس جب دونوں آنکھوں کے پردہ شبکیہ (ریٹی نا) کے دو مقابل حصّوں یا مطابق نقطوں پر (جن کا درمیانی فاصلہ برابر ہو) کسی چیز کا ایک ہی جیسا عکس پڑے یا تصویر بنے تو وہ چیز بجائے دو کے صرف ایک ہی نظر آیا کرتی ہے پردہ شبکیہ کے ان ایک ہی جیسے نقاط کو مطابق (کارس پانڈنگ پوائنٹس) کہتے ہیں۔

دونوں آنکھوں سے ہر ایک چیز کے بجائے دو کے ایک ہی دکھائی دینے کے متعلق بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ دائیں شبکیہ کے بیرونی حصّے میں جو ریشے پھیلتے ہیں وہ تقاطع صلیبی (آپٹک کراس) میں بائیں شبکیہ کے اندرونی حصّے کے ریشوں کیساتھ ملکر دماغ کے بائیں حصّے میں چلے جاتے ہیں اور برعکس اس کے بائیں شبکیہ کے بیرونی حصّے کے ریشے دائیں شبکیہ کے اندرونی حصّے کے ریشوں کیساتھ ملکر دماغ کے دائیں حصّے میں چلے جاتے ہیں اور یہاں پہنچکر ریشے ایک نقطہ پر تمام ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تقاطع صلیبی کے اگلے حصّے میں چند ریشے ہوتے ہیں جو ایک شبکیہ سے دوسری طرف جاتے ہیں گویا یہ ریشے شبکیہ کے مقابل کے حصّوں کو باہم ملاتے ہیں جس وجہ سے دونوں شبکیہ کے مقابل حصّوں کا فعل متحد ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے کہ دماغ کے حصّوں کا فعل باوجود دو ہونے کے جسم واصل (کارپس کلوزم) کی وجہ سے ایک ہوتا ہے۔

حول یعنی بھینگے پن۔ میں ایک کی دو چیزیں کیونکر نظر آتی ہیں جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب دونوں آنکھیں اکٹھی حرکت نہیں کرتیں اور ہر ایک آنکھ دوسری آنکھ کی نسبت زیادہ پھر جاتی ہے تو ایسی حالت میں چیزوں کا عکس دونوں آنکھوں کے شبکیہ کے مقابل حصّوں پر نہیں پڑتا۔ بلکہ وہ مختلف حصّوں پر پڑتا ہے۔ اس لیے ایک چیز کی دو چیزیں نظر آتی ہیں۔ بالفاظ دیگر یعنی اگر دونوں آنکھوں کے مطابق نقاط (کارس پانڈنگ پوائنٹس) باہم مطابق نہ ہوں۔ بلکہ مختلف ہوں اور ان پر ایک چیز کے دو عکس پڑیں یعنی دو تصویریں بنیں۔ تو پھر اس ایک چیز کی دو چیزیں نظر آتی ہیں۔ مثلاً اگر ایک قلم کو ہاتھ میں لے کر اس کو دیکھیں تو وہ ایک چیز نظر آتی ہے لیکن اگر انگلی سے ایک آنکھ کو ذرا دبا دیں۔ جس وجہ سے اسکی لمبائی دوسری آنکھ کی نسبت مختلف ہو جاتی ہے اور دونوں آنکھوں کے مطابق نقاط بھی مختلف ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک قلم کی بجائے دو دکھائی دیتی ہیں۔

عکس یا الٹی تصویر سیدھی کیوں دکھائی دیتی ہے؟ گزشتہ صفحات میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ ٹوٹو

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کے کیمرہ کے پچھلے گراؤنڈ گلاس یا نیم شفاف شیشہ پر جو عکس پڑتا ہے یا تصویر بنتی ہے وہ ہمیشہ الٹی ہوتی ہے اسی طرح سے آنکھ کے طبقہ شبکیہ پر بھی ہر ایک چیز کا انعکاس الٹا ہوتا یعنی تصویر الٹی بنتی ہے لیکن لطف یہ ہے کہ وہ دکھائی سیدھی دیتی ہے۔ اس کا کیا سبب ہے؟

اس کا سبب یہ ہے کہ عقل کو درحقیقت اجسام الٹے ہی معلوم ہیں اور یہ کہ اس بارہ میں کسی اصلاح کی بھی ضرورت نہیں۔ کیونکہ تمام چیزیں الٹی ہی دکھائی دیتی ہیں اس لیے اجسام کی وضع اور ان کی باہمی نسبت میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ جیسا کہ جب ہم آئینہ میں اپنی صورت دیکھتے ہیں۔ تو اس میں بھی جانبی انعکاس ہوتا ہے۔ یعنی آئینہ میں جو ہماری صورت کا عکس پڑتا ہے وہ معکوس جانبی ہوتا ہے۔ یعنی آئینہ میں ہمارا دایاں ہاتھ بائیں طرف اور بایاں ہاتھ دائیں طرف ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کا کچھ خیال تک نہیں آتا۔ اور نہ ہی ان احساسات میں کسی قسم کی مغائرت معلوم ہوتی ہے۔ جو کہ آئینہ میں ہم اپنی شکل کو دیکھ کر اپنی حرکات وسکنات کے درست کرنے میں قوت لامسہ وقوت باصرہ سے محسوس ومعلوم کرتے ہیں۔ مثلاً لباس پہننے یا پگڑی یا ٹائی وغیرہ کے باندھنے میں جو معکوس حرکات ہوتی ہیں۔ وہ ہمیں سیدھی معلوم ہوتی ہیں۔ ہم ذیل میں اس مسئلہ کو ذرا وضاحت سے بیان کرتے ہیں:

انعکاس صورت۔ جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے کہ آنکھ میں ہر ایک چیز کی تصویر معکوس یا الٹی بنتی ہے۔ کیونکہ آنکھ میں شعاعیں مخروطی شکل (کون آف لائٹ) میں داخل ہوتی ہیں۔ اور ہر ایک ایسے مخروط شعاعی میں ایک مرکزی شعاع (محور مخروط یا ایکسس آف دی کون) ہوتی ہے جو اس مخروط کی بقیہ شعاعوں کی تنظیم کرتی ہے۔ ایسی شعاعیں جب کسی محدب الطرفین شفاف جسم مثلاً رطوبت جلیدیہ (رطوبت بلوریہ یا لینز) میں سے گزرتی ہیں۔ تو وہ گزرتے وقت منکسر ومنحرف ہو کر مرکزی شعاع کی طرف مائل ہو جاتی ہیں اس لیے مبصر یا مرئی اپنے کے کسی مقام کا انعکاس شبکیہ پر ہمیشہ اس مرکزی شعاع کے محاذی ہوتا ہے۔ (جیسا کہ ذیل کی تصویر خط ب ا یا خط ا ب سے ظاہر ہوتا ہے) تاکہ وہ نقطہ جہاں پر کہ شبکیہ میں کسی چیز کا عکس پڑنے والا ہے۔ مخروط شعاع کے اس مرکزی شعاعی خط کو شبکیہ تک بڑھانے سے معلوم ہو سکے۔ مثلاً ا ب اس مخروط شعاع کی مرکزی شعاع ہے۔ جو کہ مقام ا سے نکلتی ہے اور ب اس مخروط شعاع کی مرکزی شعاع ہے۔ جو کہ مقام ب سے آتی ہے۔ پس آنکھ میں مقام ا کا عکس تو مقام ب پر پڑتا ہے اور مقام ب کا عکس مقام ا پر پڑتا ہے۔ لیکن دونوں

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

معکوس یعنی الٹی وضع میں ہوتے ہیں۔ یعنی اوپر کا مقام نیچے اور نیچے کا مقام اوپر۔ دائیں طرف کا بائیں طرف اور بائیں طرف کا دائیں طرف ہوتا ہے۔

اس تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ شبکیہ پر کس طرح انعکاس صورت ہوتا ہے



پس وہ عکس جو کہ شبکیہ کے کسی مقام پر پڑتا ہے جب آنکھ سے باہر کسی نقطہ کی طرف اس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو وہ اس خط مستقیم پر واقع ہوتا ہے۔ جو کہ شبکیہ کے نقطہ مذکور سے شروع کر کے مرد مک کے مرکز میں سے گزرتا ہوا باہر کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ لہٰذا جب طبقہ شبکیہ پر کسی چیز کا عکس پڑتا ہے اور عقل اس چیز کا خارج میں حوالہ دیتی ہے۔ تو وہ ہمیشہ اس عکس کے برعکس حوالہ دیتی ہے اور خارج میں اس عکس کو معکوس دکھاتی ہے۔ چنانچہ شبکیہ کے بائیں طرف اگر کوئی عکس پڑے تو عقل خارج میں اس کو دائیں طرف بتاتی ہے اگر دائیں طرف ہو تو بائیں طرف اوپر کی طرف ہو تو نیچے کی طرف اور نیچے کی طرف ہو تو اوپر کو بتاتی ہے۔ پس شبکیہ پر کے تمام عکس یا صور عقل کے نزدیک گویا آنکھ کے سامنے معکوس ہوتے ہیں جس سے اجسام سیدھے دکھائی دیتے ہیں حالانکہ شبکیہ پر ان کے عکس الٹے پڑے ہوتے ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو عقل اس چیز کے صرف اس عکس یا تصویر کو دیکھتی ہے جو طبقہ شبکیہ پر بنتی ہے۔ اور جب وہ مرئی یا مبصر یعنی دکھائی دینے والی چیز کی طرف اس کا حوالہ دیتی ہے یا آنکھ سے اس عکس کو خارج کرتی ہے تو وہ اس کو لابدی معکوس یا الٹا کر دیتی ہے۔ اور پھر وہ اس چیز کو سیدھا دیکھتی ہے۔ حالانکہ شبکیہ پر جو اس کا عکس پڑا ہوتا ہے۔ وہ الٹا ہی ہوتا ہے اس بارہ میں قوت لامسہ بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ چنانچہ وہ چیز جس کا عکس طبقہ شبکیہ کے بائیں نصف حصہ پر پڑتا ہے وہ دائیں ہاتھ سے پکڑی یا اٹھائی جاتی ہے۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دائیں طرف پڑی ہے۔ اور اسی طرح وہ جس کا عکس شبکیہ کے بالائی حصہ پر پڑتا ہے۔ اور وہ فوراً پاؤں سے چھوئی جاتی ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نیچے کی طرف پڑی ہے وغیرہ اسی وجہ سے نظر معکوس (ان ورٹڈ ویژن) اور قوت لامسہ کے احساسات کے درمیان کوئی منافرت یا اختلاف واقع نہیں ہوتا کیونکہ قوت لامسہ بھی ہر ایک چیز کو سیدھی وضع میں محسوس کرتی ہے نیز چونکہ تمام چیزوں کے عکس جتنے ہمارے اعضاء جسم کے عکس

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

بھی طبقہ شبکیہ میں سرا سر اگلے ہوتے ہیں۔ اس لیے اجسام کی وضع اور ان کی باہمی نسبت میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ کا عکس جس سے کہ ہم کسی چیز کو چھوتے ہیں وہ بھی اُلٹا ہی دکھائی دیتا ہے لیکن اس وضع کو جس میں کہ ہم اجسام یا اشیاء کو دیکھتے ہیں ہم سیدھی وضع کہتے ہیں۔ پس اس طرح سے اجسام کو سیدھی وضع میں دیکھنا دراصل عقل کا ایک کرشمہ ہے

میدان ابصارت (فیلڈ آف ویژن) جہاں تک ہماری نگاہ کام کرتی ہے یعنی جہاں تک ہماری حد نظر ہوتی ہے وہی ہمارا میدان ابصارت ہوتا ہے۔ میدان ابصارت کی تشکیل وضع شبکیہ پر منحصر ہوتی ہے کیونکہ کسی ایک وقت میں اسی قدر شے دکھائی دے سکتی ہے جو اس کے شبکیہ پر منعکس یا منعکس ہو سکے ہیں۔ پس شبکیہ کے اتوار کا عقل بذریعہ [illegible] ہے۔ تو ہی میدان ابصارت ہے۔ لیکن نفس یا عقل کے نزدیک میدان ابصارت [illegible] حدود معین نہیں کیونکہ نفس یا عقل [illegible] کی قوت ہی مختلف ہے اس لیے [illegible] کا وضع کرنے میں [illegible] وسیع ہوتا ہے جبکہ عقل [illegible] رکاوٹ نہیں ہوتی ہے [illegible] بہت تنگ ہوتا ہے۔ [illegible] ابصارت کس قدر بڑا [illegible] ہوتا ہے اور [illegible] تو ہمارا میدان ابصارت [illegible] کی وسعت کے متعلق ہمارا [illegible] ہر حالت میں ایک ہی سی ہوتی ہے [illegible] یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ افعال ابصارت میں عقل [illegible] ہوتا ہے کہ نفس قوت باصرہ کے متعلق کس حد تک [illegible] یا عقلی عمل سے ہم ہر ایک چیز میدان ابصارت کی وسعت کا صحیح اندازہ [illegible] ہیں۔ چنانچہ اس امر کی توضیح و تشریح کے لیے ہم ذیل کی طرف آپ کی توجہ منعطف کراتے ہیں۔ اس تصویر میں زاویہ [illegible] شعاعوں کے تقاطع سے بنتا ہے جو کہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

نقطہ آ اور نقطہ ب سے آتی ہیں۔ اسی زاویہ کو زاویہ نگاہ یا زاویہ بصری (آپٹیکل اینگل) کہتے ہیں۔ نقاط آ د ب کا درمیانی فاصلہ جس قدر زیادہ ہوگا یہ زاویہ بھی اسی قدر بڑا ہوگا۔ اور اسی لیے زاویہ ق اور زاویہ س دونوں برابر ہیں اور نقاط ا د ب جو کہ شبکیہ کے عکس میں ہیں۔ جب یہ زاویہ بڑھتا ہے تو ان کا بھی درمیانی فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ تو بیرونی زاویہ کا انعکاس ہے۔ وہ اشیاء جو آنکھ کے مختلف فاصلوں پر ہوتی ہیں۔ لیکن اُن کا زاویہ بصری ایک ہی ہوتا ہے۔ تو وہ شبکیہ پر یقیناً ایک ہی جسامت کے عکس ڈالتی ہیں اور اگر میدان بصارت میں اُن کا زاویہ ایک ہی ہے تو شبکیہ میں اُن کے عکس بھی وہی زاویہ اور نقاط پیدا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ذیل کی تصویر میں عیاں ہے۔



حس شبکیہ: پردۂ شبکیہ یا رے ٹینا آنکھ کا پردہ نورانی) بالتمام یکساں ذی حس نہیں ہوتا۔ یعنی اس سارے پردہ میں یکساں حس نہیں ہوتی۔ بلکہ اس میں ایک خاص نقطہ ہے جو کہ پتلی کے عین محاذ میں واقع ہے وہ روشنی کے لیے نہایت ہی ذکی الحس ہے پس اس نقطہ پر بصارت نہایت تیز ہوتی ہے۔ اس نقطہ کے مقام پر چونکہ ایک ہلکے زرد رنگ کا خفیف نشیب ہوتا ہے۔ اس لیے انگریزی میں اس کو یلو سپاٹ یعنی زرد نقطہ کہتے ہیں:۔

اس زرد نقطہ سے ½ انچ اندر کی طرف یعنی ناک کی جانب ایک دوسرا نقطہ ہے جہاں کہ عصبہ مجفقہ (آپٹک نرو) آنکھ کے ڈھیلے میں داخل ہوتا ہے۔ دوسرا نقطہ روشنی کے لیے بے حس ہے۔ یعنی اس پر روشنی کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کو انگریزی میں بلائنڈ سپاٹ یعنی تاریک نقطہ یا اندھا نقطہ کہتے ہیں۔ اس کا امتحان اسی طرح کیا جا سکتا ہے۔ کہ ایک سفید کاغذ پر ایک طرف سیاہی سے صلیبی شکل بنائیں اور اس سے دو انچ کے فاصلہ پر دوسرا کوئی نقطہ دائیں جیسا کہ ذیل میں ہے پھر آپ اپنی بائیں آنکھ کو بند کر لیں۔ اور دائیں آنکھ سے ذیل کے بائیں نقطہ کو تقریباً ایک فٹ کے فاصلہ سے بغور دیکھیں:۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اب کتاب کو آہستہ آہستہ آنکھ کے قریب لائیں لیکن نظر کو اسی نقطہ پر جمائے رکھیں کتاب کے ایک خاص فاصلہ پر (تقریباً چھ انچ کے فاصلہ پر) آنکھ کے قریب جانے سے صلیبی شکل اچانک غائب ہو جائے گی کیونکہ اب اس کا عکس آنکھ میں اندھے نقطہ پر پڑتا ہے۔ لیکن کتاب کو آنکھ کے اور نزدیک لانے سے وہ پھر دکھائی دینے لگتی ہے۔ کیونکہ اب اس کا عکس اس اندھے نقطہ پر سے گزر کر دوسرے مقام پر چلا جاتا ہے۔

قوت ماسکۂ شبکیہ: یعنی ریٹی نا کے اثرات یا نقوش کو ٹھہرانے کی قوت۔ (ریٹی نا، یعنی آنکھ کے پردہ شبکیہ یا پردہ نورانی میں ان اثرات یا نقوش کو جو اس پر پڑتے یا بنتے ہیں نہایت تھوڑا عرصہ تقریباً ۱/۸ سیکنڈ (ثانیہ) ٹھہرانے کی قوت ہوتی ہے۔ پس اگر ۱/۸ سیکنڈ سے کم عرصہ ریٹی نا پر دو چمکارے پے در پے پڑیں تو ان کا نقش یا عکس ایک دوسرے کے اُوپر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ (۱) بارش کی بوندیں برستی ہوئیں اکثر دھاریں نظر آتی ہیں۔ اور (۲) ایک تیزی سے چلتے ہوئے پہیے کے درمیانی آرے دکھائی نہیں دیتے۔ یا (۳) ایک بہت زور سے گھومتا ہوا ٹوٹا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا گھومتا ہی نہیں۔ اور (۴) اگر ایک لکڑی کے سرے کو روشن کر کے اس کو ایک لائن میں جلد جلد ہلائیں۔ تو وہ ایک روشنی کی لکیر دکھائی دیتی ہے۔ یا (۵) اگر ایک لکڑی کے دونوں سروں کو روشن کر کے بطور بنیٹی پھرائیں تو روشنی کا ایک چکر دکھائی دیتا ہے۔ اور (۶) سینما (متحرک تصاویر) کے عجیب وغریب نظائر بھی آنکھ کے اسی کرشمہ سے دکھائی دیتے ہیں۔

زوال حس شبکیہ: ریٹی نا یعنی طبقہ شبکیہ یا پردہ نورانی حس جلد زائل ہو جاتی ہے چنانچہ اگر ہم کچھ عرصہ تک ایک روشن چیز کی طرف دیکھتے رہیں۔ تو ریٹی نا کا وہ حصہ جس پر اس کا عکس پڑتا ہے جلد تھک جاتا ہے۔ پس اگر ہم ایک تیز روشن چیز کو دیکھتے ہوئے فوراً ایک دوسری سفید چیز مثلاً تختہ کاغذ کو دیکھنے لگتے ہیں تو ہمیں ایک سیاہ نقطہ دکھائی دیتا ہے۔ جو کہ اس روشنی کا تاریک عکس ہوتا ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ روشنی تختہ کاغذ کے اس حصہ پر سے ریٹی نا کے ایک ایسے حصہ پر پڑتی ہے جو کہ اس قدر تھک چکا ہوتا ہے کہ شعاعوں کی تحریک سے اس پر روشنی کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔

معمولی روشنی یا سفید روشنی جیسا کہ کہ اسے عام طور پر کہتے ہیں کئی قسم کی شعاعوں سے متفرق کی جا سکتی ہے جو کہ ریٹی نا پر پڑ کر مختلف قسم کے رنگوں کا احساس پیدا کرتی ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

پس جس طرح سے ریٹی نا تھک کر معمولی روشنی کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اسی طرح سے وہ کسی رنگ کے احساس کے لیے بھی تھک جانا یا چیز ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک تختہ کاغذ پر سرخ کاغذ کا ٹکڑا کاٹ کر لگایا جائے۔ پھر اس کاغذ کے ٹکڑے پر نظر جما کر کچھ عرصہ تک دیکھا جائے تو اس سرخ نشان کی بجائے ایک سبز نشان دکھائی دینے لگ جاتا ہے جس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ریٹی نا کا وہ حصہ جس پر سرخ نشان کا عکس پڑتا تھا سرخ شعاعوں کے احساس کے لیے تھک جاتا ہے۔ پس یونہی کہ وہ سرخ نشان دور کر دیا جاتا ہے۔ ان سرخ شعاعوں کا جو سفید روشنی میں اس نقطہ سے آتی تھیں۔ کچھ اثر باقی نہیں رہتا اور اب یہ صورت ہوتی ہے کہ اس نقطہ سے جو سفید روشنی آتی تھی۔ گویا اس میں کوئی سرخ شعاع ہے ہی نہیں لیکن اگر تم سفید روشنی میں سے سرخ شعاعوں کو نہ نکالو تو تمہیں سبز شعاع ہوتی ہے۔ یا یہ کہ سرخ اور سبز شعاعوں کو ملانے سے سفید روشنی بنتی ہے۔ سرخ اور سبز رنگ کو عینی رنگ کہتے ہیں۔ جب آنکھ کسی رنگ کے لیے تھک جاتی ہے تو دوسرا رنگ دکھائی دینے لگ جاتا ہے۔

احساس نور: عینی رنگ کو محسوس کرنا احساس رنگ کو سمجھنے کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ آنکھ کی طرح روشنی بھی ایک مادہ کی حرکت خیال کی جاتی ہے۔ ایتھر جو ایک لطیف ہر جگہ موجود خیال کی جاتی ہے۔ پس جب اس میں حرکت ہوتی ہے۔ اور وہ حرکت ایسے شبکیہ ریٹی نا تک پہنچتی ہے۔ تو اسوقت روشنی کا احساس ہوتا ہے۔ ایتھر کی یہ حرکت لہروں کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور مختلف قسم کی یہ لہریں مختلف قسم کے رنگ پیدا کرتی ہیں اور مختلف قسم کے رنگوں کی لہریں چھوٹی بڑی ہوتی ہیں۔ چنانچہ سرخ رنگ کی لہریں سب سے بڑی اور مختلف قسم کے رنگوں کی لہروں سے زیادہ لمبی ہوتی ہیں۔ اور نیلے رنگ کی روشنی کی لہریں سب سے چھوٹی ہوتی ہیں۔

سفید رنگ سات رنگوں کا مجموعہ یا مرکب ہے۔ کیونکہ جب ایک سفید رنگ کی شعاع کسی منشور مثلثی یعنی شلث نما شیشہ (پرزم) میں سے گزرتی ہے تو وہ ان سات رنگوں (۱) سرخ (۲) نارنجی (۳) زرد (۴) سبز (۵) نیلا (۶) گہرا نیلا (۷) بنفشی میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اور سات رنگ قوس قزح میں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ پھر اگر مذکورہ بالا ساتوں رنگ یعنی ساتوں رنگ کی شعاعوں کو ایک دوسرے مثلث نما شیشہ کو خاص طریق سے رکھ کر اس کے ذریعے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جمع کیا جائے۔ تو ان سا توں رنگوں کی شعاعوں کا مجموعہ وہی سفید شعاع یا سفید رنگ کی روشنی ہوتی ہے۔

نوٹ:۔ مذکورہ بالا سات رنگوں میں سے یہ تین رنگ (۱) سُرخ (۲) سبز (۳) نیلا اصلی رنگ ہیں۔ اور باقی اضافی ہیں۔ جو کہ اُن کی ترکیب سے پیدا ہوتے ہیں:۔

تجربہ۔ اگر سفید موٹے کاغذ کی ایک چکتی یا چکر کو فوس قزح کے رنگوں کی طرح سات رنگوں سے رنگ دیا جائے اور پھر اس کے مرکز میں ایک سوئی رکھ کر اس پر اس کو خوب زور سے چکر دیا جائے۔ تو ان سات رنگوں کے باہم مل جانے سے کاغذ کا وہ چکر بجائے رنگین دکھائی دینے کے سفید دکھائی دیتا ہے۔ اور اگر مذکورہ بالا سات رنگوں میں سے بعض دو یا تین رنگوں کو بھی خاص نسبت سے کاغذ کے چکر پر لگا کر اُسے زور سے چکر دیا جائے۔ تو بھی نتیجہ وہی نکلتا ہے۔ یعنے وہ چکر سفید دکھائی دیتا ہے۔ اس تجربہ سے بھی صاف ظاہر ہے۔ کہ سفید رنگ سات رنگوں کا مجموعہ یا مرکب ہے۔

جب ہم کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں۔ جس کا رنگ سفید ہوتا ہے تو ہمیں وہ سفید اس واسطے نظر آتی ہے کہ جب اس پر روشنی پڑتی ہے۔ تو اس سے سب قسم کی شعاعیں ہماری آنکھ میں منعکس ہوتی ہیں۔ اور جب ہم کسی رنگ دار چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ ہمیں اس واسطے رنگین نظر آتی ہے کہ جب اس پر روشنی پڑتی ہے۔ تو اس کی سطح پر سے صرف اسی رنگ کی شعاعیں واپس آکر ہماری آنکھ میں منعکس ہوتی ہیں۔ اور باقی سب رنگوں کی شعاعیں اس میں جذب ہو جاتی ہیں۔ مثلاً جب ہم کسی سُرخ رنگ کی چیز کو دیکھتے ہیں۔ اور سفید رنگوں کی شعاعیں اس پر پڑتی ہیں تو اس میں باقی سب رنگوں کی شعاعیں تو جذب ہو جاتی ہیں۔ مگر صرف سُرخ رنگ کی شعاعیں اس کی سطح سے ہماری آنکھ میں آتی ہیں:۔

رنگ کوری۔ (کلر بلائنڈنیس) ریٹی نا یعنی طبقہ شبکیہ کی تشریح میں ہم لکھ چکے ہیں۔ کہ اس کے دس طبقات میں سے دوسرا طبقی جو راڈز اور کونز کا ہوتا ہے۔ وہ بصارت کیلئے نہایت اہمیت رکھتا ہے اور اس طبقی کی کونز کے ذریعے رنگوں کا احساس ہوتا ہے پس اگر ان کونز میں کسی قسم کا نقص آجائے تو پھر رنگ کوری کی شکایت ہو جاتی ہے۔ یعنے کوئی ایک رنگ یا بعض اوقات سوائے سفید کے باقی کے اور رنگ دکھائی نہیں دیتے:۔

ریل اور جہاز کے ملازمین بالخصوص سگنلروں اور ڈرائیوروں یا ملاحوں یعنے جہاز رانوں

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہیں اس قسم کا نقص بصارت یعنی رنگ کوری کی شکایت نہایت بُری ہوتی ہے۔ ایسے اشخاص ان محکموں کی ملازمت کے قابل نہیں ہوتے۔

اندازہ جسامت ومسافت۔ مختلف اشیاء کی جسامت یعنی قد کا اندازہ نیز ان کی مسافت یعنی فاصلہ کا اندازہ بھی آنکھ کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے۔ مختلف اشیاء کی جسامت کے متعلق ہمارا اندازہ کچھ تو زاویہ نگاہ پر منحصر ہوتا ہے۔ جس کے ماتحت وہ دکھائی دیتی ہیں لیکن زیادہ تر وہ اس اندازہ پر منحصر ہوتا ہے جو کہ ان اشیاء کی مسافت یا دُوری کے متعلق ہم لگاتے ہیں چنانچہ ایک بلند پہاڑ جو کئی میل دُور ہوتا ہے۔ اسی زاویہ نگاہ سے دکھائی دیتا ہے جس سے کہ نزدیک کی ایک چھوٹی پہاڑی دکھائی دیتی ہے۔ مگر ہم استدلال کرتے ہیں کہ پہاڑ بہت بلند ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں۔ کہ وہ پہاڑی کی نسبت زیادہ دُور ہے۔ ہمارا مسافت کا اندازہ اکثر غلط ہوتا ہے۔ اس لیے جسامت کا اندازہ بھی غلط ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک روز روشن میں ایک چھوٹی پہاڑی کی چوٹی پر چلتے پھرتے آدمی قد وقامت میں غیر معمولی طور پر بڑے دکھائی دیتے ہیں۔ کیونکہ ہم انکے فاصلے کا زیادہ دُور کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اسی طرح بعض وقت کہر یا ابر یا غبار کی حالت میں ہم اشیاء کی ساخت یعنی ان کے فاصلہ کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے اس لیے چیزیں چھوٹی سے بڑی معلوم ہوتی ہیں۔ وغیرہ۔

اندازہ مسافت اکثر اس بات پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ کہ اس چیز کو صاف طور پر دیکھنے کے لیے ہمیں کس قدر طاقت ایکامودیشن استعمال کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ جب یہ طاقت زیادہ استعمال کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم کو یہ خیال ہوتا ہے۔ کہ وہ چیز نزدیک ہے اور جب یہ طاقت کم استعمال کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ چیز دور ہے۔

تخیلاتِ چشم۔ یعنی ایسے محسوسات بصری جو کہ آنکھ کے اندر سے محسوس ہوتے ہیں۔ مثلاً اشکال پرکنجی اور آنکھ کے ترمرے چنانچہ مثلاً اگر ایک خوب روشن شمع لیکر کسی اندھیری کوٹھڑی میں جاکر کسی تاریک دیوار کو دیکھتے رہیں تو اس شمع کو ایک آنکھ کے بیرونی جانب کے نزدیک اور نیچے کو ہلاتے رہیں۔ تاکہ روشنی اس آنکھ پر ترچھی پڑے۔ تو اس تاریک دیوار پر شاخ دار سُرخ سُرخ خطوط کی ایک شبیہ دکھائی دیتی ہے۔ جس کے دو خطوں کے درمیان میں پیالہ نما گول داغ بھی دکھائی دیتا ہے اس شکل کو شکل پرکنجی کہتے ہیں۔ اس شکل کے باریک شاخدار سُرخ خطوط درحقیقت پردہ ریٹی نا کی خونی رگوں کا عکس ہوتا ہے اور گول

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

داغ اسکے زرد نقطہ کا عکس ہوتا ہے۔

آنکھ کے تیسرے، جن کو عربی میں خیالاتِ چشم اور انگریزی میں مسّی والی ٹین ٹیز کہتے ہیں جو کہ سفید یا سیاہ رنگ کے اور مختلف اشکال کے ہوتے ہیں۔ بعض وقت آنکھوں کے سامنے اُڑتے نظر آتے ہیں۔ متقدمین اطبّاء یونان نے تو ان کو نزول الماء (موتیا بند) کا مقدمہ لکھا ہے۔ لیکن یہ رطوبت زجاجیہ (وٹری اس ہیومر) کی خرابی سے بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ اور قریب نظری (مائی اوپیا) اور بعید نظری (ہائپر مٹروپیا) میں بھی یہ اکثر دکھائی دیا کرتے ہیں۔

کیا نور یا روشنی آنکھوں کے اندر سے بھی پیدا ہو سکتی ہے؟ بیشک پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ ریٹینا پر بیرونی روشنی پڑنے کے علاوہ اور اسباب سے اس پر روشنی کا احساس پیدا ہو سکتا ہے چنانچہ (۱) آنکھ کو زور سے دبا ئیں تو اس میں روشنی کی جھلک پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنے جب ریٹی نا پر کسی قسم کا دباؤ پہنچتا ہے۔ تب بھی آنکھ میں روشنی کا احساس ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک درخشندہ شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ جو دباؤ کے رہنے تک موجود رہتی ہے۔ اس کو اصطلاح میں فاسفین کہتے ہیں۔ یہ شکل ایسی ہوتی ہے۔ جیسے کہ طاؤس یعنی مور کی دُم کے ہر ایک پَر کے درمیان آنکھ کی شبیہ ہوتی ہے۔

(۲) داغ پر چوٹ لگنے یا سر کے بل گرنے سے یا آنکھ پر چوٹ لگنے سے بھی آنکھ کے اندر روشنی کے شعلے یا چمکارے پیدا ہو جاتے ہیں یا آنکھ کے سامنے چنگاریاں سی اڑتی دکھائی دیتی ہیں۔

(۳) آنکھ کے اندر یعنی ریٹی نا پر برقی تحریک یعنی تار بجلی کی تحریک سے بھی روشنی کی چمک یا جھلک پیدا ہو جاتی ہے۔

نوٹ:۔ متقدمین اطبّاء کا خروج شعاع کا مسئلہ بھی مذکورہ بالا بیان پر ہی مبنی ہے جسے دیکھو صفحہ ۲۱۸ پر۔

اندھیرے میں کیونکر دکھائی دیتا ہے؛ ریٹی نا یعنی طبقہ شبکیہ کے متعلقہ نوٹ میں یہ بتلایا گیا ہے۔ کہ اس کے دس طبقات میں سے راڈز اور کونز کا جو دوسرا طبق ہے۔ وہ قوت بصارت کے لیے نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکہ راڈز کے ذریعے روشنی اور تاریکی کا احساس ہوتا ہے۔ اور کونز کے ذریعے صرف رنگوں کا احساس ہوتا ہے۔ راڈز میں وژوئل پرپل (ارغوانِ بصری) ہوتی ہے۔ جو کہ کونز میں مطلق نہیں ہوتی۔ تاریکی یا اندھیرے میں ان راڈز کے درمیان وژوئل پرپل یعنی ارغوان بصری مکرر پیدا ہو جاتی ہے جس سبب سے ان میں یہ خاصہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہے کہ وہ تاریکی میں بھی دیکھ سکتی ہیں۔ پس جن اشخاص میں رنگ کوری کی شکایت ہو جاتی ہے۔ یعنی جنہیں رنگ دکھائی نہیں دیتے یا ایسے جانور جو کہ تاریکی میں رہتے ہیں۔ یا بہت سے ایسے جانور جو کہ رات کو اندھیرے میں دیکھتے ہیں۔ جیسے اُلو۔ چمگادڑ۔ بلی۔ کورمونش۔ یعنی بھیجو ندر وغیرہ ان کی بصارت کلیتہً راڈز کے ذریعے ہی انجام پاتی ہے۔ یعنی وہ راڈز کے ذریعے ہی دیکھتے ہیں پس جب ان راڈز میں کسی قسم کا نقص واقع ہو جاتا ہے۔ تو پھر رتوندا یا شبکوری کی شکایت ہو جاتی ہے شبکوری کو عربی میں غشار اور انگریزی میں سیمی زل اد سایا نائٹ بلائنڈ نیس کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں راڈز میں اغلباً ڈزڈیل پرپل دوبارہ پیدا نہیں ہوتا۔

طبی نوٹ۔ بصارت کی ماہیت میں حکماء یونان اور انکے متقدمین و تابعین کے نظریات بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ چنانچہ رویت (آنکھ سے دیکھنا) کے متعلق انکے مندرجہ ذیل تین مذاہب ہیں۔

[illegible] شعاع۔ بعض حکماء کا یہ مذہب ہے کہ آنکھوں سے مخروطی شکل کی شعاعیں (کونز آف لائٹ) [illegible] جسکا کچھ حصہ آنکھ کے قریب ہوتا ہے اور زائد حصہ بعد اور چوڑا حصہ مبصر دکھائی [illegible] کی سطح کے قریب [illegible] اس چیز [illegible] کے یعنی بنا بر اس چیز [illegible] کھائی دیتی ہے [illegible] شعاع نہیں ہوتا بلکہ انہی مخروطی شعاع [illegible] آف لائٹ کہتے ہیں [illegible] تصویر [illegible] ہیئت قرار نہیں [illegible] کہتے ہیں کہ

[illegible] سے بصارت [illegible] کے ناک سے [illegible] یعنی [illegible] کہ آنکھ [illegible]

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(۳) انطباع صورت: بعض حکماء کا یہ مذہب ہے کہ مبصر یا مرئی یعنی دکھائی دینے والی چیز کی صورت شفاف ہوا کے ذریعے رطوبت جلیدیہ (لینز) میں چھپ جاتی ہے۔ اور پھر رطوبت جلیدیہ (لینز) سے اسکا عکس مجمع النور (آپٹک کنورجنس) پر منعکس ہوتا ہے اور مجمع النور وہ آلہ ہے جہاں ہر دو عکسِ محوف (آپٹک نرو) ملتے ہیں۔ پھر وہاں سے حسِ مشترک کو اس صورت کا احساس ہوتا ہے اور پھر حسِ مشترک سے نفس ناطقہ کو اس کا ادراک ہوتا ہے۔

مبصر یا مرئی یعنی دکھائی دینے والی چیز کی صورت رطوبت جلیدیہ پر اور پھر اس سے آگے مجمع النور میں کیونکر خود بخود طبع ہو جاتی یا چھپ جاتی ہے؟ اس بارہ میں بھی [illegible] مبصر یعنی دکھائی دینے والی چیز آنکھ کے سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے [illegible] رطوبت جلیدیہ میں اور رطوبت جلیدیہ سے [illegible] ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں [illegible]

فائدہ: [illegible] کے متعلق [illegible] حکماء یونان [illegible] انطباع [illegible] حقیقت [illegible] یہ امر [illegible] کے ذریعے [illegible] رطوبت جلیدیہ [illegible] کے کیمیا [illegible]

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اذن وقوتِ سامعہ (یعنی) کان اور شنوائی

کان قوت سماعت یعنی شنوائی کا خاص آلہ ہے۔ اس کے تین حصے ہوتے ہیں (۱) بیرونی کان یعنی کان کا بیرونی حصہ۔ (۲) درمیانی کان یعنی کان کا درمیانی حصہ (۳) اندرونی کان۔ یعنی کان کا اندرونی حصہ۔ کان کے بیرونی حصے کو ہی عرف عام میں کان کہتے ہیں۔ جو بذریعہ ایک نالی کے درمیانی حصے میں تمام ہوتا ہے۔ اس درمیانی حصے کو جوبہ کہتے ہیں۔ جو درحقیقت ایک جوف ہے۔ جس میں کان کی تین چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ کان کے بیرونی حصے اور درمیانی حصے کے مابین ایک جھلی ہوتی ہے۔ جسے کان کا پردہ کہتے ہیں۔ درمیانی حصے کے بعد کان کا اندرونی حصہ ہے۔ جس کو پیچیدہ ہونے کے سبب عربی میں تیہ یعنی بھول بھلیاں کہتے ہیں۔ یہ اندرونی حصہ ہی دراصل قوت سامعہ کا خاص عضو ہے کیونکہ اسمیں عصب سامعہ کے ریشے پھیلتے ہیں۔ اور کان کا بیرونی حصہ اور درمیانی حصہ ہوا کی لہروں کو اندرونی حصہ تک پہنچاتے ہیں۔ تسہیل بیان کے لیے ذیل میں ان کا علیحدہ علیحدہ بیان کیا جاتا ہے

(۱) بیرونی کان

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
بیرونی کان	صیوان الاذن	آریکل Auricle

بیرونی کان کی ساخت میں ایک صدف نما کان کی کرسی اور ایک کان کی نالی ہوتی ہے سہولت بیان کے لیے ان کا بھی علیحدہ علیحدہ بیان کیا جاتا ہے۔

کان کی کرسی

صدفۃ الاذن — پینا Pinna

کان کی کرسی لچکیلی صدف نما بیضوی شکل کی اور جلد سے پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس پر چند چھوٹے چھوٹے عضلات لگے رہتے ہیں۔ بعض حیوانات مثلاً بلی کتا۔ خر اور خرگوش وغیرہ میں یہ عضلات بڑے ہوتے ہیں جن سے وہ حیوانات اپنے کانوں کو ہلا سکتے ہیں۔ بعض انسان بھی اپنے کانوں کو کسی قدر ہلا سکتے ہیں۔ کان کی کرسی کے اندر کی طرف چند ایک نشیب و فراز پائے جاتے ہیں۔ جن کو علیحدہ علیحدہ ناموں سے نامزد کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کرسی کے بیرونی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اس پردہ کی ساخت میں عروق الحاقی بافت ورنگین شاخدار کیسٹ (سیلز) ہوتے ہیں۔ سامنے کی طرف یہ پردہ چند نوکدار حصص میں ختم ہوتا ہے جنکو زوائد ہدبیہ (سیلی مُری پرا سیسنز) کہتے ہیں ؛

فائدہ:۔ چونکہ طبقہ مشیمیہ کے اندر کی طرف سیاہ رنگ ہوتا ہے اسلیے اسکا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اپنی سیاہی کے سبب روشنی کی شعاعوں کو جذب کر کے آنکھ کی اندرونی رنگت میں اعتدال پیدا کر دیتا ہے جس سے بصارت میں بے اعتدالی و پریشانی واقع نہیں ہوتی اور یہی سبب ہے۔ کہ جن حیوانات کی آنکھوں کا یہ طبقہ مشیمیہ اندر سے سیاہ نہیں ہوتا۔ مثلاً چمگادڑ وغیرہ وہ دن کی روشنی میں دیکھ نہیں سکتے۔ انسان میں بھی جب اس پردہ کی اندرونی سیاہی میں کمی آجاتی ہے تو مریض رتوندہ کور ہو جاتا ہے

نوٹ:۔ عضلہ ہدبیہ (سلی مُری مسل) وہ عضلہ ہے جو قرنیہ اور صلبیہ کی جانب ملاپ سے شروع ہو کر پچھلی طرف طبقہ مشیمیہ پر لگا ہوا ہے۔ اسی اعضاء کے سکڑنے سے طبقہ مشیمیہ آگے کو کھچ جاتا ہے۔ اور آنکھ کے موتی (طوبت جلیدیہ لینز) کا رباط معلق (سس پنسری لیگمنٹ) ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ عضلہ ہدبیہ کا فائدہ یہ ہے کہ مختلف مسافت کی کمی دور و نزدیک کی چیزوں کو دیکھنے کیلئے یہ عضلہ آنکھ کو آمادہ کرتا ہے۔ جیسا کہ آگے مفصل بیان کیا جائے گا ؛

اس عروقی پردہ کے اگلے حصہ کو ہی عنبیہ یا آئرس کہتے ہیں جسکو بعض مشرحین نے ایک علیحدہ پردہ قرار دیا ہے اور جس کا بیان حسب ذیل ہے ؛

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
انگوری پردہ	طبقہ عنبیہ	آئرس Iris

یہ گول نازک ٹکڑے اور پھیلنے والا پردہ درحقیقت مذکورہ بالا عروقی پردہ کا اگلا حصہ ہے یہ قرنیہ کے پیچھے اور لینز (طوبت جلیدیہ) کے سامنے واقع ہوتا ہے۔ اسکے درمیان ایک سوراخ ہوتا ہے۔ جیسے انگوٹھی میں جہاں نگینہ لگا رہتا ہے اس سوراخ کو اردو میں پتلی (حدقہ۔ پیوپل) کہتے ہیں مختلف انسانوں میں اس کا رنگ مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً بعض میں بھورا یا نیلگوں اور بعض میں زردی مائل مثل انگور یا قوس قزح کے رنگ کے اسی۔ لیے اسکو عربی میں عنبیہ اور جدید عربی میں قزحیہ اور انگریزی میں آئرس (قزحیہ) کہتے ہیں ؛

اس کی ساخت بھی مثل عروقی پردہ کے عروق الحاقی بافت اور عضلاتی ریشوں سے ہوتی ہے اسکے عضلاتی ریشے جو غیر ارادی ہوتے ہیں۔ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک گول (سرکولر) اور دوسرے آڑے (ریڈیل) چنانچہ جب گول ریشے سکڑتے ہیں۔ تو پتلی سکڑتی ہے اور جب آڑے ریشے سکڑتے ہیں تو پتلی پھیل جاتی ہے ؛

فائدہ:۔ پتلی کے سکڑنے اور پھیلنے سے یہ فائدہ ہے کہ پتلی میں سے آنکھ میں داخل ہونیوالی روشنی کی مقدار معین کی جاتی ہے۔ یعنی حسب ضرورت روشنی کم و بیش آنکھ میں پہنچائی جاتی ہے ؛

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
(۳) جالدار پردہ	طبقہ شبکیہ	ریٹی نا Retina

یہ آنکھ کا اندرونی اور نورانی پردہ ہے۔ یہ نازک اور شفاف پردہ درحقیقت عصبہ مجوفہ کا پھیلاؤ ہے۔ اور کل چیزوں کا عکس اسی پردہ پر منعکس ہوتا ہے۔ اس پردہ کے تین حصے ہوتے ہیں (۱) وہ حصہ جو کہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

عصبہ مجوفہ (آپٹک نرو) کے داخل ہونے کے مقام سے شروع ہو کر سامنے کی طرف ختم ہوتا ہے اسکا سامنا مسراد نما دار ہوتا ہے جسکو عربی میں حافہ مستہ اور انگریزی میں آرا سرپٹا کہتے ہیں (۲) وہ حصہ جو کہ عضلہ بدیہ (سلیئری شل) کے پیچھے ہوتا ہے (۳) وہ حصہ جو کہ عنبیہ (آئرس) کی پچھلی سطح پر ہوتا ہے ان تینوں حصوں میں سے پہلا حصہ دیکھنے کے کام آتا ہے زندگی میں یہ پردہ شفاف اور گلابی رنگ کا ہوتا ہے لیکن مرنے کے بعد دھندلا اور زردی مائل ہو جاتا ہے۔ جس مقام پر کہ عصبہ مجوفہ (آپٹک نرو) آنکھ کے اندر داخل ہوتا ہے وہاں اس پردہ شبکیہ کی سطح پر ایک بیضوی سفید چکتی نظر آتی ہے جسکو قرص بصری (آپٹک ڈسک) کہتے ہیں اور چونکہ اس مقام پر روشنی کا اثر نہیں ہوتا اس لیے اسکو تاریک نقطہ (بلائنڈ سپاٹ) کہتے ہیں نیز اس قرص کے عین درمیان ایک زرد نقطہ (یلو سپاٹ) ہوتا ہے جس پر بصارت نہایت تیز ہوتی ہے کیونکہ یہ حصہ روشنی کو سب سے زیادہ قبول محسوس ہوتا ہے۔

ریٹی نا یعنی طبقہ شبکیہ کی حالت نہایت پیچیدہ ہے اسکی ساخت میں مندرجہ ذیل دس طبق یا پرت ہوتے ہیں (۱) زگیں طبق جو کہ رائیڈ یعنی عروقی پردہ کے ساتھ لگا ہوتا ہے (۲) راڈز اور کونز کا طبق یہ طبق قوت بصارت کیلئے مخصوص ہے۔ اس طبق میں خاص قسم کے سیلز یعنی کیسے ہوتے ہیں۔ جن میں سے بعض عصا نما ڈنڈے کی شکل کے ہوتے ہیں جنکو راڈز کہتے ہیں اور بعض مخروطی یا گاؤدم شکل کے ہوتے ہیں جنکو کونز کہتے ہیں روشنی کی شعاعوں سے تحریک ہو کر اس لطیف ساخت میں ارتعاش ہوتا ہے چنانچہ راڈز کے ذریعے روشنی و تاریکی کا احساس ہوتا ہے اور کونز کے ذریعے مختلف قسم کے رنگوں کا احساس ہوتا ہے جب ان راڈز اور کونز میں کبھی قسم کا طبعی یا عارضی نقص ہوتا ہے تو (۱) اندھیری یا (۲) شبکوری یا (۳) رنگ کوری وغیرہ امراض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اندھیرے میں دیکھنے والے حیوانات مثلاً الو وچھچھوندر وغیرہ کے اس طبق میں صرف راڈز ہی ہوتے ہیں نیز دیکھو اندھیرے میں کیونکر دکھائی دیتا ہے۔ آگے ماہیت بصارت میں (۴) بیرونی نیوکلی کر طبق (۵) بیرونی بسالار طبق (۶) افقی کیسوں کا طبق (۷) اندرونی نیوکلی کر طبق (۸) بائی پولر کیسوں کا ہوتا ہے (۹) بے شاخ کیسوں کا طبق (۱۰) اندرونی بسالار طبق (۱۱) عقدوی کیسوں کا طبق (۱۲) عصبی ریشوں کا طبق جو باہم ملکر آپٹک نرو (عصبہ مجوفہ) بناتے ہیں جسکے ذریعے حس بصر یعنی بصارت کا احساس دماغ تک پہنچتا ہے۔ جو شائقین ایسے دقیق مریض مسائل کو بالتفصیل دیکھنا چاہیں۔ وہ ہاؤل صاحب کی مطول فزیالوجی کا مطالعہ فرمائیں۔

فائدہ:۔ عصبہ مجوفہ کے آخری ریشے طبقہ شبکیہ اور دیگر اجزا چشم کے توسط سے نورانی شعاعوں کو قبول کرتے ہیں اور انہیں دماغ تک پہنچاتے ہیں جہاں قوت باصرہ ان کا ادراک کر لیتی ہے لیکن آنکھ میں آنے والی روشنی طبقہ شبکیہ میں اجسام کی صورت اس وقت تک ہرگز نہیں بنا سکتی جب تک کہ وہ آنکھ کے چند خاص اجزا میں سے نہ گزرے جو روشنی کی شعاعوں کو آنکھ کے پھیلنے سے روک دیں کیونکہ روشنی روشن جسم سے نکل کر سب طرف پھیلا کرتی ہے ایسے اگر طبقہ شبکیہ کے سامنے ذرا دور تک روشنی کو اکٹھا کریں اور پھیلنے نہ دیں تو آنکھ میں آنے والی روشنی سے طبقہ شبکیہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کا صرف ایک نقطہ ہی روشن نہ ہوتا بلکہ شبکیہ کی ساری اندرونی سطح روشن ہو جایا کرتی۔ لہٰذا شبکیہ ایسی چیزوں کا محتاج ہے جو اسکے سامنے ہوں، اور وہ روشنی کو منتشر ہونے دیں۔ بلکہ ایسے جمع کرے شبکیہ کے مخصوص نقاط پر ڈالیں اگر قدرت کی طرف سے آنکھ میں ایسا انتظام نہ ہوتا۔ تو پھر روشنی اور تاریکی میں تمیز کرنے کے سوا اور کوئی چیز صاف طور پر دکھائی نہ دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ قدرت نے انسان اور دیگر حیوانات کی آنکھ میں چند شفاف اجسام اس طبقہ شبکیہ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں جو روشنی کی شعاعوں کو اکٹھا کر کے شبکیہ کے مقابل کے نقطوں پر ڈالتے ہیں جس سے اس جسم کی پوری شکل بن جاتی ہے۔ جس سے کہ یہ روشنی کی شعاعیں آئی ہیں۔ پس وہ شفاف اجسام کیا ہیں؟ بلفظ فرنیسے جو سب سے آگے واقع ہے۔ اس سے پیچھے رطوبت زجاجیہ ہے ان میں سے روشنی کی شعاعیں گزر کر کس طرح اکٹھی ہو جاتی ہیں اس کا بیان رطوبات چشم اور بابت بصارت میں کیا جائے گا۔

رطوبات چشم (یعنی) آنکھ کی رطوبتیں

نوٹ: آنکھ میں مندرجہ ذیل تین رطوبات ہیں اور چونکہ قرنیہ اور تین رطوبات چشم روشنی کی شعاعوں کو جو آنکھ کے اندر داخل ہوتی ہیں مختلف درجہ تک منحرف کر کے طبقہ شبکیہ پر اکٹھا کر دیتی ہیں۔ اسی لیے قرنیہ اور ان تینوں رطوبات کو آنکھ کا ری فریکٹو میڈیا یا واسطہ کسر النور کہتے ہیں۔ ان رطوبات چشم کے منافع یا فوائد کا بیان دیکھو آگے بابت بصارت میں:

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
(۱) آبی رطوبت	رطوبت بیضیہ	ایکوئس ہیومر Aqueous Humour

یہ پانی یا انڈے کی سفیدی کی مانند رقیق اور شفاف رطوبت (جو کہ ایک قسم کی لف یا ملغم ہوتی ہے) قرنیہ کے پیچھے اور رطوبت جلیدیہ (لینز) کے آگے ہوتی ہے۔ یعنی وہ دونوں کے درمیان ہوتی ہے پردہ عنبیہ (آئرس) اس رطوبت کے بیچ میں حائل ہوتا ہے۔ چنانچہ آنکھ کا وہ حصہ جو قرنیہ اور عنبیہ کے درمیان ہوتا ہے آنکھ کا اگلا خانہ (حجرۂ مقدمہ۔ اینٹیریر چیمبر) کہلاتا ہے۔ اور آنکھ کا وہ حصہ جو عنبیہ (آئرس) اور رطوبت جلیدیہ (لینز) کے درمیان ہوتا ہے۔ آنکھ کا پچھلا خانہ (حجرۂ مؤخرہ۔ پوسٹیریر چیمبر) کہلاتا ہے اور آنکھ کے ان دونوں اگلے اور پچھلے خانوں میں جو کہ پتلی کے ذریعے ایک دوسرے کیساتھ ملے رہتے ہیں یہی آبی رطوبت رہتی ہے۔

نوٹ: اطباء مصر رطوبت بیضیہ کو رطوبت مائیہ لکھتے ہیں جو کہ ایکوئس ہیومر کا صحیح مترادف ہے۔

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
(۲) آنکھ کا موتی	رطوبت جلیدیہ	کرسٹے لائن لینز Crystalline Lens
بلوری رطوبت	رطوبت بلوریہ	لینز

نوٹ: لینز ایک لاطینی لفظ ہے جسکے لغوی معنی ہیں عدس یا مسور چونکہ یہ رطوبت دانہ مسور کیطرح محدب السطحین یعنی دونوں طرف سے ابھری ہوئی ہوتی ہے۔ اسلیے اسکو انگریزی میں لینز کہتے ہیں (۲) جلیدیہ ایک عربی لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں اولا جو بھی دونوں طرف سے تقریباً محدب ہوتا ہے پس مقدمین اطباء نے اس رطوبت کو جلیدیہ یعنی اولے کے مشابہ سمجھ کر اس کو رطوبت جلیدیہ سے نامزد کیا۔ لیکن جدید اطباء مصر اس کو بلور کی مانند ہونے کی حیثیت سے رطوبت بلوریہ لکھتے ہیں اور اہل ہند اس کو آنکھ کا موتی کہتے ہیں:

یہ شکل میں اولے یا موتی کی مانند لیکن بلور یا شیشہ کی طرح شفاف مگر لچکدار۔ رطوبت آنکھ میں

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

پردۂ عنبیہ (آئرس) کے پیچھے اور رطوبت زجاجیہ (وٹرئس ہیومر) کے سامنے تشبیک میں واقع ہے یہ رطوبت جلیدیہ (لینز) محدب السطحین ہوتی ہے یعنی وہ دانہ مسدر کی طرح دونوں طرف سے ابھری ہوئی ہوتی ہے پہلی اصلی پچھلی سطح زیادہ ابھری ہوئی ہوتی ہے اور اسکے اوپر ایک نازک شفاف جھلی کا غلاف ہوتا ہے جسکو غشائیہ کبوتی یا کیپسول آف دی لینز کہتے ہیں کہتے ہیں یونانی اطبا اسی کو طبقہ عنکبوتیہ کہتے ہیں۔ یہ رباط معلق (سسپنسری لیگمنٹ) کیساتھ لگا ہوتا ہے جنمیں رطوبت جلیدیہ کی شکل گول اور اس کا رنگ سرخی مائل نیم شفاف ہوتا ہے۔ لیکن جوانی میں یہ رنگ شفاف اور سخت ہو جاتی ہے۔ اور بڑھاپے میں یہ سخت اور میلی ہو جاتی ہے اور شکل میں چپٹی سی ہو جاتی ہے۔

فائدہ:۔ رطوبت جلیدیہ روشنی کی شعاعوں کو اکٹھا کرنے میں آنکھ کے اندر سب سے اہم عضو ہے۔

نوٹ:۔ (۱) عضلہ جلیدیہ (سلی اری مسل) جو کہ قرنیہ وصلبیہ کی جار طاب سے شروع ہو کر پچھلی طرف طبقہ مشیمیہ میں ملتا ہے۔ اسکے سکڑنے سے طبقہ مشیمیہ آگے کو کھینچتا ہے تو لینز کا رباط معلق ڈھیلا ہو جاتا ہے جس سے لینز کے غلاف کا تناؤ بھی گھٹ جاتا ہے اور لینز چونکہ لچکدار ہوتا ہے اسلیے اسکے غلاف کے تناؤ کے کم وبیش ہونے سے اس کا اگلا ابھار بھی کم وبیش ہوتا رہتا ہے پس اسطرح سے دور ونزدیک کی چیزوں کو دیکھتے کے لیے لینز کم وبیش محدب ہوتا رہتا ہے۔

(۲) مقدمین اطبا کو یونان اسی رطوبت جلیدیہ کے غلاف کو یعنی لینز کے کیپسول کو بلوز عنکبوتیہ کہتے ہیں یہ بھی کے اس سفید باریک جالے کی طرح ہوتا ہے جس میں مکڑی انڈے دیتی ہے۔

(۳) اسی رطوبت جلیدیہ یعنی لینز یا آنکھ کے سفید موتی کے مکدر ہو جانے کو سرخ موتیا بند (نزول الماء۔ کیٹریکٹ) کہتے ہیں چنانچہ اس مرض کے علاج پر جب آنکھ پر جراحی کرتے ہیں یعنی اسے بناتے ہیں تو آنکھ کے مکدر موتی یا لینز کو نکال دیتے ہیں اور پھر اسکی بجائے محدب شیشہ کی عینک لگاتے ہیں۔

انگریزی نام	عربی نام	اردو نام
Vitreous Humour وٹرئس ہیومر	رطوبت زجاجیہ	زجاجی رطوبت

یہ پگھلی ہوئی کانچ کی مانند ایک صاف شفاف گاڑھی لیسدار رطوبت ہے۔ جو ایک باریک شفاف جھلی میں ملفوف ہو کر رطوبت جلیدیہ کے پیچھے اور پردہ شبکیہ کے سامنے واقع ہوتی ہے۔ یہ آنکھ کا سب سے زیادہ حصہ یعنی کل ڈھیلے کا ۲/۳ حصہ بنتی ہے۔ اسکے سامنے کی طرف ایک تشبیب یا گڑھا سا ہوتا ہے جس میں لینز واقع ہوتا ہے۔ آنکھ کا ابھار زیادہ تر اسی رطوبت پر منحصر ہوتا ہے اگر یہ رطوبت نکل جائے تو آنکھ بیٹھ جاتی ہے۔ یہ طبقہ شبکیہ اور رطوبت جلیدیہ کے درمیان ایک مناسب فاصلہ پیدا کرتی ہے۔ اور شعاعوں کے انکسار واجتماع میں بھی کچھ کام کرتی ہے۔

اب آنکھ کی تشریح لکھنے کے بعد ماہیت بصارت کا بیان کیا جاتا ہے جسکو ترجمہ سے سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔

ماہیت بصارت یعنی ہمیں کیونکر دکھائی دیتا ہے

روشنی کی شعاعیں آنکھ میں داخل ہو کر طبقہ شبکیہ میں تحریک پیدا کرتی ہیں۔ اور اس تحریک سے طبقہ شبکیہ کا رابطہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اور کونز کا نازک طبقہ متاثر ہوتا ہے یعنی شعاعوں سے اس میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور پھر یہ تحریک عصبہ مجوفہ کے ریشوں کے ذریعے دماغ تک پہنچتی ہے۔ اور دماغ اپنی قدرتی طاقت سے اس روشنی کا ادراک کرتا ہے۔ کیونکہ اگرچہ یہ ایک مسلم امر ہے کہ روشنی کا انعکاس طبقہ شبکیہ پر ہوتا ہے۔ لیکن اسکا ادراک دماغ ہی کو ہوتا ہے۔ بلکہ دماغ کے ذریعے عقل کو ہوتا ہے طبقہ شبکیہ کے متعلقہ نوٹ میں صفحہ ۲۹۰ پر ہم بتا چکے ہیں۔ کہ راڈز کے ذریعے روشنی کا احساس ہوتا ہے اور کونز کے ذریعے رنگ کا احساس ہوتا ہے لیکن پھر اس بات کو بخوبی سمجھنے کے لیے کہ ہمیں کیونکر دکھائی دیتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ پہلے مندرجہ ذیل اصطلاحات وتجربات کو بخوبی سمجھ لیا جائے۔

شعاعیں۔ جو چیز روشن ہوتی ہے۔ اس سے روشنی کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ یہ شعاعیں ایک مقام سے شروع ہو کر اگر پھیلتی جائیں۔ تو انکو پھیلنے والی منتشر شعاعیں ڈیوائی وجنٹ ریز کہتے ہیں۔ اور اگر یہ شعاعیں ایک مقام سے شروع ہو کر بجائے پھیلنے کے ایک نقطہ پر اکٹھی ہو جائیں۔ تو انہیں اکٹھی ہونیوالی یا متعارب شعاعیں (کن ورجنٹ ریز) کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ شعائیں بجائے پھیلنے یا اکٹھا ہونے کے متوازی ہوتی ہیں۔ یعنی انکا درمیانی فاصلہ برابر ہوتا ہے۔ ایسی شعاعوں کو متوازی شعائیں (پیرے لل ریز) کہتے ہیں۔ آفتاب کی شعاعیں عموماً متوازی شعاعیں سمجھی جاتی ہیں۔

انحراف شعاع یا انکسار نور (ری فریکشن) جب روشنی کی شعاعیں کسی شفاف جسم مثلاً آئینہ یا پانی وغیرہ سے گزر کر کسی دوسرے کثیف یا دھندلے جسم پر پڑتی ہے۔ تو اس شفاف جسم یعنی آئینہ یا پانی سے گزرتے وقت وہ ترچھی یا منحرف ہو کر گزرتی ہیں۔ چنانچہ انکے اس طرح پر گزرنے کو انحراف شعاع اور انگریزی میں ری فریکشن کہتے ہیں۔

صاف شیشہ۔ وہ شیشہ جسکی دونوں سطحیں ہموار یا برابر ہوں اور اسکو اردو میں صاف شیشہ اور انگریزی میں پلین گلاس کہتے ہیں۔ عام شیشے جو دروازوں اور کھڑکیوں میں لگائے جاتے ہیں اسی قسم کے ہوتے ہیں۔

محدب شیشہ۔ وہ شیشہ جسکی ایک سطح ابھری ہوئی ہو اسکو اردو میں محدب شیشہ اور انگریزی میں کن ویکس گلاس کہتے ہیں۔ اور وہ شیشہ جسکی دونوں سطحیں مثل دانہ مسور کے ابھری ہوئی ہوں اسکو دوطرفہ محدب شیشہ یا محدب السطحین شیشہ۔ عربی میں عدسہ بلوریہ اور انگریزی میں "بائی کن ویکس گلاس" یا لینز کہتے ہیں۔

مقعر شیشہ۔ وہ شیشہ جسکی ایک سطح مقعر یعنی گہری ہو اسکو اردو میں مقعر شیشہ اور انگریزی میں کن کیو گلاس یا کن کیو لینز کہتے ہیں۔ اور وہ شیشہ جسکی دونوں سطحیں مقعر یعنی گہری ہوں اسکو اردو میں دوطرفہ گہرا شیشہ یا مقعر السطحین شیشہ یا مقعر لینز اور انگریزی میں بائی کن کیو گلاس یا بائی کن کیو لینز کہتے ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

لمبوترا شیشہ۔ وہ شیشہ جو ایک محور ایکس پر تو صاف یعنی مسطح ہو اور اس محور کے زاویہ قائمہ پر جو دوسرا محور ہوتا ہے۔ اس پر وہ محدب یا مقعر ہو اس کو اردو میں استوانی لینز اور انگریزی میں سیلنڈری یا سلینڈرکل لینز کہتے ہیں۔

تجربات و نتائج

تجربہ ۱۔ اگر ایک دو طرفہ محدب لینز کو آفتاب کے سامنے رکھیں اور اس لینز کے پچھلی طرف کچھ فاصلہ پر ایک تختہ کاغذ یا ایک دھندلا شیشہ گراؤنڈ گلاس رکھیں اور پھر اس لینز کو اس تختہ کاغذ سے ذرا دور نزدیک لائیں تو ایک خاص فاصلہ سے اس کاغذ پر ایک نہایت روشن نقطہ پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ لینز میں سے گزر کر آفتاب کی شعاعیں جب کاغذ پر پڑتی ہیں۔ تو وہ ایک نقطہ پر جمع ہو جاتی ہیں۔ اس نقطہ کو اردو میں نقطہ ماسکہ اور انگریزی میں فوکس کہتے ہیں اور بعض اوقات اس کو نقطۂ ماسکہ اولیہ یا پرنسپل فوکس بھی کہتے ہیں اور لینز و فوکس کے درمیانی فاصلہ کو فوکل فاصلہ کہتے ہیں۔

تصویر محدب لینز و نقطہ ماسکہ



(۱) دو طرفہ محدب لینز (۲) متوازی شعاعیں جو لینز سے گزرتے وقت ترچھی ہو گئی ہیں۔
(۳) فوکس یا نقطہ ماسکہ پر شعاعیں آن کر اکٹھی ہوئی ہیں۔

نتیجہ۔ مذکورہ بالا تجربہ سے ثابت ہوا کہ جب روشنی کی متوازی شعاعیں دو طرفہ محدب شیشہ میں سے گزرتی ہیں۔ تو وہ ایک نقطہ پر جا کر جمع ہو جاتی ہیں۔

تجربہ ۲۔ اب ایک لینز کو ایک تاریک کمرہ میں لے جائیں۔ کہ جہاں پر صرف ایک شمع روشن ہو اور پھر لینز کو تھوڑی دور سے شمع کے مقابل کریں اور لینز کے پیچھے ایک پردہ یا دیوار ہو تو اس پردہ یا دیوار ہو تو اس پردہ یا دیوار پر اس شمع کا الٹا عکس پڑتا ہے یعنی الٹی تصویر بنتی ہے۔ کیونکہ محدب الطرفین شیشہ یا لینز میں سے جو شعاعیں گزرتی ہیں۔ ان میں سے مرکزی شعاعیں لینز میں سے گزرتے وقت باہم تقاطع کرتی ہیں۔ اور دیگر شعاعیں منکسر یا منحرف ہو کر پیچھے اس طرح سے گزرتی ہیں کہ اوپر کی شعاعیں نیچے اور نیچے کی شعاعیں اوپر۔ دائیں طرف کی بائیں طرف اور بائیں طرف کی دائیں طرف ہو جاتی ہیں جس سبب سے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سیدھی تصویر الٹی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ شمع کی الٹی تصویر سے ظاہر ہے۔

شمع کی الٹی تصویر



(۱) شمع (۲) دو طرفہ محدب لینز (۳) مرکزی شعاعیں جو لینز میں سے گزرتے وقت باہم تقاطع کرتی ہیں (۴) دیگر شعاعیں جو لینز میں سے گزرتے وقت منکسر یا منحرف ہو کر مرکز شعاع کی طرف مائل ہو جاتی ہیں۔ شمع کی الٹی تصویر جو پردہ یا دیوار پر گرتی ہے۔

اگر ہم شمع کی لو کو لینز کے قریب تر لائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شمع کی صاف الٹی تصویر پہلے سے زیادہ پیچھے یعنی ذرا دور بنتی ہے اور اسکے برخلاف کرنے سے نتیجہ برعکس ہوتا ہے پس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک متحرک چیز کا ایک مستقل صاف عکس پیدا ہو تو ہمیں چاہیے۔ کہ لینز کے پیچھے پردہ کو اس متحرک شے کی حرکات کے مطابق متحرک رکھیں یعنی آگے یا پیچھے جہاں عکس صاف پڑے۔ وہاں رکھیں۔

شمع کی الٹی تصویر



اس تصویر میں شمع چونکہ لینز کے قریب ہے۔ اس لیے اس کی الٹی شبیہ لینز سے دور بنتی ہے۔

نتیجہ۔ (۲) مذکورہ بالا تجربہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ ایک دو طرفہ محدب لینز ایک روشن شے کا الٹا عکس (الٹی شبیہ) ڈالتا ہے اور یہ کہ جس قدر لینز سے کوئی چیز نزدیک ہوتی ہے اسی قدر اسکا عکس لینز سے دور پڑتا ہے یعنی لینز اور عکس کا درمیانی فاصلہ (فوکل فاصلہ) زیادہ ہوتا ہے۔

تجربہ (۱-۳) اب اگر پہلے مستعملہ لینز کی بجائے شمع کے سامنے ذرا زیادہ محدب لینز رکھ دیا جائے تو معلوم ہو گا کہ عکس پہلے کی نسبت نزدیک پڑتا ہے۔ اور مختلف طاقتوں کے لینزوں پر ایسے تجربات کرنے سے یہ بات بخوبی ثابت ہو گئی ہے۔

نتیجہ ۳۔ مذکورہ بالا تجربہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ لینز جس قدر زیادہ محدب ہوتا ہے اس میں سے شمع وغیرہ کا صاف عکس اسی قدر نزدیک پڑتا ہے یعنی لینز اور شمع کے عکس کا درمیانی فاصلہ (فوکل فاصلہ) کم ہوتا ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

خلاصۂ تجربات (۱) اگر دو طرفہ محدب لینز پر متوازی شعاعیں پڑیں۔ تو وہ شعاعیں لینز میں سے گزر کر ایک نقطہ پر اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس نقطہ کو فوکس یا پرنسپل فوکس کہتے ہیں۔ اور لینز و فوکس کے درمیانی فاصلہ کو فوکل فاصلہ کہتے ہیں۔ (۲) لینز جس قدر دونوں طرف سے زیادہ محدب ہوتا ہے۔ اسی قدر اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ اور جتنی اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ اتنا ہی اس لینز کا پرنسپل فوکس نزدیک ہوتا ہے۔ یعنی فوکل فاصلہ کم ہوتا ہے۔ اور (۳) جس قدر لینز کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اسی قدر شعاعوں کے انحراف کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی شعاعیں اس میں سے گزرتے وقت زیادہ منحرف ہو جاتی ہیں۔ اور دور جا کر اکٹھی ہوتی ہیں۔ اور فوکل فاصلہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم کسی محدب لینز پر متوازی شعاعوں کی بجائے منتشر شعاعیں پڑیں۔ تو وہ بھی لینز میں سے گزر کر ایک نقطہ پر اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ مگر ذرا زیادہ فاصلہ پر یعنی ایسی صورت میں فوکل فاصلہ کسی قدر زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے شعاعیں جس قدر زیادہ منتشر ہوں گی اسی قدر وہ لینز میں سے دور جا کر اکٹھی ہوں گی۔ اور جس نقطہ پر ایسی شعاعیں جا کر اکٹھی ہوتی ہیں۔ اس کو سیکنڈری فوکس (نقطہ ماسکہ ثانویہ) کہتے ہیں۔

مقعر لینز:۔ (کنکیو لینز) اس قسم کے لینز پر جب متوازی شعاعیں پڑتی ہیں۔ تو وہ لینز میں سے گزر کر یعنے لینز کے دوسری جانب جا کر منتشر شعاعیں ہو جاتی ہیں۔ اور اگر اس پر منتشر شعاعیں پڑیں۔ تو وہ اس لینز میں سے گزر کر اور زیادہ منتشر ہو جاتی ہیں۔

استوائی لینز (سلنڈری کل لینز یعنی لمبوتر لینز) یہ ایسا لینز ہے۔ کہ جس میں ایک جگہ تو شعاعیں ایک دوسری کو تقاطع کرتی ہیں۔ اور دوسری جگہ منحرف ہوتی ہیں۔

اب ہم ایک ایسے آلہ کا بیان کرتے ہیں جس سے آنکھ کے مختلف حصص کے افعال بخوبی سمجھ میں آ جائیں۔ آپ اس بیان کو بغور پڑھیں۔

اس تصویر میں (و) ایک چھوٹا سا بکس (صندوقچی) ہے۔ جس کی پچھلی طرف یعنی پشت (ب) میں ایک چوکور شیشہ لگا ہے۔ اور باقی کا سارا بکس لکڑی یا دھات کا بنا ہوا ہے۔ اور اندر سے سیاہ رنگ کا ہوا ہے اس کے سامنی جانب کے وسط میں (ج) ایک گول سوراخ ہے جس پر جیب گھڑی کا ایک شیشہ لگا ہوا ہے۔ اور اس کی محدب

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تصویر بکس یعنی صندوقچی جو فوٹو کا کیمرہ بن سکتی ہے۔



سطح باہر کی طرف ہے (د) ایک دھندلا شیشہ ہے۔ جو کہ بکس میں آگے یا پیچھے ہو سکتا ہے۔ تاکہ سامنے جیب والے شیشہ میں سے مختلف فاصلوں سے جو عکس پڑیں۔ وہ اس پر آجائیں (ہ) دو سیاہ تختیاں (ا) کیمرہ یا بکس (ب) چوکونہ شیشہ (ج) گول سوراخ جس پر جیب گھڑی کا گول شیشہ ہیں۔ جو بطور پردوں کے لگا ہوا ہے۔ جس کی محدب سطح باہر کی طرف اور مقعر سطح اندر کی طرف (د) استعمال ہوتی ہیں۔ ان کے دھندلا شیشہ (ہ) دو سیاہ تختیاں جن میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں (و) محدب درمیان دو چھوٹے بڑے لینز جو دستہ میں لگا ہوا ہے۔

سوراخ ہیں۔ اگر ان سے ایک پردہ کو جیب گھڑی والے شیشہ کے پیچھے رکھ دیا جائے تو پھر روشنی کی شعاعیں صرف اسی پردے کے چھوٹے سے سوراخ میں سے گزر کر بکس کے اندر جا سکیں گی (و) ایک محدب لینز ہے۔ جو کہ ایک دستہ میں لگا ہوا ہے۔ اب اگر اس بکس کو طول میں درمیان سے کاٹ دیا جائے تو اس کی یہ صورت ہوگی اور اگر اس بکس کو سیاہ کپڑے سے ڈھانپ دیا جائے تو یہ فوٹو کھینچنے کا کیمرہ بن جائے یعنی ایک تاریک کمرہ جس میں ایک لینز کی مدد سے بیرونی چیزوں کا عکس ایک پردہ پر لیا جا سکتا ہے۔

مذکورہ بالا بکس کی تصویر جو درمیان میں کاٹ ڈالا گیا ہے۔



(ا) جیب گھڑی کا شیشہ جو بکس کے گول سوراخ میں لگا ہے یہ آگے محدب اور پیچھے مقعر ہے (ب) گراؤنڈ گلاس یعنی دھندلا شیشہ جس پر عکس پڑتا ہے۔

اگر ہم اس بکس کو پانی سے بھر دیں۔ تو پانی کی وہ محدب سطح جو جیب گھڑی والے شیشہ کی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اندرونی مقطر سطح میں اس کے بھرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ خود بجائے ایک محدب لینز کے کام دیگی پس اس طرح سے بغیر لینز کے استعمال کے ہی اس میں عکس یا شبیہ پیدا ہو جائیں گی اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مذکورہ بالا آلہ یعنی کیمرہ جس کا مفصل بیان کیا گیا ہے آنکھ کی بہت سی ضروری ساختوں کا اظہار کرتا ہے یعنی نمبر ۱ کا کیمرہ اپنی ساخت کے اعتبار سے وہ کرہ چشم یا آنکھ کے مشابہ ہے۔ چنانچہ (۱) وہ لکڑی یا دھات جس سے کیمرہ کا زیادہ حصہ بنا ہے اور ادھر اُدھر روشنی کو کیمرہ میں نہیں آنے دیتا ہے۔ آنکھ میں اس کی بجائے سکلیر الک کوٹ (طبقہ صلبیہ) ہے۔ جو کہ سخت اور غیر شفاف ہے۔ اور ادھر اُدھر کی روشنی کو آنکھ میں نہیں جانے دیتا (۲) کیمرہ اندر سے سیاہ رنگا ہوا ہے۔ اس کے سیاہ رنگ کی بجائے آنکھ میں کورائیڈ کوٹ (طبقہ مشیمیہ) ہے (۳) کیمرہ کے سامنے جو جیب گھڑی کا شیشہ لگا ہوا ہے۔ اس کی بجائے آنکھ میں کارنیا (طبقہ قرنیہ) ہے (۴) کیمرہ میں جو ڈایافرام یعنی باریک سوراخدار پردہ ہوتا ہے۔ جس کے ذریعے روشنی کی مقدار جو کہ کیمرہ میں داخل ہوتی ہے کم و بیش کی جا سکتی ہے۔ اس کی بجائے آنکھ میں آئرس طبقہ عنبیہ ہے۔ جس میں پتلی ہوتی ہے۔ جس کے سکڑنے یا پھیلنے سے روشنی کی مقدار جو آنکھ میں داخل ہوتی ہے کم و بیش کی جا سکتی ہے (۵) کیمرہ میں جو لینز ہوتا ہے اس کی بجائے آنکھ میں کرسٹلائن لینز (طوبت جلیدیہ) جو کہ شعاعوں کو منحرف کر کے ریٹینا (طبقہ شبکیہ) پر اکٹھا کر دیتی ہے (۶) جس طرح سے کیمرہ میں گراؤنڈ گلاس کو آگے یا پیچھے کر کے اور فوکس کو ٹھیک کر کے روشنی کی شعاعوں کو پلیٹ پر اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آنکھ میں بھی انتظام ہے جس کی وجہ سے لینز کی طاقت کو کم و بیش کرنے سے مختلف شعاعیں ریٹینا پر اکٹھی کی جا سکتی ہیں اس انتظام کو ڈاکٹری میں ایکاموڈیشن کہتے ہیں (۷) جس طرح سے کیمرہ میں باہر کی چیزوں کی تصویر پچھلی پلیٹ پر آجاتی ہے۔ اسی طرح سے آنکھ میں بیرونی چیزوں کی تصویر ریٹینا پر بن جاتی ہے۔ پھر یہاں سے عصب بصارت (آپٹک نرو۔ عصبہ مجوف) کے ذریعے دماغ کو جاتا ہے۔ جس کے ذریعے نفس یا عقل کو وہ چیز نظر آتی ہے ؛

چونکہ قرنیہ اور آنکھ کی رطوبات ثلاثہ (۱) کوئس ہیومر (رطوبت بیضیہ) (۲) کرسٹلائن لینز (رطوبت جلیدیہ) (۳) وٹرئس ہیومر (رطوبت زجاجیہ) روشنی کی شعاعوں کو جو کہ آنکھ کے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اندر داخل ہوتی ہے۔ مختلف درجہ تک منحرف ومنکسر کرکے اور مجتمع کرکے رے ٹینا طبقہ شبکیہ) پر اکٹھا کر دیتی ہے۔ اس لیے آنکھ کے چاروں اجزا (کو انگریزی میں ری فریکٹر میڈیا (واسطہ مکسر النور) کہتے ہیں۔ اور تاکہ انحراف شعاع یا انکسار نور (ری فریکشن کا مسئلہ اور آنکھ کی رطوبت ثلاثہ کے افعال بھی آپ کو بخوبی سمجھ میں آجائیں۔ ہم مندرجہ ذیل دو تین اور تجربات آپکو دکھاتے ہیں:۔

تجربہ نمبر ۱۔ اگر ایک تاریک کمرہ میں اس پانی بھرے ہوئے بکس (کیمرہ) سے چند قدم کے فاصلہ پر ایک روشن شمع کو اس انداز سے رکھیں کہ وہ اس بکس کے جیب گھڑی والے شیشہ کے

دھندلے شیشہ پر شمع کا اُلٹا عکس



(۱) شمع (۲) جیب گھڑی کا شیشہ جو آگے محدب اور پیچھے مقعر ہے (۳) سیاہ تختی جس میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جس میں شمع کی شعاعیں گزر رہی ہیں (۴) گراؤنڈ گلاس یعنی دھندلا شیشہ جس پر شمع کا الٹا عکس پڑا ہوا ہے

عین محاذ میں ہو۔ اور اب اس بکس کے گراؤنڈ گلاس کو ذرا آگے پیچھے لے جائیں۔ تو ایک خاص فاصلہ سے اس پر شمع کا صاف الٹا عکس پڑنے لگتا ہے کیونکہ روشنی کی شعاعیں جو کہ شمع سے نکلتی ہیں۔ وہ اس بکس کے سامنے جیب گھڑی والے شیشہ میں سے گزرتے وقت منحرف۔ یعنی ترچھی ہو جاتی ہیں۔ جس وجہ سے گراؤنڈ گلاس پر شمع کا الٹا عکس پڑتا ہے۔ یعنی اسکی الٹی شبیہ بنتی ہے۔ اور وہ پانی جو اس بکس میں بھرا ہوا ہے اور جس کی اگلی سطح جیب گھڑی کے شیشہ کی اندرونی مقعر سطح کے ساتھ لگنے سے محدب ہو جاتی ہے۔ وہ بجائے خود ایک محدب لینز کے کام دیتا ہے۔ پس مذکورہ بالا تجربہ سے ہم نے انسانی آنکھ کے شفاف قرنیہ کی۔ جو جیب گھڑی کے شیشہ کی مانند ہے) منفعت کو نیز اس کی پچھلی آبی رطوبت یا رطوبت بیضیہ (ایکوئس ہیومر) کے فوائد کو بخوبی ظاہر کر دیا ہے۔

اب اس تجربہ کو پھر کرو۔ اور پہلے جیب گھڑی کے شیشہ کے پیچھے ایک محدب لینز رکھو۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اور دیکھو جب صرف پانی واسطہ کسر النور تھا۔ اس کی نسبت اب شمع کا الٹا عکس نزدیک فاصلہ سے گراؤنڈ گلاس پر پڑا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے آنکھ میں کرسٹیلائن لینز (رطوبت جلیدیہ) کی بدولت آنکھ میں عکس پڑتا یا شبیہ بنتی ہے۔ یہ شبیہ کو اس قدر آگے لے آتا ہے۔ کہ وہ رے بننا بالکل نمایاں ہوتی ہے۔

لینز کا عکس کو نزدیک ڈالنا



(۱) شمع (۲) گھڑی کا شیشہ جو بکس کے گول سوراخ میں لگا ہوا ہے (۳) سیاہ تختی جسمیں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے (۴) ایک دستہ میں لگا ہوا محدب لینز (۵) گراؤنڈ گلاس یا دھندلا شیشہ جس پر شمع کا الٹا عکس پڑتا ہے۔

اب جبکہ گراؤنڈ گلاس پر شمع کا عکس پڑ رہا ہے۔ جیب گھڑی کے شیشہ اور لینز کے درمیان ایک وہ سوراخ دار پردہ (دیافرام) جس کا ذکر بکس کی تشریح میں ہو چکا ہے۔ حائل کر دو اور دیکھو کہ شمع کا عکس اب ویسا روشن نہیں جیسا کہ پہلے تھا۔ کیونکہ بہت سی روشنی کم ہو گئی ہے۔ لیکن یہ پہلے کی نسبت صاف تر ہے ایسے مختلف سوراخوں والے پردوں کو استعمال کرنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ کہ پردہ مذکور کا سوراخ جس قدر چھوٹا ہوتا ہے۔ اسی قدر عکس زیادہ صاف پڑتا ہے۔ پس اس تجربہ سے ہم نے آنکھ کے پردہ عنبیہ (آئرس) کی منفعت کو بخوبی ظاہر کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پردہ عنبیہ میں پتلی ہوتی ہے۔ جو چھوٹی بڑی ہو کر مناسب و ضروری روشنی کو آنکھ میں جانے دیتی ہے۔

ہم آنکھ میں عکس یا تصویر بننے کو ایک اور آسان ترین طریق پر بھی ظاہر کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک گردی شیشی لیں جس کو کرہ چشم تصور کیا جائے۔ سیاہ یا سفید کاغذ کا ایک گول ٹکڑا کاٹ کر جس کے درمیان پتلی کی طرح ایک چھوٹا سا سوراخ بھی ہو۔ اس شیشی کے ایک طرف چسپاں کر دیا جائے (جیسا کہ اس تصویر میں ہے) اب ایک محدب لینز کو ایک کارک وکاگ پر نصب کر دیں اور ایک دوسرے کارک پر گراؤنڈ گلاس کو کھڑا کر دیں۔ پھر اب محدب لینز کو کاغذ کی اس پتلی کے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

آنکھ میں بھی ہر چیز کی اسی طرح سے تصویر بنتی ہے

(۱) شمع (۲) کانچ میں لگا ہوا لینز (۳) کرد کی شیشی جسکے سامنے کاغذ کا گول ٹکڑا کاٹ کر لگایا ہوا ہے۔ اور اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے (۴) گراؤنڈ گلاس جس پر شمع کی الٹی شبیہ بن گئی ہے۔

سامنے رکھیں۔ اور شیشی کے دوسری طرف بالمقابل چند انچ کے فاصلہ پر گراؤنڈ گلاس کو کھڑا کر دیں۔ اس تصویر میں لینز آنکھ کے کرسٹلائن لینز کی بجائے ہے۔ اور یہ ویسا ہی کام دیتا ہے گویا کہ یہ آئرس (عنبیہ) کے پیچھے تھا چنانچہ گراؤنڈ گلاس کو ایک ٹھیک فاصلہ پر رکھنے سے اس پر شمع کی ایک صاف الٹی شبیہ بن جاتی ہے۔

نوٹ:۔ اسی لیے موتیا بند کی بیماری میں آنکھ کا مکدر موتی (مکدر لینز) نکال دینے کے اور اس کی بجائے شیشہ کا لینز آنکھ میں لگا دینے سے مریض کی نظر درست ہو جاتی ہے۔

ہم نے مذکورہ بالا بیان میں آنکھ کو فوٹو گرافر کے کیمرہ سے تشبیہ دی تھی۔ اس تاریک کیمرہ میں سامنے کی طرف ایک لینز لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کے پیچھے کی طرف گراؤنڈ گلاس کا پردہ ہوتا ہے۔ روشن شے سے روشنی کی شعاعیں ڈایافرام (سوراخ دار پردہ جو لینز کے آگے رکھا جاتا ہے) میں سے گزرتی ہیں جو صرف مرکزی شعاعوں کو اپنے سوراخ میں سے گزرنے دیتا ہے اور زائد بیرونی شعاعوں کو منقطع کر دیتا ہے۔ روشنی کی مرکزی شعائیں پھر لینز میں سے گزرتی ہیں۔ جس میں گزرتے وقت وہ منحرف ہو جاتی ہیں۔ اور پچھلے گراؤنڈ گلاس پر وہ الٹا عکس یا الٹی شبیہ بناتی ہیں۔ لیکن یہ پچھلا پردہ (گراؤنڈ گلاس) چونکہ متحرک ہے یعنی آگے پیچھے جا سکتا ہے اس لیے صاف عکس لینے کے لیے اس کو جس مناسب فاصلہ پر چاہیں وہاں رکھ سکتے ہیں۔ اور لینز کو آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن آنکھ میں گراؤنڈ گلاس پردہ کی بجائے پردہ رے ٹینا (پردہ شبکیہ) ہوتا ہے جس پر عکس پڑتا یا شبیہ بنتی ہے لیکن یہ پردہ متحرک نہیں ہوتا۔ یعنی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ پس جب ہم کسی خاص فاصلہ سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ ہم کو صاف دکھائی دیتی ہے کیونکہ اس فاصلہ سے رے ٹینا پر اس کا صاف عکس

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

پڑتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس سمت میں دوسری چیزوں کو جو اس پہلی چیز سے نزدیک و دور فاصلوں پر ہوتی ہیں۔ دیکھیں تو وہ ایسی صاف دکھائی نہیں دیتیں۔ لیکن اب اگر ہم دوسری چیز کو جو کہ پہلی چیز سے نزدیک ہے۔ غور دیکھنے لگیں۔ تو وہ چیز بھی ہم کو صاف دکھائی دینے لگتی ہے۔ کیونکہ اس کا بھی صاف عکس رے ٹینا پر پڑتا ہے۔ حالانکہ رے ٹینا آگے یا پیچھے نہیں ہٹا۔ لیکن آنکھ کی قوتِ منحرف (ری فریکٹو پاور) ضرور بڑھی ہے تاکہ اس نزدیک کی چیز کا صحیح فوکس لے۔ یعنی اس کو صاف طور پر دیکھ سکے۔ یہ تغیر سیلی ٹری مسلز کے لینز پر عمل کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ (دیکھو صفحہ ۲۸۱) اور جب ہم نزدیک سے دیکھتے ہوئے دور کی چیز کو دیکھنے لگتے ہیں۔ تو آنکھ میں اس کے برعکس تغیر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی سیلی ٹری مسلز (عضلات ہدبیہ) ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اور سسپنسری لگیمنٹ (رباط معلق) کو رائیڈ (مشیمیہ) کے کناروں کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ پس لینز کم محدب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دور و نزدیک کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے نظر کا جمانا جس کو اصطلاح میں ایکاموڈیشن کہتے ہیں۔ سیلی ٹری مسلز کے لینز پر عمل کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے جس کو ہم ذرا اور وضاحت سے بیان کیے دیتے ہیں ؎

ایکاموڈیشن۔ (نظر جمانا) یعنی نزدیک و دور دیکھنے کے لیے آنکھ کو آمادہ کرنا ؎

آنکھ کی قدرتی بناوٹ ایسی ہے کہ جب اس پر متوازی شعاعیں پڑتی ہیں تو وہ ٹھیک رے ٹینا پر جا کر اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اور تجربات سے یہ بات معلوم ہوئی ہے۔ کہ شعاعیں ان اشیاء سے آتی ہیں جو کہ بیس فٹ یا اس سے زیادہ فاصلہ پر واقع ہوں۔ وہ تقریباً متوازی ہوتی ہیں۔ اس لیے معمولی حالات میں آنکھ کی ساخت ایسی ہے۔ کہ بیس فٹ سے لے کر دو سو فٹ فاصلہ تک کی چیزیں رے ٹینا پر ٹھیک فوکس (منعکس) ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو شعاعیں ان اشیاء سے آتی ہیں جو کہ بیس فٹ سے کم فاصلہ پر واقع ہوں۔ وہ شعاعیں متوازی نہیں ہوتیں اس لیے وہ رے ٹینا پر فوکس (منعکس) نہیں ہوتیں۔ بلکہ اس سے پیچھے فوکس ہوتی ہیں۔ اسلیے انکی تصویر رے ٹینا پر نہیں بنتی اور وہ بخوبی دکھائی نہیں دیتیں۔ پس ان شعاعوں کو بخوبی دیکھنے کے لیے ان کو رے ٹینا پر فوکس کرنے کا انتظام کرنا پڑتا ہے اس انتظام کو ہی ایکاموڈیشن (نظر جمانا) کہتے ہیں۔ اور یہ انتظام اس طرح سے ہوتا ہے۔ کہ سیلی ٹری مسلز کے سکڑنے سے لینز کا سسپنسری لگیمنٹ (رباط معلق) ڈھیلا ہو جاتا ہے پس لینز جو صحت کی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

حالت میں لچکدار ہوتا ہے۔ وہ کسی قدر محدب ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی اگلی سطح زیادہ ابھر آتی ہے جس کی وجہ سے روشنی کی شعاعیں جو ریٹینا کے پیچھے فوکس (منعکس) ہوتی تھیں اب وہ ٹھیک ریٹینا پر فوکس ہو جاتی ہیں۔ پس اس انتظام ایکاموڈیشن کی طاقت دو باتوں پر منحصر ہوتی ہے ایک تو لینز کے لچکدار ہونے پر اور دوسرے سلی ٹری مسلز کے سکڑنے پر۔ کیونکہ اگر لینز لچکدار نہ ہوگا یا سلی ٹری مسل بخوبی نہ سکڑے گا۔ اور لینز کا سس پنسری لیگیمنٹ ڈھیلا نہیں ہوگا۔ اور لینز کی اگلی سطح ابھرے گی نہیں۔ تو یہ انتظام ٹھیک نہیں ہوگا چنانچہ جوں جوں آدمی کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ توں توں سلی ٹری مسل کے سکڑنے کی طاقت بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں (بالعموم چالیس سال کے بعد) دور کی چیزیں تو ٹھیک دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن نزدیک کی چیزیں ٹھیک دکھائی نہیں دیتیں۔ مثلاً بوڑھے اشخاص دور سے یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن نزدیک سے نہیں پڑھ سکتے۔ ایسی حالت کو پریس بائی اوپیا بصر الشیوخ۔ بڑھاپے کی نظر کہتے ہیں۔

نوٹ:۔ ہر ایک آدمی زیادہ سے زیادہ ایکاموڈیشن کو استعمال کر کے جس مقام سے کسی چیز کو صاف طور پر دیکھ سکتا ہے اس مقام کو اس شخص کا قریبی مقام کہتے ہیں۔ اور برخلاف ازیں کم سے کم طاقت ایکاموڈیشن کو استعمال کر کے جس مقام سے وہ کسی چیز کو صاف طور پر دیکھ سکتا ہے۔ اس مقام کو اس کا بعیدی مقام کہتے ہیں۔

حالت صحت میں قریبی مقام آنکھ سے قریباً چھ انچ کے فاصلہ پر ہوتا ہے۔ اور بعیدی مقام بے حد فاصلہ پر۔

ری فریکٹو ایرر یعنی انحرافی غلطی۔ یا شعاع کا آنکھ میں ٹھیک منحرف نہ ہونا:۔

عام طور پر آنکھ کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ بغیر ایکاموڈیشن کے متوازی شعاعیں ریٹینا پر فوکس ہو جاتی ہیں۔ ایسی آنکھ کو تندرست آنکھ کہتے ہیں۔ لیکن جب کسی سبب سے روشنی کی متوازی شعاعیں ریٹینا پر فوکس نہ ہوں۔ یعنی ایک نقطہ پر جمع نہ ہوں بلکہ آگے یا پیچھے فوکس ہوں۔ تو ایسی آنکھ کو تندرست آنکھ کو تندرست آنکھ نہیں کہتے۔ بلکہ آنکھ کی ایسی حالت کو اے میٹروپیا (نقص بصارت) کہتے ہیں۔ اور یہ صاف ظاہر ہے۔ کہ ایسی حالت دو وجوہ سے ہو سکتی ہے ایک تو لینز (رطوبت جلیدیہ) یا کارنیا (قرنیہ) کی قوت انحراف (ری فریکٹو پاور) کے کم و بیش ہو جانے سے اور دوسرے لینز اور ریٹینا کا درمیانی فاصلہ گھٹ جانے پر یا بڑھ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جانے سے اور اکثر یہ مرض اس دوسری وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ صحیح اور تندرست نظر وہ ہے جس سے نزدیک دور کی چیزیں صاف نظر آئیں اور جب صرف دور کی چیزیں یا صرف نزدیک کی چیزیں صاف دکھائی دیں تو پھر نگاہ صحیح نہیں بلکہ ناقص ہے۔ جس کے چند ضروری اقسام ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

قریب نظری یا کوتاہ نظری۔ (قصر البصر۔ مائی اوپیا) معمولی حالات میں لینز اور ریٹینا کا درمیانی فاصلہ ۲۲٫۵ ملی میٹر یا تقریباً ⅞ انچ (استقدر) ہوتا ہے۔ اور اگر یہ فاصلہ بڑھ جائے تو مائی اوپیا (قریب نظری) کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جس صورت میں روشنی کی شعاعیں ٹھیک شبکیہ پر نہیں پڑتی ہیں۔ بلکہ چیزوں کا عکس شبکیہ سے کسی قدر سامنے پڑتا ہے اس لیے وہ چیزیں جس کا عکس شبکیہ سے آگے پڑا ہے صاف نظر نہیں آتیں اور ایسا اکثر ان حالات میں ہوتا ہے جبکہ آنکھ کسی سبب سے بڑی ہو جائے اور آنکھ میں یہ نقص کبھی تو پیدائشی ہوتا ہے لیکن بعد از پیدائش دیگر اسباب سے بھی ہو جایا کرتا ہے چنانچہ (۱) رطوبت جلیدیہ کا غیر معمولی طور پر محدب ہونا ہے۔ (۲) طبقہ قرنیہ کا زیادہ ابھرا ہوا ہونا (۳) آنکھ کے اگلے پچھلے قطر کا زیادہ ہونا جس سے لینز اور ریٹینا یعنی رطوبت جلیدیہ اور طبقہ شبکیہ کا درمیانی فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے (۴) سیلیری مسل یعنی عضلہ ہدبیہ کے فعل کا زیادہ ہو جانا جس سے جلیدیہ کی تحدیب بڑھ جاتی ہے۔ اس کے عام اسباب ہوتے ہیں (۵) ایسے طلبار وغیرہ جو باریک بینی کرتے ہیں یا خراب روشنی میں سر جھکا کر پڑھتے یا نگاہ کا کام کرتے ہیں۔ ان کو اکثر یہ شکایت ہو جایا کرتی ہے۔ کیونکہ باریک بینی سے آنکھ پر زور پڑتا ہے۔ پس آنکھ کی طرف زیادہ خون آتا ہے جس وجہ سے آنکھ رفتہ رفتہ قد میں بڑھ جاتی ہے۔ طبقہ قرنیہ و رطوبت جلیدیہ کی تحدیب زیادہ ہو جاتی ہے۔ وغیرہ اس مرض میں مریض نزدیک سے تو بخوبی دیکھ سکتا ہے لیکن دور سے بخوبی نہیں دیکھ سکتا اس کا علاج صرف یہی ہے کہ مقعر لینز یعنے گہرے شیشوں کی مناسب عینک لگائی جائے۔ تا کہ شعاعیں زیادہ ڈائی ورجنٹ ہو کر ریٹینا پر فوکس ہوں۔ یعنی شبکیہ پر پڑیں۔

بعید نظری (ہائپر مٹروپیا) اسی طرح سے آنکھ میں کبھی مذکورہ بالا حالات کے برعکس حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی لینز اور ریٹینا کا درمیانی فاصلہ کم ہو جاتا ہے ایسی حالت کو ہائپر وپیا (بعید نظری) کہتے ہیں۔ اور یہ نقص آنکھ میں ایسی حالت میں ہو جاتا ہے۔ جب کہ آنکھ قد میں چھوٹی ہو جائے۔ خواہ پیدائشی ہو یا بعد از پیدائش دیگر اسباب سے اس حالت میں لینز

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

بلند کنارے کو عربی میں عُرف محیط یا حَتا الاذن اور انگریزی میں ہیلکس کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابل دموازی ابھرے ہوئے خط کو عربی میں عُرف متوسط یا نظیر الحِناء اور انگریزی میں اینٹی ہیلکس کہتے ہیں۔ اور ان دونوں کے درمیانی کشتی نما نشیب کو عربی میں حفرہ زورقیہ اور انگریزی میں سکیفائڈ فاسا کہتے ہیں عرف متوسط کا بالائی کنارہ دو شاخوں میں منقسم ہو کر ایک مثلث نشیب کو گھیرتا ہے جس کو عربی میں حفرہ مثلث اور انگریزی میں فاسا آمدی ہے لکس کہتے ہیں۔ عرف متوسط کے سامنے ایک گہرا نشیب یا جوف ہے جسکو عربی میں جوف مرکزی اور انگریزی میں کانکا کہتے ہیں۔ جس کو عرف محیط کی سامنی ترچھی نوک دو حصّوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ جوف مرکزی کے سامنے ایک چھوٹی سی بلندی ہوتی ہے۔ جس پر چند بال بھی ہوتے ہیں اس کو عربی میں بروز مقدم یا وَتد الاذن اور انگریزی میں ٹرے گس کہتے ہیں۔ اس کے مقابل پیچھے کی طرف کان کے سوراخ کے موازی ایک اور چھوٹی بلندی ہوتی ہے جس کو عربی میں بروز مؤخر یا نظیر الوتد اور انگریزی میں اینٹی ٹرے گس کہتے ہیں۔ اور دونوں بلندیوں کے مابین ایک گہرا کفدانہ ہوتا ہے جوف مرکزی کے وسط میں کان کی نالی کا بیرونی سوراخ ہوتا ہے۔ جس کو عربی میں صِماخ الاذن اور انگریزی میں می ٹیٹس آڈی ٹوریس ایکسٹرنس کہتے ہیں۔ بروز مؤخر کے پیچھے ملائم گوشت ہوتا ہے۔ جو کرّی سے خالی اور چربی دار ہوتا ہے۔ اس کو اردو میں کان کی لو فارسی میں نرمۂ گوش عربی میں حجّۃ یا شحمۃ الاذن اور انگریزی میں لابیُول کہتے ہیں۔

فائدہ: اس بیرونی کان یا کان کی کرّی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بیرونی ہوا کی لہروں کو جن سے آواز پیدا ہوتی ہے جمع کر کے کان کے سوراخ کی راہ درمیانی کان میں غشاء طبلی یا طبل الاذن تک پہنچا دیتی ہے۔

بیرونی کان کی تصویر



(۱) عرف محیط (۲) حفرہ مثلث (۳) عرف متوسط (۵) بروز مؤخر (۶) بروز مقدم (۷) جوف مرکزی (۸) شحمۃ الاذن

—Outer surface of the Pinna of the Right Ear.

1. helix; 2. antihelix; 3. tragus; 4. antitragus; 5. concha; 6. lobule.

کان کا سوراخ — صِماخ الاذن — می ٹیٹس آڈی ٹوریس ایکسٹرنس

کان کی نالی — مِزاب السمع — آڈی ٹوری کینال

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کان کی نالی۔ کان کے جوف مرکزی کے نشیب سے شروع ہوکر کان کے پردہ (غشاء طبلی) پر ختم ہوتی ہے۔ یہ نالی تقریباً سوا انچ لمبی قدرے بیضوی، دونوں سروں پر کشادہ اور درمیان میں تنگ ہوتی ہے۔ اسکی رفتار ترچھے طور پر سامنے اور اندر کی طرف ہوتی ہے۔ یہ نالی بیرونی کان کے مرکزی جوف سے شروع ہوکر درمیانی کان کے پردہ (غشاء طبلی) پر ختم ہوتی ہے۔ یعنی اس نالی کے اندرونی سرے پر ایک پتلی سی جھلی لگی رہتی ہے۔ جسے اردو میں کان کا پردہ عربی میں غشاء مقروش یا غشاء طبلی اور انگریزی میں میمبرینا ٹمپنائی کہتے ہیں۔ اس نالی کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک بیرونی جو غضروفی یعنی کرّی کا ہوتا ہے۔ یہ نصف انچ لمبا ہوتا ہے۔ اور دوسرا عظمی جو ہڈی کا ہوتا ہے اور یہ پون انچ لمبا ہوتا ہے۔ کرّی والا حصہ استخوانی حصے کے ساتھ خوب مظبوطی سے ملا رہتا ہے۔ اس نالی کے اندرونی جانب باریک چسپیدہ جلد کا استر ہوتا ہے اور اس کے غضروفی حصے میں چھوٹی چھوٹی گلٹیاں ہوتی ہیں جن سے ایک قسم کی مومی رطوبت تراوش پاتی ہے۔ جسے کان کا میل (صملوح۔ ویکس آفدی الرُ) کہتے ہیں نیز اس میں چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں۔ جو گرد وغبار یا کسی کیڑے وغیرہ کو کان میں نہیں جانے دیتے۔

Fig. 205.—Diagrammatic front view of the Left Ear.
A portion of the temporal bone has been detached.

اس تصویر میں بائیں جانب کی کنپٹی کی ہڈی کو چیر کر اس میں درمیانی اور اندرونی کان کی ساخت دکھائی ہے۔

(۱) بیرونی کان (۲) کان کا بیرونی سوراخ (۴) کان کا پردہ (۳) کان کا ڈھول (۵) پچھلی طرف کا سوراخ جو خلیا یا علیہ میں کھلتا ہے ۳ اور ۵ کے درمیان کان کی چھوٹی ہڈیوں کا سلسلہ (۶) نقنع یعنی کان وحلق کی درمیانی نالی (۵) کان کا اندرونی سوراخ کا تعلق عصب سامع سے ہے اور (۵) عصب سامع ہوکر بیضہ سے اوپر پتہ کی دیوار میں ختم ہوتا ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

فائدہ:- بیرونی ہوا کی لہریں جو کان کی کری میں گھستی ہیں۔ کان کی اسی نالی کے ذریعے کان کے پردہ تک پہنچتی ہیں۔ نیز اس نالی میں گنبد کی طرح ہر اگوئج کر آواز کو زیادہ سخت بناتی ہے۔

(۲) درمیانی کان

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
درمیانی کان	اذن متوسط	مڈل ائر Middle Ear
کان کا جوف	جویر تجویف طبلی	رٹم پے نم Tympanum
کان کا ڈھول	دُمامہ۔ طبل الاذن	ائر ڈرم Ear Drum

کان کا ڈھول (تجویف طبلی) ایک بے ڈول یا بے ترتیب جوف ہے جو کہ کنپٹی کی ہڈی کے سخت حصہ میں واقع ہے اور اس طرح پر محدود ہے کہ اسکے سامنے شریان سباتی کی حامل گیرائیڈ کینائیل پیچھے کنپٹی کی ہڈی کے زائدہ حلمیہ کے زنبوری خانے (خلایہ۔ حلمیہ۔ مسٹائڈ سیلزہ) اوپر تیلا استخوانی طبق جو اس کو کھوپری کے جوف سے علیحدہ رکھتا ہے۔ نیچے گردن کی اندرونی ورید کا شیب (حفرہ وداجیہ۔ جوگولز ماسا) باہر کی طرف کان کی نالی کی جھلی (غشاء طبلی اور اندر کی جانب اندرونی کان ہوتا ہے۔ یہ جوف ہوا سے بھرا رہتا ہے۔ اور کان اور حلق کی درمیانی نالی (نفتخ یوسٹے کین ٹیوب) کے ذریعے حلق سے ملا رہتا ہے۔ یہ جوف پانچ لائن لمبا۔ اڑھائی لائن چوڑا اور تین لائن گہرا ہوتا ہے۔ اس کی حد دیں چار دیواریں ایک چھت اور ایک صحن ہوتا ہے چھت ایک باریک استخوانی طبق سے بنتی ہے۔ جو اس کو جوف دماغ سے علیحدہ کرتی ہے۔ اس کا صحن تنگ اور جوگولر فاسا کے مقابل ہے۔ اس کے اندر کیطرف ایک باریک عصب (جیکب سینسر نرو) کے گزرنے کے لیے سوراخ ہوتا ہے۔ کان کا یہ جوف چونکہ ڈھول سے بہت مشابہ ہے اس لیے اس کو کان کا ڈھول کہتے ہیں۔ اور جس طرح ڈھول میں سے زائد ہوا نکلنے کے لیے پیچھے عموماً ایک سوراخ ہوتا ہے اسی طرح اس میں کان و حلق کا درمیانی سوراخ ہے۔

کان کے اس ڈھول (طبل الاذن) کی بیرونی دیوار غشاء طبلی یعنی کان کے پردہ سے بنتی ہے۔ اور اس دیوار میں تین چھوٹے چھوٹے سوراخ پائے جاتے ہیں۔ اس کی بیرونی دیوار میں ایک بیضوی سوراخ (کوہ بیضیہ۔ فنسترہ اوفیلس) ہوتا ہے جس پر عظم رکابی (سٹے پیز) کا قاعدہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جڑا رہتا ہے۔ اور یہ ایک جھلی سے بند رہتا ہے۔ نیز اس دیوار میں ایک گول سوراخ (کوہ مقدیرہ فنسٹرا روٹنڈ) ہوتا ہے۔ جو بیضوی سوراخ کے نیچے اور پیچھے واقع ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک جھلی سے بند ہوتا ہے۔ ان دو سوراخوں کے علاوہ اس میں چار چھوٹے چھوٹے ابھار ہوتے ہیں۔ جن میں سے ایک جوفدار۔ ایک گول اور مخروطی ہوتا ہے۔ اس کی پچھلی دیوار میں سٹائلڈ سیلڑ ہوتے ہیں اس کی اگلی دیوار میں ایک گول نالی عضلہ شادہ للطبلہ (ٹینسر ٹمپنائی کے لیے) ہوتی ہے۔ اس نالی کے نیچے کی طرف کان و حلق کی درمیانی نالی (یوسٹے کین بیوب) ہوتی ہے۔ جس کے ذریعے کان کا یہ جوف حلق کے ساتھ ملا رہتا ہے۔ اس نالی کی رفتار کا میلان سامنے نیچے اور اندر کو ہوتا ہے۔ اس نالی کا کچھ حصہ تو استخوانی ہوتا ہے۔ اور کچھ غضروفی۔ استخوانی حصہ تقریباً نصف انچ لمبا ہوتا ہے اور طبل الاذن کی اگلی دیوار کے نچلے حصے سے شروع ہو کر ایک بیضوی سوراخ میں ختم ہوتا ہے۔ اس کا غضروفی حصہ تقریباً ایک انچ لمبا ہوتا ہے۔ یہ نیچے کی طرف غشائی ہوتا ہے اور حلق کے بالائی اور پہلوی حصے میں ایک بیضوی سوراخ میں ختم ہوتا ہے۔ اسی نالی کے ذریعے حلق کی جھلی کان کے ڈھول کی جھلی (میوکس میمبرین) سے ملی رہتی ہے۔ اسی واسطے نزلہ حار (سورتھروٹ) میں اس جھلی میں اجتماع خون ہونے کے سبب یا لوزتین کے متورم ہوتے سے کان بھاری ہو جایا کرتے ہیں یعنی اونچا سنائی دینے لگتا ہے۔

کان کا پردہ غشاء طبلی ممبرینا ٹمپنائی Membraina Tympani

یہ جھلی کان کی نالی کو کان کے ڈھول سے علیحدہ کرتی ہے۔ یعنی ان دونوں کے درمیان واقع ہے۔ یہ جھلی پتلی شفاف شکل میں بیضوی نیچے کی نسبت چوڑی اور ترچھے طور پر نیچے اور اندر کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اور کان کی نالی (آڈی ٹوری کینال) کے کناروں پر سر چسپاں ہوتی ہے۔ عظم مطرقی (میلی اس) کا دستہ اس کے وسطین عمودی طور پر چسپاں رہتا ہے۔ اور اس کو اندر کی طرف کھینچے رکھتا ہے۔ اسی لیے اس جھلی کی اندرونی سطح محدب اور باہر والی مقعر ہوتی ہے۔ اس جھلی کے جس مقام پر مطرقی ہڈی چسپاں ہوتی ہے اسے انگریزی میں امبو کہتے ہیں۔ اس جھلی کی ساخت میں تین طبقات ہوتے ہیں۔ بیرونی طبقہ جلدی جو کان کی استری جلد سے بنتا ہے۔ درمیانی لیفی اور اندرونی غشائی مخاطی ہوتا ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جوبہ یعنی کان کے جوف یا ڈھول کے اندر تین چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ جن میں سے ایک بیرونی ہڈی۔ ہتوڑی نما ہڈی (عظم مطرقی میلی اس) کان کے پردہ کے ساتھ چسپاں ہوتی ہے۔ دوسری درمیانی ہڈی۔ اہرن نما ہڈی (عظم سندانی۔ انکس) ایک طرف بیرونی ہتوڑی نما ہڈی سے اور دوسری اندرونی رکاب نما ہڈی سے جڑی رہتی ہے۔ تیسری اندرونی ہڈی۔ رکاب نما ہڈی (عظم رکابی۔ سٹے پیز) اس کا چوڑا سرا تو مذکورہ بالا گول سوراخ پر لگا رہتا ہے۔ اور دوسرا درمیانی اہرن نما ہڈی کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ یہ ہڈیاں چار اربط (رباط متقدم۔ رباط مؤخر۔ رباط معلق۔ رباط مستدیر) کے ذریعے باہم جڑی رہتی ہیں۔ اور ان پر تین چھوٹے چھوٹے عضلات لگے رہتے ہیں۔

منافع: جب ہوا کی لہر یا آواز کی تھرتھراہٹ کان میں آتی ہیں۔ تو پہلے وہ کان کے پردے کو جنبش دیتی ہے۔ اور کان کا پردہ ان ہڈیوں کو ہلاتا ہے۔ اور ان ہڈیوں کے ذریعے وہ تھرتھراہٹ درمیانی کان کے سوراخ تک پہنچ جاتی ہے۔ ان ہڈیوں کا کام یہ ہے۔ کہ اگر آواز کی تھرتھراہٹ قوی یا شدید ہو۔ تو یہ اس کے صدمہ کو کسی قدر روک دیتی ہیں اور اگر یہ تھرتھراہٹ ضعیف ہو۔ تو یہ اس کو عصب سامع تک پہنچانے میں مدد ہوتی ہیں۔ جوبہ کے اندر ہوا کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر جوبہ کے اندر ہوا نہ ہو۔ تو نہ کان کے پردہ میں تحریک ہو اور نہ کان کی ہڈیوں میں جنبش ہو۔

کان و حلق کی درمیانی نلی یعنی نفغ جمع نفاغ (یوسٹے کین ٹیوب) کا فائدہ یہ ہے۔ کہ جوبہ کی ہوا کی مقدار میں اس سے اعتدال قائم رہتا ہے۔ نفاغ کی وجہ سے آواز واضح اور نمایاں ہوتی ہے۔ جس طرح سے کہ بعض بالجوں کے سوراخ ان کی آواز کو واضح کر دیتے ہیں۔ جوبہ کی زائد ہوا نفاغ کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے۔ نیز جوبہ میں جو بلغمی رطوبات تراوش پاتی ہیں۔ وہ بھی ان کی راہ حلق میں چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے ان کے مسدود ہو جانے سے سماعت میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔

اندرونی کان

اردو نام	عربی نام	انگریزی نام
اندرونی کان	اذن باطن	انٹرنل ایر Internal Ear
بھول بھلیاں	تیہ	لے برنتھ Labyrimth

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

چونکہ اندرونی کان کی ساخت نہایت پیچیدہ ہوتی ہے۔ اس لیے اسکو عربی میں متاہ اور انگریزی میں لے برنتھ یعنی بھول بھلیاں کہتے ہیں۔ اندرونی کان قوت سامعہ کا خاص عضو ہے۔ اس میں عصب سامع کے ریشے پھیلتے ہیں۔ اسکے بھی بیتہ تین حصے ہوتے ہیں سامنے کی طرف ایک نالی ہے۔ جو تقریباً اڑھائی چکر لگاتی ہے۔ اس کو (۱) کان کا گھونگھا۔ قوقعہ۔ کاکلیا، کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے کی طرف ایک جوف ہوتا ہے۔ جس کو (۲) دہلیز (ویلیز۔ ویسٹی بیول) کہتے ہیں۔ دہلیز کے پچھلی جانب تین نیم دائرہ یا (۳) ھلالی نالیاں مجازی ہلالیہ۔ سیمی سرکولر کینالز) ہوتی ہیں۔ جن کے پانچ سوراخ دہلیز میں کھلتے ہیں۔

اندرونی کان یعنی کان کا یہ اندرونی حصہ رتیہ درحقیقت نہایت پیچیدہ تجاویف ہیں۔ جو کینٹی کے سخت حصے میں واقع ہیں۔ ہڈی کی ان تجاویف یعنی ہلالی نالیوں اور دہلیز کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے۔ جو شکل میں بعینہٖ تجاویف کی مانند ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا یہ اندرونی حصہ یا تیہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ (۱) تیہ استخوانی (۲) تیہ غشائی۔ تیہ استخوانی (آشی اس لے برنتھ) کی اندرونی سطح کو نہایت نازک ٹائبرو سیرس جھلی استر کرتی ہے۔ جس کا بیرونی طبق تیہ استخوانی سے ملا رہتا ہے۔ اور اندرونی طبق ایک رقیق شفاف رطوبت (پیری لمف) پیدا کر کے تیہ غشائی کو تر رکھتا ہے۔ تیہ غشائی میرے نس سے برنتھ یہ جھلی کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور تیہ استخوانی کے اندر پیری لمف میں رہتا ہے یہ شکل میں بعینہٖ تیہ استخوانی جیسا ہوتا ہے اس تیہ غشائی میں عصب سامع کی آخری شاخیں ختم ہوتی ہیں اور اس کے اندر اینڈو لمف نامی شفاف رطوبت بھری رہتی ہے۔ جس میں کچھ ٹھوس ذرات ہوتے ہیں۔ جن کے سبب ذرا سی حرکت سے عصب سامع کے ریشوں میں تحریک ہوتی ہے۔ تیہ غشائی کے اندرونی جانب نہایت باریک رونگٹے (البشرہ ہدبیہ ہیرسیلز) ہوتے ہیں۔ جو مخمل کے ریشوں کی طرح اندرونی رطوبت میں ابھرے رہتے ہیں تاکہ اندرونی رطوبت کی خفیف تحریک بھی ان میں اثر کر سکے۔ انہیں میں عصب سامع کے ریشے ختم ہوتے ہیں کان کی یہ اندرونی رطوبت ہی آواز کی لہروں کو عصب سامع تک پہنچاتی ہے اندرونی کان بذریعہ دو گول اور بیضوی سوراخوں (کوۃ بیضہ دکوہ مستدیرہ) کے درمیانی کان یعنی جوبہ کے ساتھ ملا رہتا ہے۔ اور کان کے اندرونی سوراخ (ثقبہ سمعیہ بالمنہ انٹرنل آڈی ٹری می ٹیٹس) کے ذریعے جس میں کہ عصب سامع قیام پذیر ہوتا ہے یہ دماغ سے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تعلق رکھتا ہے۔ اب اس کے مذکورہ بالا ہر حصص کا علیحدہ علیحدہ بیان بھی کر دیا جاتا ہے۔

دہلیز Vestibule ویسٹی بیُول

دہلیز اندرونی کان کا درمیانی حصہ ہے۔ جو گھونگے اور ہلالی نالیوں کے سامنے اور کان کے ڈھول کے اندرونی جانب واقع ہے۔ یہ شکل میں بیضوی اور دونوں جانب سے پچکی ہے اس کی لمبائی چوڑائی تقریباً ۱/۵ انچ ہوتی ہے اور اسکی تین دیواریں اور دو سرے ہوتے ہیں بیرونی دیوار میں بیضوی سوراخ ہے۔ جو عظم رکابی سے پوشیدہ رہتا ہے۔ اندرونی دیوار میں سامنے کی طرف ایک گول نشیب ہے جس میں عصب سامع کے ریشوں کیلئے چند سوراخ ہوتے ہیں۔



تصویر تیہ غشائی و اختتام عصب سامع

اس تصویر میں تیہ غشائی اور توقعہ تیہ عصب سامع کا اختتام دکھایا گیا ہے۔ عصب سامع مختلف شاخوں میں منقسم ہو گیا ہے (۲) سامنے عمودی ہلالی نالی کی طرف منتفع میں عصب سامع کی ایک شاخ ختم ہوتی ہے (۳) پچھلی عمودی ہلالی نالی کیطرف منتفخ میں ایضاً (۴) توقعہ میں ایضاً (۵) بیرونی افقی ہلالی کے ایضاً دہلیز کے اندر کی بیضوی غشائی تھیلی اٹریکل میں ایضاً (۷) اسکے متصلہ غشائی کیسہ میں ایضاً (۸) اٹریکل اور سکیول کو ملانے والی نالی۔

ہلالی دیوار میں جو کہ دہلیز کی چھت ہے۔ ایک بیضوی نشیب ہوتا ہے دہلیز کے پچھلے سرے میں ہلالی نالیوں (سیمی سرکولر کینالز) کے پانچ سوراخ اور اگلے سرے میں کان کے گھونگے (توقعہ) کا سوراخ ہوتا ہے۔

نوٹ: تیہ غشائی کا وہ حصہ جو تیرا کھوانی کی دہلیز میں واقع ہوتا ہے۔ وہ جھلی کی ایک چھوٹی سی بیضوی تھیلی (حوصلۂ صغیرہ اٹریکل) ہوتی ہے جس میں غشائی ہلالی نالیوں کے پانچ سوراخ کھلتے ہیں۔ اس بیضوی تھیلی کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی گول تھیلی (کیسۂ عرضیہ سیکیول) ملحق ہوتی ہے چنانچہ مذکورہ بالا بیضوی تھیلی (اٹریکل) اور اس گول تھیلی سیکیول اور تینوں غشائی ہلالی نالیوں کے مجموعے کو تیہ غشائی کہتے ہیں۔

ہلالی نالیاں مجاری ہلالیہ Semi Circular Canals سیمی سرکولر کینالز

یہ تعداد میں تین ہوتی ہیں۔ جن میں سے ایک دہلیز کے سامنے کی طرف۔ ایک پیچھے کی طرف اور ایک باہر کی طرف رہتی ہے۔ ان کی لمبائی کم و بیش اور ان کا قطر تقریباً ۱/۲ انچ ہوتا ہے یہ شکل

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

میں نیم دائرہ ہوتی ہے۔ اور یہ تینوں نالیاں بذریعہ پانچ سوراخوں کے دہلیز میں کھلتی ہیں۔ ہر ایک نالی کے بجائے آغاز کا سرا پھولا ہوا (طرف منتفخ۔ ایم پولا) ہوتا ہے۔ یہ غشائی کی یہ ہلالی نالیاں دہلیز کے اندر کی چھوٹی سی غشائی بیضوی تھیلی (اٹریکل) میں کھلتی ہیں۔ جیسا کہ تصویر بالا میں دکھایا گیا ہے۔ ان میں سے دو نالیاں تو عمودی وضع پر واقع ہیں جن میں سے ایک مذکورہ بیضوی تھیلی کے سامنے کی طرف اور دوسری اسکے نیچے کی طرف ہوتی ہے اس لیے ان کو اگلی اور پچھلی عمودی ہلالی نالیاں (اینٹیریر اینڈ پوسٹیریر۔ ورٹیکل سیمی سرکولر کینالز) کہتے ہیں۔ ان میں سے پچھلی نالی زیادہ لمبی ہوتی ہے باہر کی طرف کی نالی سب سے چھوٹی اور وضع میں اُفقی یعنی آڑی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو بیرونی افقی ہلالی (ایکسٹرنل ہاری زنٹل سیمی سرکولر کینال) کہتے ہیں۔ ان تینوں نالیوں کے پھولے ہوئے سروں (ایم پولا) میں عصب سامع کے ریشے ختم ہوتے ہیں (دیکھو تصویر بالا) جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ مذکورہ بالا تینوں غشائی ہلالی نالیوں اور اس چھوٹی سی بیضوی تھیلی کو جس میں کہ وہ کھلتی ہیں نیز اسکی گول ملحقہ تھیلی کو بحیثیت مجموعی تیہ غشائی کہتے ہیں۔ جس میں سے ایک رطوبت بھری رہتی ہے اور اس میں عصب سامع کے ریشے ختم ہوتے ہیں۔ پس آواز کی لہریں انکی اندرونی رطوبت میں تموج پیدا کرتی ہیں جس سے عصب سامع کے ریشے متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن جسم کی حس تساوی و توازن (سینس آف کوآرڈی نیشن اینڈ ایکوئی لبریم) کے لیے یہ نہایت اہمیت رکھتی ہیں جس کو دیکھو آگے ماہیت سماعت میں۔ فائدہ۔ یہ ہلالی نالیاں آواز کی لہروں کو اپنی اندرونی رطوبت میں جمع کرتی ہیں۔ نیز یہ ان کو عصب سامع تک پہنچاتی ہیں۔

گھونگا توقعہ کاکلیا Cochlea

کان کا یہ گھونگا دہلیز کے سامنے رہتا ہے۔ اس کی چوٹی طبل الاذن کی اندرونی دیوار کے اوپر اور سامنے رہتی ہے۔ اسکی لمبائی اور قاعدہ یعنی جڑھ کے پاس چوڑائی تقریباً ۳/۴ انچ ہوتی ہے اسکی شکل مخروطی اور وضع افقی یا آڑی ہوتی ہے۔ مخروط کا زاویہ سامنے اور باہر کو ہوتا ہے اور اسکے قاعدہ میں بہت سے سوراخ عصب سامع کی شاخوں کے نفوذ کرنے کیلئے ہوتے ہیں۔ اس کے درمیانی مخروطی حصے کو جسکے گرد نالیاں ۲½ چکر لگاتی ہیں۔ عمود (ماڈی اولس) کہتے ہیں۔ اور چکر دار نالیوں کو مجاری لولبیہ (سپائرل کینال) کہتے ہیں۔ یہ نالی عمود کے گرد اڑھائی چکر لگاتی ہے۔ اور تقریباً ڈیڑھ انچ لمبی ہوتی ہے۔ اس کے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اندر ایک نامکمل پردہ ہوتا ہے۔ جو ٹیمپینم نامی جھلی کے ذریعے مکمل ہو جاتا ہے۔ پس اس مکمل پردہ سمعیہ کان کا گھونگا دو حصوں میں منقسم ہو جاتا ہے جن میں سے بالائی حصے کو (۱) ویسٹی بیولی سیڑھی (سلم ویسٹی بیولی۔ سکیلا ویسٹی بیولی) اور زیرین حصے کو طبلی سیڑھی (سلم طبلی۔ سکیلا ٹمپینی نائی) کہتے ہیں۔ یہ دونوں حصے ایک سرے پر باہم مل جاتے ہیں۔ اس نالی میں تین سوراخ ہوتے ہیں (۱) گول سوراخ جو طبل الاذن سے ربط رکھتا ہے۔ مگر ایک جھلی سے بند ہوتا ہے (۲) بیضوی سوراخ جو دہلیز سے ملا ہوا ہے (۳) مجری توقعی جو قبت نما ہوتا ہے:

فائدہ۔ قوقعہ میں عصب سامع کے ریشے پھیلتے ہیں۔ اور یہ ان ثمرجات یا لہروں کو جو (۱) سر کی ہڈیوں سے آتی ہیں۔ یا جو (۲) دہلیز اور گول سوراخ سے آتی ہیں۔ قبول کرتا ہے:

ماہیت سماعت یعنی سنائی کس طرح دیتا ہے

اس بات کے سمجھنے کے لیے کہ ہمیں کس طرح سنائی دیتا ہے۔ پہلے آواز اور اس کے پیدا ہونے کے طریق کا سمجھنا ضروری ہے۔ پس معلوم ہوا کہ جب کوئی چیز یا اس کا کوئی حصہ تھرتھراتا ہے تو اس کے تھرتھرانے سے اس کے اردگرد کی ہوا میں بھی تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ پس اگر یہ تھرتھراہٹ اس قدر کافی اور قوی ہو۔ کہ ہمارے کان تک پہنچ سکے۔ تو یہ اس قسم کا احساس پیدا کرتی ہے۔ جس کو کہ ہم آواز کہتے ہیں۔

آواز۔ آواز ہوا میں بحساب ۱۱۰۰ فیٹ فی ثانیہ سفر کرتی ہے۔ یہ جامد اور سیال چیزوں میں سے بھی گزر جاتی ہے۔ پس آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا ذریعہ بالعموم ہوا یا کوئی ٹھوس یا سیال چیز ہوا کرتی ہے۔ جب ہوا میں باقاعدہ یکساں اور مسلسل تھرتھراہٹ پیدا ہو تو اس سے سُریلی آواز (موسیقی آواز۔ نغمہ ٹیون) پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر ہوا کی یہ تھرتھراہٹ بیقاعدہ مختلف یا غیر مسلسل ہو۔ تو اس سے شور و غوغا پیدا ہوتا ہے۔ اس سریلی آواز یا شور و غوغا کا کمزور یا پُرزور ہونا ہوائی تھرتھراہٹ کی قوت پر منحصر ہوتا ہے۔ یعنے اگر ہوا میں کمزور تھرتھراہٹ ہو۔ تو آواز بھی کمزور پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر اس پُرزور تھرتھراہٹ ہو۔ تو آواز بھی پُرزور ہوتی ہے۔ موسیقی آواز یا سریلی آواز کے باریک یا موٹا ہونے کو اردو میں سر عربی میں نغمہ اور انگریزی میں پچ کہتے ہیں۔ باریک آواز کو اونچے سُر کی آواز اور اصطلاح موسیقی میں زیر کہتے ہیں اور موٹی آواز کو نیچے سُر کی آواز اور اصطلاح موسیقی میں بم کہتے ہیں اور سُر کا اونچا یا نیچا ہونا اس بات پر منحصر ہوتا ہے۔ کہ آواز کے پیدا ہونے والی چیز ایک ثانیہ میں کتنی دفعہ یا کتنے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زور سے تھرتھراتی ہے۔ چنانچہ جب تھرتھرانے کی تعداد زیادہ ہو۔ یا تھرتھراہٹ زور سے ہو۔ تو آواز اونچی ہوتی ہے۔ اور جب تھرتھرانے کی تعداد کم ہو یا تھرتھراہٹ کمزور ہو۔ تو آواز نیچی ہوتی ہے ۔

انسان کی آواز۔ انسان کی آواز حنجرہ (لیرنکس) میں پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اس کے اندر جو آواز کی تار ہیں ہوتی ہیں۔ انکے تھرتھرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ ان آواز کی تاروں کو قدیم الاطباء عرب لِسَانُ المزمار اور جدید اطباء مصور تران الصوتیان کہتے ہیں۔ اور انگریزی میں ان کو دوکل کارڈ کہتے ہیں پس جن جانوروں کے یہ دوکل کارڈز پتلے اور چھوٹے ہوتے ہیں وہ جلد تھرتھرا سکتے ہیں۔ اس لیے ان میں سے باریک یا اونچے سُر کی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے بچوں اور عورتوں کی آواز اور جن حیوانات کے دوکل کارڈز موٹے اور بڑے ہوتے ہیں یا زور سے تھرتھراتے ہیں۔ ان کی آواز موٹی اور بلند ہوتی ہے۔ جیسے مرد کی آواز ۔

دوکل کارڈز کی یہ تھرتھراہٹ حنجرہ کی ہوا میں ایک تموّج پیدا کرتی ہے۔ اور یہ تموّج بیرونی ہوا سے ہوتی ہوئی جب کان کے ذریعے عصب سماعت پہنچتی ہے۔ تو حسّ سماعت پیدا کرتی ہے۔ اور وہ حسّ دماغ تک پہنچ کر ایک ایسا اثر پیدا کرتی ہے جس سے کہ آواز سُنائی دیتی ہے (نیز دیکھو تشریح حنجرہ صفحہ ۱۸۰ پر) ۔

ماہیتِ سماعت

جس طرح ارتعاش شعاعی یا روشنی کی لہروں سے آنکھ کے پردہ شبکیہ پر تحریک ہو کر بینائی پیدا ہوتی یا دکھائی دیتا ہے اسی طرح سے ارتعاش ہوائی یا ہوا کی لہروں سے کان کے عصب سامع پر تحریک ہو کر شنوائی پیدا ہوتی یا سُنائی دیتا ہے۔ یعنی ہوا کے توسط سے ہم سب قسم کی آوازیں سنتے ہیں۔ ہر قسم کی آوازیں ہوا میں لہریں پیدا کرتی ہیں اور یہ ہوا کی لہریں بیرونی کان یعنی کان کی کرسی میں جمع ہو کر کان کے سوراخ کی راہ درمیانی کان میں جا کر کان کے پردے یا ڈھول پر لگتی ہے اور اس میں لرزش پیدا کرتی ہے۔ اور کان کے پردہ سے چونکہ درمیانی کان کی مطرقی ہڈی لگی رہتی ہے۔ اس لیے کان کے پردہ کی لرزش سے اس ہڈی میں جنبش ہوتی ہے۔ پھر اس سے سندانی ہڈی اور سندانی سے رکابی ہڈی متحرک ہوتی ہے۔ پھر کان کی ہڈیوں کی حرکت سے وہ لہریں کان کے ڈھول اندرونی دیوار کے بیضوی سوراخ (کوّۃ بیضی) میں جا کر اس جھلی کو جو اس بیضوی سوراخ پر

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

لگی ہوئی ہے۔ متحرک کرتی ہیں۔ اور چونکہ یہ بیضوی سوراخ اندرونی کان کی دہلیز سے ملا ہوا ہے اس لیے اس جھلی کی حرکت سے اندرونی کان یعنی قیہ استخوانی کی رطوبت (پیرلمف) میں موجیں یا لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس اندرونی رطوبت سے بشرہ سمعیہ یعنی اس جھلی کے اندرونی رونگٹوں میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ جس سے عصب سامع کے ریشے متاثر ہوتے ہیں، پھر یہ تاثر دماغ تک پہنچتا ہے۔ جس سے کہ ہم آواز کو محسوس کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ وَالْحِکْمَۃُ لِلّٰہِ! کان بھی اس حکیم مطلق کی حکمت کاملہ کا ایک عجیب نمونہ ہے کان کے ذریعے ہم سنتے ہیں اور قوت سامع کے ذریعے ہم نغمہ و شور اور زیر و بم میں تمیز کر سکتے ہیں۔ لیکن مختلف قسم کی آوازوں کو بار بار سننے کے تجربات سے ہم آوازوں کی پیدائش کے اسباب کو بھی سمجھنے لگتے ہیں۔

آواز کا رُخ اور فاصلہ۔ آوازیں ہم کو مختلف اطراف اور مختلف فاصلوں سے آتی ہیں۔ آواز کا رخ یا اس کا فاصلہ دریافت کرنے کے لیے ہمیں کلیتہً ان اثرات پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ جو کہ آواز سے ہمارے دونوں کانوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ آواز کس طرف سے آ رہی ہے؟ اس کا علم قوت سامعہ کے ذریعے براہ راست نہیں ہوتا۔ بلکہ نفس یا عقل کو اس کا ادراک کثرت تجربات سے ہوتا ہے۔ کیونکہ مختلف اطراف سے جو آواز کی لہریں آتی ہیں۔ وہ مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں۔ اور اس کا بار بار تجربہ ہوتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آواز کی لہریں کسی آڑ وغیرہ کی وجہ سے لوٹ کر آتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کا رُخ معلوم کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ کبھی آواز کا رُخ معلوم کرنے کے لیے انسان اپنے سر کو پھراتا ہے اور صرف ایک کان کا استعمال کرتا ہے۔ تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آواز سیدھی کدھر سے آ رہی ہے۔ جانور مثلاً کتا۔ بلی وغیرہ آواز کا رُخ دریافت کرنے کے لیے اپنے کانوں کو پھرا لیتے ہیں۔ تحویل صورت کے معمولی طریق میں جب کوئی بات حائل یا مزاحم ہوتی ہے۔ تو ہمیں آواز کا فاصلہ لگانے میں غلطی ہوتی ہے۔ جیسا ٹیلیفون یا فونوگراف میں گفتگو سننے سے۔ برق باری میں بھی آواز کے رُخ اور اس کے فاصلہ کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب آواز کسی چوٹ میں سے گزر کر آتی ہے۔ تب بھی اس کی سمت اور اس کے بعد کا اندازہ لگانا دشوار ہوتا ہے۔

اختلافِ قوتِ سامع۔ قوت باصرہ کی طرح قوت سامع بھی مختلف اشخاص میں مختلف

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ بعض لوگ تو ہلکی آواز بھی بخوبی سن سکتے ہیں۔ لیکن نغماتِ موسیقی میں تمیز نہیں کر سکتے۔ ہلکی سے ہلکی آواز جو اکثر آدمی سن سکتے ہیں۔ وہ ثانیہ (سیکنڈ) تیس امواج یا لہروں والی ہوتی ہے۔ اور اونچی سے اونچی آواز بہت مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً بڑی توپ کی آواز یا بادل کی گرج یا بجلی کی کڑک کی آواز بہت شدید اور مہیب ہوتی ہے بعض اشخاص ایک سیکنڈ میں تیس ہزار امواج یا لہروں والی آواز بھی سن سکتے ہیں۔ لیکن بعض آدمی چمگادڑ یا چوہیا کی چوں چوں اور چڑیا کی چڑچڑ بھی نہیں سن سکتے۔ اسی طرح سے بہت سے حشرات الارض آوازیں نکالتے ہیں۔ جو کہ ہمیں سنائی نہیں دیتیں۔

آواز کا اثر۔ جب ایک قسم کی آواز دیر تک قوت سامعہ میں اثر کرتی رہتی ہے۔ تو اس کا احساس بھی دیر تک قائم رہتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ کچھ عرصہ تک متواتر شور و غوغا سنتے رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد بھی کچھ دیر تک ان کے کانوں میں شور و غل کی آوازیں معلوم معلوم ہوتی رہتی ہیں۔

کان بجنا۔ (طنین وودی۔ تنائیٹس آرم) کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ کوئی بیرونی آواز تو کان میں نہیں آتی۔ لیکن کان کے اندر مختلف آوازیں معلوم ہوتی ہیں۔ اسی کو کان بجنا کہتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے۔ کہ جس طرح بیرونی آوازوں سے عصب سامع میں تحریک پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اندرونی اسباب مثلاً دماغ یا کان میں اجتماع خون (کنجسشن) ہونے کے سبب یا بعض دماغی امراض یا عصب سامع کے امراض میں اس میں تحریک ہو کر کان کے اندر آوازوں کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح جمائی لینے یا زور سے کھانسنے یا ناک صاف کرتے وقت بھی جب کہ ہوا حلق سے گزر کر حلق اور کان کی درمیانی نالی (نفنغ۔ نغانغ) کی راہ جو یہ کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ تب بھی کان میں آواز معلوم ہوتی ہے۔

انعکاسی حرکاتِ سماعت۔ مختلف آوازوں سے کبھی جسم کے دیگر قسم کے احساسات واقع ہوتے ہیں چنانچہ نغمہ و ترنم سے طبیعت مسرور ہوتی ہے۔ اچانک سخت و مہیب آواز سے آنکھیں فوراً بند ہو جاتی ہیں۔ اور کبھی سارا جسم کانپنے لگتا ہے۔ وغیرہ۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

قوّتِ توازن (یا) حسِّ تساوی

جس طرح حس باصرہ کا تعلق صرف آنکھ کے ساتھ ہے۔ اور کسی دوسرے عضو حس کیساتھ نہیں۔ اسی طرح حسِّ سامع کا تعلق صرف کان کے ساتھ ہے وغیرہ۔ اور بہر صورت ہم ان حواس یا قویٰ کے استعمال سے بخوبی واقف ہیں۔ لیکن ان کے سوا ایک اور حسّ بھی ہے۔ جس سے ہم بے خبر ہیں۔ اور یہ حسّ تصادی یا حسّ توازن ہے۔ اور جب کبھی یہ حسّ ہم سے دُور ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہم یقیناً اپنے جسم کا توازن قائم نہیں رکھ سکتے جس حالت کو ہم سر چکرانے یا گھومری (گڈمڈی نیس) سے تعبیر کرتے ہیں۔ چونکہ یہ لفظ ہمیشہ ٹھیک انہیں معنوں استعمال نہیں ہوتا۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسکا صحیح مفہوم بتا دیا جائے۔ چنانچہ (۱) اکثر اشخاص جب زیادہ بلندی پر سے نیچے کو دیکھتے ہیں۔ مثلاً کسی بلند چٹان پر سے یا کسی اونچے مینارہ یا برج پر سے یا بعض حالتوں میں کسی اونچی سیڑھی یا مچان وغیرہ پر سے نیچے کو دیکھتے ہیں۔ تو اُن کا سر چکرانے لگتا ہے یہ احساس یا یہ حالت جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ جب طاری ہوتی ہے۔ تو معمولی حرکات جسم کے انجام دینے یا ان کے مساوی و توازن کی قابلیت کو زائل کر دیتی ہے۔ اور اگر یہ شدید ہو تو پھر اس شخص کا اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ عموماً گر ہی پڑتا ہے (۲) اسی طرح سے اگر ایک آدمی چند بار جلد جلد چکر کھاتا ہے۔ اور پھر ٹھہر جاتا ہے۔ تو اس کو بھی چکر چڑھ جاتا ہے۔ یعنی اس کا بھی سر چکراتا ہے۔ لیکن اس حالت میں اس کو ایک خاص قسم کا احساس ہوتا ہے۔ یعنی اس کو کمرہ یا اردگرد کی اشیاء گھومتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ اور اگر اس کو زیادہ چکر آئے۔ تو وہ گر پڑتا ہے۔

عضلات کی قوتِ تساوی جس سے کہ جسم کا توازن قائم رہتا ہے۔ اُن احساسات کا نتیجہ ہے جو کہ ایک سے زائد اعضاء حسّ سے آتے ہیں۔ سر چکرانے کی مذکورہ بالا مثالوں میں سے پہلی مثال میں سر چکرانے کا سبب درحقیقت نقص بصارت تھا۔ یعنی غیر معمولی حالات میں نظر کا جما نہ سکنا اس لیے بعض ایسے اشخاص میں جن کا سر بلند مقامات سے نیچے کو دیکھنے سے سر چکرانے لگتا ہے۔ صرف مناسب عینک کے لگانے سے یہ شکایت رفع ہو جاتی ہے پس حسِّ باصرہ ان حواس میں سے ایک حسّ ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جو کہ جسم کی قوت تسادی کی معاون ومدد ہیں۔ اس طرح سے وہ احساسات جو کہ اطراف جسم سے آتے ہیں۔ وہ بھی اس کے اجزاء معاونہ میں سے ہیں۔ چنانچہ مرض لوکوموٹر اٹیکسی یا ہزال نخاع کے مریضوں کی حالت سے یہ صاف ظاہر ہے۔ کیونکہ اس مرض کے مریض کی چال لڑکھڑاتی ہوتی ہے۔ وہ صرف دیکھ کر ہی چل سکتا ہے۔ کیونکہ وہ احساسات جو کہ اس کی ٹانگوں سے آتے ہیں۔ وہ حرام مغز کے ماؤف ہونے کے سبب زائل ہو جاتے ہیں۔ پس جب وہ چلتا ہے۔ تو نہایت غور سے دیکھ دیکھ کر قدم اٹھاتا ہے یعنی جس مقام پر اسے قدم رکھنا ہوتا ہے۔ وہ اس مقام کو بغور بدقت نظر رکھتا ہے۔ اور اگر اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں۔ تو پھر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ بلکہ فوراً گر پڑتا ہے۔ وہ خاص حس جو کہ ٹانگوں سے آتی ہے۔ اور ایک تندرست شخص میں جسم کے توازن وتسادی میں ممد ہوتی ہے۔ وہ کسی حد تک وہ احساسات ہوتے ہیں۔ جو کہ پاؤں کے تلوے کی جلد سے آتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو کہ مفاصل اور عضلات سے آتے ہیں۔ پس وہ احساسات جو کہ اطراف جسم سے آتے ہیں۔ وہ بھی دوسرے درجہ پر جسم کی قوت تسادی کے معاون ومدد ہوتے ہیں۔ لیکن مذکورہ بالا دونوں قسم کے احساسات سے جو کہ آنکھوں سے یا اطراف جسم سے آتے ہیں۔ تیسرا ایک اور احساس ہے جو کہ ایک خاص عضو سے آتا ہے۔ وہ عضو جو کہ جسم کے گرد وپیش کی اشیاء میں اس کی (جسم کی) وضع کے تغیرات کو اندازہ کرنے کی غرض سے موجود ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح سے آنکھ دیکھتی ہے۔ اور کان سنتا ہے۔ یہ عضو جسم کی وضع کے تغیرات کا اندازہ کرتا ہے۔ اور یہ عضو کان کی تیہ غشائی ہے۔ یعنی وہ چھوٹی سی غشائی بیضوی تھیلی اور وہ تین ہلالی نالیاں جو اس میں کھلتی ہیں (دیکھو صفحہ ۲۶۶) جب جلد جلد چند چکر کھا کر آدمی ٹھہر جاتا ہے اور اس کو کمرہ یا اپنے اردگرد کی اشیاء گھومتی معلوم ہوتی ہیں۔ تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے۔ کہ تیہ غشائی میں تحریک ہوتی اور اس کی اندرونی رطوبت میں گردش ہوتی ہے۔

تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ کہ عصب سامع کی وہ آخری شاخیں جو کہ تیہ غشائی کی بیضوی تھیلی (ریٹربل) میں ہلالی نالیوں کے پھولے ہوئے سروں (امپولا)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

میں ختم ہوتی ہیں۔ ان پر ہلانی نالیوں کی رطوبت کے باقاعدہ دباؤ پڑنے سے جسم کے عضلات منظم و باقاعدہ طور پر کام کرتے ہیں۔ اور جسم کا توازن قائم رہتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کبوتر کے کان کی افقی یا آڑی ہلالی نالی کاٹ دی جائے۔ تو وہ بے قاعدہ طور پر اپنے سر کو ادھر اُدھر مارنے لگتا ہے۔ اور اگر اس کے کان کی عمودی ہلالی نالی کو کاٹ دیا جائے۔ تو وہ اپنے سر کو اوپر نیچے مارتا ہے۔ اور درست طور پر اُڑ بھی نہیں سکتا بلکہ زمین پر گر پڑتا ہے۔ اسے نگلنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اُس کی قوتِ سماعت میں فرق آجاتا ہے وغیرہ۔

دوار سمعی (منسز ڈیزیز) جس میں کہ مریض کو دوران سر کے ساتھ طنین اور غثیان کی بھی شکایت ہوتی ہے۔ اکثر اندرونی کان کی انہی ہلالی نالیوں میں جریان خون کے سبب سے ہوا کرتا ہے۔

نوٹ:۔ چونکہ مؤخر دماغ یعنی چھوٹا دماغ بھی عضلاتِ جسم کی حرکات کا منظم ہے۔ اور جسم کے توازن کو قائم رکھتا ہے (دیکھو صفحہ ۲۱) اس لیے اگر اس کے خاص عصبہ میں نقص آجائے۔ تب بھی اسی طرح سے سر چکرانے لگتا ہے۔ جیسا کہ مذکورہ بالا احسان کے فتور سے چکراتا ہے۔

فضیلت قوتِ سامعہ۔ قوتِ سامعہ کو قوت باصرہ پر فضیلت ہے۔ کیونکہ ایک اندھا آدمی محض سن کر تحصیل علم کر سکتا ہے۔ چنانچہ کئی ایک نابینا آدمی حافظ۔ عالم فاضل۔ حکیم اور وکیل ہیں۔ لیکن ایک بہرہ آدمی تحصیل علم سے بے بہرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بھی ہر جگہ سمع کا لفظ بصر پر مقدم آیا ہے۔ مثلاً وَعَلٰی سَمْعِهِمْ وَعَلٰی اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ

حکماء یورپ و امریکہ نے ماہیت بصارت کو معلوم کر کے ٹیلسکوپ (دوربین) مائیکروسکوپ (خُردبین) اور بائیسکوپ وغیرہ ایجادات دقیقہ و لطیفہ کیں۔ ماہیت صورت و ماہیت سماعت کو معلوم کر کے گراموفون۔ مائکروفون اور ٹیلیفون وغیرہ نہایت عجیب وغریب و نہایت مفید آلات ایجاد کئے۔ مگر ہمیں بھی اس بات کا فخر تو ہے۔ کہ ہمارے اسلاف میں سے حکماء الہٰی اتقیین ہو چکے ہیں۔ جو اپنے باطن کی صفائی اور روشنی کے سبب مکاشفہ و مراقبہ ہی میں مکالمہ کرتے اور پڑھتے پڑھاتے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تھے۔ نیز غائبانہ توجہ سے ہی مریضوں کا علاج و معالجہ بھی کر دیتے تھے۔ جس کو انگریزی میں ٹیلی پیتھی کہتے ہیں۔ لیکن اب یہ فسانے ہیں "پدرم سلطان بود" کے ترانے ہیں۔ حقیقت میں نہایت افسوس کا مقام ہے کہ ہماری آنکھوں پر ایسا جہالت کا پردہ چھا گیا۔ اور ایسا غفلت کا پنبہ در گوش ہوا کہ ہم اکتساب علوم و فنون میں یورپ والوں کی خوشہ چینی کے قابل بھی نہ رہے۔ بہین تفاوت راہ از کجا است تا بکجا۔ افسوس صد افسوس!

ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ
ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنانا آتی ہے

انف وقوتِ شامہ (یعنی) ناک اور بو یائی

ناک قوتِ شامہ یعنی سونگھنے کی قوت کا خاص آلہ ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ ایک بیرونی حصہ جس کو ناک کہتے ہیں۔ اور دوسرا اندرونی حصہ جس کو ناک کا جوف کہتے ہیں تسہیل بیان کیلئے ذیل میں دونوں کا علیحدہ علیحدہ بیان کیا جاتا ہے۔

Nose نوز انف ناک

ناک چہرہ کے وسط میں بالائی لب کے اوپر مثلث شکل میں واقع ہے اس کا تنگ سرا پیشانی سے چسپاں ہے۔ اور فراخ حصہ نیچے واقع ہے۔ جس میں دو سوراخ پائے جاتے ہیں جن کو نتھنے (منخرین۔ نا ئیرلز) کہتے ہیں۔ ان دونوں نتھنوں کے درمیان دیوار فاصل (جدار فاصل۔ کلمنا) ہوتی ہے۔ نتھنوں کے اندرونی جانب بال ہوتے ہیں۔ جو وقت تنفس گرد و غبار کو اندر نہیں جانے دیتے۔ ناک کی پہلوی سطحیں بالائی جانب باہم مل کر ناک کی پشت بناتی ہیں۔ جو سامنے ایک ابھار میں ختم ہوتی ہیں جسے ناک کی چونکی (از بتہ الانف ٹپ آف دی نوز) کہتے ہیں۔

ناک کی بناوٹ میں ناک کی تین ہڈیاں دو جانبی (عظام الانف۔ نیزل بون) اور ایک درمیانی بالنسہ کی ہڈی (عظم الوتیرہ۔ آس وُمر) ہوتی ہیں۔ نیز بالائی جبڑے کی ہڈی کا الفی نکال ہوتا ہے۔ اور پانچ کرتیاں ہوتی ہیں۔ جن میں دو بالائی پہلوی کرتیاں (غضاریف جانبہ اعلیٰ۔ اپر لیٹرل کارٹلجز) دو زیرین پہلوی کرتیاں (غضاریف جانبہ سفلی (اپر لیٹرل کارٹلجز) جو دونوں نتھنوں کے سوراخوں پر ہوتی ہیں۔ ان کو غضاریف جناحیہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

بھی کہتے ہیں۔ اور ایک درمیانی کڑی (غضروف فاصل۔ کارٹلیج آندی سیپٹم) ہوتی ہے یہ پانچوں کرتیاں بذریعہ ایک مضبوط و بیرریشہ دار جھلی (غشاء غضروفی۔ پیری کانڈریم) کے ایک دوسرے کیساتھ اور ناک کی ہڈیوں کے ساتھ ملی رہتی ہے۔ ناک کی جلد بہ نسبت اور حصہ کے ناک کی پھنکی اور نتھنوں کے کناروں پر موٹی اور خوب چربیاں ہوتی ہے۔ ناک کے اندر کی طرف جو بلغمی جھلی (غشاء مخاطی۔ میوکس ممبرین) استر کرتی ہے۔ وہ بیرونی جانب یعنی نتھنے کے کناروں پر ناک کی جلد سے اور اندرونی جانب ناک کے غار کی استر جھلی سے ملی رہی ہے:

ناک کا جوف جوفِ الف نیزل فارسی Nasal Fossae

ناک کا جوف درحقیقت دو بڑے بیڈول اور ناہموار غار ہیں۔ جو چہرہ کے درمیانی خط میں کھوپری کے پیندے سے منہ کی چھت ناک یا تالو کے اوپر واقع ہیں۔ ہر ایک غار میں اگلے اور پچھلے دو سوراخ ہیں۔ پس یہ جوف دونوں اگلے سوراخوں یا سامنے نتھنوں (منخرین مقدم۔ اینٹیریر نیرس) کے ذریعے سامنی طرف چہرہ سے ملا رہتا ہے۔ اور دونوں پچھلے سوراخوں یا پچھلے نتھنوں (منخرین مؤخر۔ پوسٹیریر نیرس) کے ذریعے حلق سے ملا رہتا ہے یہ دونوں جوف بذریعہ ایک بارکھڑی دیوار (فاصل الانف سیپٹم نیزائی) کے ایک دوسرے سے الگ الگ رہتے ہیں۔ یہ جوف نیچے کی نسبت اوپر کی طرف تنگ اور سامنے و پیچھے کی نسبت درمیان میں بہت تنگ و عمیق ہوتے ہیں۔ ناک کا ہر ایک جوف چار نجادیف کے ساتھ ملا رہتا ہے (۱) آنسوؤں کی نالی (مجری الدمع۔ لکریمل کینال) کے ذریعے چشم خانہ کے جوف کے ساتھ (۲) تالو کی اگلی نالی (مجری حنکی مقدم۔ اینٹیریر پیلیٹائن کینال) کے ذریعے منہ کے جوف کیساتھ (۳) ناک کی چھت کی سوراخدار ہڈی کے سوراخ (ثقوب مصفاۃ آلفیکٹری فورمین) کے ذریعے کھوپری کے جوف کیساتھ اور (۴) سوراخ و تدی حنکی (ثقبہ وتدیہ حنکیہ۔ سفی نوپیلے ٹائن فورمین) کے ذریعے جوف وتدی و تکی کے ساتھ ناک کے یہ دونوں غار پندرہ ہڈیوں کے ملنے سے بنتے ہیں۔ جس میں تین تو سر کی ہڈیاں ہیں۔ اور بارہ چہرہ کی ہڈیاں۔ ناک کے ہر ایک جوف میں ایک محراب ایک فرش اور چند دیوار میں ہوتی ہیں۔ محراب لمبا اور تنگ ہوتا ہے۔ فرش پہلوی جانب سے مقعر درمیان میں کشادہ اور سروں پر تنگ ہوتا ہے۔ ہر ایک جوف کی اندرونی دیوار وہی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

باریک کھڑی درمیانی دیوار ہے۔ جو ایک جوف کو دوسرے جوف سے علیحدہ کرتی ہے۔ اس میں کبھی ایک سوراخ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دونوں جوف باہم ملتے رہتے ہیں۔ بیرونی دیوار کی اندرونی سطح پر پیڈول سی تین لمبی لمبی نالیاں ہوتی ہیں۔ جو تین استخوانی طبقات کے درمیان ہوتی ہیں۔ ان میں سے بالائی نالی سب سے چھوٹی ہوتی ہے۔ درمیانی نالی میں دو سوراخ ہوتے ہیں۔ اور زیرین نالی ناک کی بیرونی دیوار کی پوری لمبائی میں ہوتی ہے چونکہ اس نالی میں سامنے کی طرف آنسو کی نالی (مجری الف) کا زیرین سوراخ واقع ہے اس لیے اس کی راہ سے آنکھ کا سرمہ اور آنسو ناک کی طرف چلا جاتا ہے

اس جوف کے اندر جو جھلی استر کرتی ہے۔ اس کو غشاء مخاطی (شنیدنی ڈیہون ممبرین) کہتے ہیں۔ جو اپنے نیچے والی ہڈی و کری کی جھلی سے خوب ملی رہتی ہے۔ ناک کی یہ استری جھلی یا غشاء مخاطی (۱) سامنے کی طرف ناک سامنے نتھنوں کے ذریعے جلد کے ساتھ (۲) پچھلے نتھنوں کے ذریعے حلق کی غشاء مخاطی (میوکس ممبرین) کے ساتھ (۳) آنسوؤں کی نالی کے ذریعے آنکھ کے طبقہ ملتحمہ کے ساتھ (۴) نغنغ یعنی حلق و کان کی درمیانی نالی کے ذریعے طبل الاذن اور خلایا حلیمہ کے ساتھ اور (۵) دیگر سوراخوں کے ذریعے پیشانی وغیرہ کی ہڈیوں کے خلایا کے ساتھ ملی رہتی ہے۔ اس جھلی کے ان تعلقات کے سبب ہی ناک کا ورم مذکورہ بالا مقامات متعلقہ تک پھیل سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے زکام کے بعض مریض سر و چہرہ میں درد کی شکایت کیا کرتے ہیں۔ اور چونکہ اس جھلی کا تعلق دماغی جھلیوں سے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ناک کی ورم کے سبب دماغی پردوں میں بھی ورم ہو سکتا ہے۔

اعصاب۔ ناک کے جوف میں مندرجہ ذیل اعصاب پھیلتے ہیں (۱) عصب شامہ (الفیکٹری نرو) کے ریشے نتھنوں کی درمیانی دیوار فاصل کے بالائی ثلث حصہ عظم مصفاۃ کے جز اسفنجی اور مشاشی اعلےٰ و متوسط کی سطح پر پھیلتے ہیں (۲) عصب عینی (افتھلمک نرو) کی شاخ بینی دیوار قاسم کے بالائی اور اگلے حصے میں اور جوف کی بیرونی دیواروں پر پھیلتی ہے (۳) عصب فکی اعلیٰ (سپیریئر میگزلری نرو) یک رسی مقدم (اینٹیریئر ڈینٹل) کی کچھ شاخیں جوف اسفل اور عظم فکوی اسفل میں پھیلتی ہیں (۴) عصب غبیشوی (ریڈیین نرو) وغیرہ کی شاخیں دیوار قاسم کے بالائی اور وسطی حصہ میں جاتی ہیں۔ اور (۵) عصب

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

الفی وحنکی (زبر و پیلے ٹائن) کی شاخیں دیوار فاصل کے دسطی حصّہ پر پھیلتی ہیں، وغیرہ۔

ماہیّتِ شم (یعنی) سونگھنے کی ماہیّت

سونگھنے کی قوت کے ذریعے انسان چیزوں کی بُو محسوس کرتا ہے۔ یہ قوتِ ناک کے اندر فقط اس کے بالائی حصّے میں ہوتی ہے۔ ناک کے جوف کے اندر کی طرف غشاء مخاطی کا استر ہوتا ہے۔ جس میں عصب شامہ کی شاخیں ناک کی چھت کی سوراخدار ہڈی (عظم مصفاق) کے سوراخوں میں سے اکر پھیلتی ہیں۔ جس طرح سے ہوا کے ذریعے ہم سنتے ہیں۔ اسی طرح سے ہوا کے ذریعے ہم سونگھتے ہیں۔ کیونکہ ہوا میں خوش بُو یا بدبو کے مادی ذرات مل کر اس کو خوشبودار یا بدبُودار بنا دیتے ہیں۔ جب ہم ناک کے ذریعے سانس لیتے ہیں تو ہوا ناک کے اندر جاتی ہے۔ اور خوشبو یا بدبُو کے ذرات جو ہوا میں ملے ہوئے ہوتے ہیں وہ قوت شامہ کے عصبی ریشوں پر لگتے ہیں اور ان پر خاص قسم کا اثر کرتے ہیں۔ اور پھر ان سے دماغ کو یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ یعنی چیزوں کی بُو معلوم ہوتی ہے۔ جب ہم کسی بُو کو بخوبی سونگھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنا منہ بند کر کے ناک کے راستے زور سے سانس کھینچتے ہیں تاکہ ہوا قوت شامہ کے عصب کی شاخوں کو اچھی طرح مس کرے۔ اور بُو بخوبی محسوس ہو۔ ناک کے جوف کے تمام حصّوں میں قوتِ لامسہ بھی ہوتی ہے۔ جس سے ناک کے اندر سردی۔ گرمی۔ خارش۔ گدگدی اور درد کا احساس ہوتا ہے۔ اور نتھنوں میں اکثر اوقات یا دباؤ محسوس ہوتا ہے بعض حالات میں قوت شامہ تو معدوم ہو جاتی ہے مگر قوتِ لامسہ کے افعال بحال رہتے ہیں۔ لیکن قوتِ شامہ کو قوت لامسہ سے تمیز کرنا اور یہ معلوم کرنا کہ کون سی [illegible] سے متعلق ہیں۔ اکثر مشکل ہوتا ہے چنانچہ جب ایمونیا یا پسی ہوئی [illegible] ناک کے اندر داخل ہوتی ہیں تو چونکہ دونوں قوتیں متاثر ہوتی ہیں۔ اس لیے [illegible] میں باہمی تفریق [illegible]

ادراک کے [illegible] غشاء مخاطی [illegible] ہو کیونکہ جب [illegible] ہوتا۔ [illegible] ناک [illegible] جھاگ دار بلغم سے [illegible] کہ [illegible] نہیں ہوتا

اختلافِ قوتِ شامہ۔ تمام حیوانات میں قوتِ شامہ [illegible] نہیں ہوتی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

بلکہ مختلف ہوا کرتی ہے۔ سبزی خور حیوانات اور گوشت حیوانات میں مختلف قسم کی بوؤں کے احساس و ادراک کی قوت مختلف ہوتی ہے۔ چنانچہ گوشت کھانے والے حیوانات میں حیوانی مواد کی بُو زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ اور ان میں نباتات اور پھولوں کی بو اس کا احساس بہت کم ہوتا یا بالکل نہیں ہوتا اس کے برخلاف نباتات کھانیوالے حیوانات میں نباتات کی بُو زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ اور حیوانی مواد کی بُو بہت کم معلوم ہوتی یا ہوتی ہی نہیں انسان میں اگرچہ دونوں قسم کے حیوانات سے قوت شامہ کم ہے۔ لیکن اس کو اس لحاظ سے ان پر فضیلت ہے کہ یہ بہت سی قسم کی بوؤں کو پہچان سکتا ہے قوت شامہ کے اس اختلاف کا سبب عصبۂ شامہ کے دماغی حصص یا مراکز کا مختلف اختلاف ہے قوت شامہ کا ادراک نہایت ہی لطیف ہے۔ یہ ایسے اجزاء صغیرہ کو معلوم اور تمیز کر لیتی ہے جس کا کسی خرد بین سے دیکھنا بھی محال ہے چنانچہ مشک کے ایک گرین کے ۱/۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ کی جسامت کے ذرۂ صغیرہ کو بھی یہ قوت محسوس کر لیتی ہے۔ بُو اگر مرغوب ہو تو اسے خوشبو کہتے ہیں۔ اور اگر نامرغوب ہو تو اسے بدبو کہتے ہیں۔ لیکن بُو کا مرغوب یا نامرغوب ہونا ایک نسبتی امر ہے۔ کیونکہ ایک قسم کی بو بعض حیوانات کے لیے مرغوب ہوتی ہے۔ اور دوسروں کے لیے نامرغوب اسی طرح ایک شخص کو کوئی بُو اچھی معلوم ہوتی ہے اور دوسرے کو بُری معلوم ہوتی ہے۔ بعض اشخاص کسی خاص بُو کو محسوس نہیں کرتے اور دوسرے محسوس کرتے ہیں۔ اور جس طرح مختلف اشخاص میں قوتِ بینائی یا قوتِ شنوائی کم و بیش ہوتی ہے۔ اسی طرح قوت شامہ بھی کم و بیش ہوتی ہے۔

شامہ باطنیہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خارج میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے ناک میں کسی قسم کی بُو آئے۔ لیکن ایک شخص بُو کا احساس کرتا ہے۔ حالانکہ کوئی دوسرا شخص محسوس نہیں کرتا اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ عصب شامہ پر کوئی اندرونی حاس تحریک ہوتی ہے اور اگرچہ عصبی مزاج اشخاص میں ایسا ہوا کرتا ہے لیکن کبھی کبھی دیگر اشخاص میں بھی اس قسم کا اندرونی احساس قسم ہوتا ہے۔ ایک شخص جو ہمیشہ بُری بوئیں محسوس کیا کرتا تھا۔ مرنے کے بعد جب اسکے ناک اور دماغ کا امتحان کیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اسکے مقدم دماغ کے دونوں حصّوں کے وسط میں ایک خنازیری رسولی تھی۔ جس میں سڑے ہوئے مواد تھے ڈاکٹر ڈوبایز نے ایک ایسے شخص کا بیان کیا ہے۔ کہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جو گھوڑے پر سے گر پڑا تھا۔ گرنے کے بعد وہ چند سال تک زندہ رہا۔ لیکن اس کو ہمیشہ ناک میں بُو کا احساس ہوتا تھا جس کی وجہ بھی یہی خیال کی گئی تھی کہ اس کے متقدم دماغ میں مرکزِ قوتِ شامہ کے آس پاس کوئی ناصلہ مادہ جمع ہو گیا ہو گا۔

برقی رَو کی تحریک سے بھی عصبِ شامہ میں گدگداہٹ ہوتی ہے۔ چھینکیں آتی ہیں۔ اور فاسفورس کی بُو کی مانند بُو آتی ہے وغیرہ۔

لِسان و قوّتِ ذائقہ (یعنی) زبان اور ذائقہ

زبان ایک لحمی عضو ہے۔ یہ قوتِ ذائقہ کا خاص آلہ ہے اور حوضِ دہن میں واقع ہے۔ چبانے۔ نگلنے۔ چوسنے اور خاص کر تکلم یعنی بولنے میں یہی کام آتی ہے۔ بلکہ کلام کے ساتھ تو زبان کا خاص تعلق ہے۔ اس کے ان افعال کا بیان مختلف مواقع پر کیا جا چکا ہے۔ پس یہاں پر اس کی تشریح اور خاص قوتِ ذائقہ کا بیان کیا جائے گا۔

زبان کا قاعدہ یعنی چوڑا عصبہ جو تیجے کو مائل ہے۔ چند عضلات کے ذریعے عظم لامی (ہائی آئیڈ بون) سے اور عشاء مخاطی کی تین جھلّیوں کے ذریعے غضروف بکی سے چسپاں ہے۔ اس کے پہلو کی کناروں سے غشاء مخاطی پلٹ کر مسوڑھوں پر استر لگاتی ہے۔ اور اس کی ایک جھلّی اس کی زیرین سطح پر پائی جاتی ہے۔ جس کو لگام زبان (قیدِ اللسان۔ فریم لنگوئی) کہتے ہیں اسی کے ذریعے زبان نچلے جبڑے سے جڑی ہوئی ہے۔ زبان کی ساخت میں چار یا پانچ عضلات ہوتے ہیں۔ زبان کی دو نیم شکل جانبی حصے ہوتے ہیں۔ جن کے درمیان لفیفہ دار جھلّی (فاصل لیفی۔ فائبرس سیپٹم) کا ایک پردہ ہوتا ہے۔ ہر ایک نصف حصہ نیچے کی طرف موٹا لیکن سامنے پتلا ہوتا ہے۔ اور اس میں عضلاتی ریشے چربی اور عروق و اعصاب پائے جاتے ہیں۔ زبان کے اوپر بلغمی جھلّی (غشاء مخاطی میوکس ممبرین) چڑھی ہوتی ہے جلد کی طرح زبان کی اس جھلّی کے بھی اندرونی اور بیرونی دو پرت ہوتے ہیں۔ اندرونی پرت میں عروق و اعصاب پھیلے ہیں۔ اس جھلّی کے دو پرت ہونے کے سبب ہی جلد کی طرح زبان پر بھی مرض حکۃ اللسان (اکتھی اوسس لنگوئی) اور تقشر اللسان (سورائی سس لنگوئی) پیدا ہو جاتا ہے۔ زبان کی اس جھلّی پر چھوٹے چھوٹے خانوسی ابھار (حلیمات پے پلی) ہوتے ہیں۔ جن کی وجہ سے زبان کھردری معلوم ہوتی ہے۔ یہ ابھار تین قسم کے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہوتے ہیں (۱) **خندقی اُبھار** (حلیمات مخندقہ۔ سرکم ویلیٹ پیپلی) یہ آٹھ دس ذرا بڑے بڑے اُبھار ہوتے ہیں جو اس شکل (د ا) میں زبان کے پچھلے حصے پر واقع ہیں ہر اُبھار کے گرد ایک خندق یا نالی ہوتی ہے۔ ان اُبھاروں کے اندر ذائقہ کے سیلز کا مجموعہ ہوتا ہے (۲) **فطری اُبھار** (حلیمات فطریہ۔ فنگی فارم پیپلی) یہ فطر یا کھنب کی شکل کے متوسط اُبھار جو تعداد میں زیادہ اور رنگت میں سرخ ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک اور پہلوؤں پر واقع ہوتے ہیں۔ اور اس کے درمیان میں بہت کم ہوتے ہیں (۳) باریک اُبھار (حلیمات خیطیہ فائلی فارم پیپلی) خیطہ یعنی دورے کی مانند باریک باریک ابھار بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور زبان کی تمام سطح پر پائے جاتے ہیں۔ یہ شکل میں لمبے لمبے نکیلے ہوتے ہیں۔ اور گوشت خور حیوانات مثلاً کتے، بلی اور شیر وغیرہ میں یہ نسبتاً سخت ہوتے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ ابھار ذائقہ کے لیے نہیں۔ بلکہ زیادہ تر صفائی کے کام آتے ہیں۔ چنانچہ مذکورہ حیوانات اپنی زبان کے ساتھ ہی اپنے جسموں کو چاٹ کر صاف کر لیتے ہیں۔

اعصاب۔ زبان کے ہر ایک حصے میں یہ تین اعصاب آتے ہیں (۱) پانچویں دماغی عصب کی شاخ ذوقیہ جو زبان کے سامنے دو ثلث حصوں کے اُبھاروں اور اس کی نوک کے پہلوؤں میں ختم ہوتی ہے یہ معمولی عصب حس ہے (۲) عصب لسانی د حلقی (گلاسوفیرنجیل) کی شاخ لسانی جو زبان کی جڑ اور اس کے دونوں پہلوؤں کی غشاء مخاطی اور بڑے حلیمات یا ابھاروں میں پھیلتی ہے۔ یہ زبان کی قوت حس و قوت ذائقہ بخشتی ہے (۳) زبان کا نچلا عصب (عصب تحت اللسانی۔ ہائپوگلاسل نرو) زبان کے عضلات میں پھیلتا ہے اور ان کو قوت حرکت دیتا ہے۔ زبان کے پہلے دونوں اعصاب میں قوت لامسہ و قوت ذائقہ دونوں ہوتی ہیں۔ مگر تیسرے عصب میں فقط قوت محرکہ ہوتی ہے جس مدد سے زبان کے عضلات متحرک ہوتے ہیں۔

ماہیت ذائقہ (یعنی ذائقہ کس طرح محسوس ہوتا ہے)

زبان کی جڑ اس کی نوک اور کناروں پر جو پیپلی یعنی چھوٹے چھوٹے اُبھار ہوتے ہیں۔ ان کے پہلوؤں پر اپنی تھیلی سیلز کے خاص مجموعے لگے ہوتے ہیں۔ جن کو شگوفہائے ذائقہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(ٹیسٹ بڈز) کہتے ہیں۔ ہر ایک شگوفۂ ذائقہ میں اپی تھیلیل سیلز کا ایک خاص مجموعہ ہے۔ جن کے نہایت اندرونی کیسوں سے نازک زوائد نکل کر شگوفہ کی بیرونی سطح پر آتے ہیں۔ انہیں شگوفہائے ذائقہ (ٹیسٹ بڈز) میں قوتِ ذائقہ ہوتی ہے۔ کیونکہ ان میں حسّی اعصاب کی شاخیں ختم ہوتی ہیں۔ چنانچہ جب کوئی چیز چکھی یا کھائی پی جاتی ہے۔ تو اس کے ذرات کے ان شگوفہائے ذائقہ کو مس کرنے سے ان پر جو تحریک کا اثر ہوتا ہے۔ وہ حسّی اعصاب کے ذریعے دماغ کو جاتا ہے۔ پس اس طرح سے دماغ کو ذائقہ کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن احساسِ ذائقہ کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جس چیز سے ذائقہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ چیز محلول کھلی ہوئی ہو۔ یا منہ میں گھل جائے۔ ورنہ اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ یعنی مزہ دار چیزوں کو منہ کی رطوبت میں محلول ہونا چاہیے۔ ورنہ کسی قسم کا مزہ معلوم نہیں ہوتا۔ البتہ قوتِ لامسہ کا فعل جاری رہتا ہے۔ اسی لیے جب زبان اور حلق خشک ہوتے ہیں۔ تو کسی قسم کا مزہ معلوم نہیں ہوتا۔

اقسامِ ذائقہ: ذائقہ یا مزہ چار قسم کا ہوتا ہے (۱) میٹھا جس کو فارسی میں شیریں عربی میں حلو اور انگریزی میں سویٹ کہتے ہیں (۲) کھٹا جس کو فارسی میں ترش۔ عربی میں حامض اور انگریزی میں شور کہتے ہیں (۳) سلونا جس کو فارسی میں نمکین عربی میں مالح اور انگریزی میں سالٹی کہتے ہیں (۴) کڑوا جس کو فارسی میں تلخ عربی میں مُرّ اور انگریزی میں بٹر کہتے ہیں۔ یہ چاروں اصلی ذائقے کہلاتے ہیں۔ ان کے علاوہ دو اور ذائقے بھی ہیں۔ ایک سوہانا یا کھٹا جس کو فارسی میں زمخت عربی میں عفص اور انگریزی میں اسٹرنجنٹ کہتے ہیں۔ اور دوسرے چٹ پٹا جس کو فارسی میں تیز مزہ عربی میں حرّیف اور انگریزی میں پنجنٹ کہتے ہیں۔ لیکن یہ اصلی ذائقے نہیں ہوتے۔ بلکہ یہ اصلی ذائقوں کے ساتھ دیگر احساساتِ لمسی کے ترکیب سے پیدا ہوتے ہیں۔

میٹھا ذائقہ زبان کی نوک پر زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اور کڑوا ذائقہ زبان کے پچھلے حصے پر زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ترش ذائقہ و نمکین ذائقہ زبان کے کناروں پر خوب محسوس ہوتا ہے۔ زبان کے درمیانی حصے میں قوتِ ذائقہ بہت کم ہوتی ہے۔

قوتِ ذائقہ وشامہ: مذکورہ بالا چاروں اصلی ذائقوں کے علاوہ بعض اور ایسے احساسات بھی ہیں۔ کہ جن کو بھی ہم ذائقہ یا مزہ (فلیور) سے تعبیر کرتے ہیں لیکن وہ درحقیقت

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

قوت شامہ کے احساسات ہوتے ہیں۔ جس سے ان دونوں قوتوں میں ارتباط ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً پیاز کا مزہ درحقیقت اُس کی اس بُو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو کہ ناک کے ذریعے آتی ہے۔ اور یہ بات اس طرح سے ثابت ہو سکتی ہے۔ کہ اگر ہم ناک کو بند کر لیں یا ہمیں سخت زکام ہو جس سے عارضی طور پر قوت شامہ زائل ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہماری قوتِ ذائقہ بھی زائل ہو جاتی ہے کیونکہ ایسی صورت میں ہم پیاز کے مزہ کو سیب کے مزہ سے تمیز نہیں کر سکتے۔ لیکن ناک کو بند کرنے یا زکام وغیرہ سے اصلی ذوائق کا احساس زائل نہیں ہو جاتا۔ البتہ کسی قدر کم ضرور ہو جاتا ہے یعنی اگر ناک بند ہو تو چیزوں کا مزہ اچھی طرح معلوم نہیں ہوتا جس سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ قوتِ ذائقہ اور قوت شامہ میں باہمی ارتباط ہے کیونکہ جس وقت یہ دونوں قوتیں باہم عمل کرتی ہیں۔ تو مزے کا احساس پورے طور پر ہوتا ہے۔

شرائطِ ذائقہ کسی چیز کا ذائقہ چکھنے کے لیے یہ تین شرائط ہیں (۱) ایسے اعصاب کا ہونا جن میں قوت ذائقہ ہو (۲) اُن اعصاب ذائقہ کا مزیدار مواد سے متاثر ہونا یعنی اُن کا ایسے مواد سے متاثر ہونا جن میں کسی قسم کا مزہ ہو (۳) جن مقامات میں قوتِ ذائقہ ہوتی ہے۔ ان کی رطوبات میں ان مواد کا محلول ہونا۔ اگر ان میں سے کوئی شرط پوری نہ ہو تو پھر ذائقہ محسوس نہیں ہو سکتا۔

مقامِ ذائقہ قوتِ ذائقہ زیادہ تر زبان اور حلق میں ہوتی ہے۔ زبان کی ساخت میں زیادہ تر عضلات ہیں۔ جن پر غشاءِ مخاطی محیط ہے۔ اس جھلی میں بلغمی رطوبت خارج کرنے والی گلٹیاں (لنکواں میوکس گلینڈ) بکثرت ہوتی ہیں۔

علاوہ ازیں قوتِ ذائقہ نرم تالو۔ غلصمہ۔ کوّے۔ لوزتین اور حلق کے بالائی حصّے میں بھی ہوتی ہے۔ عصب لسانی و حلقی کی شاخیں زبان کی جڑ اور اس کے پچھلے حصّے میں قوت ذائقہ بخشتی ہیں۔ اور پانچویں عصب کی شاخ زبان کے اگلے حصّے میں قوتِ ذائقہ بخشتی ہے۔

قوت ذائقہ و قوت لامسہ زبان میں قوتِ ذائقہ کے علاوہ قوتِ لامسہ یعنی چھونے کی قوت بھی ہے۔ اور یہ زیادہ اس کے کناروں اور نوک میں ہوتی ہے جس سے وہ سردی۔ گرمی۔ درد اور دباؤ وغیرہ کا احساس کر لیتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کہ زبان کی قوتِ لامسہ جاتی رہتی ہے۔ اور قوتِ ذائقہ قائم رہتی ہے۔ اسی طرح کبھی قوتِ ذائقہ زائل ہو جاتی ہے۔ اور قوتِ لامسہ قائم رہتی ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں حصّوں کے اعصاب جُدا جُدا ہوتے ہیں۔ اگرچہ دونوں قسم کے اعصاب زبان کے اُبھاروں (حلمات پے پلی) میں اکٹھے رہتے ہیں۔ زبان میں مذکورہ بالا دونوں اعصاب ذائقہ و لامسہ اپنے مختلف ریشوں کے ذریعے چکھنے و چھونے کی قوتیں بخشتے ہیں۔ تریف یعنی تیز مزہ یا چٹپٹی چیزوں سے بہ دونوں قسم کے اعصاب متاثر ہوتے ہیں۔

زبان کے دیگر حصّوں کی نسبت اس کی نوک میں قوتِ لامسہ یا حِس زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے زبان کی نوک کی بیماری میں عصب لسانی کی خراش کے سبب کان میں درد محسوس ہوتا ہے۔

تغیرِ ذائقہ: قوتِ ذائقہ کے اعصاب میں مختلف مزے کی چیزیں مختلف طور پر تغیر پیدا کرتی ہیں۔ جن سے مختلف مزے معلوم ہوتے ہیں۔ اور بعض چیزیں دوسری چیزوں کے مزوں کو بدل دیتی ہیں۔ مثلاً مٹھائی کا ذائقہ شراب کے ذائقے کو خراب کر دیتا ہے لیکن پنیر کا ذائقہ اُسے بہتر بنا دیتا ہے۔ بعض چیزوں سے فسادِ ذوق ہو جاتا ہے مثلاً گرمارلوئی کے چبانے سے کچھ دیر کے لیے مٹھائی کا ذائقہ زائل ہو جاتا ہے۔

قیامِ ذائقہ: بعض چیزوں کا مزہ اُن کے کھانے پینے کے بعد بھی دیر تک قائم رہتا ہے اور ایسی صورت میں اگر دوسری چیزیں چکھی جائیں۔ تو اُن کا مزہ بخوبی معلوم نہیں ہوتا ایک چیز جب بار بار چکھی جاتی ہے۔ تو اسکا ادراک کم ہوتا جاتا ہے۔

ذائقہ باطنیہ: اگرچہ ذائقہ ہمیشہ کھانے پینے کی چیزوں سے محسوس ہوتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ صرف اندرونی اعصاب سے ہی مزے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ اندرونی اسباب دماغی مرکز ذائقہ یا اعصاب ذائقہ میں مخصوص تغیرات پیدا کرتے ہیں مثلاً اجتماعِ خون سے کبھی مختلف ذائقے معلوم ہوتے ہیں۔ جب برقی قوت کی خفیف رَو سے اعصاب ذائقہ میں تحریک پہنچائی جاتی ہے۔ تو خاص قسم کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح جب زبان کے مخصوص اُبھاروں (حلمات) کو ٹھکرایا جاتا ہے۔ تب بھی ایک قسم کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے اور جب تالو یا حلق کا بالائی حصّہ سہلایا جاتا ہے تو متلی آتی ہے جو قوتِ ذائقہ کے احساس کی ایک قسم ہے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جلد وقوتِ لامسہ

پہلے جلد کی تشریح اور اس کے متعلقات کا بیان کیا جائے گا۔ اور پھر قوت لامسہ کا

جلد کے فوائد: (۱) جلد قوتِ لامسہ کا خاص آلہ ہے (۲) یہ تمام جسم کا غلاف بناتی ہے۔ جس سے اندرونی اعضاء کی حفاظت ہوتی ہے (۳) یہ پسینے کے ذریعے فضلات بدنی کو خارج کر کے خون کو صاف کرتی ہے۔ (۴) یہ حرارت عزیزی یعنی حرارت بدن کو اعتدال پر قائم رکھتی ہے (۵) یہ اپنے مسامات کے ذریعے پانی وغیرہ سے بدن کو رطب کرتی ہے۔

ہتھیلی اور تلوے کی جلد تمام کے دیگر حصص کی جلد کی نسبت موٹی ہوتی ہے پپوٹے نطفے اور قضیب کی جلد نہایت پتلی اور نازک ہوتی ہے۔ عورتوں کی نسبت مردوں کی جلد اور بچوں کی نسبت جوانوں کی جلد موٹی ہوتی ہے۔ پشت کی جلد جسم کے سامنے حصے کی نسبت اور بازوؤں کی باہر والی سطح کی جلد انکی اندرونی سطح کی نسبت موٹی ہوتی ہے۔

جلد کی ساخت: جلد کی ساخت میں دو طبقات ہوتے ہیں۔ ایک بالائی طبقہ جسے عربی میں بشرہ اور انگریزی میں ایپی ڈرمس کہتے ہیں۔ اور دوسرا زیریں طبقہ جسے عربی میں ادمہ اور انگریزی میں ڈرمس کہتے ہیں:

جلد کا بالائی طبقہ (بشرہ، ایپی ڈرمس) یہ طبقہ جلد کے عمیق طبقہ کو پوشیدہ کر کے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ طبقہ سینگ کی مانند چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنتا ہے۔ جو ہمیشہ گھس گھسا کر اترتے رہتے ہیں۔ اور انکی بجائے اور نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ جلد کے اس طبقہ کی موٹائی مختلف مقامات پر مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً ہتھیلیوں اور تلوؤں میں نسبتاً بہت موٹی اور پپوٹوں وغیرہ میں بہت باریک ہوتی ہے۔ خوردبین سے جلد کے بالائی طبقہ کی سطح پر نہایت باریک بیشمار سوراخ دکھائی دیتے ہیں جنہیں مسامات کہتے ہیں۔ یہ درحقیقت پسینے کی چھوٹی غدد کی نالیوں کے سوراخ ہوتے ہیں۔ اس طبقہ کا گہرا حصہ جو سچی جلد کے ساتھ ملا رہتا ہے۔ قدرے ملائم اور خانہ دار ساخت کا ہوتا ہے۔ اس طبقہ کے اس حصے میں رنگیں مادے کے ذرات ہوتے ہیں۔ جن پر جلد کی رنگت کا انحصار ہوتا ہے۔ یعنی اسی سے زنگی و فرنگی اور کالے گورے ہوتے ہیں۔

جلد کا عمیق طبقہ (ادمہ ڈرمس) یہ خانہ دار اور ریشہ دار ساخت سے بنا ہوا ہوتا ہے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جس میں خونی عروق اور عصبی ریشے بھی ہوتے ہیں۔ یہ طبقہ سخت اور لچکیلا ہوتا ہے۔ اور اندرونی اعضاء کو بیرونی صدمات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس طبقہ کے بھی دو حصے ہوتے ہیں۔ نیچے والے حصے میں چربی کے ذرات۔ پسینہ اور چربی پیدا کرنیوالے غدود اور بالوں کی جڑوں کے نشیب ہوتے ہیں۔ اس حصے میں مختلف مقامات پر تحمۂ عضلاتی ریشے بھی پائے جاتے ہیں۔ جن کے باعث سردی وغیرہ لگنے سے جلد سکڑ جاتی ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طبقہ کے بالائی حصے میں نالوسی شکل کی بیشمار چھوٹی چھوٹی بلندیاں ہوتی ہیں۔ جو قوتِ لامسہ کا خاص آلہ ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی بلندیوں میں حسّی اعصاب کی شاخیں ختم ہوتی ہیں۔ جس کے زیادہ حسّی دار مقامات کی بلندیوں جسامت میں بڑی لمبی اور گنجان ہوتی ہیں۔ مثلاً ہتھیلیوں اور انگلیوں کے سروں اور پاؤں کے تلوؤں میں اور جس جگہ کی حس کم ہوتی ہے۔ وہاں یہ بلندیاں بھی چھوٹی اور کھری ہوتی ہیں۔ اور منہ کی مذکورہ بالا بعض عصبی بلندیوں میں حسّی اعصاب کی شاخیں ایک بیضوی صورت میں ختم ہوتی ہیں جن کو اصطلاح میں لمسی کیسے (جسمیات لمسہ ٹیکٹائل کارپسکلز یا ٹچ اینڈ آرگنز) کہتے ہیں۔ ان لمسی کیسوں کے علاوہ حسّی اعصاب کے بعض نہایت ہی باریک ریشے بشرہ۔ اپی ڈرمس کے بعض کیسوں میں بھی ختم ہوتے ہیں۔ بہر صورت حسّی اعصاب کے اختتامی سروں پر جلد کا بالائی پرت (بشرہ) ضرور ہوتا ہے کیونکہ اگر کوئی چیز براہ راست اعصاب کی شاخوں کو مس کرے تو بجائے لمس کے درد کا احساس ہوتا ہے۔

مُلحقات جلد

جلد کے ملحقات چار ہیں (۱) بال (۲) ناخن (۳) پسینے کے غدد (۴) چکنائی کے غدود

(۱) بال۔ ہتھیلیوں۔ تلوؤں اور پپوٹوں وغیرہ کے سوا جسم کی کل سطح پر بال ہوتے ہیں۔ ہر ایک بال کی جڑ حقیقی جلد کے نشیب میں رہتی ہے۔ جہاں خون کے باریک عروق سے بال کی پرورش ہوتی ہے۔ ہر ایک بال کھردرا، چپٹا اور درمیان سے سوراخدار ہوتا ہے۔ جس میں رنگین مادے اور ہوا کے اجزاء ہوتے ہیں۔ سیاہ بالوں میں رنگین مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور سفید بالوں میں ان کے درمیانی سوراخوں میں ہوا کے چھوٹے چھوٹے بلبلے ہوتے ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(۲) **ناخون**۔ یہ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے اخیر پوروں پر لگے رہتے ہیں۔ ہر ایک ناخن پھلکدار چپٹا اور ذرا ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ ناخنوں کے نیچے والی نیچی جلد میں ذرا بڑی بڑی بلندیوں کی قطاریں ہوتی ہیں۔ انہیں بلندیوں سے ناخن اپنی پرورش کے لیے خون جذب کرتا ہے۔ اگر ناخن کے گرجانے پر یہ بلندیاں کسی طرح سے خراب یا ضائع ہوجائیں تو پھر ناخن دوبارہ پیدا نہیں ہوسکتا ہر ایک ناخن کی جڑ جلد کے نیچے ہوتی ہے۔ ناخن سے انگلیوں کی گرفت میں تقویت حاصل ہوتی ہے (۳) **پسینے کے غدود** (غدد عرقیہ۔ سویٹ گلینڈز) یہ غدود چھوٹے چھوٹے گول اور سرخ رنگ کے ہوتے ہیں اور خفتی جلد کے گہرے حصے میں رہتے ہیں ہر ایک غدود کی نالی پیچیدہ مار سے جلد کی بالائی سطح پر پہنچکر ختم ہوتی ہے۔ غدود خون سے کثیف اجزاء کو جذب کرکے پسینے کی صورت میں خارج کرتے ہیں (۴) چکنائی کے غدود (غدد شحمیہ۔ سیشی ئس گلینڈز) یہ غدود بھی چھوٹی چھوٹی تھیلی کے مانند ہوتے ہیں اور نیچی جلد میں رہتے ہیں یہ سر اور چہرے کی جلد میں بکثرت ہوتے ہیں لیکن ہتھیلیوں میں بالکل نہیں ہوتے ان غدودوں کی نالیاں بالوں کی جڑ کے نزدیک اوپر جلد میں ختم ہوتی ہیں ان غدودوں سے سفید اور چکنی رطوبت پیدا ہوکر جلد کو چکنا رکھتی ہے۔

جلد کے فضلات۔ جلد ایک تو راہ مسامات پسینہ خارج کرتی ہے۔ اور دوسرے روغنی مواد خارج کرتی ہے۔ ان دونوں کیلئے علیحدہ علیحدہ گلٹیاں ہوتی ہیں جن کا بیان اوپر کیا گیا۔

پسینہ (عرق۔ سویٹ) پسینہ خاص گلٹیوں سے خارج ہوتا ہے یہ عموماً اسقدر کم اور آہستہ بنتا ہے کہ اس کے آبی اجزاء جلد تک پہنچ کر بخارات کی شکل میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ اور نامعلوم طور پر اڑکر غائب ہوجاتے ہیں البتہ شدت ریاضت یا بیرونی حرارت کے وقت یا بعض امراض میں جبکہ بخارات کو اڑنے سے روکا جائے تو پسینہ سطح جلد پر قطاط کی شکل میں جمع ہوکر بہنے لگتا ہے پسینہ کیساتھ جلد کے دیگر مواد و رطوبت بھی مخلوط ہوجاتے ہیں لیکن زیادہ تر اس میں پانی اور اجزاء پسینہ کیساتھ ہوتے ہیں پسینہ کے کچھ اجزاء تو بخارات بن کر اڑجاتے ہیں لیکن کچھ اجزاء روغنی مواد کیساتھ مل کر جم جاتے ہیں جسکو میل کہتے ہیں یہ اندازہ کیا گیا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں تقریباً بارہ تیرہ چھٹانک پانی جلد سے بذریعہ بخارات خارج ہوجاتا ہے۔ اور تقریباً آٹھ چھٹانک بذریعہ تنفس بشکل بخارات خارج ہوجاتا ہے۔

انجذاب بذریعہ جلد۔ تجربات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جلد کے ذریعہ پانی کسی قدر منجذب ہوسکتا ہے۔ چنانچہ شدت پیاس میں غسل کرنے سے یا جسم پر چادر لپیٹنے سے تسکین ہوجاتی ہے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جلد بعض قسم کی ہواؤں کو بھی جذب کر لیتی ہے اور بعض معدنی دوائیں بھی جلد کے ذریعے خون میں جذب ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ مرض آتشک میں سیماب کی مالش سے وہ خون میں جذب ہو کر اپنا اثر کرتا ہے وغیرہ۔ لیکن آج کل اکثر امراض میں ڈاکٹر صاحبان اکثر دواؤں کے لطیف جوہر زیر جلد پچکاری (زراقہ تحت الجلد۔ ہائپوڈرمک سرنج) کے ذریعے استعمال کرتے ہیں۔

قوتِ لامسہ یعنی چھونے کی قوت

مقام قوتِ لامسہ۔ دیگر حواس کی طرح قوتِ لامسہ (حسِ لامسہ) جسم کے کسی خاص مقام کے ساتھ مخصوص و محدود نہیں بلکہ یہ جسم کے ان تمام مقامات میں پائی جاتی ہے۔ جو کہ معمولی احساس سے کسی تحریک کا ادراک کرتے ہیں کیونکہ قوتِ لامسہ درحقیقت عام قوتِ حس کی متغیر امتیازی صورت ہے اور جن اعصاب پر اس قوت کا انحصار ہے۔ وہ وہی اعصاب ہیں جو جسم کے مختلف حصص کو عام قوتِ حس دیتے ہیں یعنی وہ اعصاب جو حرام مغز کی پچھلی جڑوں سے شروع ہوتے ہیں۔ نیز دماغی اعصاب حس جن کے ذریعے بھی قوتِ لامسہ جسم کے مختلف مقامات میں حاصل ہوتی ہے۔ یہ قوت جلد، زبان اور دونوں ہونٹوں میں نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ ان مقامات میں مذکورہ بالا فانوسی بلندیاں (حلیمات۔ پیپلی) جن میں اعصاب کی شاخیں پھیلتی ہیں بکثرت ہوتی ہیں۔ ناخنوں اور دانتوں کے ذریعے بھی ایک عجیب اور خاص قسم کی حسِ لامسہ کا احساس ہوتا ہے۔ کسی حد تک بالوں خصوصاً پلک کے بالوں کے ذریعہ بھی اس حس کا احساس ہوتا ہے۔

اندازہ شکل و مقدار اجسام۔ قوتِ لامسہ کے ذریعے ہی عقل کو اجسام کی مقدار، ان کی شکل اور ان کی بیرونی صفات معلوم ہوتی ہیں۔ اسی لیے قوتِ لامسہ ان مقامات میں زیادہ ہوتی ہے۔ جو مختلف اجسام پر زیادہ آسانی سے پھرائے جا سکتے ہیں چنانچہ ہاتھ اس کام کے لیے نہایت موافق و موزوں ہیں۔

یہ بتایا جا چکا ہے۔ کہ جلد کے دو طبقات ہوتے ہیں۔ اور اس کے زیریں طبقہ میں بہت سے چھوٹے چھوٹے ابھار ہوتے ہیں جن کو عربی حلیمات اور انگریزی میں پیپلی کہتے ہیں۔ ان ابھاروں میں قوتِ لامسہ کے عصبی ریشے یا تو شاخ در شاخ ہو کر جال بناتے ہیں۔ یا باریک عصبی ریشے ان ابھاروں کے اندر ختم ہوتے ہیں لیکن کبھی عصبی ریشوں کے اختتامی سرے پھیل کر بیضوی صورت میں ختم ہوتے ہیں۔ جن کو لمسی کیسے (حلیمات لمسیہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ٹیکٹائل کارپسکلز کہتے ہیں۔ ایسے لمسی کیسے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور زبان کی نوک میں زیادہ ہوتے ہیں۔ جہاں کہ قوت لامسہ بھی تیز ہوتی ہے ؛

ماہیت لامسہ یعنی احساس لمس کیونکر ہوتا ہے ؟ جب کوئی چیز جلد کے ساتھ چھوتی ہے تو اس کی شکل کی بے شمار چھوٹی چھوٹی بلندیوں میں بطور لمسی کیسوں کے ہوتی ہیں اس حس کا احساس فوراً دماغ تک پہنچ جاتا ہے ؛

اختلاف قوت لامسہ جسم کے مختلف مقامات کی جلد میں قوت لامسہ کم وبیش ہوتی ہے۔ چنانچہ انگلیوں کے سروں بالخصوص انگشت شہادت اور چھوٹی انگلی کے سروں پر یہ نہایت تیز ہوتی ہے۔ اور جن مقامات کی جلد موٹی ہوتی ہے۔ یا جہاں عصبی شاخیں کم ہوتی ہیں وہاں کی حس لامسہ بھی کم ہوتی ہے۔ مثلاً ایک پرکار کے دونوں سروں کو باہم ملا کر کہ جن میں ۱/۱۰ انچ کا فاصلہ ہو۔ زبان کی نوک پر لگائیں۔ تو دونوں سرے محسوس ہوں گے۔ اور اگر ان میں ۱/۲ انچ کا فاصلہ ہو اور انکو انگلی کی نوک پر لگائیں۔ تب بھی انکی دونوں نوکیں محسوس ہوں گی۔ لیکن ان کو ہاتھ یا بازو کی پشت پر لگائیں۔ تو دو کی بجائے صرف ایک ہی نوک محسوس ہوگی۔ اور اگر ان کا درمیانی فاصلہ تین انچ بڑھا کر پھر ان کو پشت کے کئی مقام پر لگایا جائے تو بھی بجائے دو نوکوں کے صرف پرکار کی ایک نوک کا ہی احساس ہوگا۔ اس سے صاف ظاہر ہے۔ کہ جلد کے مختلف مقامات پر قوت لامسہ کم وبیش ہوتی ہے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ قوت لامسہ کے لیے مختلف قسم کے اعصاب ہوتے ہیں۔ جو مختلف قسم کے احساسات کو محسوس کرتے ہیں۔ مثلاً گرمی سردی کا احساس۔ سختی نرمی کا احساس۔ دکھ درد کا احساس اور دباؤ یا وزن کا احساس وغیرہ ؛

یونانی اطباء نے تو اس قسم کے سردی گرمی وسختی نرمی وغیرہ کے احساسات کو قوت لامسہ کی تحت میں ہی مانا اور بیان کیا ہے۔ اور اگرچہ موجودہ ڈاکٹران یورپ بھی انکو قوت لامسہ کے اقسام ہی شمار کرتے ہیں۔ لیکن تسہیل بیان کے لیے اس قسم کی احساسات کو مختلف ناموں سے نامزد کر دیا ہے۔ جن کو ہم بھی ذیل میں بیان کیے دیتے ہیں ؛

(۱) حس حرّی (تھرمل سینس سے شن) یہ وہ حس ہے کہ جس کے ذریعے گرمی وسردی کا احساس ہوتا ہے ؛

(۲) حس الٰمی (ڈولورس سینس سے شن) یہ وہ حس ہے کہ جس کے ذریعے درد والم کا احساس

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہوتا ہے۔ جلد کے مختلف مقامات پر گرمی سردی اور درد کا احساس بھی کم وبیش ہوتا ہے۔ بلکہ بعض خاص خاص مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن پر صرف گرمی یا صرف سردی یا صرف درد کا احساس ہوتا ہے چنانچہ ایسے مقامات کو جن پر صرف گرمی کا احساس ہوتا ہے انگریز ہیٹ سپارٹ کہتے ہیں اور جن پر صرف سردی کا احساس ہوتا ہے انکو کولڈ سپاٹ اور جن پر صرف درد کا احساس ہوتا ہے انکو پین سپاٹ کہتے ہیں۔ گرمی سردی کے احساس کا حِس کلائی کی جلد اور رخساروں پر نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لئے بعض لوگ معمولی گرم چیزوں کے درجہ حرارت کو گال پر رکھ کر محسوس کیا کرتے ہیں۔

کسی گرم یا سرد چیز کے چھونے سے چونکہ جلد کی طبعی حرارت میں تغیر آجاتا ہے اسلیے گرمی یا سردی کا احساس ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر ایک ہاتھ کو برفاب یا سرد پانی میں ڈال کر سرد کرلیں اور دوسرے ہاتھ کو گرم آب یا گرم پانی میں ڈالکر گرم کرلیں۔ اور پھر دونوں ہاتھوں کو نیم گرم یا گنگنے پانی میں ڈالیں تو وہ نیم گرم پانی سرد ہاتھ کو گرم اور گرم ہاتھ کو سرد معلوم ہوتا ہے اسی طرح جسم کو گرم ہوا لگنے کے بعد جب اس سے کم درجہ کی گرم ہوا لگتی ہے تو وہ سرد معلوم ہوتی ہے۔ ایسا ہی اگر سردی سے فوراً اٹھ کر اس سے کم درجہ کی سردی میں آئیں تو گرمی معلوم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حرارت اور برودت کو امور اضافیہ میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ کیونکہ بعض حالات میں جو چیز سرد معلوم ہوتی ہے۔ وہ چیز دوسرے حالات میں گرم محسوس ہوتی ہے۔ اس قسم کے احساسات حسی اعصاب کے خاص قسم کے انتہائی سروں کے ذریعے ہی محسوس ہوتے ہیں کیونکہ خود جرم اعصاب پر گرمی یا سردی کے لگانے سے درد کا احساس ہوتا ہے۔

(۳) حِس ثقل یا حِس عضلی (مسکولر سینس) یہ وہ حِس ہے جس کے ذریعے دباؤ یا وزن کا احساس ہوتا ہے۔ اسی حِس کی وجہ سے ہم اپنے جسم میں حرکت محسوس کرتے ہیں۔ یعنی جب جسم کا کوئی حصہ حرکت کرتا ہے۔ تو فوراً معلوم ہوجاتا ہے۔ کہ کونسا حصہ حرکت کررہا ہے اسی حس کی وجہ سے کسی چیز کا وزن معلوم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک ہاتھ میز پر رکھا ہو۔ اور اسکی ہتھیلی پر ایک وزن رکھ دیا جائے تو اس سے دو قسم کا احساس ہوتا ہے ایک تو اس چیز کے چھونے کا اور دوسرے اس کے وزن کے دباؤ کا۔ چنانچہ اس دباؤ کی مقدار سے ہم ہاتھ کو ہلائے بغیر بھی اس چیز کے وزن کا کسی قدر اندازہ کرسکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس چیز کو ہاتھ پر اٹھا کر اس کے وزن کا اندازہ کریں۔ تو ہم نسبتاً بہتر اندازہ کرسکتے ہیں۔ کیونکہ جس قدر

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

حرکت اس کے اٹھانے میں کی جاتی ہے۔ اس حرکت سے اس کے وزن کا اندازہ کیا جاتا ہے چونکہ اشیاء کے اوزان کا اندازہ درحقیقت عضلاتی طاقت سے ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو حس عضلی کہنا زیادہ مناسب اور بجا ہے۔ لیکن متقدمین اطباء نے اسکو حس لامسہ سے علیحدہ بیان نہیں کیا۔

(۴) حس حسّی (دسٹرل سین سے ٹن) یہ وہ حس ہے جس کے ذریعے اعضاء اندرونی کی حسی تحریکات مثلاً بھوک پیاس بے چینی یا غشی وغیرہ کا احساس ہوتا ہے جسم کے تمام احشاء یعنی اندرونی اعضاء میں حس بہت کم ہوتی ہے مثلاً معمولی حالت میں اپنے دلکی حرکت خود کسی شخص کو محسوس نہیں ہوتی۔ ایسا ہی تمام اعضاء اندرونی جب معمولی حالت میں اپنے طبعی افعال انجام دیتے ہیں۔ تو اُن سے سوا حسی تحریکات مثلاً بھوک پیاس وغیرہ کے اور کسی قسم کی حس پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن بعض غیر طبعی حالات میں ان اعضاء اندرونی سے بھی کچھ احساسات محسوس ہوتے ہیں۔ مثلاً خفقان یا اختلاج قلب کی حالت میں دلکی دھڑکن محسوس ہوتی ہے یا کسی عضو اندرونی کے ورم کی حالت میں اس میں درد محسوس ہوتا ہے۔

لامسہ باطنیہ و وہمیہ۔ دیگر حواس کی طرح قوتِ لامسہ بھی کبھی اندرونی اسباب سے متاثر ہوتی ہے۔ چنانچہ تشریرہ یعنی جھرجھری اور تپ لرزہ کے وقت لرزہ یا کپکپی اور عصبی درد وغیرہ اس قسم کی مثالیں ہیں۔ نیز جس طرح بعض چیزوں کے صرف خیال کرنے سے کبھی متلی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اعضاء میں جو پہلے ہی سے درد کے لیے مستعد ہوتے ہیں۔ صرف درد کا خیال کرنے سے ہی ان میں درد ہونے لگتا ہے۔ اور کبھی مکروہ یا مہیب چیز کے محض تصور سے ہی جسم میں پھریری محسوس ہوتے لگتی ہے۔ بعض لوگوں کو انگلیوں کے اشاروں سے گدگدی محسوس ہوتی ہے وغیرہ۔ اس قسم کے احساسات اکثر وہمی اور خیالی ہوتے ہیں۔

تمت بالخیر

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

a comprehensive text book on

HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY



DR. GHULAM JILANI KHAN

Publishers :-
ADARA-E-TEHQIQAT-E-TIB-E-UNANI
FAISALABAD